

# Caderno de Prova

E06

## Médico (Ginecologia e Obstetrícia)

Dia: 21 de fevereiro de 2010 • Horário: das 15 às 18 h

Duração: 3 horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

**Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.**

### Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova se:

- faltam folhas e a seqüência de questões, no total de 40, está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

**Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.**

### Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado. O gabarito da prova será divulgado no site do concurso.

<http://hu.fepese.ufsc.br>



# Conhecimentos Gerais

(15 questões)

## Texto

O extraordinário sucesso do programa criado por Zilda Arns, em conjunto com o arcebispo de Salvador, dom Geraldo Majella, é inversamente proporcional à complexidade de seus métodos. O trabalho da Pastoral da Criança, pelo qual ela recebeu uma indicação ao Prêmio Nobel, se baseia na adoção, por parte das mães, de medidas simples, mas que podem salvar a vida de seus filhos. A aplicação do soro caseiro (duas colheres de sopa de açúcar e uma de sal dissolvidas em 1 litro de água limpa) em crianças desidratadas e a ingestão da multimistura (farinha que aproveita folhas e grãos) para combater a desnutrição, por exemplo, são métodos de eficácia comprovada há muito tempo. O mérito da Pastoral foi fazer com que **chegassem** a quem precisa. Para isso, o programa se vale do trabalho voluntário – **que** elimina a logística e os gastos envolvidos em pagamentos e outras burocracias – e de uma metodologia antiassistencialista, que ensina as mães a cuidar melhor do desenvolvimento dos filhos em vez de torná-**las** dependentes de uma organização que **o** faça. O baixo custo da ação é outro dado surpreendente. O gasto mensal com cada criança da Pastoral é de apenas 1,70 real. A representante do Unicef no Brasil, Marie-Pierre Poirier, avalia: “O Brasil foi um dos países que tiveram maior redução na mortalidade infantil nos últimos vinte anos. O trabalho da Pastoral da Criança foi fundamental para tanto”.

Simple, barato e eficiente. *Veja*, São Paulo: Abril, ed. 2148, ano 43, nº 3, p. 87, 20 jan. 2010.

Com base no texto e, principalmente, em seu primeiro período, transcrito abaixo, resolva as questões 1, 2, 3 e 4, que seguem, assinalando a alternativa **correta** para cada uma.

“O **extraordinário** sucesso do programa criado por Zilda Arns, **em conjunto com o arcebispo de Salvador, dom Geraldo Majella**, é inversamente proporcional à complexidade de **seus** métodos.”

1. Assinale a alternativa que interpreta **corretamente** este primeiro período.
  - a. ( ) Somente um programa com a alta complexidade metodológica daquele criado por Zilda Arns poderia obter sucesso.
  - b. (X) A complexidade metodológica do programa criado por Zilda Arns é muito menor do que o sucesso por ele alcançado.
  - c. ( ) O programa criado por Zilda Arns é tão complicado metodologicamente quanto o tamanho do sucesso por ele alcançado.
  - d. ( ) O programa criado por Zilda Arns tem enorme sucesso devido à alta complexidade de seus métodos.
  - e. ( ) A complexidade metodológica do programa criado por Zilda Arns é muito maior do que o sucesso por ele alcançado.

---

## 2. Analise o texto abaixo:

O adjetivo “extraordinário”, destacado no período, poderia ser substituído por ..... sem prejuízo gramatical ou de sentido.

Assinale a alternativa que completa **corretamente** a lacuna do texto.

- a. ( ) mágico
- b. ( ) inaceitável
- c. ( ) inexplicável
- d. (X) excepcional
- e. ( ) superestimado

3. O pronome “seus”, em “à complexidade de seus métodos”, refere-se a:

- a. ( ) sucesso.
- b. (X) programa.
- c. ( ) Zilda Arns.
- d. ( ) complexidade.
- e. ( ) o arcebispo de Salvador.

---

4. Assinale a alternativa **correta**.

- a. ( ) O programa desenvolvido por Zilda Arns mostra que ela foi uma cientista renomada.
- b. ( ) Zilda Arns e dom Geraldo Majella foram indicados ao Prêmio Nobel.
- c. ( ) Zilda Arns desenvolveu sozinha o programa da Pastoral da Criança.
- d. ( ) Zilda Arns foi agraciada com o Prêmio Nobel pelo seu trabalho, realizado por meio da Pastoral da Criança.
- e. (X) Zilda Arns recebeu uma indicação ao Prêmio Nobel pelo seu trabalho, realizado por meio da Pastoral da Criança.

---

5. Com relação à regência verbal e à regência nominal, assinale com (C) as frases corretas e com (E) as erradas.

- ( ) Garoto, ajude a seu pai, por favor!
- ( ) A mãe da moça pediu permissão para assistir ao parto.
- ( ) A enfermeira assistiu o cirurgião durante o procedimento.
- ( ) O Papa atendeu os peregrinos.
- ( ) Aquele médico é contrário ao aborto.
- ( ) Aquele empresário tem bens avaliáveis de 3 milhões.

Assinale a alternativa que indica a seqüência **correta**, de cima para baixo.

- a. ( ) C – C – E – E – C – C
- b. ( ) C – E – C – C – E – E
- c. ( ) C – E – C – E – C – C
- d. (X) E – C – C – C – C – E
- e. ( ) E – C – E – C – E – C

6. Considere as afirmativas abaixo, baseadas no texto.

- 1. O programa criado por Zilda Arns se baseia na adoção de medidas simples para combater a desidratação e a desnutrição.
- 2. Para combater a desnutrição, o programa de Zilda Arns prevê a ingestão do soro caseiro.
- 3. Para combater a desidratação, o programa de Zilda Arns prevê a ingestão da multimistura.
- 4. Na frase, sublinhada no texto, “mas que podem salvar a vida de **seus** filhos”, o pronome **seus** refere-se a “mães”.
- 5. A eficácia do programa criado por Zilda Arns é sustentada por dois pilares: trabalho voluntário e metodologia antiassistencialista.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) Estão corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. (X) Estão corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- c. ( ) Estão corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
- d. ( ) Estão corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
- e. ( ) Estão corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.

---

7. Com base no texto, assinale a alternativa **correta**.

Em “O trabalho da Pastoral da Criança foi fundamental para tanto”, a palavra sublinhada pode ser substituída, sem alterar o sentido do texto, por:

- a. (X) isso.
- b. ( ) nós.
- c. ( ) ele.
- d. ( ) aquilo.
- e. ( ) as crianças.

---

8. Assinale a alternativa em que **todas** as palavras estão grafadas corretamente.

- a. ( ) porisso –paralisia – calterização– chapéis
- b. ( ) anorecsia – pedestre – ximpanzé – assepcia
- c. (X) assepsia – acefalia – poluição – mercurocromo
- d. ( ) hidropisia – húmido – paíz – beneficente
- e. ( ) excessão – ultravioleta – diagnóstico – cancerígeno

9. Escreva ( V ) para verdadeiro e ( F ) para falso.

- ( ) O verbo “**chegassem**” refere-se a (ou tem como sujeito) “métodos de eficácia comprovada”.
- ( ) O pronome relativo **que**, em “ – **que** elimina a logística e os gastos...” refere-se a (ou substitui) “programa”.
- ( ) Na frase “em vez de torná-**las** dependentes de uma organização que o faça”, a forma pronominal **las** está substituindo “as mães”.
- ( ) Na oração “que **o** faça”, **o** é um pronome que está substituindo “cuidar melhor do desenvolvimento dos filhos”.
- ( ) Na oração “**que** ensina as mães a cuidar melhor do desenvolvimento dos filhos...”, o pronome relativo **que** refere-se (ou substitui) “metodologia antiassistencialista”.
- ( ) As palavras **extraordinário**, **eficácia** e **água** são acentuadas devido à mesma regra de acentuação gráfica.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. ( ) V – V – V – V – V – V
- b. ( ) F – V – V – F – V – F
- c. ( ) V – F – V – V – V – F
- d. ( ) F – F – V – F – F – F
- e. (X) V – F – V – V – V – V

---

10. Assinale a alternativa **correta**.

Se na frase “O gasto mensal com cada criança da Pastoral é de apenas 1,70 real” substituíssemos **gasto** por **gastos** e **1,70** por **3,00**, a frase ficaria assim:

- a. ( ) Os gastos mensal com cada criança da Pastoral é de apenas 3,00 real.
- b. ( ) Os gastos mensais com cada crianças das Pastorais é de apenas 3.00 real.
- c. (X) Os gastos mensais com cada criança da Pastoral são de apenas 3,00 reais.
- d. ( ) Os gastos mensais com cada criança das Pastorais é de apenas 3,00 reais.
- e. ( ) Os gastos por mês com uma só criança da Pastoral é de apenas 3,00 real.

11. Com relação à concordância nominal, assinale com ( C ) as frases corretas e com ( E ) as erradas.

- ( ) Vossa Excelência está certa. (dirigindo-se a um homem)
- ( ) As cópias seguem anexas.
- ( ) Os alunos estavam quite com a tesouraria da escola.
- ( ) Juliana adora vestidos salmão.
- ( ) Paulo prefere ternos azul-marinho.
- ( ) A garota chegou meia cansada da viagem.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. (X) E – C – E – C – C – E
- b. ( ) E – E – C – E – C – C
- c. ( ) E – E – E – C – C – C
- d. ( ) C – C – C – C – E – C
- e. ( ) C – C – C – E – E – E

---

12. Assinale a alternativa em que as opções 1. e 2. são igualmente **corretas** em relação à concordância verbal.

- a. ( ) 1. O autor do livro é eu.  
2. O que se procurava eram livros raros.
- b. ( ) 1. É proibido fumar neste recinto.  
2. Ginástica matinal é boa para a saúde.
- c. (X) 1. Eu e Paula chegamos muito cedo.  
2. Pediatras são exemplo de paciência.
- d. ( ) 1. Passear, ler e dormir era tudo o que planejava para as férias.  
2. Rir e chorar faz parte da vida.
- e. ( ) 1. Somente 10% das ruas da cidade não ficaram alagadas.  
2. Dos funcionários, 20% não conseguiu chegar ao trabalho.

**13.** Leia atentamente as proposições abaixo.

1. A relação dos aprovados .....  
no anexo.
2. O preço dos cereais ..... sofrer  
novo aumento.
3. As encomendas para a grande festa já  
..... chegando.
4. Foi ..... para julho o início das  
férias de inverno.
5. Prometemos ..... encontrar no bar do  
clube.
6. O governador deixou ..... a  
sua discordância.

Assinale a alternativa que preenche **correta** e sequencialmente as lacunas do texto.

- a. ( X ) está ; deve ; estão ; marcado ; nos ; clara
- b. ( ) estão ; devem ; está ; marcada ; se ; claro
- c. ( ) estão ; deve ; está ; marcadas ; lhe ; claramente
- d. ( ) consta ; deverão ; vão ; estabelecido ; lhes ; óbvia
- e. ( ) aparece ; vão ; estão ; marcado ; a ; evidente

---

**14.** Assinale a alternativa **correta** em relação ao uso da crase.

- a. ( ) A chegada estava prevista para às 20 horas.
- b. ( ) Chegou à Brasília, vindo de Roma.
- c. ( ) Apesar de gostar de andar à pé, preferiu pegar um ônibus.
- d. ( ) Apesar do grande tumulto, a polícia ficou à distância.
- e. ( X ) Foi a Washington e não fez uma visita à Casa Branca!

**15.** Ordene numericamente (de 1 a 4) os fragmentos abaixo, de forma que constituam um texto coeso e coerente.

Adaptado de Terapia do Riso. *Seleções*. Reader's Digest, jan. 2010, pg 33.

- ( ) Todos os participantes do estudo tomaram os medicamentos comuns da diabete, mas os que também assistiram a 30 minutos de comédia por dia apresentaram melhora dos fatores de risco cardiovascular.
- ( ) Portanto, comece a praticar as gargalhadas.
- ( ) De acordo com um estudo americano, assistir a filmes engraçados pode ajudar as pessoas com diabete a reduzir o estresse e a reação inflamatória e a melhorar o nível de colesterol.
- ( ) Embora vários outros estudos tenham sido muito pequenos, sabemos com certeza que rir não faz mal.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. ( ) 1 – 2 – 3 – 4
- b. ( ) 1 – 4 – 2 – 3
- c. ( ) 2 – 3 – 1 – 4
- d. ( X ) 2 – 4 – 1 – 3
- e. ( ) 3 – 1 – 4 – 2

# Conhecimentos Específicos

(25 questões)

**16.** Sobre infecções congênitas, assinale a alternativa **correta**.

- a. ( ) As principais complicações da parvovirose congênita são a policitemia e o oligoâmnio.
- b. (X) Quanto ao citomegalovírus, não se recomenda o rastreamento sorológico de rotina durante a gestação.
- c. ( ) O teste de avidéz de IgG para toxoplasmose, quando apresenta altos valores, indica primoinfecção recente.
- d. ( ) A administração de altas doses de imunoglobulina para gestantes expostas ao vírus da rubéola demonstrou efeito benéfico e deve ser recomendada no primeiro trimestre.
- e. ( ) A infecção materna por varicela-zoster apresenta risco global da síndrome da varicela congênita acima de 50%. O aciclovir é a droga de escolha para evitar a transmissão vertical. A imunoglobulina está contraindicada.

**17.** Durante o parto, após a saída do pólo cefálico, foi feito o diagnóstico de distócia de ombro.

Entre as manobras abaixo, qual é bastante eficaz e está entre as primeiras medidas a serem tomadas?

- a. ( ) Sinfisiotomia.
- b. ( ) Manobra de Zavanelli.
- c. (X) Hiperflexão e abdução das coxas.
- d. ( ) Fratura de clavícula ou clidotomia.
- e. ( ) Compressão do fundo uterino e tração do polo cefálico.

**18.** Qual das técnicas abaixo está indicada na terapia da hemorragia pós-parto?

- a. (X) Sutura de B-Lynch
- b. ( ) Sutura de Lash e Lash.
- c. ( ) Técnica de Joel-Cohen.
- d. ( ) Técnica de MacDonald.
- e. ( ) Administração de halotano.

**19.** Em caso de parada cardiorespiratória materna, em gestações com mais de 26 semanas, está indicada a cesárea perimortem quanto tempo após o início das manobras de ressuscitação?

- a. (X) De 4 a 6 minutos.
- b. ( ) De 10 a 15 minutos.
- c. ( ) Em torno de 20 minutos.
- d. ( ) Em torno de 30 minutos.
- e. ( ) Imediatamente, em caso de assistolia ou após 12 minutos em caso de fibrilação ventricular.

**20.** Uma gestante com 28 semanas realiza a curva glicêmica, com 100 g, apresenta os resultados abaixo, sem alterações clínicas ou ultrassonográficas:

hora	0	1	2	3
mg/dL	105	178	165	148

Qual a conduta inicial indicada, considerando os critérios de Carpenter e Coustan:

- a. ( ) Como apresenta mais de dois pontos alterados, internar e iniciar a insulina.
- b. (X) Orientação dietética e perfil glicêmico, após 10 a 14 dias.
- c. ( ) Solicitar hemoglobina glicada e iniciar a insulina de estiver alterada.
- d. ( ) Apresenta apenas um ponto alterado. Orientar apenas restrição de glicídeos e repetir a curva após quatro semanas.
- e. ( ) Solicitar dopplervelocimetria e iniciar a insulina se tiver alteração da velocidade sistólica na artéria cerebral média, associando AAS se as uterinas também estiverem alteradas.

**21.** Sobre indução do parto, assinale a alternativa **correta**:

- a. ( ) O uso de laminarias é restrito, devido ao alto risco de hipertonia uterina.
- b. ( ) Na indução de parto em paciente com cicatriz uterina prévia, devemos utilizar metade da dose usual de misoprostol.
- c. ( ) Taquissístolia consiste na ocorrência de contração uterina com duração superior a 90 segundos.
- d. ( ) A dose usual de misoprostol para indução do parto, com feto vivo a termo, é de 100 a 200 microgramas a cada 4 a 6 horas.
- e. (X) A utilização transcervical de cateter de Foley, com o balão inflado, é uma técnica eficaz e de baixo risco para maturação do colo, sendo bastante útil na gestante com uma cesariana anterior.

---

**22.** Qual das situações abaixo caracteriza uma indicação absoluta de cesariana?

- a. ( ) Líquido meconial.
- b. ( ) Cesariana anterior.
- c. (X) Placenta prévia total.
- d. ( ) Oligoâmnio acentuado.
- e. ( ) Desacelerações intraparto do tipo I

---

**23.** Quais as complicações mais frequentes com o uso prolongado da heparina não fracionada em gestantes?

- a. ( ) Neuropatia e parestesias.
- b. (X) Osteoporose e trombocitopenia.
- c. ( ) Cefaleia e trabalho de parto prematuro.
- d. ( ) Retardo de crescimento intrauterino e óbito fetal.
- e. ( ) Descolamento de placenta e fotossensibilidade.

**24.** Entre os procedimentos abaixo, qual a técnica não invasiva mais indicada para a predição do grau de anemia fetal?

- a. ( ) Gráfico de Liley.
- b. ( ) Coombs indireto.
- c. ( ) Perfil biofísico fetal.
- d. (X) Pico sistólico da velocidade da artéria cerebral média.
- e. ( ) Medida do tecido celular subcutâneo e grau de ascite.

---

**25.** Uma gestante com 18 semanas comparece à emergência da maternidade, vítima de estupro.

Qual a recomendação do Ministério da Saúde em relação à quimioprofilaxia das doenças sexualmente transmitidas, não virais?

- a. ( ) Esquema com ofloxacina e azitromicina.
- b. ( ) Esquema com penicilina G benzatina, nistatina e metronidazol.
- c. (X) Esquema com penicilina G benzatina, ceftriaxona, azitromicina e metronidazol.
- d. ( ) Evitar a quimioprofilaxia empírica, coletar material para exame e medicar de acordo com o resultado.
- e. ( ) Evitar a quimioprofilaxia empírica, encaminhar para o ambulatório, para medicar de acordo com a evolução.

---

**26.** Qual a dose de ataque de sulfato de magnésio, segundo Pritchard, para tratamento da eclampsia?

- a. ( ) 10 g endovenosa.
- b. ( ) 4 a 6 g endovenosa.
- c. ( ) 6 g endovenosa e 6 g intramuscular.
- d. ( ) 6 g endovenosa e 10 g intramuscular.
- e. (X) 4 g endovenosa e 10 g intramuscular.



**27.** Uma paciente de 30 anos chega à emergência referindo febre, calafrios, e dor pélvica de forte intensidade, com piora progressiva nas últimas 24 horas. Refere vida sexual ativa e uso de contraceptivo hormonal oral. Ao exame, a paciente apresenta dor importante ao toque vaginal, com presença de lesão em fossa ilíaca esquerda, confirmada como massa heterogênea ao ultrassom transvaginal.

A melhor conduta para a paciente é:

- a. ( ) Indicar laparotomia após 4 horas de início do antibiótico.
- b. ( ) A laparoscopia é a melhor via de abordagem dos abscessos pélvicos.
- c. ( ) Drenar o abscesso por colpotomia, junto com início do uso do antibiótico.
- d. (X) Iniciar imediatamente com antibiótico e observar resposta clínica em 48 horas.
- e. ( ) Fazer punção da massa guiada por ultrassom e, se confirmar o diagnóstico, iniciar com antibiótico.

---

**28.** Assinale a alternativa que é considerada como critério definitivo para o diagnóstico de doença inflamatória pélvica:

- a. ( ) Dor à palpação uterina.
- b. ( ) Dor à mobilização do colo uterino.
- c. ( ) Temperatura axilar maior do que 38,2°C.
- d. ( ) Presença de *Chlamydia* na endocervice.
- e. (X) Imagem sugestiva de abscesso tubo-ovariano na ultrassonografia.

---

**29.** Qual dos procedimentos abaixo é recomendado na assistência ao parto, baseado nas evidências científicas disponíveis até o momento?

- a. ( ) Enteroclasma de rotina.
- b. ( ) Monitorização eletrônica fetal contínua.
- c. ( ) Fórcepe de alívio em todas as primigestas.
- d. (X) Realizar episiotomia apenas em casos selecionados.
- e. ( ) Aplicar 10 U de ocitocina IM após desprendimento do ombro exclusivamente nas pacientes com história de hemorragia puerperal em gestações anteriores.

**30.** Com relação ao puerpério, assinale a alternativa **correta**.

- a. ( ) A colocação de DIU está contraindicada na fase de amamentação.
- b. ( ) O primeiro sangramento menstrual do puerpério nunca é precedido de ovulação.
- c. (X) A primeira ovulação ocorre em média 40-45 dias após o nascimento nas pacientes que não amamentam.
- d. ( ) O padrão de amamentação (número e duração das mamadas) não interfere no retorno à ovulação.
- e. ( ) O aleitamento exclusivo, na presença ou ausência de menstruações, é eficaz, dispensando outros métodos contraceptivos.

---

**31.** Assinale a alternativa **correta** referente à doença hipertensiva específica da gestação.

- a. (X) Ocorre diminuição de prostaciclina e aumento de tromboxano.
- b. ( ) O descolamento de retina é a lesão retiniana inicial.
- c. ( ) Ocorre diminuição de resposta a agentes hipotensores.
- d. ( ) O diabetes é importante fator de risco para a doença.
- e. ( ) Geralmente se manifesta antes da 20ª semana de gestação.

---

**32.** No exame ultrassonográfico obstétrico, o parâmetro mais adequado para o rastreamento da restrição de crescimento intrauterino é:

- a. ( ) Diâmetro biparietal.
- b. ( ) Circunferência cefálica.
- c. (X) Circunferência abdominal.
- d. ( ) Comprimento do fêmur.
- e. ( ) Translucência nucal.

**33.** Uma paciente com história de duas gestações anteriores, um abortamento de primeiro trimestre e um parto vaginal, apresenta-se com gestação de 41 semanas e 3 dias, contrações esporádicas, colo grosso, posterior, uma polpa de dilatação, BCF de 136 bpm.

Qual a melhor conduta?

- a. ( ) Indicar cesárea por colo desfavorável para indução.
- b. (X) Misoprostol vaginal 25 µg a cada 4 ou 6 horas para preparo do colo.
- c. ( ) Misoprostol vaginal 200 µg a cada 4 ou 6 horas para preparo do colo.
- d. ( ) Indução com ocitocina, utilizando-se solução com concentração de 10 mUI/mL.
- e. ( ) Amniotomia, antibiótico e ocitocina, iniciando-se indução com infusão de 2 mUI/mL.

---

**34.** Uma gestante de 30 semanas pela DUM e USG, com história de parto vaginal pré-termo em gestação anterior, procura maternidade relatando perda de líquido claro via vaginal há aproximadamente 24 horas, confirmada pelo exame especular.

Ao exame clínico:

PA = 110 × 80, FC = 90 bpm, T axilar = 37,9°C, BCF = 166 bpm, 1 contração/10 min, colo grosso, 2 cm de dilatação.

Qual a melhor conduta?

- a. (X) Iniciar com antibiótico e induzir o parto.
- b. ( ) Iniciar uterolítico e usar corticoide para acelerar maturidade pulmonar.
- c. ( ) Iniciar uterolítico, antibiótico e usar corticoide para acelerar maturidade pulmonar.
- d. ( ) Fazer hidratação rápida, repouso e usar corticoide para acelerar maturidade pulmonar.
- e. ( ) Iniciar com uterolítico, antibiótico, corticoide para acelerar maturidade pulmonar e induzir parto com 34 semanas.

**35.** Com relação à doença trofoblástica gestacional, assinale a alternativa **correta**.

- a. ( ) A histerectomia é a primeira opção de tratamento para coriocarcinoma.
- b. ( ) Deve-se contraindicar definitivamente gestações após diagnóstico de doença trofoblástica gestacional.
- c. ( ) A radioterapia é o tratamento de escolha para as pacientes portadoras de coriocarcinoma que não tiverem remissão espontânea após esvaziamento da cavidade uterina.
- d. (X) A quimioterapia é o tratamento de escolha para as pacientes portadoras de coriocarcinoma que não tiverem remissão espontânea após esvaziamento da cavidade uterina.
- e. ( ) Histerectomia seguida de quimioterapia é a melhor opção de tratamento após diagnóstico de coriocarcinoma.

---

**36.** Assinale a alternativa **correta** sobre hiperemese gravídica:

- a. ( ) Sua etiologia é exclusivamente hormonal.
- b. (X) A incidência varia de 0,1% a 0,2% das gestações.
- c. ( ) O uso de clorpromazina está contraindicado como tratamento.
- d. ( ) Geralmente o hematócrito está diminuído devido à desidratação.
- e. ( ) A alcalose hiperclorêmica é o distúrbio metabólico mais frequente.

---

**37.** A fontanela do crânio fetal que constitui valioso ponto de referência para o diagnóstico da variedade de posição, obtido com o toque digital ou manual, é:

- a. ( ) Ptérica.
- b. ( ) Astérica.
- c. ( ) Metópica.
- d. (X) Bregmática.
- e. ( ) Lambdoide.

**38.** O agente etiológico mais provável em casos de abortamento acompanhado por choque séptico, icterícia, hemoglobinúria e elevado grau de mortalidade materna é:

- a.  Clostridium welchii.
  - b.  Bacteroides fragilis.
  - c.  Peptostreptococcus.
  - d.  Streptococcus agalactiae.
  - e.  Pseudomonas aeruginosa.
- 

**39.** Assinale a alternativa **correta**.

A gestação é definida prolongada ou pós-matura:

- a.  A partir de 40 semanas.
  - b.  Ao completar 41 semanas.
  - c.  A partir de 41 semanas e 1 dia.
  - d.  A partir de 42 semanas e 6 dias.
  - e.  Com duração igual ou superior a 42 semanas completas.
- 

**40.** A hipotonia e atonia uterinas são causas frequentes de hemorragia após secundamento.

São considerados fatores de risco:

1. gemelidade.
2. leiomioma uterino.
3. polidramnio.
4. cesárea anterior.

Assinale a alternativa que indica **todos** os itens considerados fatores de risco.

- a.  Apenas 4 é fator de risco.
- b.  Apenas 1 e 3 são fatores de risco.
- c.  Apenas 1 e 4 são fatores de risco.
- d.  Apenas 2 e 4 são fatores de risco.
- e.  Apenas 1, 2 e 3 são fatores de risco.

**Página  
em Branco.  
(rascunho)**

**Página  
em Branco.  
(rascunho)**

**Página  
em Branco.  
(rascunho)**





**FEPESE • Fundação de Estudos e  
Pesquisas Sócio-Econômicos**  
Campus Universitário • UFSC  
88040-900 • Florianópolis • SC  
Fone/Fax: (48) 3953-1000  
<http://www.fepese.ufsc.br>