



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
CONCURSO PÚBLICO - 2006

Enfermeiro

INSTRUÇÕES GERAIS

- Você recebeu do fiscal:
 - Um **caderno de questões** contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha da Prova Objetiva;
 - Um **cartão de respostas** personalizado para a Prova Objetiva.
- É responsabilidade do candidato certificar-se de que o nome do cargo/área informado nesta capa de prova corresponde ao nome do cargo/área informado em seu **cartão de respostas**.
- Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no **caderno de questões** se a numeração das questões e a paginação estão corretas.
- Você dispõe de 5 (cinco) horas para fazer a Prova Objetiva. Faça-a com tranquilidade, mas **controle o seu tempo**. Este **tempo** inclui a marcação do **cartão de respostas**.
- Após o início da prova, será efetuada a coleta da impressão digital de cada candidato (Edital 62/2005 e Edital 63/2005 – Item 6.2.4 alínea a).
- Somente após decorrida uma hora do início da prova, entregar o seu **caderno de questões**, o seu **cartão de respostas**, e retirar-se da sala de prova (Edital 62/2005 e Edital 63/2005 – Item 6.2.4 alínea b).
- Somente será permitido levar seu **caderno de questões** no decurso dos últimos 60 minutos anteriores ao horário previsto para o término da prova (Edital 62/2005 e Edital 63/2005 – Item 6.2.4 alínea c).
- **Não** será permitido ao candidato copiar seus assinalamentos feitos no **cartão de respostas** (Edital 62/2005 e Edital 63/2005 – Item 6.2.4 alínea d).
- Após o término de sua prova, entregue obrigatoriamente ao fiscal o **cartão de respostas** devidamente **assinado** e o **caderno de respostas** (Edital 62/2005 e Edital 63/2005 – Item 6.2.4 alínea e).
- Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão ser liberados juntos (Edital 62/2005 e Edital 63/2005 – Item 6.2.4 alínea f).
- Se você precisar de algum esclarecimento, solicite a presença do **responsável pelo local**.

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

- Verifique se os seus dados estão corretos no **cartão de respostas**. Solicite ao fiscal para efetuar as correções na Ata de Aplicação de Prova.
- Leia atentamente cada questão e assinale no **cartão de respostas** a alternativa que mais adequadamente a responde.
- O **cartão de respostas NÃO** pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
- A maneira correta de assinalar a alternativa no **cartão de respostas** é cobrindo, fortemente, com caneta esferográfica azul ou preta, o espaço a ela correspondente, conforme o exemplo a seguir:



CRONOGRAMA PREVISTO

ATIVIDADE	DATA	LOCAL
Divulgação do gabarito - Prova Objetiva (PO)	03/04/2006	www.nce.ufrj.br/concursos
Interposição de recursos contra o gabarito (RG) da PO	04 e 05/04/2006	NCE/UFRJ
Divulgação do resultado do julgamento dos RG da PO e o resultado preliminar das PO	13/04/2006	www.nce.ufrj.br/concursos
Demais atividades consultar Manual do Candidato ou pelo endereço eletrônico www.nce.ufrj.br/concursos		



LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO – CRIANÇAS, OBJETOS DESCARTÁVEIS

Maria Elisa Alves – *O Globo*, 09/02/2006

Depressão pós-parto ou pobreza costumam ser as justificativas para uma atitude extrema, que tem sido cada vez mais freqüente: o abandono de um filho recém-nascido. Mas, para especialistas, a mãe que deixa um bebê ao relento e a que tenta matá-lo são desequilibradas. A psicanalista Eliana Helsinger diz que as mulheres envolvidas nesses crimes têm distúrbios psíquicos e tratam crianças como objetos descartáveis:

- Quando elas se livram de um bebê num rio, é como se ele nunca tivesse existido – diz Eliana, que acredita que a pobreza em nada influencia o gesto das mães. – Se você não tem nada, você deixa o bebê num orfanato, não se livra dele simplesmente.

Para o pediatra Lauro Monteiro Filho, os abandonos recentes não se assemelham aos casos de depressão pós-parto, quando as mães rejeitam os bebês por se sentirem, muitas vezes, incapazes de lidar com eles.

- Esses casos destroem o mito do amor materno. Entre adolescentes, é comum a rejeição pelo filho, um estorvo. Isso existe em todas as classes, a diferença é que, na média, há avós para cuidar de uma criança rejeitada. Antigamente, existia a roda dos expostos (lugar nas Santas Casas onde as mães deixavam anonimamente os filhos que não podiam criar). Hoje, a Justiça poderia assumir papel semelhante, fazer campanha dizendo que aceita filhos que as mães não querem. Há tantas famílias querendo adotar bebês.

Para o deputado Flávio Bolsonaro (PP), defensor do planejamento familiar, a situação econômica das mães pode influenciar suas decisões:

- Quando percebem que não vão conseguir sustentar mais um filho, desesperam-se. A culpa desses abandonos é também do poder público. O Rio só oferece dez laqueaduras por mês.

Para o prefeito César Maia, a discussão não é essa:

- Que relação pode haver entre uma assassina bárbara, uma mente desvirtuada e a prevenção da natalidade? Pensar em anticoncepcionais tomando como base fatos bárbaros como esse é uma grave e perigosa distorção.

1 - “Depressão pós-parto ou pobreza costumam ser as justificativas para uma atitude extrema, que tem sido cada vez mais freqüente: o abandono de um filho recém-nascido”; as mesmas idéias desse segmento inicial do texto só NÃO são repetidas de forma adequada em:

- (A) uma atitude extrema, cada vez mais freqüente, a de abandonar um filho recém-nascido tem sido justificada costumeiramente pela depressão pós-parto ou pela pobreza;
- (B) a atitude extrema do abandono de um filho recém-nascido, cada vez mais freqüente, tem na depressão pós-parto ou na pobreza as justificativas mais usuais;
- (C) a depressão pós-parto ou a pobreza costumam ter como justificativas a atitude extrema, cada vez mais freqüente, de abandonar um filho recém-nascido;

- (D) o abandono de um filho recém-nascido, uma atitude extrema, costuma ser justificado pela pobreza ou pela depressão pós-parto;
- (E) as justificativas de depressão pós-parto ou pobreza são apontadas habitualmente para o abandono de um filho recém-nascido, uma atitude extrema cada vez mais freqüente.

2 - “Depressão pós-parto ou pobreza costumam ser as justificativas...”; neste caso a concordância se faz com a forma verbal no plural (costumam) porque o fato expresso pelo verbo pode ser atribuído tanto a “depressão” como a “pobreza”. A frase abaixo em que a forma verbal deve vir no singular é:

- (A) a filha ou o filho abandonado devem ter a proteção da lei;
- (B) a mãe ou o pai devem ser responsabilizados pelo mal causado aos filhos;
- (C) menino ou menina abandonada devem ser objeto de adoção;
- (D) a educação ou a lei devem fazer com que as crianças não sofram;
- (E) Minas ou São Paulo devem ser a sede de uma ONG de proteção à criança.

3 - “a mãe que deixa um bebê ao relento e a que tenta matá-lo são desequilibradas”; entre as alternativas abaixo, aquela que NÃO conserva o sentido original dessa opinião da psicanalista é:

- (A) tanto a mãe que deixa um bebê ao relento como a que tenta matá-lo são desequilibradas;
- (B) só a mãe que deixa um bebê ao relento e também a que tenta matá-lo são desequilibradas;
- (C) a mãe que deixa um bebê ao relento assim como a que tenta matá-lo são desequilibradas;
- (D) a mãe que deixa um bebê ao relento tanto quanto a mãe que tenta matá-lo são desequilibradas;
- (E) assim como a mãe que deixa um bebê ao relento, também a mãe que tenta matá-lo é desequilibrada.

4 - “as mulheres envolvidas nesses crimes têm distúrbios psíquicos / e tratam crianças como objetos descartáveis”; a segunda oração desse período, em relação à primeira, apresenta um valor semântico de:

- (A) adição;
- (B) causa;
- (C) comparação;
- (D) consequência;
- (E) explicação.

5 - Um subtítulo adequado a essa matéria jornalística é:

- (A) psicanalista culpa distúrbios psíquicos e pediatra descarta depressão pós-parto;
- (B) pobreza explica o abandono de bebês;
- (C) distúrbios psíquicos e pobreza não explicam o abandono de bebês;
- (D) bebês abandonados são vítimas do descaso das autoridades públicas;
- (E) pobreza é causa mais grave que os distúrbios psíquicos no abandono de bebês.



6 - "Se você não tem nada, você deixa o bebê num orfanato, não se livra dele simplesmente"; o comentário INCORRETO sobre esse segmento do texto é:

- (A) o pronome *você* se refere ao leitor do texto;
- (B) o advérbio *simplesmente* está mal colocado na frase;
- (C) o pronome *ele* (dele) se refere ao *bebê* citado anteriormente;
- (D) a última oração mostra uma idéia de oposição em relação à oração anterior;
- (E) o vocábulo *bebê* abrange pessoas do sexo masculino e do feminino.

7 - O texto lido foi produzido num momento em que vinham ocorrendo vários casos de abandono de bebês em várias partes do país. O segmento do texto que mostra uma relação com acontecimentos cronologicamente próximos e não um tratamento geral do tema é:

- (A) "Depressão pós-parto ou pobreza costumam ser as justificativas para uma atitude extrema, que tem sido cada vez mais freqüente: o abandono de um filho recém-nascido."
- (B) "Há tantas famílias querendo adotar bebês."
- (C) "as mães rejeitam os bebês por se sentirem, muitas vezes, incapazes de lidar com eles."
- (D) "Se você não tem nada, você deixa o bebê num orfanato."
- (E) "Entre adolescentes, é comum a rejeição pelo filho, um estorvo."

8 - Como uma solução para minorar os problemas derivados do abandono de bebês o texto sugere:

- (A) a volta da "roda dos expostos";
- (B) o não-engravidamento de adolescentes;
- (C) a redução da pobreza;
- (D) uma campanha oficial;
- (E) o tratamento psiquiátrico das grávidas.

9 - "Esses casos destroem o mito do amor materno"; o mito aludido pelo pediatra consultado pelo autor da matéria jornalística é construído basicamente pela idéia de:

- (A) duro trabalho doméstico;
- (B) amor incondicional aos filhos;
- (C) dedicação constante ao cônjuge;
- (D) responsabilidade pela educação dos filhos;
- (E) encaminhamento religioso da família.

10 - O texto fala de bebês como "objetos descartáveis"; o significado do adjetivo "descartável" mais adequado (significados retirados do dicionário Houaiss), em função do contexto em que está situado, é:

- (A) que não se destina nem a conservar nem a consertar;
- (B) que se deita fora após uma ou mais utilizações;
- (C) que é facilmente substituível;
- (D) que se caracteriza por ser passageiro, sem profundidade;
- (E) que pode ou deve ser posto de lado.

11 - Entre os segmentos abaixo, aquele cuja preposição destacada tem emprego inadequado por gerar certa ambigüidade é:

- (A) "Isso existe em todas as classes";
- (B) "é comum a rejeição pelo filho, um estorvo";
- (C) "há avós para cuidar de uma criança";
- (D) "Para o pediatra Lauro Monteiro Filho";
- (E) "a pobreza em nada influencia o gesto das mães".

12 - "Entre adolescentes, é comum a rejeição pelo filho, um estorvo. Isso existe em todas as classes, a diferença é que, na média, há avós para cuidar de uma criança rejeitada".

A expressão "na média", nesse segmento do texto:

- (A) equivale à expressão "em geral";
- (B) corresponde à "proporcionalmente";
- (C) refere-se à classe média;
- (D) é sinônimo de "no final";
- (E) pode ser substituída por "globalmente".

13 - Pode-se observar, a partir dos depoimentos do texto, que:

- (A) cada depoente vê o caso a partir de seu espaço profissional;
- (B) o pediatra tenta criticar o depoimento anterior;
- (C) a psicanalista vê o problema de forma feminista;
- (D) as razões apresentadas não são acompanhadas de argumentos;
- (E) nenhum depoente apresenta soluções para o problema.

14 - "Pós-parto" e "recém-nascido" são vocábulos grafados com hífen; o substantivo abaixo que NÃO deve ser grafado com hífen é:

- (A) segunda-feira;
- (B) ponto-de-vista;
- (C) abaixo-assinado;
- (D) extra-oficial;
- (E) manga-espada.

15 - "Há tantas famílias querendo adotar bebês"; a alternativa abaixo que substitui INCORRETAMENTE a forma do verbo *haver* é:

- (A) pode haver;
- (B) deve haver;
- (C) podem existir;
- (D) há de haver;
- (E) deve existir.

16 - "Há tantas famílias querendo adotar bebês"; se substituirmos o substantivo *bebês* por um pronome pessoal oblíquo, a forma adequada dessa frase será:

- (A) Há tantas famílias querendo adotar-lhes;
- (B) Há tantas famílias lhes querendo adotar;
- (C) Há tantas famílias querendo adotá-los;
- (D) Há tantas famílias querendo os adotar;
- (E) Há tantas famílias querendo adotar-los.



17 - No texto, as opiniões que se opõem são:

- (A) pediatra X psicanalista;
- (B) psicanalista X deputado;
- (C) deputado X pediatra;
- (D) prefeito X pediatra;
- (E) psicanalista X prefeito.

18 - "O Rio só oferece dez laqueaduras por mês"; a introdução da palavra só nesta frase do texto mostra:

- (A) uma opinião negativa do deputado pelo serviço prestado pela Prefeitura;
- (B) um julgamento da autora do texto sobre o fato discutido;
- (C) uma apreciação elogiosa sobre o que é feito na área do planejamento familiar;
- (D) o ponto de vista de que o número de laqueaduras no Brasil é muito grande;
- (E) uma dúvida sobre a eficiência do poder público no problema discutido no texto.

19 - "deixavam anonimamente os filhos que não podiam criar"; nesta frase do texto o pronome relativo QUE não é precedido de qualquer preposição, pois o verbo *criar* não a exige. A alternativa abaixo em que a frase apresenta erro no uso de uma preposição antes do pronome relativo é:

- (A) As mães abandonam filhos de que não gostam;
- (B) Os locais em que são abandonados os bebês são desertos;
- (C) A pobreza não é causa a que se possa apelar;
- (D) Os políticos só falam de assuntos de que lhes tragam votos;
- (E) Esses são os pontos sobre que se deve pensar.

20 - "Quando percebem que não vão conseguir sustentar mais um filho, desesperam-se"; em relação às duas orações anteriores, a terceira oração desse fragmento do texto (desesperam-se) mostra um tempo:

- (A) simultâneo;
- (B) imediatamente anterior;
- (C) imediatamente posterior;
- (D) bastante anterior;
- (E) bastante posterior.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21 - Vacinas são imunobiológicos que podem permanecer armazenados em refrigeradores domésticos; para não haver perda de potência, a faixa de temperatura recomendada é de:

- (A) +5° a +9° C;
- (B) +2° a +8° C;
- (C) -2° a +5° C;
- (D) +1 a +8° C;
- (E) +0 a +6° C.

22 - Entre as penalidades definidas pelo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, a que consiste em "admoestação ao infrator, de forma reservada, que será registrada no Prontuário do mesmo, na presença de duas testemunhas" denomina-se:

- (A) multa;
- (B) censura;
- (C) advertência verbal;
- (D) suspensão do exercício profissional;
- (E) cassação do direito ao exercício profissional.

23 - Na instalação de Unidades de Saúde da Família em um município, deve-se levar em conta as seguintes orientações:

- A) sempre instalar unidades em prédios novos e exclusivamente construídos para este fim;
- B) os equipamentos a serem instalados na unidade devem contemplar o nível de média complexidade das ações;
- C) o número de profissionais das equipes é dimensionado levando-se em conta a capacidade instalada e a adscrição da clientela;
- D) a dedicação de horário parcial da equipe oferece a garantia de vinculação da clientela;
- E) o ideal é que seja instalada uma equipe de Saúde da Família em cada comunidade ou bairro.

24 - Em relação à transmissão do HIV, é correto afirmar que:

- A) qualquer pessoa infectada é considerada transmissora, independente da carga viral;
- B) somente portadores que apresentam infecções oportunistas são transmissores;
- C) as pessoas com infecção aguda transmitem com menos facilidade o vírus;
- D) mulheres idosas têm menos potencial transmissor que as jovens;
- E) pessoas que praticam sexo com parceiros do mesmo sexo transmitem mais facilmente.

25 - Na administração de um medicamento por via oral, um enfermeiro observa que a dosagem prescrita é de 50 gotas, mas a preparação de que dispõe não possui conta-gotas. Ao utilizar uma seringa para adequar a dose, este enfermeiro deverá administrar:

- A) 1,5 mL;
- B) 2,5 mL;
- C) 3 mL;
- D) 4 mL;
- E) 5 mL.



26 - A Política Nacional de Humanização, ou HumanizaSUS, é desenvolvida a partir dos seguintes princípios e estratégias:

- A) a humanização deve ser vista pelos profissionais como um programa a ser aplicado aos serviços de saúde;
- B) busca-se ampliar a co-responsabilização de sujeitos nos processos de gestão e atenção;
- C) busca-se viabilizar a participação dos trabalhadores de saúde pela eleição de um representante em cada unidade;
- D) na humanização das relações, deve-se incentivar e valorizar a redução da jornada de trabalho;
- E) no acolhimento nos setores de urgência, o uso de protocolos clínicos será desaconselhado.

27 - A Constituição Brasileira, além de apresentar princípios e diretrizes da política nacional de saúde, dispõe sobre a relação do Estado com a iniciativa privada, sendo correto afirmar que:

- A) a participação da iniciativa privada é excludente em relação à filantrópica;
- B) a prioridade será para as instituições de medicina de grupo;
- C) a forma legal de relação será por meio de contrato de direito privado;
- D) a iniciativa privada pode, livremente, prestar assistência à saúde;
- E) as instituições privadas são restritas às áreas onde o SUS não está presente.

28 - Sobre o dimensionamento do pessoal de enfermagem nos serviços de saúde, é correto afirmar que:

- A) na maioria das instituições de saúde o pessoal de enfermagem representa, quantitativamente, um percentual pouco significativo, mas importante do ponto de vista qualitativo;
- B) a definição do quantitativo de profissionais com base no tipo de unidade de internação não é considerada adequada, por não considerar a variação na gravidade dos pacientes e no tipo de assistência de enfermagem a ser prestada;
- C) a ausência de parâmetros bem definidos para o dimensionamento de equipes de enfermagem não representa problema ou causa fragilização da categoria;
- D) a inadequação numérica e qualitativa dos recursos humanos da enfermagem repercute no direito à assistência livre de risco, mas não compromete legalmente a instituição;
- E) o enfoque qualitativo é mais importante que o quantitativo no dimensionamento do pessoal de enfermagem.

29 - Uma enfermeira é pressionada pela direção de um hospital a ocupar um cargo de chefia em função eticamente inadequada ao exercício da enfermagem. Não concordando com o convite, é despedida sumariamente. O Código de Ética recomenda que esta profissional:

- A) reporte formalmente à Seção Regional da Associação Brasileira de Enfermagem;
- B) encaminhe processo civil no juizado de pequenas causas alegando danos morais e de materiais;

- C) faça denúncia trabalhista na Delegacia do Trabalho e Ministério Público de sua área legal;
- D) denuncie formalmente ao Conselho Federal de Enfermagem e Ministério Público;
- E) comunique formalmente ao Conselho Regional de Enfermagem.

30 - Na terapia anticoagulante após a ocorrência de Trombose Venosa Profunda, o enfermeiro deverá cumprir alguns cuidados, considerando que:

- A) a interação medicamentosa com salicilatos e barbitúricos tende a diminuir os efeitos dos anticoagulantes;
- B) o local de aplicação de anticoagulantes por via subcutânea é preferencialmente a área abdominal, de 5 cm ao redor do umbigo;
- C) recomenda-se a técnica em Z para a minimização da dor local na terapia subcutânea de longa duração;
- D) o uso concomitante de anticoncepcionais orais pode acarretar diminuição dos efeitos dos anticoagulantes;
- E) deve-se alertar para a duplicação da dose subsequente quando houver esquecimento da anterior, para garantir os efeitos anticoagulantes.

31 - A drenagem torácica é procedimento usual nos casos de hemotórax. A localização correta do tubo de toracotomia é o:

- A) sexto ou sétimo espaço intercostal lateral na linha axilar média;
- B) segundo ou terceiro espaço intercostal na linha medioclavicular;
- C) espaço subesternal, linha média anterior do tórax;
- D) terceiro espaço intercostal, linha posterior do tórax;
- E) espaço subcostal, linha antero-lateral média.

32 - Entre os cuidados de enfermagem ao paciente submetido a um cateterismo cardíaco, está incluído:

- A) registrar os pulsos distais do membro oposto ao do exame antes do procedimento;
- B) mobilizar ativamente o membro afetado imediatamente antes e após a realização do exame;
- C) avaliar sintomas dolorosos sugestivos de infarto do miocárdio;
- D) registrar a pressão arterial e o pulso apical a cada 90 minutos;
- E) estimular a deambulação precoce após 2 horas do exame.

33 - Em situações de emergência com ocorrência de fraturas, antes de transportar a pessoa ferida deve-se aplicar uma tala observando-se os seguintes cuidados:

- A) a extensão das talas limita-se à área da fratura e exclui as articulações adjacentes;
- B) ao aplicar a tala, uma das mãos fica distal à fratura e a outra por baixo, permitindo a sustentação;
- C) os membros superiores são imobilizados em posição de extensão e pronação;
- D) em fraturas abertas o curativo a ser aplicado deverá ser seco;
- E) na evidência de comprometimento neurovascular do membro, garantir a maior fixação da tala.



34 - As atividades descritas abaixo listadas são da competência da Vigilância Sanitária, EXCETO:

- A) estabelecer normas e padrões sobre limites de contaminantes, resíduos tóxicos, desinfetantes, metais pesados e outros;
- B) interditar os locais de fabricação, controle, importação, armazenamento, distribuição e venda de produtos e de prestação de serviços relativos à saúde;
- C) estabelecer, coordenar e monitorar os sistemas de vigilância toxicológica e farmacológica e promover a revisão e atualização periódica da farmacopéia;
- D) detectar precocemente surtos e epidemias com acompanhamento da ocorrência de casos de cada doença e agravo de notificação;
- E) conceder registros de produtos, segundo as normas de sua área de atuação, e monitorar a evolução dos preços de medicamentos, equipamentos, componentes, insumos e serviços de saúde.

35 - Classifica-se como ação de prevenção primária do uso de drogas:

- A) prestar orientações a um grupo de idosos que fazem uso habitual de medicamentos para dormir;
- B) favorecer a reinserção social de usuários de álcool em abstinência;
- C) elaborar cartilhas trazendo informações sobre tipos de drogas e seus efeitos para escolares;
- D) encaminhar usuário de crack para uma clínica de desintoxicação;
- E) desenvolver atividades de redução de danos entre usuário de drogas injetáveis.

36 - Sobre a atual Política de Saúde Mental, é correto afirmar que:

- A) a prestação de cuidados de saúde mental é promovida prioritariamente em nível ambulatorial;
- B) o tratamento de doentes mentais em regime de internamento deve ocorrer em hospitais especializados;
- C) as ações devem buscar o afastamento dos doentes do seu meio habitual, a fim de facilitar a sua reabilitação e inserção social;
- D) a reabilitação psicossocial é assegurada, preferencialmente, em estruturas de média complexidade;
- E) os centros de atenção psicossocial deverão estar inseridos nas comunidades e adaptados ao grau de autonomia dos doentes.

37 - Em relação aos cuidados de enfermagem em pacientes com úlceras de pressão estágio II, considera-se que:

- A) a migração celular epitelial é facilitada na presença de curativos secos;
- B) curativos oclusivos semipermeáveis são úteis para auxiliar na cicatrização;
- C) para ser eficiente, a limpeza da ferida deve ser feita com movimentos vigorosos;
- D) deve-se utilizar solução de peróxido de hidrogênio a 10% para a limpeza da úlcera;
- E) a lâmpada de calor pode ser utilizada para auxiliar na cicatrização de uma ferida aberta.

38 - A constipação intestinal é condição comum no pós-operatório. Sua causa mais freqüente é:

- A) a diminuição da mobilidade;
- B) os distúrbios do sono e repouso;
- C) a presença de distensão por gases;
- D) o uso de faixas e cintas abdominais;
- E) a ingestão oral de alimentação pastosa.

39 - O melhor agente de esterilização para marcapassos cardíacos, na desinfecção e esterilização de artigos e superfícies é:

- A) álcool etílico a 70%;
- B) vapor d'água sob pressão;
- C) hipoclorito de sódio;
- D) óxido de etileno;
- E) glutaraldeído.

40 - Na insuficiência renal aguda, o enfermeiro da Unidade de Cuidados Intensivos deve monitorar atentamente o grau de equilíbrio hidroeletrólítico do paciente, por meio dos níveis séricos de eletrólitos e pela observação de sinais e sintomas. O desequilíbrio que oferece risco de vida mais imediato nessa condição clínica é:

- A) hipopotassemia;
- B) hiponatemia;
- C) hipercalemia;
- D) hipernatemia;
- E) hipovolemia.

41 - Durante uma consulta pré-natal de rotina, a gestante que está sendo atendida queixa-se de cefaléia, dor epigástrica, alterações visuais e sua pressão arterial é de 150 x 100 mmHg. O enfermeiro que está realizando a consulta deve:

- A) marcar retorno em 7 dias e orientar quanto ao repouso;
- B) solicitar ultra-sonografia e cardiocografia de urgência;
- C) marcar retorno em 3 dias e orientar quanto ao agravamento dos sintomas;
- D) referir ao pré-natal de risco ou a unidade de referência hospitalar;
- E) orientar e tratar a gestante de acordo com o protocolo da instituição.

42 - Nos serviços de saúde, durante o atendimento a crianças entre 2 meses e 5 anos de idade, independente do problema referido pelos responsáveis, cinco sintomas classificados como sinais gerais de perigo deverão ser obrigatoriamente investigados. Esses sintomas são:

- A) tosse, constipação intestinal, conjuntivite, prurido e coriza nasal;
- B) diarreia, lesão de pele, flatulência, soluço e febre;
- C) tosse ou dificuldade para respirar, diarreia, febre e problema de ouvido;
- D) equimoses, escotomas, prurido, pirose, regurgitação e vômitos;
- E) insônia, disfagia, dificuldade para respirar, boca seca e cefaléia.



43 - O diagnóstico clínico do início do trabalho de parto é feito com base na presença dos seguintes sinais e sintomas:

- A) rotura da bolsa amniótica e encaixe fetal;
- B) presença de contrações uterinas a intervalos regulares com dilatação progressiva do colo uterino;
- C) perda do tampão mucoso e formação da bolsa amniótica;
- D) dilatação perineal e coroamento da cabeça fetal;
- E) aumento dos batimentos cardíacos fetais e eliminação de secreção sero-sanguinolenta.

44 - Durante o terceiro trimestre de gravidez, uma gestante apresenta dor abdominal súbita, sangramento vaginal e hipertonia uterina, sendo detectado, durante exame, sofrimento fetal. Esse quadro clínico é decorrente de:

- A) placenta prévia;
- B) parto prematuro;
- C) eclampsia;
- D) descolamento prematuro de placenta;
- E) abortamento.

45 - Durante o segundo período do trabalho de parto, é necessária uma monitorização efetiva do bem estar fetal, pois há um aumento do risco de hipóxia e acidose fetal em decorrência:

- A) da interrupção da circulação materna;
- B) da expulsão placentária;
- C) da intensidade e frequência das contrações uterinas;
- D) dos esforços maternos para a expulsão;
- E) da compressão do períneo.

46 - A associação, durante o trabalho de parto, de medidas como exercícios respiratórios, técnicas de relaxamento, deambulação, massagens e banhos contribuem para:

- A) alívio da dor e do desconforto;
- B) desaceleração da descida e progressão fetais;
- C) aceleração das contrações uterinas;
- D) normalidade dos batimentos cardíacos fetais;
- E) encurtamento das fases do trabalho de parto.

47 - O método canguru é um tipo de assistência neonatal que envolve o contato precoce pele a pele entre mãe e recém-nascido prematuro ou de baixo peso. De acordo com a Norma de Atenção Humanizada ao Recém-Nascido de Baixo Peso, a colocação do neonato sobre o tórax da mãe poderá ser iniciada na unidade neonatal:

- A) após o recém-nascido atingir 1500g;
- B) a partir do momento em que as condições clínicas do recém-nascido permitirem;
- C) quando o recém-nascido estiver alimentando-se exclusivamente pelo seio materno;
- D) quando o recém-nascido apresentar condições de permanecer nessa posição por um período de pelo menos doze horas;
- E) quando o ganho de peso do recém-nascido for considerado satisfatório.

48 - O Índice de Apgar é utilizado para:

- A) avaliar a necessidade de reanimação do recém-nascido;
- B) avaliar os efeitos das condutas empregadas na reanimação do recém-nascido;
- C) avaliar a necessidade de administração de sangue no período neonatal imediato;
- D) estabelecer o setor para o qual o recém-nascido deverá ser encaminhado;
- E) avaliar a eficácia das condutas adotadas durante o acompanhamento pré-natal.

49 - Durante os cuidados de reanimação neonatal, a aspiração da traquéia deverá ser realizada:

- A) em todos os recém-nascidos com idade gestacional entre 30 e 37 semanas;
- B) em recém-nascidos prematuros e de baixo peso;
- C) em recém-nascidos cujo Apgar no 1º minuto for inferior a 8;
- D) em recém-nascidos em que o líquido amniótico apresentar-se com aspecto meconial;
- E) em recém-nascidos portadores de anomalias congênitas.

50 - Um recém-nascido, filho de mãe diabética, admitido em sistema de alojamento conjunto, com 6 horas de vida, apresentava-se letárgico, hipotônico e com episódios de abalos e tremores de membros. Esse quadro clínico, que requer pronta intervenção do enfermeiro, é decorrente de:

- A) hipoglicemia;
- B) hipertermia;
- C) acidose;
- D) anemia;
- E) hiperglicemia.



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Núcleo de Computação Eletrônica
Divisão de Concursos

Endereço: Prédio do CCMN, Bloco C
Ilha do Fundão - Cidade Universitária - Rio de Janeiro/RJ

Caixa Postal: 2324 - CEP 20010-974

Central de Atendimento: 0800 7273333 ou (21) 2598-3333

Informações: Dias úteis, de 9 h às 17 h (horário de Brasília)

Site: www.nce.ufrj.br/concursos

Email: concursoufrj@nce.ufrj.br