

Caderno de Prova

S21

Médico

Dia: 16 de março de 2008 • Horário: das 14 às 18 h

Duração: 4 (quatro) horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

❶ Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova:

- se faltam folhas, se a seqüência de questões, no total de 50 (cinquenta), está correta;
- se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado. O gabarito da prova será divulgado no site do concurso.

<http://pmf.fepese.ufsc.br>

Conhecimentos Gerais

(15 questões)

Língua Portuguesa

(8 questões)

Texto

1 Em 1807, o imperador francês era o senhor abso-
2 luto da Europa. Seus exércitos **havam colocado de**
3 **joelhos** todos os reis e rainhas do continente, numa
4 sucessão de vitórias surpreendentes e brilhantes.
5 Só não haviam conseguido **subjugar** a Inglaterra.
6 Protegidos pelo Canal da Mancha, os ingleses tinham
7 evitado o confronto direto em terra com as forças de
8 Napoleão. Ao mesmo tempo, haviam se consolidado
9 como os senhores dos mares na batalha de Trafalgar,
10 em 1805, quando sua Marinha de Guerra, sob o
11 comando de Lord Nelson, destruiu, na entrada do
12 Mediterrâneo, as esquadras combinadas da França e
13 da Espanha. Napoleão reagiu decretando o bloqueio
14 continental, medida que previa o fechamento dos
15 portos europeus ao comércio de produtos britânicos.
16 Suas ordens foram imediatamente obedecidas por
17 todos os países, com uma única exceção: o pequeno e
18 desprotegido Portugal.

GOMES, Laurentino. **1808**. São Paulo: Planeta do Brasil, 2007, p. 33.

1. As afirmativas abaixo são falsas de acordo com o texto. Assinale aquela que se torna **verdadeira** de acordo com o texto se for trocada uma palavra ou expressão pela que está entre parênteses.

- a. () A Inglaterra havia sido subjugada. (derrotada)
- b. () Napoleão permitiu que Portugal mantivesse o comércio com a Inglaterra. (concordou)
- c. () As esquadras combinadas da França e da Espanha derrotaram a esquadra inglesa. (venceram)
- d. () As ordens de Napoleão decretando o bloqueio foram obedecidas tardiamente. (precocemente)
- e. (X) Os exércitos do imperador francês haviam sofrido reveses surpreendentes. (obtido vitórias)

2. Com base no texto, assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso.

- () Em 1805, a Espanha estava aliada à França.
- () A expressão “havam colocado de joelhos”, sublinhada no texto, poderia ser substituída por “havam derrotado”, sem significativa alteração de sentido.
- () O verbo “subjugar”, destacado no texto, tem o sentido de vencer, dominar.
- () Em toda a Europa, nenhum país se atreveu a desobedecer ao bloqueio continental decretado pelo imperador francês, com exceção de Portugal e Inglaterra.
- () O Canal da Mancha foi um empecilho para a resistência interna dos ingleses às forças inimigas.

A seqüência **correta**, de cima para baixo, é:

- a. () V – V – V – V – F
- b. (X) V – V – V – F – F
- c. () V – F – F – V – F
- d. () F – V – V – V – V
- e. () F – F – V – F – V

3. Assinale a alternativa em que as opções a) e b) são igualmente **corretas**, em relação ao plural das palavras:

- a. () a) gás – gases
b) chapéu – chapéis
- b. () a) degrau – degrais
b) fuzil – fuzis
- c. () a) mares azul-escuros
b) uniformes verdes-garrafas
- d. (X) a) papel – papéis
b) farol – faróis
- e. () a) luvas cinzas
b) sapatos cor-de-rosa

4. Considere as afirmativas abaixo, baseadas no texto.

- I. O pronome **seus**, em “seus exércitos” (linha 2), refere-se ao imperador francês; o mesmo ocorre com o pronome **sua**, em “sua Marinha de Guerra”, (linha 10).
- II. Em “os ingleses tinham evitado o **confronto direto**” (linhas 6 e 7), a expressão destacada é um objeto direto.
- III. Em “o fechamento **dos portos europeus**” (linhas 14 e 15), a expressão destacada é um objeto indireto.
- IV. Em “Suas ordens foram imediatamente obedecidas **por todos os países**” (linha 16), a expressão destacada é agente da passiva.

Assinale a alternativa em que todas as afirmativas são **corretas**.

- a. () I – II
- b. (X) II – IV
- c. () I – II – III
- d. () I – III – IV
- e. () II – III – IV

5. A partir do texto, analise as afirmativas abaixo:

- I. “...tinham evitado o confronto direto com as forças de Napoleão” pode ser substituída por “tinham evitado o confronto direto com as forças napoleônicas”, sem prejuízo do sentido original.
- II. Os vocábulos **Mediterrâneo, britânicos e países** são acentuados devido à mesma regra de acentuação gráfica.
- III. “...numa sucessão de vitórias” tem o mesmo sentido que “numa seqüência de vitórias”.
- IV. Em “medida que previa o fechamento dos portos” **que** é pronome relativo referente ao vocábulo **medida**.

Assinale a alternativa **correta**.

- a. () Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
- b. () Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
- c. (X) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- d. () Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- e. () Todas as afirmativas estão corretas.

6. Leia atentamente as proposições abaixo:

1. *Um assessor, dirigindo-se ao governador:*
—Restituo a Vossa Excelência projeto de lei devidamente apreciado.
2. *O prefeito, dirigindo-se aos vereadores:*
—Estamos no senso de responsabilidade.
3. *Um deputado, dirigindo-se a uma eleitora:*
—Informo a V.Sa. de que observações serão levadas em consideração.

Assinale a alternativa que completa, de forma seqüencial e **correta**, as lacunas.

- a. () seu ; confiante ; seu ; suas
- b. () seu ; confiante ; seu ; vossas
- c. (X) seu ; confiante ; vosso ; suas
- d. () vosso ; confiantes ; seu ; vossas
- e. () vosso ; confiantes ; vosso ; vossas

7. Assinale a alternativa **correta**.

- a. () Precisam-se de digitadores.
- b. () Houveram muitas pessoas na festa.
- c. () Fazem cinco anos que Joana partiu.
- d. () Mais de um lavrador compraram tratores.
- e. (X) Pagaram a dívida o chefe e os funcionários.

8. Analise as proposições abaixo e assinale a única **correta**.

- a. () Quero falar consigo.
- b. () Nunca viu-se tamanha bobagem!
- c. (X) Assim como é correto dizer “Meus pais saíram conosco” também é correta a frase “O chefe falou com nós mesmos”.
- d. () As frases “Os rapazes não estavam rindo só das meninas” e “Os rapazes não estavam rindo, só das meninas” possuem o mesmo sentido.
- e. () Em “Suas ordens e decretos foram obedecidos”, o particípio *obedecidos* poderia estar no feminino – *obedecidas* – sem prejuízo da correção gramatical e lingüística.

Matemática

(3 questões)

9. Em dezembro de 2007, vigorava no Brasil a seguinte tabela para o cálculo do imposto de renda sobre os salários.

Imposto de renda retido na fonte

Tabela Progressiva Mensal		
Base de cálculo (R\$)	Alíquota %	Parcela a deduzir (R\$)
Até 1.313,69	–	–
De 1.313,70 até 2.625,12	15,0	197,05
Acima de 2.625,12	27,5	525,19

Fonte: <http://www.receita.fazenda.gov.br> Consulta: 12/12/2007

Com base nos dados fornecidos pela tabela, o imposto de renda retido na fonte por uma pessoa que recebe um salário mensal de R\$ 3.000,00 é:

- a. () R\$ 825,00
- b. () R\$ 721,90
- c. () R\$ 525,19
- d. (X) R\$ 299,81
- e. () R\$ 103,09

10. Um banco concedeu a um cliente um empréstimo a juros simples por 18 meses. Se o montante (capital inicial + juro) é igual a 190% do capital emprestado, então a taxa mensal do empréstimo é:

- a. () 2%
- b. (X) 5%
- c. () 7%
- d. () 10,5%
- e. () 20%

11. Na preparação de um evento da prefeitura municipal trabalharam 25 funcionários (de mesma capacidade de trabalho) durante 18 dias. Decorridos os 18 dias do início da tarefa, foram contratados 5 funcionários (de mesma capacidade de trabalho dos primeiros) que trabalharam junto com os primeiros durante 10 dias. Em quanto tempo teria sido concluída a tarefa se os 30 funcionários tivessem trabalhado desde o início?

- a. () 14
- b. () 21
- c. (X) 25
- d. () 28
- e. () 30

Estudos Sociais

(2 questões)

12. Recentemente, na cidade de Bali na Indonésia, 190 países aprovaram o “Mapa do Caminho”, de grande importância para o futuro da humanidade.

Assinale a alternativa **correta**.

- a. (X) O chamado Mapa do Caminho de Bali define um roteiro com os princípios que vão guiar as negociações do regime global de mudanças climáticas, que sucederá ao Protocolo de Kyoto, a partir de 2012.
- b. () O Mapa do Caminho coloca fim ao conflito entre a Coreia do Norte e Coreia do Sul, causa de grande instabilidade na região desde a Segunda Guerra Mundial.
- c. () O Mapa do Caminho sinaliza uma solução para os conflitos tribais na África, principalmente na região do Saara, o que certamente significará a salvação de milhares de vidas humanas.
- d. () O Mapa do Caminho é um protocolo em que se propõem medidas de combate à AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis, barateando o custo do tratamento para que ele se torne acessível às nações mais pobres.
- e. () As diretrizes do Mapa do Caminho permitirão o fim do conflito entre o governo do presidente Uribe e o movimento guerrilheiro na Colômbia.

13. Leia a notícia:

DF tem maior Índice de Desenvolvimento Juvenil do País

A terceira edição do Índice de Desenvolvimento Juvenil (IDJ), medida agora em 2007, e preparada pelo pesquisador Julio Jacobo Waiselfiz, mostrou que as mortes violentas caíram, a desigualdade social diminuiu e a educação mostra avanços no País [...]

“Há sinais de evolução, em especial na área de saúde. Ainda é um processo vacilante, mas mostra que há condições para que se melhore mais”, afirmou Waiselfiz. As melhorias se concentram na educação e na saúde, onde, pela primeira vez desde 2003, alguns Estados, como São Paulo mostraram redução nos casos de mortes violentas de jovens. “Não é homogêneo. Há muitas diferenças, houve aumento em alguns lugares, mas existem pontos de queda”, explicou o pesquisador.

Disponível em: <http://noticias.br.msn.com/artigo.aspx?cp-documentid=5890093>. Acesso em 20/12/2007.

Assinale a alternativa verdadeira em relação ao “índice de Desenvolvimento Juvenil do País”.

- a. () A região nordeste, não obstante serem elevados os índices de pobreza, destacou-se entre as regiões com os melhores IDJ do Brasil.
- b. () O Estado de Rondônia destacou-se, nesta pesquisa, como o Estado que apresentou os melhores índices em 2007.
- c. () O Rio Grande do Sul vem em primeiro lugar entre os Estados com os melhores IDJ do país.
- d. (X) O Distrito Federal e o Estado de Santa Catarina destacaram-se entre as regiões com os melhores IDJ do Brasil.
- e. () O pior Índice de Desenvolvimento Juvenil foi alcançado, devido ao grande índice de violência urbana, pelo Estado de São Paulo.

Legislação

(2 questões)

14. Assinale a alternativa **correta**:

- a. (X) A vacância do cargo público decorrerá de exoneração, demissão, aposentadoria ou falecimento.
- b. () A posse do candidato aprovado em concurso público ocorrerá no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados da publicação do ato de nomeação no órgão oficial de divulgação do Município, prorrogável a requerimento do interessado por mais 30 (trinta) dias ou, em caso de doença comprovada, enquanto durar o impedimento.
- c. () O prazo para o servidor entrar em exercício será de até 45 (quarenta e cinco) dias, contados da data da posse, sob pena de exoneração.
- d. () São estáveis, após 2 (dois) anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.
- e. () A carga horária normal do trabalho do servidor é de 40 (quarenta) horas semanais, cumpridas em dias e horários próprios, se não houver regulamentação específica.

15. Caracteriza-se a inassiduidade habitual pela falta injustificada ao serviço:

- a. () Por período igual ou superior a 30 (trinta) dias intercalados, durante o período de 6 (seis) meses.
- b. (X) Por período igual ou superior a 60 (sessenta) dias intercalados, durante o período de 12 (doze) meses.
- c. () Por período igual ou superior a 60 (sessenta) dias intercalados, durante o período de 24 (vinte e quatro) meses.
- d. () Por período igual ou superior a 90 (noventa) dias intercalados, durante o período de 12 (doze) meses.
- e. () Por período igual ou superior a 120 (cento e vinte) dias intercalados, durante o período de 24 (vinte e quatro) meses.

Conhecimentos Específicos

(35 questões)

16. As ações preventivas podem ocorrer em momentos diferentes na história da doença. Existem quatro momentos básicos na prevenção de doenças. Sobre eles, é **correto** afirmar.

- a. () A prevenção secundária ocorre antes da instalação das complicações da doença,
- b. () A prevenção terciária ocorre antes da incapacitação ou óbito do paciente.
- c. () A prevenção primária e a secundária não alteram a história natural das doenças.
- d. (X) A prevenção primordial ocorre antes da instalação dos fatores de risco da doença.
- e. () A prevenção primária ocorre antes do diagnóstico clínico e instalação dos fatores de risco da doença.

17. Em relação às ações preventivas de saúde, podemos considerar como exemplo de ações primárias:

- a. () Instruções específicas sobre dieta e exercícios e a prescrição de fármacos a hipertensos.
- b. () Realização de glicemias de jejum em pacientes obesos, mas assintomáticos.
- c. () Uso de inibidores da enzima conversora da angiotensina para evitar eventos cardiovasculares.
- d. () Ações visando prevenir o início da obesidade e sedentarismo em adolescentes e adultos jovens.
- e. (X) Recomendações dietéticas ou exercícios físicos a um paciente obeso, sem diabetes ou portadores de tolerância diminuída a glicose.

18. São diretrizes e características do modelo assistencial do Sistema Único de Saúde:

- a. () Gratuidade, universalidade, equidade, integralidade, descentralização e controle social.
- b. () Gratuidade, equidade, resolubilidade, e controle social.
- c. (X) Universalidade, equidade, integralidade, hierarquização e regionalização, descentralização e controle social.
- d. () Universalidade, gratuidade, integralidade, hierarquização e regionalização, descentralização e controle social.
- e. () Universalidade, equidade, interdisciplinaridade e transdisciplinariedade e controle social.

19. A Varicela é uma doença infecto-contagiosa aguda, causada pelo herpes-vírus *Zoster varicellae*. Sobre ela, é **correto** afirmar que:

- a. (X) O período de incubação é de 11 a 21 dias e o período prodrômico, de 24 horas.
- b. () As complicações mais freqüentes são a pneumonia e encefalite.
- c. () As complicações mais freqüentes são a encefalite e a Síndrome de Reye.
- d. () O aciclovir reduz a duração da febre e o número de lesões e está indicado seu uso de rotina em crianças, dentro de 25 a 48 horas após o início da erupção.
- e. () A erupção apresenta-se com lesões características: primeiro aparecem as vesículas circundadas por mácula eritematosa que se rompem e apresentam crostas.

20. A Coqueluche é uma doença infecto-contagiosa aguda causada por um pequeno bacilo gram-negativo, a *Bordetella pertussis*. Sobre ela, é **correto** afirmar que:

- a. () A imunidade adquirida com a doença é permanente.
- b. (X) As lesões consistem em necrose do epitélio respiratório, com infiltrado local de neutrófilos e macrófagos.
- c. () A fase catarral é inespecífica, com tosse produtiva, que perdura por 24 a 48 horas, seguida pela fase paroxística, com tosse espasmódica característica.
- d. () Após a fase de convalescença, em torno da 4ª semana, o número e a intensidade das crises diminuem e a tosse espasmódica desaparece.
- e. () Crianças com 6 meses de idade frequentemente requerem hospitalização para monitorização dos sinais vitais e risco de pneumotórax.

21. O Sarampo é uma doença infecto-contagiosa causada por um vírus RNA da família *paramixovírus*. Sobre ele, é **correto** afirmar que:

- a. () No Brasil, com a cobertura vacinal e a vigilância epidemiológica, foi considerada erradicada em 2005.
- b. () A complicação mais freqüente do sarampo é a contaminação bacteriana secundária das lesões.
- c. (X) É a mais contagiosa das doenças infecciosas, com uma taxa de ataque secundário em populações susceptíveis próxima de 100%.
- d. () É considerada uma doença benigna quando afeta crianças bem nutridas e de bom nível social.
- e. () O período de incubação é rápido, de até 48 horas, com febre, coriza, hiperemia das mucosas e conjuntival 3 a 4 dias antes do exantema e das manchas de Koplik.

22. Em lactente de 6 meses, que chega à Unidade Local de Saúde com a mãe referindo aumento intermitente do volume da bolsa escrotal desde o nascimento, deve ser considerado o diagnóstico de:

- a. () Distopia testicular.
- b. () Hidrocele septada.
- c. () Hérnia inguino escrotal.
- d. (X) Hidrocele comunicante.
- e. () Hérnia inguinal encarcerada.

23. A estenose hipertrófica do piloro é caracterizada pelo aparecimento de vômitos não biliares em jato, a partir da 4ª semana de vida, usualmente em meninos e primogênitos. Sobre essa doença, pode-se afirmar que:

- a. (X) Sua etiologia permanece desconhecida e o tratamento de escolha é a piloromiotomia.
- b. () Em casos de diagnóstico tardio pode evoluir com acidose hipercalêmica e hipoclorêmica devido a vômitos persistentes.
- c. () O índice de suspeição é lato com a história clínica e a confirmação diagnóstica é feita com ultra-sonografia abdominal ou seriografia esôfago-gastro-duodenal.
- d. () O uso de antieméticos e antiespasmódicos pode diminuir o a espasticidade da musculatura pilórica e evoluir com cura em 2 a 4 semanas.
- e. () As principais complicações da doença são a perfuração gástrica e o refluxo gastro-esofágico.

24. A cardiopatia isquêmica é uma importante causa de mortalidade no Brasil. O diagnóstico da angina é clínico e frequentemente é necessária a confirmação objetiva da doença. Sobre essa confirmação, é **correto** afirmar que:

- a. () O infradesnivelamento do segmento ST de 2 mm ou mais, associado ao aumento da pressão arterial sistólica no teste de esforço, sugerem isquemia miocárdica grave.
- b. (X) O teste funcional está indicado para confirmar o diagnóstico clínico e avaliar a gravidade da isquemia.
- c. () A cintilografia miocárdica está indicada na dúvida diagnóstica com o objetivo de estabelecer a base anatômica da sintomatologia.
- d. () A cineangiocoronariografia é o exame de escolha para o diagnóstico da doença.
- e. () A cineangiocoronariografia está indicada apenas no planejamento de procedimentos de revascularização cirúrgica ou por cateter.

25. O ponto central na insuficiência cardíaca é a presença de dispnéia, congestão e limitação funcional de origem circulatória. Podem ser considerados como Estágio A, segundo a American Heart Association/ American College of Cardiology, pacientes com:

- a. () doença isquêmica coronariana associada.
- b. () hipertrofia, dilatação ou hipocontratilidade ventricular, valvulopatia assintomática, infarto do miocárdio prévio.
- c. () sintomas de insuficiência cardíaca ou assintomáticos com sintomas prévios, incluindo aqueles em classe funcional de I a IV.
- d. () hospitalizações freqüentes, em lista de transplante, em uso de auxílio circulatório contínuo.
- e. (X) hipertensão arterial sistêmica, coronariopatia, diabetes melito, emprego de fármacos cardiotoxicos, abuso de álcool, febre reumática, história familiar de miocardiopatia.

26. Em relação às arritmias cardíacas, assinale a alternativa **correta**:

- a. () Bradiarritmias são arritmias com frequência cardíaca abaixo de 40 bpm, via de regra assintomáticas em indivíduos normais como atletas e vagotônicos.
- b. () As taquiarritmias caracterizam-se por frequências cardíacas acima de 120 bpm, sendo a mais freqüente a taquicardia supraventricular paroxística.
- c. () A taquicardia sinusal ocorre em pacientes com doenças cardíacas primárias ou indivíduos que utilizam substâncias de ação central como xantinas, álcool ou anfetaminas.
- d. () A fibrilação atrial habitualmente é assintomática, com maior frequência em adultos jovens, excedendo 5 a 10% em pacientes abaixo dos 30 anos.
- e. (X) A arritmia sinusal é extremamente freqüente, especialmente em crianças e adolescentes e encontra-se associada à arritmia respiratória e é diagnosticada quando a variação entre o ciclo mais curto e o mais longo for maior que 1,2 segundos.

27. Considerando-se a asma como uma doença inflamatória crônica da via aérea, com limitação variável do fluxo aéreo e responsividade aumentada da traquéia e brônquios aos estímulos, as alterações de provas de função pulmonar nesses pacientes caracterizam-se por:

- a. () Variação Volume Expiratório Forçado (VEF) e da relação VEF/capacidade vital forçada em 50% do previsto.
- b. () Redução de 50% da Volume Expiratório Forçado (VEF) após 6 minutos de corrida.
- c. (X) Aumento de 20% ou mais da variação diurna do Pico de Fluxo Expiratório (PFE) medido 2 vezes ao dia, em pelo menos 3 dias por semana, durante 2 semanas.
- d. () Normalização do Volume Expiratório Forçado (VEF) com nebulização com broncodilatador ou curso com corticosteróide administrado via oral por 2 semanas.
- e. () Demonstração de hipereatividade das vias aéreas com teste de broncoprovocação com agentes brônquio constritores como metacolina e histamina.

28. Segundo o Projeto GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease), coordenado pela OMS, a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é uma doença com limitação do fluxo aéreo, usualmente progressiva, e está associada a uma resposta inflamatória do pulmão, cujo principal fator de risco é:

- a. Tabagismo.
- b. Poeiras e produtos químicos ocupacionais.
- c. Doenças restritivas pulmonares associadas.
- d. Poluição do ar intradomiciliar da combustão de biomassa (lenha)
- e. Poluição do ar extradomiciliar da combustão de derivados de petróleo.

29. As bursas são dispositivos anatômicos situados próximos às estruturas de movimento que visam facilitar a ação dos músculos e tendões, contendo pequenas quantidades de líquidos. Sobre as bursites, podemos afirmar que:

- a. A fase aguda requer repouso da estrutura comprometida e identificação dos fatores desencadeantes e calor local úmido.
- b. A aspiração de líquido da bursa somente deve ser realizada na suspeita de bursites infecciosas.
- c. A bursite isquiática é uma das mais prevalentes, acomete preferencialmente as mulheres e manifesta-se por dor na face lateral da coxa, que pode irradiar para a região glútea e perna.
- d. São decorrentes de processo inflamatório das bursas, em geral relacionadas com traumatismos ou como manifestação de doenças sistêmicas.
- e. A bursite anserina pode gerar dor no pé e no tornozelo, que se agrava ao descer ou subir escadas, sendo mais comum em mulheres obesas.

30. Considera-se o Atestado Médico como a afirmação simples e por escrito de um fato médico e suas conseqüências. Ele deve ser emitido com seguinte condição:

- a. Para certificar condições de sanidade ou doença, intervenções cirúrgicas e suas conseqüências, ou impossibilidade de comparecer ao trabalho e/ou escola.
- b. Deve ser acompanhado do Código de Classificação Internacional de Doenças (CID), sempre que envolver períodos de afastamento ao trabalho e/ou escola.
- c. Nos atestados com finalidade de justificarem faltas no trabalho, quando há necessidade de afastamento superior a 7 dias, o paciente deve ser encaminhado à perícia médica.
- d. O Atestado Médico, explicitando uma incapacidade permanente, é um documento legal que dispensa o parecer de perícia médica.
- e. Nos atestados com finalidade de justificarem faltas no trabalho, a história clínica progressiva de sinais e sintomas clínicos progressivos podem ser incluídos no período de afastamento.

31. O Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica foi criado em 1975, quando implementou a obrigatoriedade de notificação de algumas doenças. Desde então, a avaliação de séries históricas permitiu estabelecer padrões de tendências de algumas doenças transmissíveis.

Assinale a alternativa que indica uma consequência da criação do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica.

- a. Aumento de doenças infecciosas crônicas como a tuberculose e hanseníase.
- b. Redução da incidência de malária e leishmaniose.
- c. Redução da incidência de doenças imunopreveníveis.
- d. Redução de doenças transmissíveis como a cólera e dengue.
- e. Erradicação do sarampo e da raiva humana.

32. No Brasil, existem atualmente 35 doenças de notificação compulsória. Entre elas, podemos citar:

- a. () Febre tifóide, cólera, shigelose e botulismo.
- b. () Rubéola, sarampo, salmonelose e tuberculose.
- c. () Hanseníase, herpes zoster, leptospirose e tétano.
- d. () Hepatite A, Hepatite B, HIV e molusco contagioso.
- e. (X) Difteria, coqueluche, doença meningocócica e meningite por *haemophilus influenzae*.

33. Os acidentes por animais peçonhentos são emergências clínicas e constituem um problema de relevância médica, tanto pelo número de atendimentos que geram, quanto pela mortalidade e morbidade que determinam. Sobre o diagnóstico diferencial a partir do exame físico, podemos afirmar que:

- a. () Edema discreto e presença de alterações neurológicas, mialgias intensas duas horas após o acidente são compatíveis com acidente elapídico.
- b. (X) Edema volumoso a partir de uma hora da picada, sinais puntiformes de implantação de presas e alteração do tempo de coagulação são compatíveis com acidente botrópico.
- c. () Evolução precoce (uma hora) com paralisia dos músculos elevadores das pálpebras, insuficiência ventilatória, hipotensão arterial e dificuldade para deglutição é compatível com acidente crotálico.
- d. () Edema discreto, pouca sintomatologia muscular dolorosa e hematúria macroscópica são compatíveis com acidente botrópico.
- e. () Dor intensa no local da picada associada à diminuição da perfusão de extremidades por edema e síndrome compartimental são compatíveis com acidente crotálico.

34. As características morfológicas de lesões dermatológicas têm grande significado e podem facilitar o reconhecimento diagnóstico. Sobre elas, podemos afirmar:

- a. (X) As leucodermias são manchas brancas por diminuição ou ausência de melanina.
- b. () A xantocromia é a cor amarelada causada pelo depósitos de carotenos.
- c. () Os eritemas são manchas angiomatosas de cor vermelha, permanentes, por aumento do número de capilares.
- d. () Petéquias são manchas vermelhas por extravasamento de hemácias na derme, que não desaparecem à vitropressão, maiores que 1 cm.
- e. () Pápulas são formações sólidas, pedunculadas, decorrentes de hipertrofia das papilas dérmicas e que sangram facilmente.

35. Em relação à dermatite seborréica, assinale a alternativa **correta**:

- a. () É uma doença inflamatória crônica e recorrente e multifatorial, cuja principal característica é a presença de lesões eritemato-escamosas, bem delimitadas, formando placas confluentes.
- b. () O eritema é a lesão primária e a escama, consequência direta da multiplicação acelerada de melanócitos que se acumulam na superfície da pele.
- c. () Os fatores desencadeantes variam desde infecções bacterianas até exposição excessiva a radiações solares, fármacos e estresse emocional.
- d. (X) Fungos do gênero *Malassezia* têm sido os principais microorganismos implicados na patogênese.
- e. () Pode acometer a pele, unhas e articulações, sendo que o comprometimento ungueal é caracterizado por depressões puntiformes na lâmina ungueal e pequenas manchas amarelo acastanhadas no leito ungueal.

36. O vitiligo atinge cerca de 1% da população. A sua principal característica clínica é:

- a. () É uma micose superficial, na qual ocorrem lesões lenticulares hipercrômicas e hipocrômicas, recobertas por descamação fina.
- b. (X) Aparecimento de manchas hipocrômicas na pele e mucosas, provocadas pela destruição de melanócitos.
- c. () É uma hipocrômica pós inflamatória, representando lesões residuais hipocrômicas, com história pregressa de diversas dermatites.
- d. () Corresponde a nevo anêmico, que corresponde à área desprovida de vasos, onde não surge eritema à escarificação da pele.
- e. () Doença fúngica, que acomete exclusivamente a camada mais superficial da pele causada pela *Malassezia furfur*.

37. O câncer de pele é o tipo mais comum de câncer em seres humanos. Sobre as suas apresentações clínicas, podemos afirmar:

- a. () O carcinoma epidermóide apresenta-se inicialmente como pápula rósea, com bordas translúcidas peroladas, às vezes com finas teleangiectasias, que crescem progressivamente até formar um nódulo. Pode ocorrer ulceração central, em geral recoberta por crosta, sangramento intermitente e difícil cicatrização.
- b. () O risco de degeneração maligna de nevos melanocíticos adquiridos está relacionado com o tamanho dos nevos maiores que 5 cm de diâmetro.
- c. () O melanoma é bastante raro antes da puberdade e, quando presente, tem origem no nevo gigante, adquirido em mais da metade dos casos.
- d. (X) O carcinoma basocelular é o tumor maligno mais comum, de crescimento lento, com capacidade invasiva localizada, podendo destruir tecidos adjacentes.
- e. () O melanoma é uma proliferação maligna de queratinócitos da epiderme, tem caráter invasivo e pode originar metástases.

38. Nas Hepatites, os marcadores sorológicos tem um significado. Todas as relações de anticorpos/significado abaixo são corretas, **exceto**:

- a. () Anti-HBe / Convalescença.
- b. () Anti-VCH / Hepatite crônica.
- c. () Anti-HBs / Imune à hepatite.
- d. () IgM anti-VHA / Hepatite aguda.
- e. (X) IgG anti-VHE / Hepatite aguda.

39. Marcos, 25 anos foi encaminhado à Unidade Local de Saúde com suspeita de hepatite B aguda. A investigação sorológica realizada mostrou HBsAg (+) e IgM anti-HBc (-). Sobre o resultado desses exames, podemos considerar como sendo:

- a. () Não infectado, apenas cicatriz imunológica.
- b. (X) Infecção aguda ou falso positivo, solicitar IgM anti-HBc em 15 dias.
- c. () Infecção crônica.
- d. () Infecção aguda.
- e. () Falso negativo.

40. A Doença de Chagas é uma doença endêmica, que não apresenta variações clínicas ou sazonais de importância epidemiológica. A principal forma de transmissão em centros urbanos é:

- a. (X) Transfusão de sangue.
- b. () Durante a gestação, por via placentária.
- c. () Pela ingestão de alimentos contaminados.
- d. () Por meio de vetores, nas fezes dos insetos triatomídeos.
- e. () Uso de drogas injetáveis, com seringas compartilhadas.

41. A Dengue constitui-se no momento em um grave problema de saúde pública no Brasil. As medidas profiláticas e de controle dessa doença baseiam-se fundamentalmente:

- a. () Na vacinação da população de áreas epidêmicas e endêmicas.
- b. (X) Na vigilância epidemiológica e no combate ao vetor.
- c. () No isolamento preventivo de pacientes com diagnóstico laboratorial confirmado, tanto virilógico quanto sorológico.
- d. () No saneamento básico de comunidades afetadas.
- e. () No tratamento da água e na higiene dos alimentos.

42. A Dengue é uma doença de notificação compulsória e, para fins de vigilância epidemiológica, deve-se sempre procurar confirmar o diagnóstico por meio de exames laboratoriais. Indique método ideal de confirmação da Dengue:

- a. () Coagulograma.
- b. () Prova de resistência capilar.
- c. (X) Isolamento e identificação viral.
- d. () Detecção de antígenos virais.
- e. () Testes sorológicos para detecção de anticorpos.

43. O Brasil ocupa o 2º lugar, atrás da Índia, em número de casos da endemia de Hanseníase. Pacientes com placas eritematosas, eritemato-hipocrômicas, bem delimitadas, hipo ou anestésicas com comprometimento de nervos, caracterizam a forma de:

- a. () Hanseníase Dimorfa.
- b. () Hanseníase Tuberosa.
- c. () Hanseníase Virchowiana.
- d. (X) Hanseníase Tuberculóide.
- e. () Hanseníase Indeterminada.

44. Dentro da organização dos serviços de saúde pública no Brasil, existem programas estaduais e municipais de controle da tuberculose que atuam baseados em prioridades de atendimento. Tais prioridades compreendem:

- a. () Campanhas educativas e de esclarecimento.
- b. () Identificação e tratamento de pacientes bacilíferos, por um período de 3 a 6 meses.
- c. () Diagnóstico, com realização de PPD em contatos de pacientes bacilíferos.
- d. () Diagnóstico, com realização de Rx de tórax em contatos de pacientes bacilíferos.
- e. (X) Prevenção, que inclui medidas como vacinação com BCG intradérmico e quimioprofilaxia, pós-exposição com hidrazida.

45. Para o diagnóstico da tuberculose pulmonar em adultos, o método diagnóstico de maior sensibilidade para a sua confirmação é:

- a. () Biopsia pleural.
- b. () Radiografia de tórax.
- c. () Aspiração de lavado gástrico.
- d. (X) Broncoscopia com lavado alveolar.
- e. () Pesquisa de BAAR no escarro, com uma concentração mínima de 5.000 bacilos por milímetro de secreção.

46. As recomendações do Ministério da Saúde para início de terapia anti-retroviral em pacientes com HIV-AIDS são:

- a. () Sempre iniciar o tratamento após o diagnóstico.
- b. () Indivíduos assintomáticos sem contagem de células CD4 disponível.
- c. (X) Indivíduos assintomáticos com CD4 inferior a 200 células por mm³.
- d. () Indivíduos assintomáticos com CD4 entre 200 e 350 células por mm³.
- e. () Indivíduos assintomáticos com CD4 maior que 350 células por mm³.

47. Um homem de 26 anos, previamente saudável, tem um quadro de febre, mal estar geral, mialgias e dor de garganta. Três dias após, quando já estava totalmente assintomático e sem qualquer alteração ao exame físico, ele apresenta hematúria macroscópica e o exame de urina mostra 3+ de proteína, cilindros hemáticos e hematúria importante e a creatinina sérica é 0,9 mg/dl. O mais provável diagnóstico clínico é:

- a. () Doença de lesão mínima.
- b. (X) Nefropatia por Imunoglobulina A.
- c. () Glomerulonefrite rapidamente progressiva.
- d. () Glomerulonefrite membrano-proliferativa.
- e. () Glomerulonefrite difusa aguda pós-estreptocócica.

48. Com relação ao tratamento da hipertensão arterial sistêmica e doença renal:

- a. () O uso de beta-bloqueadores é contra-indicado para tratar hipertensão arterial sistêmica em pacientes com diabetes e lesão renal.
- b. () Pacientes que apresentem doença renal só deverão ter níveis alvos mais baixos para controle da pressão arterial se já tiverem uma taxa de filtração glomerular $< 60 \text{ ml / min / } 1,73 \text{ m}^2$.
- c. () Não há nenhuma preferência no uso de drogas no controle da hipertensão arterial em pacientes com doença renal. O importante é controlar a pressão.
- d. () Pacientes com insuficiência renal crônica com taxa de filtração glomerular $< 50 \text{ ml / min / } 1,73 \text{ m}^2$ têm contra-indicação para o uso de inibidores da enzima conversora da angiotensina.
- e. (X) Pacientes que apresentem alguma doença renal (de qualquer causa e em qualquer estágio) devem ter níveis alvos para controle da pressão arterial mais baixos que a população em geral.

49. Dentre as drogas abaixo, indique a mais indicada no tratamento da cistite bacteriana na mulher jovem:

- a. () Ampicilina.
- b. () Nitrofurantoína.
- c. (X) Sulfametoxazol + trimetoprim.
- d. () Levofloxacina.
- e. () Penicilina.

50. Considere um paciente com diabetes mellitus. A esse respeito, assinale a alternativa **correta**.

- a. (X) A nefropatia é mais comum no diabético tipo II.
- b. () Seu quadro clínico clássico é de uma síndrome nefrítica.
- c. () O primeiro sinal laboratorial de nefropatia diabética é a presença de proteinúria $> 200 \text{ mg}$ nas 24 horas.
- d. () Devemos evitar o uso de inibidor de enzima conversora da angiotensina pelo risco maior de hipercalemia.
- e. () O controle glicêmico deve ser feito com insulinoterapia pois os estudos mostram proteção renal com o uso de insulina.



**FEPESE • Fundação de Estudos e
Pesquisas Sócio-Econômicos**
Campus Universitário • UFSC
88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3233-0737
<http://www.fepese.ufsc.br>