

Caderno de Prova

S22

Médico (Angiologia)

Dia: 16 de março de 2008 • Horário: das 14 às 18 h

Duração: 4 (quatro) horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova:

- se faltam folhas, se a seqüência de questões, no total de 50 (cinquenta), está correta;
- se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado. O gabarito da prova será divulgado no site do concurso.

<http://pmf.fepese.ufsc.br>

Conhecimentos Gerais

(15 questões)

Língua Portuguesa

(8 questões)

Texto

1 Em 1807, o imperador francês era o senhor abso-
2 luto da Europa. Seus exércitos **havam colocado de**
3 **joelhos** todos os reis e rainhas do continente, numa
4 sucessão de vitórias surpreendentes e brilhantes.
5 Só não haviam conseguido **subjugar** a Inglaterra.
6 Protegidos pelo Canal da Mancha, os ingleses tinham
7 evitado o confronto direto em terra com as forças de
8 Napoleão. Ao mesmo tempo, haviam se consolidado
9 como os senhores dos mares na batalha de Trafalgar,
10 em 1805, quando sua Marinha de Guerra, sob o
11 comando de Lord Nelson, destruiu, na entrada do
12 Mediterrâneo, as esquadras combinadas da França e
13 da Espanha. Napoleão reagiu decretando o bloqueio
14 continental, medida que previa o fechamento dos
15 portos europeus ao comércio de produtos britânicos.
16 Suas ordens foram imediatamente obedecidas por
17 todos os países, com uma única exceção: o pequeno e
18 desprotegido Portugal.

GOMES, Laurentino. 1808. São Paulo: Planeta do Brasil, 2007, p. 33.

1. As afirmativas abaixo são falsas de acordo com o texto. Assinale aquela que se torna **verdadeira** de acordo com o texto se for trocada uma palavra ou expressão pela que está entre parênteses.

- a. () A Inglaterra havia sido subjugada. (derrotada)
- b. () Napoleão permitiu que Portugal mantivesse o comércio com a Inglaterra. (concordou)
- c. () As esquadras combinadas da França e da Espanha derrotaram a esquadra inglesa. (venceram)
- d. () As ordens de Napoleão decretando o bloqueio foram obedecidas tardiamente. (precocemente)
- e. (X) Os exércitos do imperador francês haviam sofrido reveses surpreendentes. (obtido vitórias)

2. Com base no texto, assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso.

- () Em 1805, a Espanha estava aliada à França.
- () A expressão “havam colocado de joelhos”, sublinhada no texto, poderia ser substituída por “havam derrotado”, sem significativa alteração de sentido.
- () O verbo “subjugar”, destacado no texto, tem o sentido de vencer, dominar.
- () Em toda a Europa, nenhum país se atreveu a desobedecer ao bloqueio continental decretado pelo imperador francês, com exceção de Portugal e Inglaterra.
- () O Canal da Mancha foi um empecilho para a resistência interna dos ingleses às forças inimigas.

A seqüência **correta**, de cima para baixo, é:

- a. () V – V – V – V – F
- b. (X) V – V – V – F – F
- c. () V – F – F – V – F
- d. () F – V – V – V – V
- e. () F – F – V – F – V

3. Assinale a alternativa em que as opções a) e b) são igualmente **corretas**, em relação ao plural das palavras:

- a. () a) gás – gases
b) chapéu – chapéis
- b. () a) degrau – degrais
b) fuzil – fuzis
- c. () a) mares azul-escuros
b) uniformes verdes-garrafas
- d. (X) a) papel – papéis
b) farol – faróis
- e. () a) luvas cinzas
b) sapatos cor-de-rosa

4. Considere as afirmativas abaixo, baseadas no texto.

- I. O pronome **seus**, em “seus exércitos” (linha 2), refere-se ao imperador francês; o mesmo ocorre com o pronome **sua**, em “sua Marinha de Guerra”, (linha 10).
- II. Em “os ingleses tinham evitado o **confronto direto**” (linhas 6 e 7), a expressão destacada é um objeto direto.
- III. Em “o fechamento **dos portos europeus**” (linhas 14 e 15), a expressão destacada é um objeto indireto.
- IV. Em “Suas ordens foram imediatamente obedecidas **por todos os países**” (linha 16), a expressão destacada é agente da passiva.

Assinale a alternativa em que todas as afirmativas são **corretas**.

- a. () I – II
- b. (X) II – IV
- c. () I – II – III
- d. () I – III – IV
- e. () II – III – IV

5. A partir do texto, analise as afirmativas abaixo:

- I. “...tinham evitado o confronto direto com as forças de Napoleão” pode ser substituída por “tinham evitado o confronto direto com as forças napoleônicas”, sem prejuízo do sentido original.
- II. Os vocábulos **Mediterrâneo, britânicos e países** são acentuados devido à mesma regra de acentuação gráfica.
- III. “...numa sucessão de vitórias” tem o mesmo sentido que “numa seqüência de vitórias”.
- IV. Em “medida que previa o fechamento dos portos” **que** é pronome relativo referente ao vocábulo **medida**.

Assinale a alternativa **correta**.

- a. () Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
- b. () Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
- c. (X) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- d. () Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- e. () Todas as afirmativas estão corretas.

6. Leia atentamente as proposições abaixo:

1. *Um assessor, dirigindo-se ao governador:*
—Restituo a Vossa Excelência projeto de lei devidamente apreciado.
2. *O prefeito, dirigindo-se aos vereadores:*
—Estamos no senso de responsabilidade.
3. *Um deputado, dirigindo-se a uma eleitora:*
—Informo a V.Sa. de que observações serão levadas em consideração.

Assinale a alternativa que completa, de forma seqüencial e **correta**, as lacunas.

- a. () seu ; confiante ; seu ; suas
- b. () seu ; confiante ; seu ; vossas
- c. (X) seu ; confiante ; vosso ; suas
- d. () vosso ; confiantes ; seu ; vossas
- e. () vosso ; confiantes ; vosso ; vossas

7. Assinale a alternativa **correta**.

- a. () Precisam-se de digitadores.
- b. () Houveram muitas pessoas na festa.
- c. () Fazem cinco anos que Joana partiu.
- d. () Mais de um lavrador compraram tratores.
- e. (X) Pagaram a dívida o chefe e os funcionários.

8. Analise as proposições abaixo e assinale a única **correta**.

- a. () Quero falar consigo.
- b. () Nunca viu-se tamanha bobagem!
- c. (X) Assim como é correto dizer “Meus pais saíram conosco” também é correta a frase “O chefe falou com nós mesmos”.
- d. () As frases “Os rapazes não estavam rindo só das meninas” e “Os rapazes não estavam rindo, só das meninas” possuem o mesmo sentido.
- e. () Em “Suas ordens e decretos foram obedecidos”, o particípio *obedecidos* poderia estar no feminino – *obedecidas* – sem prejuízo da correção gramatical e lingüística.

Matemática

(3 questões)

9. Em dezembro de 2007, vigorava no Brasil a seguinte tabela para o cálculo do imposto de renda sobre os salários.

Imposto de renda retido na fonte

Tabela Progressiva Mensal		
Base de cálculo (R\$)	Alíquota %	Parcela a deduzir (R\$)
Até 1.313,69	–	–
De 1.313,70 até 2.625,12	15,0	197,05
Acima de 2.625,12	27,5	525,19

Fonte: <http://www.receita.fazenda.gov.br> Consulta: 12/12/2007

Com base nos dados fornecidos pela tabela, o imposto de renda retido na fonte por uma pessoa que recebe um salário mensal de R\$ 3.000,00 é:

- a. () R\$ 825,00
- b. () R\$ 721,90
- c. () R\$ 525,19
- d. (X) R\$ 299,81
- e. () R\$ 103,09

10. Um banco concedeu a um cliente um empréstimo a juros simples por 18 meses. Se o montante (capital inicial + juro) é igual a 190% do capital emprestado, então a taxa mensal do empréstimo é:

- a. () 2%
- b. (X) 5%
- c. () 7%
- d. () 10,5%
- e. () 20%

11. Na preparação de um evento da prefeitura municipal trabalharam 25 funcionários (de mesma capacidade de trabalho) durante 18 dias. Decorridos os 18 dias do início da tarefa, foram contratados 5 funcionários (de mesma capacidade de trabalho dos primeiros) que trabalharam junto com os primeiros durante 10 dias. Em quanto tempo teria sido concluída a tarefa se os 30 funcionários tivessem trabalhado desde o início?

- a. () 14
- b. () 21
- c. (X) 25
- d. () 28
- e. () 30

Estudos Sociais

(2 questões)

12. Recentemente, na cidade de Bali na Indonésia, 190 países aprovaram o “Mapa do Caminho”, de grande importância para o futuro da humanidade.

Assinale a alternativa **correta**.

- a. (X) O chamado Mapa do Caminho de Bali define um roteiro com os princípios que vão guiar as negociações do regime global de mudanças climáticas, que sucederá ao Protocolo de Kyoto, a partir de 2012.
- b. () O Mapa do Caminho coloca fim ao conflito entre a Coreia do Norte e Coreia do Sul, causa de grande instabilidade na região desde a Segunda Guerra Mundial.
- c. () O Mapa do Caminho sinaliza uma solução para os conflitos tribais na África, principalmente na região do Saara, o que certamente significará a salvação de milhares de vidas humanas.
- d. () O Mapa do Caminho é um protocolo em que se propõem medidas de combate à AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis, barateando o custo do tratamento para que ele se torne acessível às nações mais pobres.
- e. () As diretrizes do Mapa do Caminho permitirão o fim do conflito entre o governo do presidente Uribe e o movimento guerrilheiro na Colômbia.

13. Leia a notícia:

DF tem maior Índice de Desenvolvimento Juvenil do País

A terceira edição do Índice de Desenvolvimento Juvenil (IDJ), medida agora em 2007, e preparada pelo pesquisador Julio Jacobo Waiselfiz, mostrou que as mortes violentas caíram, a desigualdade social diminuiu e a educação mostra avanços no País [...]

“Há sinais de evolução, em especial na área de saúde. Ainda é um processo vacilante, mas mostra que há condições para que se melhore mais”, afirmou Waiselfiz. As melhorias se concentram na educação e na saúde, onde, pela primeira vez desde 2003, alguns Estados, como São Paulo mostraram redução nos casos de mortes violentas de jovens. “Não é homogêneo. Há muitas diferenças, houve aumento em alguns lugares, mas existem pontos de queda”, explicou o pesquisador.

Disponível em: <http://noticias.br.msn.com/artigo.aspx?cp-documentid=5890093>. Acesso em 20/12/2007.

Assinale a alternativa verdadeira em relação ao “índice de Desenvolvimento Juvenil do País”.

- a. () A região nordeste, não obstante serem elevados os índices de pobreza, destacou-se entre as regiões com os melhores IDJ do Brasil.
- b. () O Estado de Rondônia destacou-se, nesta pesquisa, como o Estado que apresentou os melhores índices em 2007.
- c. () O Rio Grande do Sul vem em primeiro lugar entre os Estados com os melhores IDJ do país.
- d. (X) O Distrito Federal e o Estado de Santa Catarina destacaram-se entre as regiões com os melhores IDJ do Brasil.
- e. () O pior Índice de Desenvolvimento Juvenil foi alcançado, devido ao grande índice de violência urbana, pelo Estado de São Paulo.

Legislação

(2 questões)

14. Assinale a alternativa **correta**:

- a. (X) A vacância do cargo público decorrerá de exoneração, demissão, aposentadoria ou falecimento.
- b. () A posse do candidato aprovado em concurso público ocorrerá no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados da publicação do ato de nomeação no órgão oficial de divulgação do Município, prorrogável a requerimento do interessado por mais 30 (trinta) dias ou, em caso de doença comprovada, enquanto durar o impedimento.
- c. () O prazo para o servidor entrar em exercício será de até 45 (quarenta e cinco) dias, contados da data da posse, sob pena de exoneração.
- d. () São estáveis, após 2 (dois) anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.
- e. () A carga horária normal do trabalho do servidor é de 40 (quarenta) horas semanais, cumpridas em dias e horários próprios, se não houver regulamentação específica.

15. Caracteriza-se a inassiduidade habitual pela falta injustificada ao serviço:

- a. () Por período igual ou superior a 30 (trinta) dias intercalados, durante o período de 6 (seis) meses.
- b. (X) Por período igual ou superior a 60 (sessenta) dias intercalados, durante o período de 12 (doze) meses.
- c. () Por período igual ou superior a 60 (sessenta) dias intercalados, durante o período de 24 (vinte e quatro) meses.
- d. () Por período igual ou superior a 90 (noventa) dias intercalados, durante o período de 12 (doze) meses.
- e. () Por período igual ou superior a 120 (cento e vinte) dias intercalados, durante o período de 24 (vinte e quatro) meses.

Conhecimentos Específicos

(35 questões)

16. A estratégia Saúde da Família é um modelo de organização dos serviços de Atenção Primária à Saúde, do Sistema Único de Saúde, caracterizado por:

- a. () Equipes multiprofissionais compostas por um médico generalista ou de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e quatro a seis agentes comunitários de saúde, responsáveis pela atenção integral e contínua de cerca de 8000 famílias.
- b. () Equipes multiprofissionais compostas por um médico generalista, um pediatra e um ginecologista, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e quatro a seis agentes comunitários de saúde, responsáveis pela atenção integral e contínua de cerca de 800 famílias.
- c. () Equipes multiprofissionais compostas por um médico generalista, um pediatra e um ginecologista, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e quatro a seis agentes comunitários de saúde, responsáveis pela atenção integral e contínua de cerca de 8000 famílias.
- d. () Equipes multiprofissionais compostas por um médico generalista ou de família, um odontólogo e quatro a seis agentes comunitários de saúde, responsáveis pela atenção integral e contínua de cerca de 800 famílias.
- e. (X) Equipes multiprofissionais compostas por um médico generalista ou de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e quatro a seis agentes comunitários de saúde, responsáveis pela atenção integral e contínua de cerca de 800 famílias.

17. Em relação às atribuições específicas do médico na Estratégia de Saúde da família, é **correto** afirmar:

- a. () Trabalha com adscrição de famílias em base geográfica definida, a microárea.
- b. () Gerencia os insumos necessários para o adequado funcionamento da Unidade local de Saúde.
- c. () Realiza diagnóstico com finalidade de obter o perfil epidemiológico para planejamento e programação em saúde bucal.
- d. (X) Realiza assistência integral aos indivíduos e famílias em todas as fases do desenvolvimento humano.
- e. () Desenvolve atividades de promoção da saúde e de prevenção das doenças e agravos, por meio de visitas domiciliares e ações educativas individuais e coletivas nos domicílios e comunidade.

18. As ações preventivas no Sistema Único de Saúde podem ocorrer em momentos diferentes na história da doença. Existem quatro momentos básicos na prevenção de doenças. Sobre eles, é **correto** afirmar.

- a. (X) A prevenção primordial ocorre antes da instalação dos fatores de risco da doença.
- b. () A prevenção primária ocorre antes do diagnóstico clínico e instalação dos fatores de risco da doença.
- c. () A prevenção secundária ocorre antes da instalação das complicações da doença.
- d. () A prevenção terciária da incapacitação ou óbito do paciente.
- e. () A prevenção primária e secundária não alteram a história natural das doenças.

19. Em relação às ações preventivas de saúde podemos considerar como exemplo de ações primárias:

- a. () Realização de glicemias de jejum em pacientes obesos, mas assintomáticos.
- b. () Ações visando prevenir o início da obesidade e sedentarismo em adolescentes e adultos jovens.
- c. () Instruções específicas sobre dieta e exercícios e a prescrição de fármacos a hipertensos.
- d. () Uso de inibidores da enzima convertora da angiotensina para evitar eventos cardiovasculares.
- e. (X) Recomendações dietéticas ou exercícios físicos a um paciente obeso, sem diabetes ou portadores de tolerância diminuída à glicose.

20. São diretrizes e características do modelo assistencial do Sistema Único de Saúde:

- a. (X) Universalidade, equidade, integralidade, hierarquização e regionalização, descentralização e controle social.
- b. () Gratuidade, universalidade, equidade, integralidade, descentralização e controle social.
- c. () Universalidade, equidade, interdisciplinaridade e transdisciplinariedade e controle social.
- d. () Gratuidade, equidade, resolubilidade e controle social.
- e. () Universalidade, transdisciplinaridade, integralidade, hierarquização e regionalização, descentralização e controle social.

21. Assinale a alternativa que completa **corretamente** a sentença.

A cirurgia de varizes de membros inferiores poderá ser indicada em pacientes com:

- a. (X) linfedema.
- b. () infarto do miocárdio recente.
- c. () varizes em membro isquêmico.
- d. () presença de úlcera de estase infectada.
- e. () hipo ou agenesia de sistema venoso profundo.

22. Assinale a alternativa que completa **corretamente** a sentença.

O tratamento clínico da úlcera de estase, utilizando a Maggot Terapia, consiste no uso de substâncias de ação:

- a. () osmótica.
- b. (X) biológica.
- c. () analgésica.
- d. () antisséptica.
- e. () proteolítica exógena.

23. Com relação à isquemia intestinal crônica, assinale a alternativa **correta**.

- a. () Faz diagnóstico diferencial com neoplasia de intestino delgado.
- b. () O emagrecimento precede ao aparecimento de dor pós prandial.
- c. () Ao exame físico, é auscultado sopro sistólico de ejeção no epigástrio.
- d. (X) Pode ser uma manifestação da Síndrome de Nicholson.
- e. () A raridade das manifestações clínicas é decorrência da intensa circulação colateral entre as artérias cólica direita e cólica esquerda, também conhecida como arcada de Riouland.

24. Assinale a alternativa que completa **corretamente** a sentença.

O paciente portador de tromboflebite superficial de membro superior deve:

- a. () receber a prescrição de antibiótico.
- b. () ser tratado com heparina sódica.
- c. (X) ser acompanhado ambulatorialmente.
- d. () ser submetido a tratamento cirúrgico de urgência.
- e. () ser submetido a exame Eco Doppler Colorido do sistema venoso profundo.

25. Com relação à parede vascular, assinale a alternativa **incorreta**.

- a. () A adventícia da veia é mais espessa do que a adventícia de artérias de calibre semelhante.
- b. () As arteríolas possuem a camada média desprovida da camada limitante elástica interna.
- c. () A camada média das artérias elásticas é constituída, predominantemente, por células musculares lisas, colágeno e substância fundamental.
- d. (X) Capilares são vasos constituídos de células endoteliais interpostas por fibras musculares lisas.
- e. () Artéria muscular é caracterizada por uma progressiva diminuição do componente elástico da camada média, que é compensado pelo aumento do componente muscular.

26. Assinale a alternativa que completa **corretamente** a sentença.

Paciente com claudicação intermitente na panturrilha, deve apresentar oclusão isolada:

- a. () da artéria ilíaca interna.
- b. () da artéria ilíaca comum.
- c. () da artéria tibial posterior.
- d. () da artéria femoral profunda.
- e. (X) do território fêmoro-poplíteo acima do joelho.

27. Quanto à doença linfática, assinale a alternativa **correta**.

- a. () É conhecida como linfangite aguda quando o agente etiológico é o estreptococo beta hemolítico.
- b. (X) Denomina-se edema rizomélico, o que tem início na raiz da coxa.
- c. () O agente etiológico mais comum é o estafilococos aureus.
- d. () É uma manifestação própria da Síndrome de Klippel Trenaunay.
- e. () O linfedema secundário é sempre de origem inflamatória.

28. Assinale a alternativa que indica **corretamente** o que caracteriza a Síndrome de Mc Ardle:

- a. () Miosite.
- b. () Artrite migratória.
- c. (X) Dor muscular aos exercícios.
- d. () Acúmulo de glicogênio tipo IV no tecido muscular.
- e. () Aumento da concentração de glicogenofosforilase no tecido muscular.

29. Um paciente apresenta quadro de embolia arterial aguda, caracterizado por ausência do pulso femoral. Assinale a alternativa que **não** indica uma causa desse quadro clínico.

- a. (X) hipotireoidismo.
- b. () hipertireoidismo.
- c. () infarto do miocárdio.
- d. () injeção intra-arterial.
- e. () aneurismas arteriais.

30. Sobre o Dispositivo Eco Color Doppler, assinale a alternativa **incorreta**.

- a. () Deve ser considerado o exame de escolha para avaliação inicial das lesões carotídeas.
- b. () Pode ser utilizado para o acompanhamento de pacientes com trombose venosa profunda.
- c. (X) É o exame de eleição para o estudo dos ramos viscerais, que emergem do saco aneurismático na aorta infrarrenal.
- d. () É uma modalidade de instrumento que utiliza a combinação da imagem, dada por um ultrassom modo B, com a velocidade, dada por um doppler ultra-som de onda contínua.
- e. () Para o diagnóstico das lesões obstrutivas e estenosantes, analisa a velocidade local, acrescida das informações morfológicas dadas pela imagem.

31. Assinale a alternativa **correta**, a respeito da semiologia vascular:

- a. () Rubor cutâneo com diminuição da temperatura indica circulação colateral eficiente.
 - b. (X) Vasoconstricção com hiperidrose é sinal de hiperatividade simpática.
 - c. () Espasmo venular produz palidez com hipotermia.
 - d. () Cianose intermitente é sinal de inviabilidade tissular.
 - e. () Livedo reticular é um sinal patognomônico de periarterite nodosa.
-

32. Nos pacientes amputados em membros inferiores, a prótese deve sustentar de forma adequada o peso do corpo. Qual o local de apoio considerado **correto**, nas amputações?

- a. () De Syme, o apoio é lateral.
 - b. () Ao nível do pé, o apoio é terminal.
 - c. () De coxa, o ponto de apoio é o púbis.
 - d. () A de Chopard não permite o uso de próteses.
 - e. (X) De perna, o apoio é o tendão patelar acima de sua inserção na tuberosidade anterior da tibia.
-

33. Assinale a alternativa que completa **corretamente** a sentença.

A sintomatologia decorrente da Síndrome de Aprisionamento da Artéria Poplítea ocorre por:

- a. () comprometimento da veia poplítea.
- b. (X) compressão da artéria poplítea, pela inserção medial do músculo gastrocnêmio.
- c. () compressão da artéria poplítea, pela inserção lateral do músculo gastrocnêmio.
- d. () oclusão aguda da artéria poplítea de origem embólica.
- e. () hematoma, em decorrência de traumatismo do joelho.

34. Com relação à Síndrome de Leriche, assinale a alternativa **correta**.

- a. () É mais freqüente em pacientes do sexo feminino.
 - b. () É causada por trombose venosa ileofemoral.
 - c. () É caracterizada por fístula arteriovenosa aorto-cava.
 - d. () É acompanhada de dor pós-prandial e emagrecimento.
 - e. (X) Claudicação intermitente de coxas e panturrilhas, atrofia de membros inferiores e disfunção erétil masculina fazem parte do quadro clínico.
-

35. Com relação ao pé diabético, assinale a alternativa **correta**.

- a. () A polineuropatia distal é consequência da auto-simpatectomia.
 - b. () A neuropatia sensitiva periférica é encontrada em 50% dos pacientes diabéticos.
 - c. () A microangiopatia é encontrada em 98% dos pacientes diabéticos.
 - d. (X) Lesões cutâneas e profundas são decorrentes de complicações neuropáticas, vasculares e infecciosas.
 - e. () A perda da sensibilidade do pé diabético chama-se sinal de Charcot.
-

36. Assinale a alternativa que corresponde à doença arterial mais comum em jovens tabagistas, que determina lesões obstrutivas infra-geniculares:

- a. (X) Doença de Buerger
- b. () Displasia fibromuscular
- c. () Cisto da artéria poplítea
- d. () Aneurisma de artéria poplítea
- e. () Aterosclerose obliterante periférica

37. Diante de um paciente com suspeita de trombose venosa profunda aguda, assinale a alternativa que demonstra a conduta a ser adotada:

- a. () A terapêutica anticoagulante somente deve ser iniciada após a confirmação diagnóstica com Eco Color Doppler.
- b. () A flebografia é o melhor método para a confirmação diagnóstica e deve ser solicitada mesmo em casos onde a clínica é discreta.
- c. () Todos os pacientes devem ser internados e submetidos à anticoagulação com heparina endovenosa em infusão contínua.
- d. (X) O tratamento da trombose venosa profunda pode ser iniciado com heparina de baixo peso molecular em regime ambulatorial.
- e. () Até a confirmação diagnóstica da trombose venosa profunda com Eco Color Doppler, devemos manter o paciente com cumarínicos.

38. Assinale a alternativa que apresenta a droga com efeito direto sobre a trombina:

- a. (X) Hirudina
- b. () Heparina Sódica
- c. () Heparina de baixo peso molecular
- d. () Heparina Cálcica
- e. () Cumarínicos

39. Em relação aos exames angiográficos, assinale a resposta **correta**.

- a. () O sinal da taça invertida aparece na arteriografia do aprisionamento da artéria poplítea.
- b. (X) O sinal da cimitarra aparece no exame angiográfico da doença cística da artéria poplítea.
- c. () A estenose arterial ao nível do canal de Hunter é sugestivo de aprisionamento da artéria poplítea.
- d. () A imagem em forma de "saca-rolha" aparece nos exames angiográficos de pacientes com aneurisma de artéria poplítea.
- e. () A arteriografia digital não oferece nenhuma vantagem em relação à arteriografia convencional.

40. Os anticoagulantes orais são utilizados com frequência na Angiologia. Com relação ao assunto, assinale a alternativa **correta**:

- a. () O uso concomitante com alopurinol, metronidazol e cimetidina provoca redução do efeito do anticoagulante oral devido à diminuição do seu catabolismo.
- b. () Essas drogas podem ser utilizadas com segurança no primeiro trimestre da gestação, uma vez que a paciente não será submetida ao parto antes deste período.
- c. () O anticoagulante oral é a droga de escolha para o tratamento da trombose venosa profunda durante toda a gestação.
- d. () A dosagem do anticoagulante oral deve ser controlada periodicamente mediante a realização do tempo de tromboplastina parcial ativada.
- e. (X) Nos pacientes com trombose venosa profunda e embolia pulmonar, recomenda-se o tratamento com anticoagulante durante 6 meses.

41. Assinale a alternativa **correta**, com relação às doenças arteriais inflamatórias:

- a. () A arterite temporal cursa com sinais laboratoriais bastante específicos que normalmente confirmam o diagnóstico.
- b. () A tromboangeíte obliterante é mais frequente em homens fumantes com idade superior a 70 anos.
- c. (X) A abordagem cirúrgica da arterite de Takayasu não é a melhor opção na fase aguda da doença.
- d. () Na arterite temporal, as alterações histológicas encontradas na biópsia de artéria temporal não são segmentares; portanto, o segmento retirado deverá ser o menor possível.
- e. () As alterações arteriográficas observadas na tromboangeíte obliterante são de artérias de médio e grande calibre.

42. A embolia é uma das causas de oclusão arterial aguda. O local mais comumente afetado nestes casos é:

- a. a bifurcação da artéria ilíaca.
 - b. porção proximal da artéria braquial.
 - c. qualquer segmento da artéria poplítea.
 - d. a bifurcação da artéria femoral comum.
 - e. a artéria femoral superficial ao nível dos adutores.
-

43. A descoberta do sistema linfático é atribuída a:

- a. Jean Pecquet
 - b. E. W. Starling
 - c. William Harvey
 - d. James Bartholin
 - e. Gasparo Asselius
-

44. Qual dos elementos abaixo é utilizado em exames de ressonância magnética para melhorar a qualidade da imagem em doenças vasculares? Assinale-o.

- a. Gadolínio
 - b. Iopamiron
 - c. Hexabrix
 - d. Lpiodol
 - e. Telebrix
-

45. Assinale a alternativa **correta** em relação à embolia pulmonar:

- a. O filtro de cava tipo Simon não pode ser implantado por via percutânea.
- b. O filtro de veia cava tipo LGM deixou de ser indicado uma vez que necessita de uma abordagem cirúrgica.
- c. O filtro de veia cava tipo “ninho de pássaro” pode ser implantado em veia cava com calibre acima de 40 mm.
- d. Os filtros de veia cava não devem ser implantados em pacientes politraumatizados.
- e. O melhor método para evitar uma embolia pulmonar é a implantação de um filtro de veia cava.

46. Assinale a alternativa **correta**, em relação ao aneurisma de aorta abdominal infrarenal:

- a. Aneurismas menores de 4 cm podem romper.
 - b. Aneurismas com mais de 6 cm de diâmetro não têm indicação cirúrgica.
 - c. A maioria dos aneurismas de aorta são supra-renais.
 - d. Nos casos de ruptura, o índice de mortalidade chega a 20%.
 - e. O diagnóstico pelo exame físico não pode ser feito, uma vez que a aorta é retroperitoneal.
-

47. Assinale a alternativa que determina uma contra-indicação para a revascularização fêmoro-distal, em caso de isquemia crítica:

- a. Fração de ejeção < 20% por cintilografia cardíaca.
 - b. Estudo angiográfico, sem enchimento de vasos de perna.
 - c. Existência de ponte fêmoro-distal prévia.
 - d. Tromboflebite de veia safena interna
 - e. Anquilose do joelho.
-

48. Assinale a alternativa **correta**, em relação à fistula arteriovenosa de vasos femorais:

- a. O sinal de Nicoladoni-Brahan é encontrado somente em microfístulas.
- b. A compressão da fistula de longa evolução promove redução da pressão arterial.
- c. A compressão da fistula de longa evolução, promove aumento da frequência cardíaca.
- d. O diagnóstico é essencialmente clínico pela constatação de frêmito e sopro no local.
- e. O tratamento deve ser realizado somente na fase tardia da doença.

49. Assinale a alternativa **correta**, em relação à oclusão arterial aguda de membro inferior:

- a. () O tratamento da trombose arterial aguda sempre é feito com cateter de Fogarty.
 - b. (X) A heparinização só deverá ser iniciada nos casos onde a cirurgia não estiver indicada.
 - c. () Nos casos de embolia arterial, o estudo angiográfico é mandatório e normalmente mostra abundante circulação colateral.
 - d. () A cianose fixa não tem correlação com a viabilidade tissular.
 - e. () Impotência funcional, anestesia e hipotermia são sinais de isquemia irreversível.
-

50. Em relação à doença de Mondor, podemos afirmar:

- a. () Aparece em pacientes acima de 60 anos, com antecedentes de tabagismo e se manifesta inicialmente com uma oclusão fêmoro-poplítea.
- b. () Afeta pacientes jovens com história de trauma repetido sobre trajeto arterial e se manifesta com isquemia da extremidade.
- c. (X) É uma doença rara que pode estar associada à neoplasia e se manifesta no tórax como uma tromboflebite.
- d. () Ocorre preferencialmente em mulheres jovens, onde existe uma associação de fumo e uso de anticoncepcionais orais, manifestando-se com trombose venosa profunda de membros inferiores.
- e. () É uma doença rara que se manifesta com dor abdominal em decorrência de uma trombose de veia mesentérica.

**Página
em Branco.
(rascunho)**



**FEPESE • Fundação de Estudos e
Pesquisas Sócio-Econômicos**
Campus Universitário • UFSC
88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3233-0737
<http://www.fepese.ufsc.br>