

# Caderno de Prova

27

## Médico (Endocrinologia)

Dia: 16 de março de 2008 • Horário: das 14 às 18 h

Duração: 4 (quatro) horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

❶ Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

### Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova:

- se faltam folhas, se a seqüência de questões, no total de 50 (cinquenta), está correta;
- se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

**Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.**

### Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado. O gabarito da prova será divulgado no site do concurso.

<http://pmf.fepese.ufsc.br>



# Conhecimentos Gerais

(15 questões)

## Língua Portuguesa

(8 questões)

### Texto

1 Em 1807, o imperador francês era o senhor abso-  
2 luto da Europa. Seus exércitos **havam colocado de**  
3 **joelhos** todos os reis e rainhas do continente, numa  
4 sucessão de vitórias surpreendentes e brilhantes.  
5 Só não haviam conseguido **subjugar** a Inglaterra.  
6 Protegidos pelo Canal da Mancha, os ingleses tinham  
7 evitado o confronto direto em terra com as forças de  
8 Napoleão. Ao mesmo tempo, haviam se consolidado  
9 como os senhores dos mares na batalha de Trafalgar,  
10 em 1805, quando sua Marinha de Guerra, sob o  
11 comando de Lord Nelson, destruiu, na entrada do  
12 Mediterrâneo, as esquadras combinadas da França e  
13 da Espanha. Napoleão reagiu decretando o bloqueio  
14 continental, medida que previa o fechamento dos  
15 portos europeus ao comércio de produtos britânicos.  
16 Suas ordens foram imediatamente obedecidas por  
17 todos os países, com uma única exceção: o pequeno e  
18 desprotegido Portugal.

GOMES, Laurentino. 1808. São Paulo: Planeta do Brasil, 2007, p. 33.

1. As afirmativas abaixo são falsas de acordo com o texto. Assinale aquela que se torna **verdadeira** de acordo com o texto se for trocada uma palavra ou expressão pela que está entre parênteses.

- a. ( ) A Inglaterra havia sido subjugada. (derrotada)
- b. ( ) Napoleão permitiu que Portugal mantivesse o comércio com a Inglaterra. (concordou)
- c. ( ) As esquadras combinadas da França e da Espanha derrotaram a esquadra inglesa. (venceram)
- d. ( ) As ordens de Napoleão decretando o bloqueio foram obedecidas tardiamente. (precocemente)
- e. (X) Os exércitos do imperador francês haviam sofrido reveses surpreendentes. (obtido vitórias)

2. Com base no texto, assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso.

- ( ) Em 1805, a Espanha estava aliada à França.
- ( ) A expressão “havam colocado de joelhos”, sublinhada no texto, poderia ser substituída por “havam derrotado”, sem significativa alteração de sentido.
- ( ) O verbo “subjugar”, destacado no texto, tem o sentido de vencer, dominar.
- ( ) Em toda a Europa, nenhum país se atreveu a desobedecer ao bloqueio continental decretado pelo imperador francês, com exceção de Portugal e Inglaterra.
- ( ) O Canal da Mancha foi um empecilho para a resistência interna dos ingleses às forças inimigas.

A seqüência **correta**, de cima para baixo, é:

- a. ( ) V – V – V – V – F
- b. (X) V – V – V – F – F
- c. ( ) V – F – F – V – F
- d. ( ) F – V – V – V – V
- e. ( ) F – F – V – F – V

3. Assinale a alternativa em que as opções a) e b) são igualmente **corretas**, em relação ao plural das palavras:

- a. ( ) a) gás – gases  
b) chapéu – chapéis
- b. ( ) a) degrau – degrais  
b) fuzil – fuzis
- c. ( ) a) mares azul-escuros  
b) uniformes verdes-garrafas
- d. (X) a) papel – papéis  
b) farol – faróis
- e. ( ) a) luvas cinzas  
b) sapatos cor-de-rosa

4. Considere as afirmativas abaixo, baseadas no texto.

- I. O pronome **seus**, em “seus exércitos” (linha 2), refere-se ao imperador francês; o mesmo ocorre com o pronome **sua**, em “sua Marinha de Guerra”, (linha 10).
- II. Em “os ingleses tinham evitado o **confronto direto**” (linhas 6 e 7), a expressão destacada é um objeto direto.
- III. Em “o fechamento **dos portos europeus**” (linhas 14 e 15), a expressão destacada é um objeto indireto.
- IV. Em “Suas ordens foram imediatamente obedecidas **por todos os países**” (linha 16), a expressão destacada é agente da passiva.

Assinale a alternativa em que todas as afirmativas são **corretas**.

- a. ( ) I – II
- b. (X) II – IV
- c. ( ) I – II – III
- d. ( ) I – III – IV
- e. ( ) II – III – IV

5. A partir do texto, analise as afirmativas abaixo:

- I. “...tinham evitado o confronto direto com as forças de Napoleão” pode ser substituída por “tinham evitado o confronto direto com as forças napoleônicas”, sem prejuízo do sentido original.
- II. Os vocábulos **Mediterrâneo, britânicos e países** são acentuados devido à mesma regra de acentuação gráfica.
- III. “...numa sucessão de vitórias” tem o mesmo sentido que “numa seqüência de vitórias”.
- IV. Em “medida que previa o fechamento dos portos” **que** é pronome relativo referente ao vocábulo **medida**.

Assinale a alternativa **correta**.

- a. ( ) Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
- b. ( ) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
- c. (X) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- d. ( ) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- e. ( ) Todas as afirmativas estão corretas.

6. Leia atentamente as proposições abaixo:

1. *Um assessor, dirigindo-se ao governador:*  
—Restituo a Vossa Excelência ..... projeto de lei devidamente apreciado.
2. *O prefeito, dirigindo-se aos vereadores:*  
—Estamos ..... no ..... senso de responsabilidade.
3. *Um deputado, dirigindo-se a uma eleitora:*  
—Informo a V.Sa. de que ..... observações serão levadas em consideração.

Assinale a alternativa que completa, de forma seqüencial e **correta**, as lacunas.

- a. ( ) seu ; confiante ; seu ; suas
- b. ( ) seu ; confiante ; seu ; vossas
- c. (X) seu ; confiante ; vosso ; suas
- d. ( ) vosso ; confiantes ; seu ; vossas
- e. ( ) vosso ; confiantes ; vosso ; vossas

7. Assinale a alternativa **correta**.

- a. ( ) Precisam-se de digitadores.
- b. ( ) Houveram muitas pessoas na festa.
- c. ( ) Fazem cinco anos que Joana partiu.
- d. ( ) Mais de um lavrador compraram tratores.
- e. (X) Pagaram a dívida o chefe e os funcionários.

8. Analise as proposições abaixo e assinale a única **correta**.

- a. ( ) Quero falar consigo.
- b. ( ) Nunca viu-se tamanha bobagem!
- c. (X) Assim como é correto dizer “Meus pais saíram conosco” também é correta a frase “O chefe falou com nós mesmos”.
- d. ( ) As frases “Os rapazes não estavam rindo só das meninas” e “Os rapazes não estavam rindo, só das meninas” possuem o mesmo sentido.
- e. ( ) Em “Suas ordens e decretos foram obedecidos”, o particípio *obedecidos* poderia estar no feminino – *obedecidas* – sem prejuízo da correção gramatical e lingüística.

## Matemática

(3 questões)

9. Em dezembro de 2007, vigorava no Brasil a seguinte tabela para o cálculo do imposto de renda sobre os salários.

### Imposto de renda retido na fonte

| Tabela Progressiva Mensal |            |                         |
|---------------------------|------------|-------------------------|
| Base de cálculo (R\$)     | Alíquota % | Parcela a deduzir (R\$) |
| Até 1.313,69              | –          | –                       |
| De 1.313,70 até 2.625,12  | 15,0       | 197,05                  |
| Acima de 2.625,12         | 27,5       | 525,19                  |

Fonte: <http://www.receita.fazenda.gov.br> Consulta: 12/12/2007

Com base nos dados fornecidos pela tabela, o imposto de renda retido na fonte por uma pessoa que recebe um salário mensal de R\$ 3.000,00 é:

- a. ( ) R\$ 825,00
- b. ( ) R\$ 721,90
- c. ( ) R\$ 525,19
- d. (X) R\$ 299,81
- e. ( ) R\$ 103,09

10. Um banco concedeu a um cliente um empréstimo a juros simples por 18 meses. Se o montante (capital inicial + juro) é igual a 190% do capital emprestado, então a taxa mensal do empréstimo é:

- a. ( ) 2%
- b. (X) 5%
- c. ( ) 7%
- d. ( ) 10,5%
- e. ( ) 20%

11. Na preparação de um evento da prefeitura municipal trabalharam 25 funcionários (de mesma capacidade de trabalho) durante 18 dias. Decorridos os 18 dias do início da tarefa, foram contratados 5 funcionários (de mesma capacidade de trabalho dos primeiros) que trabalharam junto com os primeiros durante 10 dias. Em quanto tempo teria sido concluída a tarefa se os 30 funcionários tivessem trabalhado desde o início?

- a. ( ) 14
- b. ( ) 21
- c. (X) 25
- d. ( ) 28
- e. ( ) 30

## Estudos Sociais

(2 questões)

12. Recentemente, na cidade de Bali na Indonésia, 190 países aprovaram o “Mapa do Caminho”, de grande importância para o futuro da humanidade.

Assinale a alternativa **correta**.

- a. (X) O chamado Mapa do Caminho de Bali define um roteiro com os princípios que vão guiar as negociações do regime global de mudanças climáticas, que sucederá ao Protocolo de Kyoto, a partir de 2012.
- b. ( ) O Mapa do Caminho coloca fim ao conflito entre a Coreia do Norte e Coreia do Sul, causa de grande instabilidade na região desde a Segunda Guerra Mundial.
- c. ( ) O Mapa do Caminho sinaliza uma solução para os conflitos tribais na África, principalmente na região do Saara, o que certamente significará a salvação de milhares de vidas humanas.
- d. ( ) O Mapa do Caminho é um protocolo em que se propõem medidas de combate à AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis, barateando o custo do tratamento para que ele se torne acessível às nações mais pobres.
- e. ( ) As diretrizes do Mapa do Caminho permitirão o fim do conflito entre o governo do presidente Uribe e o movimento guerrilheiro na Colômbia.

13. Leia a notícia:

**DF tem maior Índice de Desenvolvimento Juvenil do País**

A terceira edição do Índice de Desenvolvimento Juvenil (IDJ), medida agora em 2007, e preparada pelo pesquisador Julio Jacobo Waiselfiz, mostrou que as mortes violentas caíram, a desigualdade social diminuiu e a educação mostra avanços no País [...]

“Há sinais de evolução, em especial na área de saúde. Ainda é um processo vacilante, mas mostra que há condições para que se melhore mais”, afirmou Waiselfiz. As melhorias se concentram na educação e na saúde, onde, pela primeira vez desde 2003, alguns Estados, como São Paulo mostraram redução nos casos de mortes violentas de jovens. “Não é homogêneo. Há muitas diferenças, houve aumento em alguns lugares, mas existem pontos de queda”, explicou o pesquisador.

Disponível em: <http://noticias.br.msn.com/artigo.aspx?cp-documentid=5890093>. Acesso em 20/12/2007.

Assinale a alternativa verdadeira em relação ao “índice de Desenvolvimento Juvenil do País”.

- a. ( ) A região nordeste, não obstante serem elevados os índices de pobreza, destacou-se entre as regiões com os melhores IDJ do Brasil.
- b. ( ) O Estado de Rondônia destacou-se, nesta pesquisa, como o Estado que apresentou os melhores índices em 2007.
- c. ( ) O Rio Grande do Sul vem em primeiro lugar entre os Estados com os melhores IDJ do país.
- d. (X) O Distrito Federal e o Estado de Santa Catarina destacaram-se entre as regiões com os melhores IDJ do Brasil.
- e. ( ) O pior Índice de Desenvolvimento Juvenil foi alcançado, devido ao grande índice de violência urbana, pelo Estado de São Paulo.

**Legislação**

(2 questões)

14. Assinale a alternativa **correta**:

- a. (X) A vacância do cargo público decorrerá de exoneração, demissão, aposentadoria ou falecimento.
- b. ( ) A posse do candidato aprovado em concurso público ocorrerá no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados da publicação do ato de nomeação no órgão oficial de divulgação do Município, prorrogável a requerimento do interessado por mais 30 (trinta) dias ou, em caso de doença comprovada, enquanto durar o impedimento.
- c. ( ) O prazo para o servidor entrar em exercício será de até 45 (quarenta e cinco) dias, contados da data da posse, sob pena de exoneração.
- d. ( ) São estáveis, após 2 (dois) anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.
- e. ( ) A carga horária normal do trabalho do servidor é de 40 (quarenta) horas semanais, cumpridas em dias e horários próprios, se não houver regulamentação específica.

15. Caracteriza-se a inassiduidade habitual pela falta injustificada ao serviço:

- a. ( ) Por período igual ou superior a 30 (trinta) dias intercalados, durante o período de 6 (seis) meses.
- b. (X) Por período igual ou superior a 60 (sessenta) dias intercalados, durante o período de 12 (doze) meses.
- c. ( ) Por período igual ou superior a 60 (sessenta) dias intercalados, durante o período de 24 (vinte e quatro) meses.
- d. ( ) Por período igual ou superior a 90 (noventa) dias intercalados, durante o período de 12 (doze) meses.
- e. ( ) Por período igual ou superior a 120 (cento e vinte) dias intercalados, durante o período de 24 (vinte e quatro) meses.

## Conhecimentos Específicos

(35 questões)

16. A estratégia Saúde da Família é um modelo de organização dos serviços de Atenção Primária à Saúde, do Sistema Único de Saúde, caracterizado por:

- a. ( ) Equipes multiprofissionais compostas por um médico generalista ou de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e quatro a seis agentes comunitários de saúde, responsáveis pela atenção integral e contínua de cerca de 8000 famílias.
- b. ( ) Equipes multiprofissionais compostas por um médico generalista, um pediatra e um ginecologista, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e quatro a seis agentes comunitários de saúde, responsáveis pela atenção integral e contínua de cerca de 800 famílias.
- c. ( ) Equipes multiprofissionais compostas por um médico generalista, um pediatra e um ginecologista, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e quatro a seis agentes comunitários de saúde, responsáveis pela atenção integral e contínua de cerca de 8000 famílias.
- d. ( ) Equipes multiprofissionais compostas por um médico generalista ou de família, um odontólogo e quatro a seis agentes comunitários de saúde, responsáveis pela atenção integral e contínua de cerca de 800 famílias.
- e. (X) Equipes multiprofissionais compostas por um médico generalista ou de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e quatro a seis agentes comunitários de saúde, responsáveis pela atenção integral e contínua de cerca de 800 famílias.

17. Em relação às atribuições específicas do médico na Estratégia de Saúde da família, é **correto** afirmar:

- a. ( ) Trabalha com adscrição de famílias em base geográfica definida, a microárea.
- b. ( ) Gerencia os insumos necessários para o adequado funcionamento da Unidade local de Saúde.
- c. ( ) Realiza diagnóstico com finalidade de obter o perfil epidemiológico para planejamento e programação em saúde bucal.
- d. (X) Realiza assistência integral aos indivíduos e famílias em todas as fases do desenvolvimento humano.
- e. ( ) Desenvolve atividades de promoção da saúde e de prevenção das doenças e agravos, por meio de visitas domiciliares e ações educativas individuais e coletivas nos domicílios e comunidade.

---

18. As ações preventivas no Sistema Único de Saúde podem ocorrer em momentos diferentes na história da doença. Existem quatro momentos básicos na prevenção de doenças. Sobre eles, é **correto** afirmar.

- a. (X) A prevenção primordial ocorre antes da instalação dos fatores de risco da doença.
- b. ( ) A prevenção primária ocorre antes do diagnóstico clínico e instalação dos fatores de risco da doença.
- c. ( ) A prevenção secundária ocorre antes da instalação das complicações da doença.
- d. ( ) A prevenção terciária da incapacitação ou óbito do paciente.
- e. ( ) A prevenção primária e secundária não alteram a história natural das doenças.

**19.** Em relação às ações preventivas de saúde podemos considerar como exemplo de ações primárias:

- a. ( ) Realização de glicemias de jejum em pacientes obesos, mas assintomáticos.
  - b. ( ) Ações visando prevenir o início da obesidade e sedentarismo em adolescentes e adultos jovens.
  - c. ( ) Instruções específicas sobre dieta e exercícios e a prescrição de fármacos a hipertensos.
  - d. ( ) Uso de inibidores da enzima convertora da angiotensina para evitar eventos cardiovasculares.
  - e. (X) Recomendações dietéticas ou exercícios físicos a um paciente obeso, sem diabetes ou portadores de tolerância diminuída à glicose.
- 

**20.** São diretrizes e características do modelo assistencial do Sistema Único de Saúde:

- a. (X) Universalidade, equidade, integralidade, hierarquização e regionalização, descentralização e controle social.
  - b. ( ) Gratuidade, universalidade, equidade, integralidade, descentralização e controle social.
  - c. ( ) Universalidade, equidade, interdisciplinaridade e transdisciplinariedade e controle social.
  - d. ( ) Gratuidade, equidade, resolubilidade e controle social.
  - e. ( ) Universalidade, transdisciplinaridade, integralidade, hierarquização e regionalização, descentralização e controle social.
- 

**21.** Quais das drogas abaixo estão associadas com ginecomastia?

- a. ( ) Álcool, Propanolol e Digoxina
- b. ( ) Tiazidicos, Estrógenos e Alfametioldopa
- c. ( ) Estrógenos, Cetoconazole e Bromocriptina
- d. (X) Andrógenos, Finasteride e Espironolactona
- e. ( ) Esteróides anabólicos, Flutamida e Propanolol

**22.** A causa mais comum de hipotireoidismo adquirido na infância é:

- a. ( ) Uso de iodo.
  - b. ( ) Pós-tireoidectomia.
  - c. (X) Tireoidite auto-imune.
  - d. ( ) Tireóide ectópica de manifestação tardia.
  - e. ( ) Irradiação para tratamento de doenças neoplásicas.
- 

**23.** Com relação ao bócio mergulhante, é **correto** afirmar:

- a. ( ) Doses supressivas de T4 podem ser bastante úteis no seu tratamento.
  - b. (X) Uma forma de tratamento é a utilização de doses de 50 a 100 mC de iodo radioativo.
  - c. ( ) Os fenômenos compressivos do bócio mergulhante são freqüentes em função do crescimento rápido.
  - d. ( ) O bócio mergulhante é encontrado com maior freqüência em zonas com oferta adequada de iodo.
  - e. ( ) A cintilografia de tireóide não é um método de imagem adequado para diagnosticar o bócio mergulhante.
- 

**24.** Na gravidez, a glândula tireóide:

- a. (X) aumenta de volume.
  - b. ( ) secreta mais T4 do que na não gestante.
  - c. ( ) o T3 reverso é o melhor indicador da função.
  - d. ( ) ocorre redução importante dos níveis de TBG.
  - e. ( ) é mais sensível ao TSH do que na não gestante.
- 

**25.** São consideradas drogas anti-reabsortivas ósseas:

- a. ( ) GH, PTH e Fluoreto
- b. ( ) Fluoreto, PTH e Cálcio
- c. ( ) Estrogênio, Fluoreto e GH
- d. ( ) PTH, Cálcio e Alendronato
- e. (X) Alendronato, Calcitonina e Estrogênio



**26.** Qual o sinal de alerta para efeitos colaterais em pacientes sob uso de propiltiouracil?

- a.  Arritmia
  - b.  Amidalite
  - c.  Diarréia
  - d.  Hematuria
  - e.  Incoordenação motora
- 

**27.** Numa paciente com amenorréia, qual dos exames abaixo é menos importante no diagnóstico?

- a.  Dosagem de TSH
  - b.  Dosagem de FSH
  - c.  Dosagem de progesterona
  - d.  Dosagem de prolactina
  - e.  Dosagem de Beta HCG
- 

**28.** No hiperparatireodismo primário, o sítio esquelético que usualmente exibe a maior perda mineral é:

- a.  quadril
  - b.  fêmur total
  - c.  colo do fêmur
  - d.  rádio ultradistal
  - e.  rádio 33% (terço proximal)
- 

**29.** Assinale a manifestação clínica que **não** é característica da neuropatia autonômica diabética:

- a.  Bradicardia
  - b.  Impotência sexual
  - c.  Incontinência fecal
  - d.  Hipotensão postural
  - e.  Ejaculação retrógrada
- 

**30.** A causa mais comum de diabetes insípido central é:

- a.  tumoral
- b.  idiopático
- c.  pós-cirurgia
- d.  pós-irradiação
- e.  traumatismo craniano

**31.** Com relação ao manejo da hiperplasia adrenal congênita, é **correto** afirmar:

- a.  O hiperandrogenismo em mulheres acometidas é exclusivamente adrenal.
  - b.  Não há necessidade de repor glicocorticoide em homens adultos com a forma virilizante da doença.
  - c.  O tratamento pré-natal com dexametasona está indicado em mulheres com hiperplasia adrenal congênita pela chance de 50% de transmissão ao feto.
  - d.  O tumor de restos adrenais é freqüente em homens com a forma clássica não tratados, podendo levar à infertilidade.
  - e.  A dosagem de 17-hidróxi-progesterona basal acima de  $2 \mu\text{g/l}$  faz o diagnóstico de hiperplasia adrenal congênita forma não clássica.
- 

**32.** Com relação à nefropatia diabética, podemos afirmar que:

- a.  no início do quadro pode ocorrer elevação da taxa de filtração glomerular.
  - b.  a presença de hipertensão arterial sempre está presente no início do quadro.
  - c.  o rastreamento deve ser feito no momento do diagnóstico independente do tipo de diabetes.
  - d.  está sempre associada a retinopatia no diabetes melitus tipo 2.
  - e.  a evolução clínica é igual nos casos de diabetes tipo 1 e tipo 2.
- 

**33.** Em pacientes portadores de doença Addison, qual o grupo de situações que pode desencadear uma crise de insuficiência adrenal aguda, na ausência de tratamento preventivo?

Assinale a alternativa **correta**.

- a.  crises de enxaqueca e período pré-menstrual.
- b.  gripe, trabalho de parto e depressão.
- c.  gripe, trabalho de parto, diarréia prolongada e cirurgias.
- d.  trabalho de parto, dieta rica em açúcar e vômito.
- e.  aborto, período pré-menstrual e diarréia prolongada.

**34.** Na síndrome dos ovários policísticos, pode ocorrer:

- a.  acne, atraso puberal e hipotensão postural.
  - b.  atraso puberal, câncer de colo uterino e hirsutismo.
  - c.  intolerância a glicose, hipotômia muscular e hipotensão arterial.
  - d.  dislipidemia, apnéia do sono e irregularidade menstrual.
  - e.  hirsutismo, hipoglicemias severas e amenorréia primária.
- 

**35.** Na deficiência de hormônio de crescimento em adultos ocorre:

- a.  perda de massa óssea.
  - b.  melhora da função cardíaca.
  - c.  menor sensibilidade à insulina.
  - d.  redução da massa corporal gorda.
  - e.  piora da função tireoidiana.
- 

**36.** Uma mulher obesa apresenta hipertrigliceridemia sem hipercolesterolemia e glicemia de jejum normal. O primeiro passo no tratamento é:

- a.  usar metformina.
  - b.  evitar contraceptivos orais.
  - c.  tratamento com fibratos.
  - d.  abstinência de álcool.
  - e.  redução do peso.
- 

**37.** Assinale o melhor esquema terapêutico pré-operatório de um paciente com feocromocitoma

- a.  Apenas prazosina.
- b.  Apenas propranolol.
- c.  Fenoxibenzamina seguida de propranolol.
- d.  Propranolol seguido de fenoxibenzamina.
- e.  Propranolol seguido de prazosina.

**38.** Em mulheres com disgenesia gonadal, o desenvolvimento de câncer nos vestígios gonadais é mais provável quando o cariótipo é:

- a.  45X0.
  - b.  46XX.
  - c.  46XX (isocromossoma X).
  - d.  mosaicismos 45X0,46XY.
  - e.  mosaicismos 45X0, 46XX.
- 

**39.** Os órgãos mais acometidos pelas diferentes infecções nos diabéticos são:

- a.  pulmões e sistema digestivo.
  - b.  pele, pulmões e sistema urinário.
  - c.  pele, pulmões, sistemas urinário e digestivo.
  - d.  sistema urinário e pares cranianos.
  - e.  sistema vascular, nervos periféricos e sistema urinário.
- 

**40.** Assinale a afirmação **correta**:

- a.  A repaglinida, nateglinida e glibenclamida estimulam a secreção de insulina através do fechamento de canais de cálcio K-dependente de ATP das células beta pancreáticas.
- b.  A hiperglicemia, mesmo quando tratada precocemente, acelera a apoptose das células beta pancreáticas em diabéticos tipo 2.
- c.  As glitazonas, além de agirem primordialmente em receptores insulínicos dos adipócitos, também exercem ação aguda na secreção de insulina pela célula beta.
- d.  Em indivíduos não diabéticos, o estímulo oral com glicose promove padrão monofásico de secreção de insulina.
- e.  A entrada de glicose nas células beta das ilhotas de Langerhans é feita através de transportadores GLUT-2.

**41.** Obesidade, hipogonadismo, retinite pigmentar, oligofrenia constituem achados clínicos da:

- a.  Síndrome de Laurence Moon Biedel.
  - b.  Síndrome de Prader-Willi.
  - c.  Síndrome de Klinefelter.
  - d.  Síndrome de Simonds.
  - e.  Síndrome de Noonan.
- 

**42.** Na presença de hipopituitarismo em um paciente diabético, deve-se estar atento a(s):

- a.  crises hipertensivas.
  - b.  apoplexia hipofisária.
  - c.  alterações eletrolíticas.
  - d.  redução das doses de insulina.
  - e.  ocorrência de estado osmolar não cetótico.
- 

**43.** Na síndrome Sheehan, o primeiro sinal ou sintoma a aparecer é:

- a.  agalactia.
  - b.  atrofia mamaria.
  - c.  hipotensão postural.
  - d.  queda de pêlos axilares.
  - e.  amenorréia e queda de cabelos.
- 

**44.** O tratamento ideal para o hipogonadismo do tipo "Sertoli Cell Only Síndrome" é:

- a.  LHRH e testosterona.
- b.  apenas testosterona.
- c.  apenas gonadotrofina coriônica.
- d.  testosterona e oxandrolona.
- e.  testosterona e gonadotrofinas.

**45.** Com relação à insuficiência adrenal secundária, podemos afirmar que o melhor método para diagnóstico é:

- a.  ressonância nuclear magnética da hipófise.
  - b.  teste de estímulo com CRH.
  - c.  dosagem de cortisol após estímulo com ACTH.
  - d.  dosagem de cortisol, sódio e potássio após estímulo com hipoglicemia.
  - e.  dosagem de cortisol após hipoglicemia induzida por insulina.
- 

**46.** Assinale as situações em que pode ocorrer hiperprolactinemia:

- a.  Estresse e hiperparatireoidismo.
  - b.  Insuficiência adrenal secundária.
  - c.  Sela vazia e hipotireoidismo secundário.
  - d.  Uso abusivo de androgênio e trauma de tórax.
  - e.  Ovários policísticos, sela vazia e hipotireoidismo primário.
- 

**47.** Assinale o **correto** com relação aos hormônios gastrointestinais:

- a.  GIP regula o esvaziamento gástrico.
  - b.  GIP suprime a secreção de glucagon.
  - c.  GLP-1 regula o esvaziamento gástrico.
  - d.  GLP-1 estimula a secreção de glucagon.
  - e.  GLP-1 aumenta a secreção de insulina glicose- independente.
- 

**48.** A dosagem de hemoglobina glicada (HbA1C) pode sofrer interferências em determinadas situações clínicas:

- a.  anemia e gravidez
- b.  hipovitaminose D
- c.  anemia e hemocromatose
- d.  hemocromatose e gravidez
- e.  gravidez e hipovitaminose C

## Secretaria Municipal de Administração

**49.** Considere um paciente masculino com 40 anos, IMC: 29, apresenta uma glicemia de jejum de 130 em um exame de rotina, com histórico familiar de diabetes. Para definição de diagnóstico deve-se:

- a. ( ) dosar hemoglobina glicada.
  - b. (X) dosar nova glicemia de jejum.
  - c. ( ) fazer testa oral de tolerância a glicose.
  - d. ( ) o diagnóstico de diabetes melitus já está definido.
  - e. ( ) fazer curva glicêmica com dosagem de insulina.
- 

**50.** O sinal do metacarpiano curto é encontrado nas seguintes situações:

- a. ( ) disgenesia da tireóide e síndrome de Turner
- b. ( ) hiperparatireoidismo e disgenesia gonádica
- c. ( ) pseudohipoparatiroidismo e doença de Paget
- d. (X) disgenesia gonádica e pseudohipoparatiroidismo
- e. ( ) síndrome de Klinefelter e hipotireoidismo congênito

**Página  
em Branco.  
(rascunho)**

**Página  
em Branco.  
(rascunho)**





**FEPESE • Fundação de Estudos e  
Pesquisas Sócio-Econômicos**  
Campus Universitário • UFSC  
88040-900 • Florianópolis • SC  
Fone/Fax: (48) 3233-0737  
<http://www.fepese.ufsc.br>