

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO – COMO PREVENIR DOENÇAS GENÉTICAS

Marcello Valle

Para alguns casais, gerar uma criança é uma decisão ética. Alguns são portadores de doenças genéticas e temem que seus filhos sofram do mesmo problema. São problemas como hemofilia, distrofia muscular, anemia falciforme e alterações ligadas ao fator Rh. Entretanto, há uma técnica que permite gerar bebês saudáveis. Trata-se do Diagnóstico Genético Pré-Implantação (ou PGD).

Essa técnica foi desenvolvida há uma década por pesquisadores londrinos e não foi bem recebida de imediato, pois criava impasses éticos. Via-se no PGD uma maneira de os pais controlarem o perfil genético e escolherem o sexo do futuro bebê.

Hoje, o PGD é totalmente aceito, inclusive no Brasil, e é uma forma precoce de diagnóstico pré-natal. É feito por meio de uma biópsia do embrião no seu terceiro dia de vida para detectar possíveis doenças. É um procedimento tecnicamente desafiador, que exige um bom entendimento de embriologia e biologia molecular.

O PGD associa métodos aplicados em reprodução assistida às técnicas de investigação genética. A biópsia do embrião inicial (entre seis e dez células) permite o estudo genético de uma única célula, possibilitando a transferência de embriões normais para as características testadas.

No Brasil, o Código de Ética do Conselho Federal de Medicina não permite a seleção sexual do embrião. Entretanto, especificamente no caso de haver doença genética ligada ao sexo (como hemofilia), é possível identificar os embriões masculinos e femininos, transferindo apenas o sexo que não tem possibilidade de ter a doença. O PGD é também indicado em casos de gravidez tardia, em especial nas gestantes acima de 35 anos. Quanto maior a idade, mais chance de dar à luz bebês com problema genéticos e de sofrer aborto espontâneo.

1. "Para alguns casais, gerar uma criança é uma decisão ética"; a forma de reescrever-se essa frase com alteração de seu sentido é:
 - (A) Para alguns casais, é uma decisão ética gerar uma criança;
 - (B) Gerar uma criança, para alguns casais, é uma decisão ética;
 - (C) É uma decisão ética, para alguns casais, gerar uma criança;
 - (D) É uma decisão ética gerar uma criança para alguns casais;
 - (E) Gerar uma criança é uma decisão ética, para alguns casais.
2. Se a decisão é "ética" ele interfere com valores:
 - (A) econômicos,
 - (B) políticos;
 - (C) morais;
 - (D) religiosos,
 - (E) sociais.

3. "Essa técnica foi desenvolvida há uma década por pesquisadores londrinos e não foi bem recebida de imediato, pois criava impasses éticos. Via-se no PGD uma maneira de os pais controlarem o perfil genético e escolherem o sexo do futuro bebê"; o comentário INCORRETO sobre esse segmento do texto é:
 - (A) a técnica aludida é a do PGD;
 - (B) a técnica vem sendo desenvolvida por dez anos;
 - (C) o impasse ético aludido é o do controle genético;
 - (D) escolher o sexo do futuro bebê não é visto como um fato positivo;
 - (E) a técnica do PGD demorou um pouco a ser aceita.
4. O PGD é "uma forma precoce de diagnóstico pré-natal", isso significa que o PGD:
 - (A) ainda não está totalmente desenvolvido;
 - (B) identifica bem cedo problemas do embrião;
 - (C) é feito com a finalidade de antecipar o nascimento do bebê;
 - (D) indica problemas do bebê pouco antes do nascimento;
 - (E) alerta para o caso de o bebê nascer antes do momento previsto.
5. "É um procedimento tecnicamente desafiador"; esta afirmação se justifica porque:
 - (A) o PGD exige bom preparo dos profissionais;
 - (B) é um procedimento ainda bastante novo;
 - (C) se trata de um procedimento não totalmente conhecido;
 - (D) a técnica deve ser adquirida em tempo recorde;
 - (E) o PGD é realizado com risco de morte da paciente grávida.
6. "o Código de Ética do Conselho Federal de Medicina **não permite a seleção sexual do embrião**"; a forma em negrito equivale à forma "proibe". A alternativa em que a equivalência apontada está ERRADA é:
 - (A) não trabalha aos domingos = descansa aos domingos;
 - (B) não aceita trabalhar pesado = recusa trabalho pesado;
 - (C) não intervém na briga = participa da briga;
 - (D) não falou diante do juiz = emudeceu diante do juiz;
 - (E) não sabe a verdade = ignora a verdade.
7. "aborto espontâneo", referido na última linha do texto, é aquele que:
 - (A) ocorre sem que tenha sido provocado;
 - (B) é causado por medicamentos específicos;
 - (C) é fruto da vontade da gestante;
 - (D) acontece em casos de perigo de vida para a gestante;
 - (E) é provocado exclusivamente pelo próprio embrião

8. "espontâneo" é palavra grafada com S; a alternativa abaixo que mostra uma palavra erradamente grafada é:
- (A) misto;
 - (B) sesta;
 - (C) estender;
 - (D) esplêndido;
 - (E) estinguir
9. O principal objetivo deste texto deve ser:
- (A) causar interesse nos leitores pela seleção do sexo dos bebês;
 - (B) criticar certas posições retrógradas de nossas autoridades médicas;
 - (C) informar os leitores sobre questões médicas;
 - (D) analisar questões sobre o ponto de vista social;
 - (E) provocar suspense por meio de ocultamento de dados
10. "Hoje o PGD é totalmente aceito, inclusive no Brasil"; esta frase significa que o PGD é aceito:
- (A) em todos os países, até mesmo no Brasil;
 - (B) sem restrições, mesmo no Brasil;
 - (C) em todos os lugares, exceto no Brasil;
 - (D) de forma ampla e em todos os países, até no Brasil;
 - (E) no Brasil, mesmo que não totalmente.

PRODUÇÃO DE INSUMOS PARA SAÚDE

11. Sobre salas de classe 1.000, NÃO é correto afirmar:

- (A) são ambientes controlados;
- (B) a vazão de ar de insuflamento, em função do volume da sala, é um parâmetro de projeto;
- (C) contagem microbiana e de partículas no ar, são monitorados e comparados a padrões de qualidade,
- (D) não há necessidade de monitoramento microbiológico das superfícies;
- (E) o fluxo de pessoal e de material deve ser rigidamente definido por procedimento operacional padronizado.

12. Podem ser consideradas como características de projeto e construção de áreas de processamento asséptico afirmativas abaixo, EXCETO:

- (A) paredes, tetos e pisos devem ser lisos, facilmente limpáveis, com cantos arredondados;
- (B) deve haver controles de temperatura e umidade;
- (C) o suprimento de ar da área deve ser através de filtros de alta eficiência de remoção de partículas e sempre em fluxo laminar;
- (D) deve haver sistema de monitoramento das condições ambientais;
- (E) deve haver sistema de limpeza e desinfecção das salas e equipamentos de processamento asséptico planejados.

13. Avalie as afirmativas abaixo sobre ambientes controlados:

- I. As classificações de áreas limpas e salas limpas baseiam-se na qualidade microbiológica do ar e das superfícies.
- II. De acordo com as boas práticas de fabricação, a melhor forma de monitoramento da qualidade microbiológica do ar consiste em se utilizar placas de Petri com meio de cultura que são abertas e expostas ao ambiente, em amostragem estática, em pontos definidos da área de processamento, por dado intervalo de tempo.
- III. Deve haver um programa de monitoramento microbiológico rotineiro das áreas classificadas.
- IV. Uma sala classe 1000 pode ser definida como aquela que apresenta, no máximo, uma unidade formadora de colônia por metro cúbico de ar amostrado (1 UFC/m³ de ar ou 1 UFC por 1000 Litros de ar).
- V. É obrigatório sempre proceder a identificação da flora encontrada nas placas com meio de cultura utilizadas no monitoramento do ambiente controlado.

Estão corretas:

- (A) I, II e V, apenas;
- (B) I e III apenas;
- (C) II e V apenas;
- (D) I, II e IV, apenas;
- (E) III e IV, apenas.

14. Sobre classificação de salas limpas, baseada na contagem de partículas do ar, está correto afirmar que:

- (A) uma sala de classe 10.000 pode apresentar uma contagem de 10.000 partículas menores que 5mm por litro de ar;
- (B) um módulo de fluxo laminar que apresenta classe 100, possui como especificação 3500 partículas menores que 5 mm por metro cúbico de ar (100 partículas menores que 5mm por pé cúbico de ar);
- (C) uma área classe 1.000 pode apresentar contagem de 1.000 partículas viáveis por metro cúbico de ar (1 UFC por litro de ar);
- (D) o envase asséptico de medicamentos injetáveis deve ocorrer numa área de classe 100.000;
- (E) uma cabina de fluxo laminar, classe 100, não pode apresentar partículas viáveis, independentemente do volume de ar amostrado.

15. Julgue as afirmativas abaixo sobre áreas de processamento asséptico de medicamentos estéreis.

- I. As áreas de produção são classificadas de acordo com características do ar em graus A, B, C e D.
- II. Os graus A, C e D correspondem às classes 100, 10.000 e 100.000, respectivamente.
- III. O envasamento asséptico de medicamentos estéreis pode ser realizado numa área grau C
- IV. A entrada de pessoal e materiais em áreas limpas deve ser através de "air-locks".
- V. O grau C corresponde a 10.000 partículas menores que 0,5mm por metro cúbico de ar.

As afirmativas corretas são:

- (A) III e V, apenas;
- (B) II, III e V, apenas;
- (C) I e IV, apenas;
- (D) II e IV, apenas;
- (E) I, II e IV, apenas.

16. Sobre nível de garantia de esterilidade, NÃO é correto afirmar que:

- (A) é um termo utilizado para descrever a confiabilidade de um processo de esterilização;
- (B) devem ser quantificado e garantido através da validação do ciclo de esterilização;
- (C) baseia-se na exposição ao agente de esterilização de maneira que possa ser verificado que a probabilidade de sobrevivência esporos de microrganismos ultra-resistentes é de 10⁻⁶;
- (D) pode ser definido como a capacidade de produção de 1000 unidades com apenas uma falha de esterilidade;
- (E) em unidades de envasamento asséptico, deve ser evidenciado através de "media-fill", ou seja, simulação do processo com meio de cultura.

17. Ao final de um ciclo de esterilização de materiais em autoclave, por exposição ao vapor d'água saturado a 121°C, uma carga de material inicialmente seco, deve se apresentar, preferencialmente:
- completamente seca, com a embalagem íntegra;
 - úmida, pois o vapor d'água se condensará sobre as superfícies;
 - completamente seca e fria;
 - parcialmente úmida; a embalagem deve ser toda em plástico, pois o papel pode se rasgar com a umidade;
 - com marcas amarelas, que indicam a passagem do vapor d'água.
18. Para uma área de processamento asséptico, a forma de se acondicionar materiais para esterilização em autoclaves, é melhor descrita como..
- materiais em embalagens plásticas, para evitar rasgos e completamente vedadas para evitar contaminação após o ciclo;
 - materiais em embalagens compostas de plástico e papel, pois o papel permite a permeação de vapor d'água durante o ciclo. A embalagem deve ser dupla, sendo a externa a ser retirada no acesso à área de processamento asséptico;
 - materiais em caixas de aço, embrulhados em papel-alumínio;
 - materiais em caixas de aço, embrulhados em sacos plásticos,
 - materiais embalados em papel Kraft, embalagem dupla, sendo a externa para retirada no acesso à área de processamento asséptico.
19. Um método de despirogenização que, em tese, pode ser aplicado a qualquer matéria é:
- limpeza química com álcool a 70%;
 - exposição ao calor seco a 270°C por 2 horas;
 - esterilização em autoclave a 121°C por 40 minutos;
 - lavagem com solução de hidróxido de sódio a 2% (p./v.);
 - lavagem com solução sulfo-crômica.
20. Sabe-se que num processo de esterilização por calor úmido, em autoclave, o agente responsável pela eliminação de microrganismos viáveis é o vapor d'água saturado. A presença de bolsas de ar no interior de materiais como garrações e mangueiras, a serem esterilizados, pode resultar no não contato do vapor d'água com alguma superfície e na conseqüente não esterilização do material. A remoção de bolsas de ar do interior da carga a ser esterilizada, que esteja convenientemente embalada, está associada a:
- aumento do tempo de exposição do vapor;
 - aumento da pressão do vapor d'água;
 - lavagem prévia do material;
 - exposição da carga a vácuo ao final do ciclo;
 - pré-condicionamento da carga com pulsos de vácuo e vapor alternados.
21. Uma característica desejável dos materiais após um ciclo de esterilização em autoclave é que estejam secos. Esta característica será conseguida preferencialmente através de:
- aumento da pressão de exposição durante o ciclo;
 - aumento da temperatura do ciclo;
 - pós-condicionamento com ar comprimido;
 - utilização de vácuo após o tempo de exposição ao vapor;
 - colocação do material num forno, após o ciclo.
22. Sobre dois ciclos de esterilização hipotéticos em autoclave, um conduzido a 121°C e outro a 134°C são feitas as afirmativas abaixo:
- Deve-se preferir sempre o ciclo a 121°C ao ciclo a 134°C por razões econômicas, pois o segundo acarretará sempre um consumo maior de vapor d'água.
 - Para meios de cultura, deve-se preferir sempre o ciclo a 121°C para evitar a decomposição dos nutrientes do meio.
 - Para se atingir um mesmo grau de esterilidade, o ciclo a 121°C exigirá um tempo muito maior que o ciclo a 134°C.
 - Para se atingir um mesmo grau de esterilidade, um ciclo a 134°C será mais econômico que outro a 121°C.
 - Não há diferença entre os dois ciclos com relação à esterilidade, pois as duas temperaturas matam, da mesma forma, todos os microrganismos, devendo-se preferir, portanto, a menor temperatura.
- Estão corretas as afirmativas:
- III e IV, apenas;
 - I e II, apenas;
 - I, II e V;
 - I e V, apenas;
 - II e IV, apenas.
23. Sobre esterilização de meios de cultura, é correto afirmar que:
- todos os meios de cultura devem ser esterilizados por filtração para se evitar a degradação térmica dos nutrientes;
 - o recipiente que contém o meio de cultura a ser esterilizado em autoclave deve ser sempre completamente vedado para evitar a contaminação após a esterilização;
 - para esterilização de meios de cultura contendo Agar, deve-se separar os componentes termossensíveis para que sejam esterilizados por filtração e posteriormente adicionados aos componentes não termossensíveis que, juntamente com o Agar, devem ser esterilizados em autoclave;
 - a glicose não é termossensível e, portanto, pode estar junta com os demais componentes de um meio de cultura numa esterilização em autoclave;
 - a esterilidade de um meio de cultura, esterilizado em autoclave, em um ciclo recém definido, pode ser comprovada simplesmente através da incubação do meio em estufa a 36°C por 14 dias, não sendo necessário qualquer teste adicional, pois o não crescimento de qualquer microrganismo após 14 dias indica certamente que o meio está estéril.

24. Sobre cabinas de segurança biológica, são feitas as afirmativas a seguir:

- I. São utilizadas para prevenir a dispersão pelo ar de aerossóis de materiais que ofereçam risco biológico.
- II. Protegem o operador integralmente, dispensando o uso de qualquer proteção adicional.
- III. Uma cabina classe I é caracterizada por entrada de ar pela abertura frontal.
- IV. Uma cabina classe II não garante a ausência de contaminação do material que está sendo manipulado.
- V. Toda cabina de segurança biológica deve apresentar filtro HEPA para exaustão de ar

Estão corretas as afirmativas:

- (A) I e V, apenas;
- (B) I, III e V;
- (C) III e IV, apenas;
- (D) IV e V, apenas;
- (E) I, II e IV;

25. As alternativas abaixo representam medidas de biossegurança relativas ao manuseio de patógenos em larga escala, EXCETO:

- (A) todos os materiais que tiveram contato com o patógeno devem ser descontaminados antes de serem lavados ou descartados;
- (B) de acordo com o nível de biossegurança, a renovação de ar na sala em que ocorre o cultivo do patógeno deve ser total, sem reciclo do ar de exaustão;
- (C) a vestimenta utilizada pelos operadores deve ser específica para a área de risco biológico, devendo ser descartada, após sua utilização;
- (D) para operadores vacinados contra o patógeno, não é necessária utilização de máscara cirúrgica durante a manipulação dos cultivos;
- (E) a sala de risco biológico deve estar a pressão negativa em relação ao ambiente exterior e a exaustão de ar deve ser provida de filtros absolutos.

26. Um laboratório que manuseia algum microrganismo patogênico representa um potencial infeccioso se:

- (A) há presença de um organismo infeccioso capaz de invadir e se multiplicar num hospedeiro humano;
- (B) há um ambiente que permita a multiplicação do agente infeccioso;
- (C) houver a transmissão do patógeno do ambiente para o ser humano;
- (D) o ser humano estiver suscetível à infecção;
- (E) as alternativas anteriores estiverem presentes em conjunto, apenas.

27. Vacinas vivas são produzidas a partir de linhagens microbianas cuja virulência foi atenuada e que não causam a doença no ser humano. Sobre este tipo de vacina, julgue as afirmativas abaixo:

- I. existe a possibilidade de o microrganismo atenuado reverter à forma virulenta do patógeno, voltando a causar a infecção.
- II. os organismos atenuados se multiplicam no ser humano, sem causar a doença, permitindo a produção de anticorpos.
- III. este tipo de vacina, em geral é tóxica, porque os vírus estão vivos e se multiplicam no organismo humano.
- IV. as linhagens de vírus atenuadas podem ser obtidas através de etapas sucessivas de cultivo em células de animais de espécies diferentes da humana de tal forma que, através de mutação natural, o vírus perde a capacidade de infectar o ser humano.
- V. apesar de atenuado, na preparação da vacina, o vírus deve ser morto por um método físico (calor) ou químico, para evitar a multiplicação no ser humano e reduzir a toxicidade.

Estão corretas as afirmativas:

- (A) apenas III e V;
- (B) apenas II e V;
- (C) apenas I, II e IV;
- (D) apenas II, IV e V;
- (E) apenas I, III e V.

28. Sobre vacinas produzidas a partir de organismos geneticamente modificados, analise as afirmativas a seguir:

- I. Sua produção apresenta vantagem sobre vacinas obtidas a partir de fragmentos do patógeno, pois a produção não envolve o seu cultivo e, portanto, não são exigidos requisitos de biossegurança necessários ao cultivo de patógenos.
- II. Uma bactéria ou levedura não patogênica torna-se capaz de produzir o antígeno a partir da introdução do gen responsável pela síntese do mesmo no microrganismo patogênico.
- III. Não são tão eficazes quanto às produzidas a partir de microrganismos vivos atenuados, mas, apresentam menores toxicidades.
- IV. Pode ocorrer a produção do antígeno de forma incorreta devido ao erro de transdução do DNA no microrganismo geneticamente modificado.
- V. Um exemplo desta tecnologia desenvolvida com sucesso foi a da produção do antígeno superficial de Hepatite B (HbsAg) em células de leveduras.

Estão corretas as afirmativas:

- (A) I e II, apenas;
- (B) I, II e V, apenas;
- (C) I, III e IV, apenas;
- (D) I e V, apenas;
- (E) II e V, apenas.

29. As medidas abaixo podem ser utilizadas para evitar a contaminação cruzada, EXCETO:

- (A) produção em áreas segregadas;
- (B) utilização de antecâmaras com diferenciais de pressão;
- (C) utilização de roupas protetoras em áreas em que estejam sendo processados produtos que apresentem risco de contaminação cruzada;
- (D) ter os controles ambientais e de processo realizados e registrados;
- (E) utilização de rótulos indicando o estado de limpeza dos equipamentos.

30. No desenvolvimento de um fármaco ou um imunobiológico, considere as fases abaixo descritas:

- I. Teste clínico para verificação da eficácia em crianças.
- II. Desenvolvimento da tecnologia de produção.
- III. Verificação de reatogenicidade e eficácia em animais
- IV. Teste clínico para verificação de eficácia em adultos jovens saudáveis.
- V. Teste clínico para verificação da reatogenicidade em grupo pequeno de adultos jovens saudáveis.

A melhor ordenação cronológica destas fases é:

- (A) III, V, II, IV, I;
- (B) II, V, IV, I, III;
- (C) III, IV, V, I, II;
- (D) II, III, V, IV, I;
- (E) III, II, V, IV, I

PRODUÇÃO DE VACINAS VIRAIS

31. Observe as afirmativas a seguir, em relação às vacinas humanas de utilização mais extensa:

- I. varicela, viva atenuada.
- II. tuberculose/BCG, viva atenuada.
- III. raiva, inativada.
- IV. hepatite B, subunidades.
- V. hepatite A, inativada.

São vacinas virais:

- (A) I, II, III e V;
- (B) I, III, IV e V;
- (C) II, III, IV e V;
- (D) I, II, IV, V;
- (E) I, IV, V.

32. Sobre o Sistema Imunitário (também conhecido como Sistema Imunológico), NÃO é correto afirmar:

- (A) existem dois tipos de mecanismos de defesa: os inatos e o sistema imunitário adquirido;
- (B) são exemplos de mecanismos de defesa inato a proteção da pele, a acidez gástrica, as células fagocitárias ou a segregação de lágrimas;
- (C) são exemplos de sistema imunitário adquirido a ação direcionada dos linfócitos e a sua produção de anticorpos específicos;
- (D) o sistema inato é composto por todos os mecanismos que defendem o organismo de forma específica, contra um invasor;
- (E) os mecanismos do sistema inato constituem as estratégias de defesa mais antigas, sendo algumas destas formas encontradas nos seres multicelulares mais primitivos, nas plantas e fungos

33. Entre as vacinas virais mais utilizadas, podemos identificar os seguintes tipos:

- I. as inativadas que contêm vírus mortos por agentes químicos
- II. as inativadas que contêm vírus mortos por agentes físicos.
- III. as vacinas vivas contendo vírus modificados, os quais geram anticorpos e/ou resposta celular nos vacinados, mas não a doença original (exceto em raríssimas ocasiões).
- IV. as vacinas que contêm apenas subunidades ou frações dos vírus para os quais se deseja obter imunidade.

Assinale:

- (A) as afirmativas I, III e IV estão corretas;
- (B) as afirmativas I, e IV estão corretas;
- (C) as afirmativas III e IV estão corretas;
- (D) as afirmativas I, II e IV estão corretas;
- (E) todas as afirmativas estão corretas.

34. Dentre as vacinas virais humanas de utilização mais extensa, podemos identificar como substrato utilizado:

- I. influenza – ovos embrionados.
- II. poliomielite oral – cultura de células.
- III. febre amarela – ovos embrionados ou cultura de células.
- IV. hepatite A – cultura de células.
- V. raiva – animais ou cultura de células.

Assinale:

- (A) apenas I está correta;
- (B) apenas I e III estão corretas;
- (C) apenas II e III e IV estão corretas;
- (D) apenas II, IV e V estão corretas;
- (E) todas estão corretas.

35. Observe as afirmativas a seguir:

- I. vírus não pode se replicar em meio de cultura sintético.
- II. as únicas formas para crescimento e estudo com vírus até 1950, eram em animais e ovos embrionados.
- III. vírus requer células vivas como hospedeiras.
- IV. cultura de células requer menor espaço, é mais conveniente do que o uso com animais ou ovos, porém tem maior custo do que estas técnicas.

São verdadeiras as sentenças:

- (A) II e III;
- (B) I, II e III;
- (C) III e IV;
- (D) II, III e IV;
- (E) todas as afirmativas.

36. Observe as afirmativas a seguir, em relação à cultura de células:

- I. as células podem ser obtidas de vários órgãos e tecidos de embriões, de origem infantil ou adulta.
- II. independente de sua fonte, culturas obtidas diretamente de órgãos animais e tecidos, são referidas como cultura de células primárias.
- III. para obter uma cultura de células primárias, os tecidos são cortados em pequenos fragmentos e digeridos enzimaticamente, usualmente com tripsina.

São verdadeiras as sentenças:

- (A) somente I;
- (B) somente II e III;
- (C) somente I e II;
- (D) somente III;
- (E) todas as afirmativas.

37. As vacinas virais:

- I. consistem em suspensões de vírus atenuados, inativados ou fração deles.
- II. podem apresentar-se sob a forma liofilizada ou suspensão.
- III. podem conter concentrações muito baixas de antibióticos, exceto estreptomicina, penicilina e seus derivados.
- IV. podem utilizar em sua formulação albumina humana, basta que demonstrem ausência de anticorpos para HIV 1 e 2.

Assinale:

- (A) I e IV estão corretas;
- (B) II e IV estão corretas;
- (C) I, II e III estão corretas;
- (D) I, III e IV estão corretas;
- (E) todas estão corretas.

38. Sobre a produção de vacinas virais:

- I. a produção de vacina é baseada no sistema de lote-semente.
- II. a cepa de vírus utilizada deve demonstrar ausência de imunogenicidade adequada, bem como ser segura ao ser humano.
- III. a replicação da cepa viral vacinal é obtida em sistema hospedeiro (animais, embriões de aves ou cultura de células) apropriado.

Assinale a alternativa correta:

- (A) somente a afirmativa I está correta;
- (B) somente as afirmativas I e III estão corretas;
- (C) somente as afirmativas I e II estão corretas;
- (D) somente as afirmativas II e III estão corretas;
- (E) todas as afirmativas estão corretas.

39. Observe as afirmativas a seguir, em relação ao Sistema Imunitário Adquirido, e assinale a alternativa INCORRETA

- (A) se concentra na capacidade das células imunitárias distinguirem proteínas produzidas pelas células do próprio corpo e proteínas produzidas por invasores ou pelas células humanas sob o controle de vírus;
- (B) a distinção é feita através de receptores, os TCR (*T-cell receptors*) ou BCR (*B cell receptors*) que são anticorpos presos à membrana;
- (C) os receptores TCR ou BCR, para serem eficazes, têm de ser produzidos com milhões de conformações. De outro modo não se ligariam a muitos tipos de proteínas de invasores e não os reconheceriam;
- (D) esta diversidade de receptores não caberia no genoma da célula e milhões de genes, cada um para cada receptor possível, não seria prático.
- (E) algumas famílias de genes têm, cada uma, vários membros ligeiramente diferentes. Através de um processo especial e único nas células humanas, estes genes nos linfócitos recombinam-se, um de cada família, num único gene, de forma totalmente organizada e ordenada.

40. Para a produção de vacinas virais, pode-se utilizar, EXCETO:

- (A) células tumorogênicas
- (B) células diplóides humanas;
- (C) linhagem primária de rim de coelho;
- (D) linhagem primária de embriões de aves;
- (E) sistema hospedeiro (animais, embriões de aves).

41. Observe as afirmativas a seguir, em relação às substâncias adjuvantes:

- I. substâncias adjuvantes, tais como, conservantes, estabilizantes, diluentes, desagregantes, aglutinantes, desluzantes, anti-aderentes, entre outras, são aquelas empregadas para preparar a forma farmacêutica.

- II. essas substâncias devem ser inócuas nas quantidades adicionadas e não devem ter influência adversa sobre a eficácia terapêutica da substância ativa contida na preparação nem interferir com ensaios e determinações.
- III. essas substâncias não devem prejudicar a eficácia terapêutica do medicamento.

Assinale:

- (A) somente I está correta;
- (B) somente II está correta;
- (C) somente I e II estão corretas;
- (D) somente II e III estão corretas;
- (E) todas estão corretas.

42. Em relação à utilização de substâncias adjuvantes, NÃO é correto afirmar:

- (A) são substâncias com finalidades específicas adicionadas às preparações injetáveis;
- (B) devem ser selecionadas tendo em vista o aumento de estabilidade do produto;
- (C) devem ser selecionadas tendo em vista a interferência na eficácia terapêutica bem como o doseamento do princípio ativo;
- (D) não devem causar toxicidade nas quantidades administradas ao paciente;
- (E) incluem os solubilizantes, os antioxidantes, os agentes quelantes, os tampões, os agentes antibacterianos, os agentes antifúngicos, os agentes anti-espumantes e outros.

43. Em relação às vacinas virais e sua produção, NÃO é correto afirmar que:

- (A) a vacina contra a raiva uso humano é uma suspensão inativada preparada a partir de vírus rábico replicado em cultura de células;
- (B) a vacina oral contra poliomielite consiste de mistura de poliovírus atenuados tipos 1,2,e 3. e sua produção é baseada no sistema de lote semente;
- (C) a vacina contra o sarampo é constituída de vírus vivos atenuados e sua produção é baseada no sistema de lote semente;
- (D) a vacina contra febre amarela é constituída de vírus vivos atenuados e sua produção é baseada no sistema de lote semente primário, do qual, por meio de passagens em ovos embrionados de galinha SPF, se origina o lote semente secundário.
- (E) a vacina contra caxumba é constituída de vírus inativado e sua produção é baseada no sistema de lote semente.

44. Observe as afirmativas a seguir, em relação à água purificada:

- I. água para preparação de medicamentos os quais requerem ser estéreis e apirogênicos.
- II. água purificada pode ser obtida por destilação, troca iônica, osmose reversa ou por um outro método adequado, que concorde com os órgãos regulatórios pretendido para o consumo humano preconizado pela autoridade competente.
- III. não se usa água purificada nas preparações pretendidas para administração parenteral.

Assinale:

- (A) apenas I está correta;
- (B) apenas I e II estão corretas;
- (C) apenas I e III estão corretas;
- (D) apenas II e III estão corretas;
- (E) todas estão corretas.

45. São alguns dos testes que devem ser executados em água purificada:

- I. condutividade.
- II. carbono orgânico total
- III. composição dos ácidos graxos

Assinale.

- (A) apenas I está correta;
- (B) apenas II está correta;
- (C) apenas I e II estão corretas;
- (D) apenas I e III estão corretas;
- (E) todas estão corretas.

46. Observe as afirmativas a seguir, em relação à água para injetáveis:

- I. água para a preparação de medicamentos para administração parenteral quando a água é utilizada como veículo.
- II. água para dissolução ou diluição de substâncias ou preparação para administração parenteral (água esterilizada para injetáveis).
- III. pode conter substâncias adicionadas para seu tratamento e purificação

Assinale:

- (A) apenas I está correta;
- (B) apenas I e II estão corretas;
- (C) apenas I e III estão corretas;
- (D) apenas II e III estão corretas;
- (E) todas estão corretas.

47. Observe as afirmativas a seguir, sobre a preparação para o cultivo celular:

- I. células requerem um complexo nutricional de forma a permitir sua propagação *in vitro*.
- II. diferentes tipos de células tem necessidades diferentes para seu crescimento e o número de formulações são desenvolvidas de forma a dar suporte ao crescimento de uma variedade da linhagem celular estabelecida.
- III. embora existam alguns meios livre de soro disponíveis, muitas linhagens celulares requerem a adição de soro como suplemento para promover a multiplicação celular.
- IV. soro fetal bovino é muitas vezes melhor para uso e não necessita inativação;
- V. não se deve utiliza soro de cavalo.

- (A) apenas I e II estão corretas;
- (B) apenas II e III estão corretas;
- (C) apenas I, II e III estão corretas;
- (D) apenas I, II, III e IV estão corretas;
- (E) todas estão corretas.

48. O meio de cultura de células mais comumente descrito é, EXCETO:

- (A) Meio 199;
- (B) BME;
- (C) EMEM;
- (D) FBS;
- (E) Alpha MEM.

49. Observe as afirmativas a seguir, sobre o cultivo celular:

- I. a adição de soro atua como um suplemento para promover a multiplicação celular.
 - II. uma vez preparado, o meio de cultura de células deve ser adequadamente estocado e deve ser congelado sem NaHCO_3 (bicarbonato de sódio).
 - III. o EDTA (ácido etilenodiamina tetracético) é um agente quelante e por vezes é usado sozinho ou em combinação com tripsina.
- (A) todas as afirmativas estão corretas.
 - (B) apenas a afirmativa I está correta;
 - (C) apenas a afirmativa II está correta;
 - (D) apenas as afirmativas I, II estão corretas;
 - (E) apenas as afirmativas II, III estão corretas;

50. Em relação ao Sistema Imunitário Adquirido, NÃO é correto afirmar que:

- (A) cada anticorpo ou BCR (*B cell receptors* que são anticorpos presos a membrana) dos linfócitos B tem seis porções e é criado de dois genes únicos desse linfócito, gerados pela recombinação (união) de um gene aleatório de cada família;
- (B) a variabilidade dos anticorpos é na prática ilimitada, e o sistema imunitário cria anticorpos contra qualquer molécula e mesmo contra moléculas artificiais nunca existentes na natureza;
- (C) uma das funções do timo e medula óssea é manter os jovens linfócitos seqüestrados até que seja possível determinar quais reagem com moléculas do próprio organismo; essa função é feita por células especializadas desses órgãos que apresentam aos linfócitos jovens moléculas produzidas por elas (e portanto próprias);
- (D) os linfócitos que não reagem com moléculas do próprio organismo são milhões, cada um com milhões de configurações possíveis de receptores e haverá inclusive vários, cada um com milhões de configurações possíveis de receptores e haverá inclusive vários, cada um com receptor para zonas diferentes de cada proteína microbiana possível;
- (E) os linfócitos, em sua esmagadora maioria sempre encontram uma proteína para a qual o seu receptor seja específico e assim que a encontram, são estimulados e multiplicam-se