

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO – COMO MUDAR O RUMO

Desde que a humanidade deixou de se preocupar apenas em sobreviver às doenças para garantir um pouco mais de sobrevida na Terra, outro incômodo passou a ter prioridade. Voltando seu olhar ao redor, como se só então pudessem fazê-lo sem medo de contágio, os homens descobriram a pobreza e a terrível desigualdade social. Os que acumularam riqueza só pensavam em amealhar cada vez mais. Os que estavam no pé da pirâmide dificilmente conseguiam subir, a não ser com a ajuda de mãos caridosas.

Diferentemente daqueles que enxergam na ajuda filantrópica a única saída para este dilema milenar, há muitos que acreditam na força e na potência dos seres humanos, desde que lhes seja dada uma chance de se fazer ouvir por quem tem poder e capital.

1. Em função do que é lido no texto, o título "Como mudar o rumo" deve referir-se:
 - (A) à mudança das preocupações da humanidade;
 - (B) à substituição das doenças pelas preocupações sociais;
 - (C) ao comportamento diferente dos que amealharam grandes riquezas;
 - (D) aos que acreditam em algo mais do que a ajuda filantrópica para sanar problemas sociais;
 - (E) ao encaminhamento dos necessitados para a ajuda filantrópica.
2. "Desde que a humanidade deixou de se preocupar apenas em sobreviver às doenças para garantir um pouco mais de sobrevida na Terra, outro incômodo passou a ter prioridade"; a nova forma dessa frase que altera o seu sentido original é:
 - (A) Outro incômodo passou a ter prioridade, desde que a humanidade deixou de se preocupar apenas em sobreviver às doenças para garantir um pouco mais de sobrevida na Terra;
 - (B) Desde que a humanidade deixou de se preocupar apenas em sobreviver às doenças, outro incômodo passou a ter prioridade, para garantir um pouco mais de sobrevida na Terra;
 - (C) Desde que a humanidade deixou de se preocupar, para garantir um pouco mais de sobrevida na Terra, apenas em sobreviver às doenças, outro incômodo passou a ter prioridade;
 - (D) Outro incômodo passou a ter prioridade, desde que a humanidade deixou de se preocupar, para garantir um pouco mais de sobrevida na Terra, apenas em sobreviver às doenças;
 - (E) Desde que a humanidade, para garantir um pouco mais de sobrevida na Terra, deixou de se preocupar apenas em sobreviver às doenças, outro incômodo passou a ter prioridade.
3. "para garantir um pouco mais de sobrevida na Terra"; o significado de "sobrevida" no texto é:
 - (A) prolongamento da vida além de limite dado;
 - (B) tudo o que ocorre em seguida à vida terrena;
 - (C) a continuidade da vida após o desaparecimento de outros;
 - (D) a sobrevivência com qualidade de vida;
 - (E) a continuidade da vida na Terra com poucas espécies que escaparam da extinção.
4. A expressão "ter prioridade" equivale semanticamente a "ser prioritário"; a alternativa abaixo que mostra uma equivalência EQUIVOCADA é:
 - (A) ter pressa = ser apressado;
 - (B) ter problemas = ser problemático;
 - (C) ter dificuldades = ser deficiente;
 - (D) ter preocupações = ser preocupado;
 - (E) ter desinteresse = ser desinteressado.
5. Ao dizer que "outro incômodo passou a ter prioridade", pode-se deduzir que:
 - (A) a situação anterior não era incômoda;
 - (B) passam a existir dois incômodos prioritários;
 - (C) o problema anterior foi solucionado;
 - (D) o incômodo anterior foi momentaneamente esquecido;
 - (E) outro incômodo fez com que o anterior ficasse em segundo plano.
6. "Voltando seu olhar ao redor, os homens descobriram a pobreza..."; a alternativa que mostra uma forma desenvolvida do gerúndio "voltando" que é adequada ao contexto é:
 - (A) antes de voltarem;
 - (B) quando voltaram;
 - (C) se voltassem;
 - (D) apesar de voltarem;
 - (E) embora voltassem.
7. "os homens descobriram a pobreza e a terrível desigualdade social"; a alternativa que mostra uma forma INADEQUADA dessa frase por alterar o seu sentido original é:
 - (A) A pobreza foi descoberta pelos homens, juntamente com a terrível desigualdade social;
 - (B) A pobreza e a terrível desigualdade social foram descobertas pelos homens;
 - (C) A pobreza e a terrível desigualdade social, os homens as descobriram;
 - (D) Os homens descobriram, além da pobreza, a terrível desigualdade social;
 - (E) Pela terrível desigualdade social, os homens descobriram a pobreza.
8. "Os que acumularam riqueza só pensavam em amealhar cada vez mais"; a alternativa que mostra a reescritura dessa mesma frase em que a mudança de posição da palavra só NÃO altera o sentido original é:
 - (A) Só os que acumularam riqueza pensavam em amealhar cada vez mais;
 - (B) Os que só acumularam riqueza, pensavam em amealhar cada vez mais;
 - (C) Os que acumularam só riqueza pensavam em amealhar cada vez mais;
 - (D) Os que acumularam riqueza pensavam só em amealhar cada vez mais;
 - (E) Os que acumularam riqueza pensavam em amealhar só cada vez mais.

9. "Os que estavam ao pé da pirâmide dificilmente conseguiram subir"; os que estão "ao pé da pirâmide" são:
- (A) os desejosos de progredir socialmente;
 - (B) os de classe social mais alta;
 - (C) os que ajudam os demais a subir socialmente;
 - (D) os mais pobres;
 - (E) os que acreditam na força e na potência dos seres humanos.
10. "desde que lhes seja dada uma chance de se fazer ouvir"; o conectivo "desde que" expressa uma:
- (A) condição;
 - (B) situação temporal;
 - (C) comparação;
 - (D) causa;
 - (E) concessão.

DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS

11. A partir do início dos sintomas de uma infecção por rotavírus, o período de máxima excreção viral do agente nas fezes se dá na (o):
- terceiro e quarto dia
 - sexto e sétimo dia
 - nono e décimo dia
 - segunda semana
 - terceira semana
12. Para o cálculo da taxa de infecção hospitalar, recomenda-se utilizar como denominador o total de:
- pacientes com infecção hospitalar
 - procedimentos cirúrgicos realizados
 - pacientes-dia
 - procedimentos invasivos realizados
 - infecções hospitalares
13. Uma epidemia de leptospirose ocorreu em uma cidade no ano de 2005 e foram notificados 200 casos com uma letalidade de 12%. O número de óbitos da doença foi igual a:
- doze
 - vinte
 - vinte e quatro
 - trinta
 - trinta e dois
14. Nos casos graves de febre maculosa, a droga de escolha é a (o):
- ciprofloxacina
 - clindamicina
 - azitromicina
 - tobramicina
 - clorafenicol
15. Pacientes com suspeita de influenza aviária (H5N1) devem receber prontamente inibidores da:
- transcriptase reversa
 - polimerase
 - integrase
 - neuraminidase
 - protease
16. O tempo entre a exposição humana ao vírus da imunodeficiência humana (HIV) e o aparecimento dos sintomas na fase aguda varia entre:
- 10 a 15 anos
 - 5 a 30 dias
 - 6 a 12 meses
 - 5 a 10 semanas
 - 3 a 6 meses
17. Recomenda-se para a profilaxia pós-exposição ao *Bacillus anthracis* o uso de:
- cloranfenicol
 - metronidazol
 - netilmicina
 - azitromicina
 - ciprofloxacina
18. São sinais de alerta na dengue, EXCETO:
- hepatomegalia dolorosa
 - vômitos persistentes
 - prova do laço positiva
 - hipotensão postural
 - aumento repentino do hematócrito
19. Em relação à difteria é correto afirmar que a (o):
- proteção conferida pelo soro antidiftérico é permanente
 - doença normalmente confere imunidade permanente
 - portador pode eliminar o bacilo por 6 meses ou mais
 - soro antidiftérico age na toxina impregnada no tecido
 - agente etiológico é o *Clostridium diphtheriae*
20. A vacinação contra gripe no Brasil visa proteger os idosos e os portadores de doenças crônicas contra as complicações da influenza. Recomenda-se também seu uso em trabalhadores de, EXCETO:
- saúde que assistam casos de infecção respiratória
 - asilos
 - creches
 - transporte de massa
 - avicultura
21. O exame sorológico anti-HIV deve ser oferecido a todos os pacientes com diagnóstico de tuberculose:
- confirmado
 - suspeito
 - confirmado somente quando associado a fatores de risco para o HIV
 - extra-pulmonar suspeito
 - pulmonar somente
22. A medida de maior impacto epidemiológico no controle da tuberculose no Brasil é a (o):
- diagnóstico e tratamento precoce de doentes
 - quimioprofilaxia em massa
 - vacinação com BCG intradérmico
 - isolamento hospitalar de doentes bacilíferos
 - exame clínico e radiológico dos comunicantes
23. O condiloma plano é uma manifestação da (o):
- papiloma vírus
 - sífilis primária
 - sífilis secundária
 - donovanose
 - linfogranuloma venéreo

24. Em 01/01/2004 existiam 900 casos de hanseníase em tratamento em um município. Ao longo do ano foram detectados 50 casos da doença e 150 pacientes obtiveram alta por cura. A população residente, estimada para 2004, era de um milhão de habitantes. Pode-se afirmar em relação à hanseníase que, em 31/12/2004, a (o):
- (A) taxa de abandono foi de 16,7%
 - (B) coeficiente de prevalência foi de 80/100.000
 - (C) coeficiente de incidência foi igual ao de prevalência
 - (D) coeficiente de incidência foi de 50/100.000
 - (E) taxa de cura foi de 15/100.000
25. Uma doença infecciosa de alta letalidade é aquela em que a (o):
- (A) taxa de incidência é elevada
 - (B) risco de morrer entre os doentes é grande
 - (C) risco de adoecer é muito alto
 - (D) risco de contágio é grande
 - (E) taxa de mortalidade é elevada
26. Um ensaio clínico para testar uma droga nova no tratamento de uma doença infecciosa, sem viés no seu planejamento, encontrou uma proporção de pacientes curados maior no grupo que usou a droga nova em relação ao grupo que utilizou o tratamento tradicional com uma significância estatística de $p < 0,001$. Este achado permite afirmar que:
- (A) é muito provável que esse achado seja ao acaso
 - (B) não houve significância clínica na pesquisa
 - (C) não houve significância estatística na pesquisa
 - (D) o intervalo de confiança foi muito grande
 - (E) é pouco provável que esse achado seja ao acaso
27. Em uma região indene há mais de dez anos para uma determinada doença infecciosa, a ocorrência de um caso autóctone pode ser considerada como um (a):
- (A) endemia
 - (B) hiperendemia
 - (C) caso importado
 - (D) epidemia
 - (E) pandemia
28. **NÃO** faz parte da lista nacional de agravos de notificação compulsória a (o):
- (A) peste
 - (B) antraz
 - (C) paralisia flácida aguda
 - (D) cólera
 - (E) varicela
29. Constitui uma medida de prevenção secundária o (a):
- (A) vacinação
 - (B) diagnóstico precoce
 - (C) educação em saúde
 - (D) reabilitação
 - (E) aconselhamento genético
30. O total de casos de tuberculose existentes em uma região durante um período de tempo denomina-se:
- (A) incidência
 - (B) prevalência
 - (C) patogenicidade
 - (D) infectividade
 - (E) risco

DERMATOLOGIA

31. Os principais agentes etiológicos envolvidas na transmissão da leishmaniose tegumentar americana no Brasil são, EXCETO:

- (A) *Leishmania braziliensis*;
- (B) *Leishmania guyanensis*
- (C) *Leishmania amazonensis*;
- (D) *Leishmania naiffi*;
- (E) *Leishmania chagasi*.

32. Em relação ao diagnóstico da leishmaniose tegumentar americana, NÃO é correto afirmar:

- (A) o diagnóstico envolve aspectos epidemiológicos, clínicos e laboratoriais;
- (B) a pesquisa parasitológica é o diagnóstico de certeza;
- (C) a introdermorreação de Montenegro pode ser negativa em lesões ativas com tempo de evolução inferior a um mês;
- (D) a positividade da pesquisa direta de amastigotas é maior nas lesões com tempo de evolução de mais de um ano;
- (E) a reação sorológica através da imunofluorescência indireta pode apresentar reações cruzadas com outros patógenos.

33. Em relação às manifestações clínicas da leishmaniose tegumentar americana podemos observar:

- (I) pápula eritematosa única ou múltipla correspondente ao ponto de inoculação;
- (II) adenopatia regional e linfangite;
- (III) lesões pápulo vesiculosas, pápulo pustulosas e pápulo crostosas;
- (IV) lesões em várias fases evolutivas.

Assinale a afirmativa correta:

- (A) apenas a afirmativa I está correta;
- (B) apenas a afirmativa II está correta;
- (C) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
- (D) apenas as afirmativas II e III estão corretas;
- (E) todas as afirmativas estão corretas.

34. Nas lesões disseminadas ou múltiplas associadas à infecção por *L. braziliensis*:

- (I) as lesões são monomórficas;
- (II) freqüentemente se associam a lesões de mucosa;
- (III) não costumam a responder a terapêutica;
- (IV) a introdermorreação de Montenegro é geralmente negativa

Assinale a afirmativa correta:

- (A) apenas a afirmativa I está correta;
- (B) apenas a afirmativa II está correta;
- (C) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
- (D) apenas as afirmativas II e III estão corretas;
- (E) todas as afirmativas estão corretas.

35. Em relação à técnica de PCR para a amplificação de DNA parasitário na leishmaniose tegumentar americana, NÃO é correto afirmar:

- (A) tem mostrado uma sensibilidade superior aos métodos convencionais de diagnóstico;
- (B) permite a caracterização do parasita quanto ao subgênero;
- (C) é uma ferramenta diagnóstica importante nos casos de lesões com suspeita de recidiva;
- (D) o achado de DNA parasitário no sangue periférico pode ser encontrado em 25% dos casos;
- (E) tem sido utilizada para a caracterização fenotípica de *Leishmania*.

36. Em relação aos achados histopatológicos da leishmaniose tegumentar americana podemos afirmar, EXCETO:

- (A) as amastigotas são mais difíceis de encontrar que nos esfregaços por aposição;
- (B) os granulomas do tipo tuberculóide é um dos achados mais freqüentes;
- (C) a hiperplasia pseudoepiteliomatosa pode ocorrer;
- (D) a degeneração fibrinóide do colágeno e vasculite são achados comuns;
- (E) é útil no diagnóstico diferencial com outras patologias.

37. Em relação a lesões de mucosa da leishmaniose tegumentar americana NÃO é correto afirmar:

- (A) na maioria dos casos é ocasionada pela *L. braziliensis*;
- (B) as lesões geralmente surgem meses ou anos após as lesões cutâneas terem cicatrizado;
- (C) tendem a evoluir para a cura espontânea;
- (D) a mucosa nasal constitui o sítio mais comum;
- (E) pode ocorrer edema e necrose das lesões no início da terapêutica específica podendo levar a quadros obstrutivos.

38. São contra-indicações ao uso do antimoniato de N-metil-glucamina (Glucantime) sistêmico EXCETO:

- (A) gravidez;
- (B) diabetes;
- (C) nefropatia;
- (D) hepatopatia;
- (E) cardiopatia.

39-A identificação do parasita ou seu antígeno em tecido pode ser feita através das seguintes técnicas:

- (I) coloração pela hematoxilinaeosina;
- (II) coloração pelo Giemsa;
- (III) reação de imunoperoxidase;
- (IV) reação de imunofluorescência indireta.

Assinale a afirmativa correta:

- (A) apenas a afirmativa I está correta;
- (B) apenas a afirmativa II está correta;
- (C) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
- (D) apenas as afirmativas I, II e III estão corretas;
- (E) todas as afirmativas estão corretas.

40-A influência de diferentes formas e/ou apresentações clínicas da leishmaniose tegumentar americana está na dependência de algumas variáveis:

- (I) espécies de *Leishmania*;
- (II) resposta imune celular do hospedeiro;
- (III) as peculiaridades dos vetores não influenciam o número de lesões apresentadas pelos pacientes;
- (IV) diagnóstico e tratamento precoce.

Assinale a afirmativa correta:

- (A) apenas a afirmativa I está correta;
- (B) apenas a afirmativa III está correta;
- (C) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
- (D) apenas as afirmativas I, II e III estão corretas;
- (E) apenas as afirmativas I, II, IV estão corretas.

41. Em relação à leishmaniose cutânea difusa podemos afirmar:

- (A) a reação de Montenegro é fortemente positiva;
- (B) tem uma boa resposta a Anfotericina B;
- (C) a principal espécie associada é a *L. amazonensis*;
- (D) caracteriza-se clinicamente pela presença de inúmeras lesões ulceradas;
- (E) o quadro clínico é por um defeito imunológico que permite a proliferação da *L. guyanensis*.

42-É diagnóstico diferencial das lesões mucosas de leishmaniose tegumentar americana, EXCETO:

- (A) histoplasmose;
- (B) paracoccidioidomicose;
- (C) carcinoma espinocelular;
- (D) esporotricose;
- (E) feohifomicose.

43-Em relação à leishmaniose tegumentar americana assinale a afirmativa correta

- (A) a lesão primária de leishmaniose tegumentar americana não cicatriza espontaneamente;
- (B) a reação de imunofluorescência indireta é um excelente método diagnóstico;
- (C) o Isotionato de Pentamidina é uma das opções de tratamento;
- (D) a Anfotericina B é a primeira escolha de tratamento;
- (E) a pesquisa de amastigotas em lesões de mucosa é frequentemente positiva.

44-Em relação à introdermorreação de Montenegro podemos fazer as seguintes afirmações, EXCETO:

- (A) pode levar até 6 semanas após o início da lesão para se tornar positiva;
- (B) pode ser feita com frações antigênicas polissacarídicas ou protéicas;
- (C) a leitura é realizada com 48 a 72 horas;
- (D) nas formas anérgicas de leishmaniose tegumentar americana às vezes é negativa;
- (E) o teste é muito sensível.

45-Assinale na relação dos países abaixo, aquele em que a leishmaniose tegumentar americana não é considerada endêmica

- (A) Argentina;
- (B) Brasil;
- (C) Uruguai;
- (D) Colômbia;
- (E) Venezuela.

46. Dentre os feitos colaterais do N-metil-glucamina (Glucantime) podemos assinalar, EXCETO

- (A) artralgia;
- (B) mialgia;
- (C) elevação de uréia e a creatinina;
- (D) encurtamento do espaço Q-T;
- (E) elevação de transaminases.

47-Em relação à leishmaniose mucosa, podemos afirmar

- (I) é freqüente;
- (II) o principal agente é a *Leshmania (viannia) naiff*;
- (III) a perfuração do septo faz diagnóstica diferencial com àquelas provocadas por usuários de cocaína inalatória;
- (IV) pode se apresentar como lesão ulcerovegetante com granulações grosseiras às vezes separadas por sulcos.

Assinale a afirmativa correta:

- (A) apenas a afirmativa I está correta;
- (B) apenas a afirmativa II está correta;
- (C) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
- (D) apenas as afirmativas III e IV estão corretas;
- (E) todas as afirmativas estão corretas.

48-Em relação às lesões de recidiva da leishmaniose cutânea podemos afirmar

- (A) são muito freqüentes;
- (B) são exclusivas da leishmaniose tegumentar americana;
- (C) só ocorrem em indivíduos da raça negra;
- (D) consistem no aparecimento de tubérculos ao redor ou sobre lesões cicatriciais;
- (E) a ocorrência de traumatismo não interfere no processo.

49-Em relação ao antimoniato de meglumina (Glucantime) podemos afirmar que:

- (I) existem diferenças regionais de sensibilidade à droga;
- (II) a dose máxima diária que pode ser utilizada é de 850 mg;
- (III) o tempo de tratamento da leishmaniose cutânea é geralmente diferente da mucosa;
- (IV) a ausência de cicatrização completa após 1 mês de suspensão da medicação é considerado falha terapêutica.

Assinale a afirmativa correta:

- (A) apenas a afirmativa I está correta;
- (B) apenas a afirmativa II está correta;
- (C) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
- (D) apenas as afirmativas I, II e III estão corretas;
- (E) todas as afirmativas estão corretas.

50-Em relação à leishmaniose tegumentar americana assinale a afirmativa correta

- (A) o período mínimo de incubação da doença são 2 meses;
- (B) os morcegos são um dos reservatórios silvestres;
- (C) o gato é um importante elo na cadeia epidemiológica urbana;
- (D) os linfonodos não são acometidos nas diversas formas clínicas;
- (E) a impregnação argêntica é o método de escolha na pesquisa direta das formas amastigotas de material histopatológico.