

CONCURSO PÚBLICO

CARGO 76

MÉDICO PSIQUIATRIA

TIPO A



INSTRUÇÕES

Confira seus dados pessoais e verifique se o tipo de caderno de provas corresponde ao tipo indicado na sua folha de respostas. Se houver qualquer divergência, solicite providências ao fiscal de sala mais próximo.

As provas objetivas são constituídas de questões com cinco opções (A, B, C, D e E), com **uma única resposta correta**. Caso o caderno das provas esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, solicite providências ao fiscal de sala mais próximo.

Transcreva as respostas das questões para a folha de respostas, que é **o único documento válido** para a correção das provas. O candidato é o único responsável pelo preenchimento da folha de respostas. Serão consideradas marcações indevidas as que estiverem em desacordo com o edital de abertura ou com a folha de respostas, tais como marcação rasurada ou emendada, ou campo de marcação não-preenchido integralmente. Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por erro de preenchimento por parte do candidato.

Para a marcação, o candidato deve usar caneta esferográfica de tinta **preta**. Não é permitido que outras pessoas façam as marcações da folha de respostas.

É vedado amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar a sua folha de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos decorrentes da impossibilidade de realização da leitura óptica.

Estas provas têm a duração de quatro horas. O candidato deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no mínimo, uma hora após o início das provas e poderá levar seu caderno de provas somente no decurso dos últimos quinze minutos anteriores ao horário determinado para o término das provas.

A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno ou na folha de respostas implicará a anulação das suas provas.

Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico <http://www.movens.org.br/prefsaoluis>, no dia 16/1/2007, a partir das 16 horas.

CRONOGRAMA

ETAPA	DIA
Divulgação do gabarito oficial preliminar das provas objetivas	16/1/2007
Prazo para entrega de recursos contra o gabarito oficial preliminar das provas objetivas – 2 dias	17 e 18/1/2007
Resultado final das provas objetivas para todos os cargos, do concurso para os cargos de Nível Médio e de Nível Fundamental e convocação para a avaliação de títulos para os cargos de Nível Superior	13/2/2007
Entrega dos documentos referentes à avaliação de títulos	14 e 15/2/2007
Resultado provisório da avaliação de títulos	7/3/2007
Prazo para entrega dos recursos contra o resultado provisório da avaliação de títulos	8 e 9/3/2007
Resultado final na avaliação de títulos e resultado final do concurso (Nível Superior)	22/3/2007



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Utilize o caso clínico hipotético descrito abaixo para responder às questões 01, 02 e 03.

Paciente de 48 anos de idade está no segundo dia de internação por pneumonia grave. Encontra-se agitado, dizendo que necessita trocar de roupa para ir ao trabalho; fala muito, embora de maneira arrastada, não consegue manter sua atenção na conversação, apresenta tremores generalizados e reclama de não conseguir enxergar direito devido às luzes intensas que saem por trás da porta.

QUESTÃO 01

De acordo com a descrição clínica do caso e as diretrizes diagnósticas definidas na CID 10, o diagnóstico do paciente é

- (A) demência na doença de Alzheimer de início precoce.
- (B) demência vascular de início agudo.
- (C) *delirium* não induzido pelo álcool ou por outras substâncias psicoativas.
- (D) demência não específica.
- (E) demência na doença do vírus da imunodeficiência humana (HIV).

QUESTÃO 02

A patologia de que o paciente é portador faz diagnóstico diferencial com

- (A) esquizofrenia.
- (B) hidrocefalia de pressão normal.
- (C) transtorno delirante induzido.
- (D) transtornos esquizoafetivos.
- (E) demência na doença de Alzheimer.

QUESTÃO 03

O tratamento farmacológico indicado para o paciente é:

- (A) antidepressivos.
- (B) estabilizadores do humor.
- (C) vitaminas do Complexo B.
- (D) neurolépticos.
- (E) antibióticos.

Utilize o caso clínico hipotético abaixo para responder às questões 04 e 05.

Paciente de 23 anos de idade, no segundo ano do curso de Direito, tem sido excelente aluno até então, porém nos últimos meses, vem faltando às aulas, alega que seus colegas de classe estabeleceram um código secreto para o depreciar.

Identifica na tosse ou espirro de seus colegas galhofas em código com relação a sua pessoa. Durante a noite não consegue dormir e tem dito aos seus pais que a Secretaria de Segurança instalou um aparelho de escuta em sua casa junto com câmeras secretas de vídeo e não acha mais seguro usar o telefone.

QUESTÃO 04

O paciente é portador de

- (A) esquizofrenia residual.
- (B) esquizofrenia paranóide.
- (C) transtorno delirante persistente.
- (D) transtorno psicótico polimorfo agudo com sintomas de esquizofrenia.
- (E) transtorno delirante induzido.

QUESTÃO 05

O quadro clínico de que o paciente é portador faz diagnóstico diferencial com

- (A) psicoses epiléticas.
- (B) esquizofrenia hebefrênica.
- (C) transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos.
- (D) transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão.
- (E) mania sem sintomas psicóticos.

Use o caso clínico hipotético abaixo para responder às questões 06 e 07.

Maria volta novamente ao pronto-socorro (PS) em estado de grande ansiedade, gritando, dizendo que sente que irá morrer a qualquer momento. Os funcionários já a conhecem, pois só este mês é a terceira vez que procura o PS. Você se interessa pelo caso e ao interrogar a paciente descobre que sua história teve início há cerca de 1 ano; as crises sempre começavam com uma sensação de desconforto mal definida; logo sentia falta de ar e o "coração disparava no peito", momento em que presentia a morte e solicitava ao marido que a levasse ao PS, pois não conseguia mais "puxar o ar para respirar". Seu marido está visivelmente contrariado, queixa-se do dinheiro que já gastou com a esposa levando-a a diversos médicos, tendo feito "vários eletros", duas endoscopias e uma ressonância.

QUESTÃO 06

O diagnóstico de Maria é:

- (A) transtorno do pânico (ansiedade paroxística episódica).
- (B) transtorno de ansiedade generalizada.
- (C) transtorno misto de ansiedade e depressão.
- (D) fobias sociais.
- (E) agorafobia.

QUESTÃO 07

A doença que deve ser considerada no diagnóstico diferencial da patologia de Maria é:

- (A) doenças Cardíacas (arritmias, *angina pectoris*, infarto do miocárdio e outras).
- (B) esquizofrenia simples.
- (C) transtorno esquizoafetivo.
- (D) transtorno de somatização.
- (E) transtorno hipocondríaco.

QUESTÃO 08

São efeitos colaterais dos antidepressivos tricíclicos:

- (A) síndrome de descontinuação e aumento de peso.
- (B) aumento de peso e aumento dos triglicerídios.
- (C) sedação e síndrome de descontinuação.
- (D) anticolinérgicos e cardíacos.
- (E) cardíacos e síndrome de descontinuação.

QUESTÃO 09

São causas somáticas de perda de peso em pacientes jovens que precisam ser diferenciadas da anorexia nervosa:

- (A) pneumonia aguda e estados gripais.
- (B) diabetes *mellitus* e gravidez ectópica.
- (C) doenças debilitantes crônicas e doença de Crohn.
- (D) estados gripais e esquizofrenia hebefrênica.
- (E) diabetes *mellitus* e estados gripais.

QUESTÃO 10

As modalidades de tratamento para os portadores de anorexia nervosa são:

- (A) medicamentosa com polivitaminas e sais minerais.
- (B) medicamentosa com antibióticos e sais minerais.
- (C) medicamentosa somente com reposição hormonal e ansiolíticos.
- (D) alimentação forçada como primeira intervenção e tratamento farmacológico.
- (E) recuperação nutricional, tratamento psicológico e farmacológico.

QUESTÃO 11

Em episódios depressivos típicos nas variedades leve, moderado e grave, o indivíduo usualmente sofre de humor deprimido, perda de interesse e prazer, com energia reduzida, levando a uma fadigabilidade aumentada e atividade diminuída.

De acordo com a CID 10, nos episódios depressivos outros sintomas são comuns. Assinale a opção que os indica corretamente.

- (A) Concentração, atenção reduzidas e auto-estima e autoconfiança aumentadas.
- (B) Sono perturbado e apetite diminuído.
- (C) Idéias ou atos autolesivos e atenção aumentada.
- (D) Visões desoladas e pessimistas do futuro com auto-estima e autoconfiança aumentadas.
- (E) Idéias de culpa e irritabilidade com auto-estima e autoconfiança aumentadas.

QUESTÃO 12

São quadros clínicos basicamente dissociativos:

- (A) amnésia dissociativa e transtorno de somatização.
- (B) transtorno de personalidade múltipla e transtornos de transe e possessão.
- (C) transtorno de somatização e estupor dissociativo.
- (D) transtorno de transe e possessão e transtorno de somatização.
- (E) transtorno de somatização e amnésia dissociativa.

QUESTÃO 13

Os psicofarmacos prescritos para mulheres no período de lactação e que têm baixo nível de risco para o lactante são:

- (A) clozapina e carbonato de lítio.
- (B) antidepressivos tricíclicos e carbonato de lítio.
- (C) antidepressivos tricíclicos e triptofano.
- (D) carbamazepina e barbitúricos.
- (E) clozapina e barbitúricos.

QUESTÃO 14

O uso de carbonato de lítio contra-indica a amamentação porque

- (A) aumenta o peso corporal e diminui a libido da nutriz.
- (B) aumenta o peso corporal e produz sonolência na nutriz.
- (C) tem baixo nível de risco para o lactante e aumenta o peso corporal da nutriz.
- (D) tem risco de toxicidade no bebê (cianose, hipotonia e hipotermia).
- (E) aumenta o peso corporal da nutriz e aumenta sua libido.

QUESTÃO 15

O tratamento de escolha em quadros depressivos e psicóticos refratários a farmacoterapia é:

- (A) psicoterapia cognitivo comportamental.
- (B) psicoterapia de grupo.
- (C) psicoterapia individual.
- (D) neurolépticos atípicos de nova geração.
- (E) eletroconvulsoterapia.

QUESTÃO 16

O exame pericial psiquiátrico é uma espécie de avaliação psiquiátrica com a finalidade judicial, policial, administrativa ou, eventualmente, de particular. (Taborda, 2004).

Em relação ao exame pericial psiquiátrico, julgue Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- I – O exame pericial psiquiátrico constitui-se em meio de prova.
- II – Conceitua-se perícia como o conjunto de procedimentos técnicos que tenha como finalidade o esclarecimento de interesse da justiça.
- III – O perito não é auxiliar do juiz.
- IV – O Código de Processo Civil prevê que o médico psiquiatra não poderá atuar como perito nos processos em que for membro da administração de pessoa jurídica que é parte no feito.
- V – O médico psiquiatra poderá ser perito nas causas em que for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes.

A seqüência correta é:

- (A) V V F V F.
- (B) F F V V F.
- (C) V V V V F.
- (D) F V F V F.
- (E) V F V F V.

QUESTÃO 17

Os principais tipos de interações medicamentosas são a farmacocinética e a farmacodinâmica. Assinale a opção correta.

- (A) A interação farmacocinética ocorre quando uma droga não altera a outra no local de ação.
- (B) A interação farmacodinâmica ocorre quando uma droga altera o efeito de outra por ação em receptores, mas não resulta efeitos semelhantes (sinergismo).
- (C) A interação farmacocinética ocorre quando uma droga interfere na absorção, distribuição ou excreção da outra droga.
- (D) Os antidepressivos tricíclicos têm baixo potencial de interação farmacocinética e farmacodinâmica, particularmente com drogas que atuam no sistema nervoso central e cardiovascular.
- (E) Os inibidores seletivos da recaptura da serotonina têm baixo potencial de interação farmacocinética e baixo de farmacodinâmica.

QUESTÃO 18

Os levantamentos epidemiológicos populacionais realizados no Brasil apontam para uma prevalência de transtornos mentais aproximada de 30% na população adulta, no período de um ano. Quando a prevalência de transtornos mentais é ajustada para os casos que demandam algum tipo de cuidado médico chega-se à estimativa, aproximada, de 20%, ou seja, um em cada cinco adultos demanda algum tipo de atenção em saúde mental num período de doze meses.

Em relação à epidemiologia dos transtornos mentais pode-se afirmar:

- (A) os transtornos psiquiátricos são mais freqüentes na população masculina.
- (B) a concentração de dependência ao álcool é maior entre as mulheres.
- (C) entre os homens são mais comuns os transtornos de ansiedade.
- (D) os transtornos mentais de ansiedade, somatoformes e depressivos são mais comuns entre os homens.
- (E) entre as mulheres são mais comuns os transtornos de ansiedade, os somatoformes e os depressivos.

CLÍNICA MÉDICA

Leia o caso clínico a seguir e responda às questões de 19 a 22.

Paciente do sexo masculino, de 53 anos, trabalhador rural, fumante há 30 anos, hipertenso, obeso, com história familiar de infarto do miocárdio em indivíduos com menos de 55 anos de idade e sem uso de qualquer medicação, apresentou exames laboratoriais com os seguintes resultados: hiperglicemia de jejum, hipercolesterolemia, HDL colesterol reduzido, LDL colesterol elevado, hipertrigliceridemia, hiperuricemia, microalbuminúria elevada e dosagens de uréia e creatinina normais.

QUESTÃO 19

Segundo as evidências disponíveis, assinale a opção que apresenta tratamento anti-hipertensivo de escolha de primeira linha para esse paciente.

- (A) diuréticos tiazídicos
- (B) beta-bloqueadores
- (C) bloqueadores dos canais de cálcio
- (D) inibidores da enzima conversora de angiotensinogênio
- (E) antagonistas alfa-adrenérgicos

QUESTÃO 20

Caso esse paciente procurasse assistência médica com artrite gotosa aguda, os medicamentos que poderiam ser iniciados para tratar a inflamação articular são:

- I - alopurinol
- II - anti-inflamatórios não-esteroidais
- III - drogas uricosúricas
- IV - colchicina
- V - hormônio adenocorticotrópico sintético

Estão corretos os itens

- (A) I, II e III.
- (B) I, II e IV.
- (C) II, III e V.
- (D) II, IV e V.
- (E) II, III e IV.

QUESTÃO 21

Se esse paciente apresentasse quadro de urgência hipertensiva, as drogas orais com as quais seu tratamento poderia ser feito são:

- I - clonidina
- II - captopril
- III - nifedipina
- IV - labetalol

A seqüência correta é

- (A) F V V V.
- (B) V F V V.
- (C) V V F V.
- (D) V V V F.
- (E) V V V V.

QUESTÃO 22

Por se tratar de paciente de alto risco de desenvolvimento de doença arterial coronariana, o tratamento da dislipidemia deverá ser iniciado. Em relação à terapia com as estatinas, assinale a opção correta.

- (A) Seu uso com fibratos não aumenta o risco de miosite.
- (B) São pouco eficazes na redução do LDL colesterol.
- (C) São drogas pouco usadas pelos efeitos colaterais hepáticos.
- (D) Essas drogas não interferem nos níveis de triglicerídeos.
- (E) Não deve ser interrompido o uso de estatinas, mesmo quando os valores de colesterol normalizarem.

QUESTÃO 23

Considere que um homem, de 63 anos de idade, aposentado, hipertenso, procura o ambulatório de clínica médica para avaliação de tremores nos membros superiores que surgiram há 6 meses. O diagnóstico, com base no exame físico, foi o de Doença de Parkinson. Em relação aos possíveis achados clínicos da doença deste paciente, julgue os itens e assinale Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- I - bradicinesia
- II - rigidez
- III - seborréia
- IV - instabilidade postural
- V - tremor intencional

A seqüência correta é

- (A) V V V V F.
- (B) V F V V V.
- (C) V V F V V.
- (D) V V V F V.
- (E) F V V V V.

QUESTÃO 24

Assinale a opção que indica a única terapia capaz de alterar o curso da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica.

- (A) cessação do tabagismo
- (B) brometo de ipratrópio inalado
- (C) beta-agonistas inalados
- (D) xantinas
- (E) corticóides inalados

QUESTÃO 25

Em um paciente previamente vacinado para hepatite B, o marcador associado à imunidade ao vírus é:

- (A) Anti-HBc.
- (B) Anti-Hbe.
- (C) Anti-HCV.
- (D) Anti-HBs.
- (E) Anti-HDV.

QUESTÃO 26

Considere um paciente com resultado de exame de fezes mostrando ovos de *A. lumbricoides* e *T. saginata*, larvas de *S. stercoralis* e cistos de *E. coli*. Assinale, entre as opções seguintes, a medicação que NÃO é necessária no seu tratamento.

- (A) albendazol
- (B) mebendazol
- (C) praziquantel
- (D) tiabendazol
- (E) metronidazol

QUESTÃO 27

Assinale a opção que indica qual medicamento NÃO deve ser administrado para paciente com quadro de diarreia dos viajantes, por não ter efeito terapêutico.

- (A) loperamida
- (B) kaolin-pectina
- (C) ciprofloxacino
- (D) azitromicina
- (E) subsalicilato de bismuto

QUESTÃO 28

Em relação à análise de exames bioquímicos, julgue os itens a seguir.

- I – Níveis normais de creatinoquinase afastam doença muscular.
- II – As doenças musculares podem elevar as transaminases.
- III – As doenças musculares podem elevar a desidrogenase láctica.

Assinale a opção correta.

- (A) Todos os itens estão corretos.
- (B) Apenas os itens I e III estão corretos.
- (C) Apenas os itens II e III estão corretos.
- (D) Apenas os itens I e II estão corretos.
- (E) Apenas o item I está correto.

QUESTÃO 29

Considere que um paciente procure o ambulatório e relate que sua urina começou a ficar vermelha depois de ter iniciado tratamento para tuberculose pulmonar. Acerca desse quadro, o medicamento a ser considerado é:

- (A) isoniazida.
- (B) rifampicina.
- (C) etambutol.
- (D) estreptomicina.
- (E) pirazinamida.

QUESTÃO 30

Considere que um paciente obeso e com intolerância à glicose procura assistência médica para saber como reduzir o risco de aparecimento de diabetes *mellitus*. Nessa situação, a conduta que permite maior redução desse risco é:

- (A) iniciar imediatamente o uso de metformina.
- (B) iniciar imediatamente o uso de troglitazona.
- (C) iniciar imediatamente o uso de sulfoniluréia.
- (D) iniciar imediatamente o uso de acarbose.
- (E) iniciar dieta e a prática de exercícios físicos para reduzir rigorosamente o peso.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Leia o texto a seguir para responder às questões de 31 a 33.

Gosto de ver casulos de borboletas. Lagartas feias que adormeceram, esperando a mágica metamorfose. De fora olhamos e tudo parece imóvel e morto. Lá dentro, entretanto, longe dos olhos e invisível, a vida amadurece vagarosamente. Chegará o momento em que ela será grande demais para o invólucro que a contém. E ele se romperá. Não lhe restará alternativa, e a borboleta voará livre, deixando sua antiga prisão... Voar livre, liberdade. [...]

Somos como as borboletas: a liberdade não é um início, mas o ponto final de um longo processo de gestação. Não é isso que acontece conosco? Quem será o tolo que pensará que a criança é gerada na hora do parto? A vida começou, em silêncio, em momento distante do passado. O nascimento é apenas o vir à luz, o descobrimento, a revelação daquilo que havia sido plantado e cresceu.

Não haverá parto se a semente não for plantada, muito tempo antes...

Não haverá borboletas se a vida não passar por longas e silenciosas metamorfoses...

Rubem Alves. **A reverência pela vida: a sedução de Gandhi.** Campinas: Papirus, 2006. p. 83.

QUESTÃO 31

A respeito do texto, assinale a opção correta.

- (A) O autor não gosta de lagartas, apenas de borboletas, conforme expresso nos dois primeiros períodos do texto.
- (B) "Lá dentro" (linha 4) situa o leitor em espaço inabitado e temporário.
- (C) A liberdade é o primeiro passo do processo de gestação.
- (D) Segundo o texto, as borboletas são resultantes de uma vida longa e silenciosa.
- (E) Ser livre, assim como nascer, é consequência de processos anteriores de amadurecimento.

QUESTÃO 32

Com relação às estruturas lingüísticas do texto, assinale a opção correta.

- (A) Nas linhas 6 e 7, os pronomes "ela" e "a" possuem o mesmo referente.
- (B) Em "Não é isso que acontece conosco?" (linha 13), o pronome "isso" é utilizado para antecipar, resumidamente, o assunto a ser tratado no período seguinte.
- (C) Na linha 14, a partícula "que", em suas duas ocorrências, pertence à mesma classe de palavras.
- (D) O uso do sinal indicativo de crase em "vir à luz" (linha 17) é facultativo.
- (E) A oração "que havia sido plantado" (linha 18) tem caráter explicativo.

QUESTÃO 33

No texto,

- (A) na primeira linha do segundo parágrafo, os dois-pontos são utilizados para introduzir uma explicação ao vocábulo "borboletas".
- (B) a supressão do ponto final que separa "Chegará o momento em que ela será grande demais para o invólucro que a contém" (linhas 6-7) e "E ele se romperá" (linhas 7-8) com a consequente substituição de "E" por **e** não acarretariam erro gramatical.
- (C) o argumento que o embasa se resume na frase "Não lhe restará alternativa" (linha 8).
- (D) ocorre essencialmente uma estrutura narrativa, pois o autor descreve o processo de formação das borboletas.
- (E) seria gramaticalmente correto o uso da vírgula após "esperando" em "Lagartas feias que adormeceram, esperando" (linhas 1-2).

QUESTÃO 34

Na campanha antifumo que está sendo desenvolvida em uma cidade, alguns profissionais de saúde querem prever o número de casos de câncer de pulmão que ocorrerá na população dessa cidade. Sabe-se que a população total é de 6.000.000 de pessoas, que 25% dessa população desenvolverá algum tipo de câncer durante a vida e que 21% dos casos previstos serão de câncer de pulmão. Portanto, o número de casos de câncer de pulmão previstos para a população dessa cidade é de

- (A) $0,315 \times 10^5$.
- (B) $3,15 \times 10^5$.
- (C) $31,5 \times 10^5$.
- (D) $315,0 \times 10^5$.
- (E) 3.150×10^5 .

Rascunho

QUESTÃO 35

Uma casa de assistência a idosos possui uma área de jardim para os pacientes, que podem fazer exercícios ao ar livre, de forma que tenham condições de aproveitar a natureza, realizando caminhadas com o objetivo de recuperar o vigor físico. Esse jardim tem o formato circular de 32,5 metros de diâmetro. Se um paciente der 5 voltas em torno do jardim, ele terá caminhado, em metros, a seguinte distância (considere $\pi = 3$):

- (A) 287,5.
- (B) 387,5.
- (C) 487,5.
- (D) 587,5.
- (E) 687,5.

QUESTÃO 36

Em exame cardiológico realizado em um paciente pós-cirúrgico, observou-se que sua pressão arterial diastólica $d(t)$, expressa em mmHg, variou, em

horas, segundo a relação $d(t) = -\frac{1}{4}t^2 + 2t + 8$,

sendo $t \in [0, 4]$, desde o início do exame. A partir dos dados fornecidos, é correto afirmar que

- (A) a pressão diastólica máxima foi de 12 mmHg.
- (B) a pressão diastólica foi decrescente em relação ao tempo $t \in [0, 4]$.
- (C) a pressão inicial diastólica foi de 12 mmHg.
- (D) a pressão diastólica não se alterou durante todo o exame.
- (E) a pressão diastólica mínima foi de 4 mmHg no intervalo de tempo considerado.

QUESTÃO 37

Atualmente, excetuando o setor de serviços, a principal atividade econômica do estado do Maranhão e da sua capital, São Luís, está concentrada

- (A) no setor industrial de minérios.
- (B) no setor industrial de alimentos.
- (C) no extrativismo vegetal.
- (D) no setor pesqueiro.
- (E) na pecuária.

QUESTÃO 38

No hino do Maranhão, cuja letra é de Antônio Baptista Barbosa de Godois, a quarta estrofe diz:

Reprimiste o flamengo aventureiro,
e o forçaste a no mar buscar guarida;
dois séculos depois, disseste ao luso:
– A liberdade é o sol que nos dá vida.

Os dois primeiros versos do hino lembram a luta dos maranhenses pela expulsão dos holandeses e os dois últimos versos aludem à

- (A) adesão do Maranhão à independência do Brasil.
- (B) liberdade obtida com a expulsão dos franceses.
- (C) liberdade obtida com a expulsão dos holandeses.
- (D) adesão ao jugo da corte portuguesa.
- (E) liberdade que o sol propicia.

QUESTÃO 39

Visando ao melhoramento da qualidade de vida do cidadão menos privilegiado, especificamente nas áreas de qualificação profissional, construção e melhoria de habitações e solidariedade, o governo maranhense executa políticas públicas por intermédio

- (A) do programa Fome Zero.
- (B) da Gerência de Desenvolvimento Social (GDS).
- (C) do combate a endemias.
- (D) da reforma agrária.
- (E) do programa Bolsa Família.

QUESTÃO 40

São atribuições comuns a todas as esferas de governo, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), definidas na Lei n.º 8.080/1990, EXCETO:

- (A) organização e coordenação do sistema de informação em saúde.
- (B) realização de pesquisas e estudos na área de saúde.
- (C) elaboração da proposta orçamentária do SUS, em conformidade com o plano de saúde.
- (D) definição das instâncias e dos mecanismos de controle, avaliação e fiscalização das ações e dos serviços de saúde.
- (E) definição do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária.

Rascunho