

MÉDICO

OTORRINOLARINGOLOGIA

INSTRUÇÕES GERAIS

- O candidato receberá do fiscal:
- Um **caderno de questões** contendo 30 (trinta) questões objetivas de múltipla escolha para os cargos de nível Fundamental ou 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla escolha para os cargos dos níveis Médio e Superior;
- Um **cartão de respostas** personalizado para a Prova Objetiva.
- **É responsabilidade do candidato certificar-se que o nome do cargo/especialidade informado nesta capa de prova corresponde ao nome do cargo/especialidade informado em seu cartão de respostas.**
- Ao ser autorizado o início da prova verifique, no **caderno de questões**, se a numeração das questões e a paginação estão corretas.
- Se você precisar de algum esclarecimento solicite a presença do **responsável pelo local**.
- **O tempo** que você dispõe para fazer a Prova Objetiva e a marcação do **cartão de respostas** é de 3 (três) horas.
- No ato da aplicação da prova haverá o procedimento da coleta da impressão digital de cada candidato. (Edital 01/2005 - Item 8.9, subitem *a.*)
- Somente depois de decorrida 1 (uma) hora do início da prova, o candidato poderá entregar seu **caderno de questões** e seu **cartão de respostas**. (Edital 01/2005 - Item 8.9, subitem *c.*)
- Ao candidato somente será permitido levar seu **caderno de questões** da Prova Objetiva ao final das provas, desde que permaneça em sala até este momento. (Edital 01/2005 - item 8.9, subitem *d.*)
- **NÃO** será permitido ao candidato copiar seus assinalamentos feitos no **cartão de respostas**. (Edital 01/2005 - Item 8.9, subitem *e.*)
- Após o término da sua prova entregue **obrigatoriamente** ao fiscal o **cartão de respostas** devidamente **assinado**.

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

- Verifique se os seus dados estão corretos no **cartão de respostas**.
- Leia atentamente cada questão e assinale no **cartão de respostas** a alternativa que mais adequadamente a responde.
- O **cartão de respostas** **NÃO** pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
- A maneira correta de assinalar a alternativa no **cartão de respostas** é cobrindo, fortemente, com caneta esferográfica azul ou preta, o espaço a ela correspondente, conforme o exemplo a seguir:



Atenção:

- Formas de marcação diferentes da que foi determinada implicarão a rejeição do **cartão de respostas** pela leitora ótica.
- A leitora ótica também **NÃO** registrará questões sem marcação, com marcação pouco nítida ou com mais de uma alternativa assinalada.

BOA SORTE !!!

CRONOGRAMA PREVISTO

ATIVIDADE	DATA	LOCAL
Divulgação do gabarito - Prova Objetiva (PO)	20/03/2006	www.nce.ufrj.br/concursos Posto de Atendimento
Interposição de recursos contra o gabarito (RG) da PO	21 e 22/03/2006	www.nce.ufrj.br/concursos Posto de Atendimento
Divulgação do resultado preliminar do julgamento do RG da PO	03/04/2006	www.nce.ufrj.br/concursos Posto de Atendimento
Divulgação do resultado final da PO	03/04/2006	www.nce.ufrj.br/concursos Posto de Atendimento
Divulgação da relação de candidatos que terão Títulos avaliados	03/04/2006	www.nce.ufrj.br/concursos Posto de Atendimento

Demais atividades consultar cronograma de atividade no Manual do Candidato ou pelo site: www.nce.ufrj.br/concursos

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO – A SAÚDE E O FUTURO

Dráuzio Varella – *Reflexões para o futuro*

Ficaremos sobrecarregados, pagando caro pela ignorância e irresponsabilidade do passado. Acharemos inacreditável não havermos percebido em tempo, por exemplo, que o vírus da Aids, presente na seringa usada pelo adolescente da periferia para viajar ao paraíso por alguns instantes, infecta as mocinhas da favela, os travestis da cadeia, as garotas da boate, o menino esperto, a menininha ingênua, o senhor enrustido, a mãe de família e se espalha para a multidão de gente pobre, sem instrução e higiene. Haverá milhões de pessoas com Aids, dependendo de tratamentos caros e assistência permanente. Seus sistemas imunológicos deprimidos se tornarão presas fáceis aos bacilos da tuberculose, que, por via aérea, irão parar nos pulmões dos que passarem por perto, fazendo ressurgir a tuberculose epidêmica do tempo dos nossos avós. Sífilis, hepatite B, herpes, papilomavírus e outras doenças sexualmente transmissíveis atacarão os incautos e darão origem ao avesso da revolução sexual entre os sensatos.

No caldo urbano da miséria/sujeira/ignorância crescerão essas pragas modernas e outras imergirão inesperadas. Estará claro, então, que o perigo será muito mais imprevisível do que aquele representado pelas antigas endemias rurais: doença de Chagas, malária, esquistossomose, passíveis de controle com inseticidas, casas de tijolos, água limpa e farta.

Assustada, a sociedade brasileira tomará, enfim, consciência do horror que será pôr filhos em um mundo tão inóspito. Nessas condições é provável que se organize para acabar com as causas dessas epidemias urbanas. Modernos hospitais sem fins lucrativos, dirigidos por fundações privadas e mantidos com o esforço e a vigilância das comunidades locais, poderão democratizar o atendimento público. Eficientes programas de prevenção, aplicados em parceria com instituições internacionais, diminuirão o número de pessoas doentes.

Então virá a fase em que surgirão novos rebeldes sonhadores, para enfrentar o desafio de estender a revolução dos genes para melhorar a qualidade de vida dos que morarem na periferia das grandes cidades ou na imensidão dos campos brasileiros.

1 - Como o texto tem um tom de profecia, a construção dessas previsões se apóia fundamentalmente:

- (A) no emprego do futuro do presente;
- (B) na abordagem de temas ainda desconhecidos;
- (C) na antevisão de um futuro sombrio;
- (D) na condenação do atraso social e cultural;
- (E) na utilização de expressões de dúvida.

2 - “Ficaremos sobrecarregados...”; a utilização da pessoa *nós* nesse segmento inicial do texto globala:

- (A) o autor e o leitor, apenas;
- (B) o autor, o leitor e todos os demais brasileiros;
- (C) os leitores em geral e o autor;
- (D) os brasileiros em geral;
- (E) o autor e a classe médica.

3 - “Ficaremos sobrecarregados, pagando caro pela ignorância...”; a forma desenvolvida adequada da oração reduzida sublinhada é:

- (A) enquanto pagamos caro pela ignorância;
- (B) se pagarmos caro pela ignorância;
- (C) quando pagarmos caro pela ignorância;
- (D) e pagaremos caro pela ignorância;
- (E) embora paguemos caro pela ignorância.

4 - “Acharemos inacreditável não havermos percebido em tempo...”; a alternativa que mostra um emprego de tempos verbais inadequado é:

- (A) achamos / percebermos;
- (B) achamos / termos percebido;
- (C) achávamos / haveramos percebido;
- (D) acharíamos / termos percebido;
- (E) acharemos / tivermos percebido.

5 - O autor do texto fala de ignorância e da irresponsabilidade passadas como motivo de males futuros. O item que se refere mais à irresponsabilidade do que à ignorância é:

- (A) “o vírus da Aids, presente na seringa usada pelo adolescente da periferia para viajar ao paraíso por alguns instantes, infecta as mocinhas da favela...”;
- (B) “se espalha para a multidão de gente pobre, sem instrução e sem higiene”;
- (C) “Seus sistemas imunológicos deprimidos se tornarão presas fáceis do bacilo da tuberculose...”;
- (D) “outras doenças sexualmente transmissíveis atacarão os incautos”;
- (E) “fazendo ressurgir a tuberculose epidêmica do tempo de nossos avós”.

6 - “darão origem ao avesso da revolução sexual entre os sensatos”; o avesso da revolução sexual entre os sensatos significa:

- (A) multiplicidade de parceiros;
- (B) liberdade ampla de relações sexuais;
- (C) evitarem-se relações de risco;
- (D) abstinência sexual completa;
- (E) preservação da virgindade até o casamento.

7 - “No caldo urbano da miséria/sujeira/ignorância”; neste segmento, as barras inclinadas entre os vocábulos substituem, respectivamente:

- (A) vírgula / conjunção;
- (B) vírgula / vírgula;
- (C) conjunção / preposição;
- (D) conjunção / conjunção;
- (E) preposição / preposição.

8 - “outras imergirão inesperadas”; nesse segmento, o vocábulo *imergirão* não pode ser confundido com seu parônimo *emergirão*, já que possuem sentido oposto. A alternativa a seguir em que houve troca entre parônimos é:

- (A) Há fragrante perigo de disseminação da Aids;
- (B) Certas doenças oferecem perigo iminente;
- (C) É necessário bom senso para a prevenção de doenças;
- (D) O tráfico de drogas contribui para doenças transmissíveis;
- (E) Numa seção daquela loja vendiam-se preservativos.

9 - “Estará claro, **então**, que o perigo será muito mais imprevisível...”; o vocábulo destacado tem valor semântico de:

- (A) explicação;
- (B) conclusão;
- (C) tempo;
- (D) condição;
- (E) comparação.

10 - O texto fala de epidemias e de endemias; a alternativa que define *endemia* é:

- (A) doença causada pela fragilidade do organismo;
- (B) mal provocado por vírus desconhecido;
- (C) doença que se alastra rapidamente por uma população;
- (D) enfermidade provocada por mau uso de medicamentos;
- (E) doença que se repete em população e/ou região específica.

11 - “...usada pelo adolescente da periferia **para** viajar ao paraíso **por** alguns instantes”; a alternativa abaixo em que a utilização de um desses vocábulos apresenta o mesmo valor semântico presente nesse segmento destacado do texto é:

- (A) “se espalha **para** a multidão de gente pobre”;
- (B) “o bacilo da tuberculose, que, **por** via aérea...”;
- (C) “irá parar nos pulmões dos que passarem **por** perto”;
- (D) “é provável que se organize **para** acabar com as causas”;
- (E) “dirigidos **por** fundações privadas”.

12 - A alternativa em que a preposição destacada tem valor semântico de meio é:

- (A) “para acabar **com** as causas dessas epidemias”;
- (B) “aplicados em parceria **com** instituições internacionais”;
- (C) “passíveis de controle **com** inseticidas”;
- (D) “mantidos **com** o esforço e a vigilância das comunidades locais”;
- (E) “Haverá milhões de pessoas **com** Aids”.

13 - “Haverá milhões de pessoas com Aids”; a alternativa abaixo em que a substituição da forma do verbo *haver* está gramaticalmente INCORRETA é:

- (A) deverá haver;
- (B) poderá haver;
- (C) poderá existir;
- (D) existirão;
- (E) deverão existir.

14 - A alternativa abaixo em que o substantivo NÃO é acompanhado por um vocábulo ou locução de valor adjetivo é:

- (A) mocinhas da favela;
- (B) travestis na cadeia;
- (C) garotas da boate;
- (D) menino esperto;
- (E) menininha ingênua.

CONHECIMENTOS COMUNS DE MEDICINA

15 - A notícia abaixo foi publicada em periódico de grande circulação local:

“Chegaram nesta segunda-feira (13/02), na Secretaria Estadual da Saúde do Piauí (Sesapi), os 380 mil preservativos no Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA). Os preservativos serão distribuídos em todo o Estado para o período do carnaval. Segundo o coordenador de Doenças Transmissíveis da Secretaria de Saúde, Antônio Ferreira, além de preservativos, equipes da secretaria estarão nos municípios onde o carnaval é mais forte e farão um trabalho de educação entre os foliões, orientando sobre os cuidados a serem tomados para a prática do sexo seguro.”

Considerando o perfil atual da epidemia de Aids no Brasil podemos afirmar que há aumento:

- (A) de casos novos na faixa etária entre 40 e 59 anos;
- (B) da relação de casos homens/mulheres;
- (C) da taxa de mortalidade;
- (D) da incidência em homossexuais;
- (E) do número de casos transfusionais.

16 - Dos princípios a seguir, estabelecidos pela Lei 8080/90, aquele que NÃO orienta as ações das unidades de saúde vinculadas ao SUS é:

- (A) participação da comunidade;
- (B) universalidade de acesso;
- (C) integralidade do cuidado;
- (D) equidade na assistência;
- (E) centralização político administrativa.

17 - No Rio de Janeiro ocorreram duas grandes epidemias de dengue. A primeira, em 1986-87, foi causada pelo tipo 1. A segunda, em 1990/91, foi provocada pelos tipos 1 e 2. A circulação de um novo vírus (o tipo 3) no Rio de Janeiro significa que:

- (A) o *Aedes aegypti* não transmite esse tipo de vírus;
- (B) aqueles que tiveram a doença em 1986 – 87 estão imunes ao tipo 3;
- (C) toda a população está sob risco de adquirir esta infecção;
- (D) somente aqueles que tiveram dengue do tipo 2 tem risco de desenvolver a forma grave;
- (E) todos que se reinfectarem por outro sorotipo desenvolverão a forma grave

18 - Dos agravos de Notificação Compulsória abaixo relacionados, aquele que deve ser *notificado imediatamente*, ainda que como *caso suspeito* é:

- (A) síndrome de imunodeficiência adquirida;
- (B) síndrome respiratória aguda grave;
- (C) tuberculose;
- (D) malária;
- (E) sarampo.

19 – Leia a notícia abaixo:

“A Central de Transplantes do Piauí, órgão da Secretaria de Saúde (Sesapi), que funciona no Hospital Getúlio Vargas (HGV), tem 1.238 pacientes na Lista Única de Espera de doador para transplantes, sendo dois de coração, 766 de córnea, 467 de rins. Para receber o transplante, o paciente precisa se submeter à Lista Única de Espera devendo seu nome ser indicado pelo Sistema Nacional de Transplantes do Ministério da Saúde, que estabelece as prioridades, por ser o órgão responsável pelo gerenciamento e pela fiscalização das atividades de captação e distribuição de órgãos ou tecidos obtidos de um doador.”

Considerando a legislação e a complexidade do Sistema Nacional de Transplantes, é correto afirmar que:

- (A) as ações de saúde relacionadas ao transplante são da atenção terciária;
- (B) a maioria dos transplantes no Brasil é realizado pela atenção privada;
- (C) a captação e distribuição de órgãos são uma estratégia da atenção primária;
- (D) o diagnóstico de morte cerebral não exige a realização de exame complementar;
- (E) a autorização da família é dispensável quando o doador documenta sua opção em vida.

20 - O programa de saúde materno infantil prevê as estratégias do *alojamento conjunto e mãe canguru* que tem como objetivo reduzir a taxa de:

- (A) tétano neonatal;
- (B) mortalidade materna;
- (C) abandono de tratamento;
- (D) mortalidade infantil;
- (E) adesão ao aleitamento materno.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21-Observe as afirmativas a seguir, com relação às otites médias crônicas:

- I – O colesteatoma adquirido pode ser primário ou secundário.
- II – A timpanosclerose pode estar associada à supuração crônica, ao colesteatoma, ao granuloma de colesterol e à otosclerose.
- III – A abertura da tuba auditiva é passiva, sendo responsável o músculo tensor do véu palatino.

- (A) apenas a afirmativa I está correta;
- (B) apenas a afirmativa II está correta;
- (C) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
- (D) apenas as afirmativas II e III estão corretas;
- (E) todas as afirmativas estão corretas.

22- Em relação ao Anel Linfático de Waldeyer, NÃO é correto afirmar que:

- (A) a tonsila palatina é o maior órgão do anel, sendo dividida em epitélio escamoso, área extrafolicular e área folicular;
- (B) a vascularização da tonsila palatina é feita por ramos da artéria carótida externa e da artéria carótida interna;
- (C) o anel capta e processa os antígenos da orofaringe e nasofaringe;
- (D) as tonsilas são capazes de produzir as cinco classes de imunoglobulinas;
- (E) é formado pelas tonsilas palatinas, faríngea, lingual, peritubárias e por folículos faríngeos.

23- Observe as afirmativas a seguir, em relação à Vertigem Postural Paroxística Benigna:

- I – É a causa mais comum de vertigem. Ao exame há nistagmo de posição, fatigável e de grande amplitude.
- II – O diagnóstico pode ser feito pela anamnese associada às provas calóricas e ao exame clínico com as provas de Epley positivas.
- III – A faixa etária mais acometida é 6ª década, na forma idiopática e 4ª e 5ª décadas na pós-viral.

- (A) apenas a afirmativa I está correta;
- (B) apenas a afirmativa II está correta;
- (C) apenas as afirmativas I e III estão corretas;
- (D) apenas as afirmativas II e III estão corretas;
- (E) todas as afirmativas estão corretas.

24 - Com relação aos tumores malignos da boca NÃO é correto afirmar que:

- (A) cerca de 90% dos pacientes são tabagistas e 75-80% etilistas;
- (B) as leucoplasias e as eritroplasias são lesões pré-malignas, sendo o potencial de malignização maior nas eritroplasias;
- (C) o carcinoma epidermóide é o mais freqüente;
- (D) normalmente são lesões ulceradas e indolores que não cicatrizam;
- (E) as metástases linfonodais cervicais respondem bem à radioterapia.

25 - É correto afirmar que:

- (A) a pesquisa do recrutamento de Metz é objetiva, aplicável nas perdas auditivas uni e bilaterais;
- (B) o efeito “on-off” pode estar presente nas fases iniciais da Doença de Ménière;
- (C) nas hipoacusias condutivas, na pesquisa dos potenciais evocados auditivos, têm-se: aumento do intervalo I-V e amplitude de V menor do que de I;
- (D) a origem das emissões otoacústicas está nas células ciliadas internas;
- (E) a eletrococleografia é o método subjetivo de avaliação da porção mais periférica do sistema auditivo, ou seja, cóclea e nervo auditivo.

26 - Com relação às estomatites, NÃO é correto afirmar que:

- (A) a síndrome de Behçet é a combinação entre úlceras orogenitais e inflamação ocular crônica;
- (B) a doença mão-pé-boca ocorre por infecção por um enterovírus;
- (C) os anticorpos de Paul-Bunnell são o achado sorológico da Mononucleose Infecciosa;
- (D) a Herpangina é uma infecção herpética primária;
- (E) a prevalência do citomegalovírus é de 40% aos 30 anos de idade e de 80-100% aos 60 anos.

27 - É correto afirmar que:

- (A) pode-se deixar as margens cirúrgicas tumorais comprometidas, quando o paciente for receber radioterapia complementar;
- (B) a biópsia cirúrgica deve ser realizada logo no início da investigação das massas cervicais;
- (C) pacientes adultos assintomáticos com massa cervical devem ser conduzidos a uma conduta expectante;
- (D) não se deve confiar em uma única biópsia negativa de um provável primário;
- (E) pode ser postergado o tratamento das metástases cervicais, dos pacientes totalmente investigados, com tumor primário oculto.

28 - Observe as afirmativas a seguir, em relação aos exames de imagem:

- I - A tomografia computadorizada (TC) é o método ideal nas doenças que acometem espaços aéreos, cortical óssea e algumas lesões de tecidos moles.
 - II - O diagnóstico da Síndrome do Aqueduto Vestibular alargado pode ser feito tanto pelo estudo tomográfico, quanto pelo de ressonância nuclear magnética (RNM).
 - III - O schwannoma em geral é isodenso em relação ao cérebro na TC; e na RNM isointenso em T1 e hiperintenso em T2, e há realce intenso com os contrastes.
- (A) apenas a afirmativa I está correta;
 - (B) apenas a afirmativa II está correta;
 - (C) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
 - (D) apenas as afirmativas II e III estão corretas;
 - (E) todas as afirmativas estão corretas.

29 - Com relação às glândulas salivares é correto afirmar que:

- (A) a sialoadenose ocorre por formação de cistos múltiplos linfoepiteliais nos pacientes soropositivos para o HIV;
- (B) os tumores epiteliais malignos correspondem à cerca de 18% dos tumores das glândulas salivares;
- (C) adenoma pleomórfico é o tumor maligno mais comum, sendo mais freqüente em parótida;
- (D) a glândula parótida drena pelo canal de Wharton e a submandibular pelo de Stensen;
- (E) os cálculos salivares ocorrem em 80-90% nas parótidas e 10-20% nas submandibulares.

30 - NÃO é correto afirmar, com relação aos papilomas nasossinusais, que:

- (A) são tumores relativamente comuns, representam de 25 a 30% dos tumores nasais;
- (B) são tumores benignos do epitélio colunar ou ciliado respiratório, bem diferenciados, com diferenciação escamosa variável;
- (C) o papiloma fungiforme origina-se geralmente no septo anterior;
- (D) o papiloma invertido origina-se na parede lateral nasal ou no meato médio, estendendo-se para as cavidades adjacentes;
- (E) os sintomas mais comuns do papiloma invertido são obstrução nasal unilateral, rinorréia, epistaxe e anosmia.

31 - Observe as afirmativas a seguir, em relação às rinites:

- I - Os sintomas das rinites, tanto alérgicas como não alérgicas, são: rinorréia, prurido, obstrução e esternutatórios.
- II - Na rinite do idoso encontra-se aumento de células inflamatórias. Os sintomas de secreção nasal e retrorinal são muito comuns.
- III - A rinite eosinofílica não alérgica é caracterizada pela presença de eosinófilos no citológico nasal, com teste cutâneo e RAST (RadioAllergoSorbet Test) positivos.

- (A) apenas a afirmativa I está correta;
- (B) apenas a afirmativa II está correta;
- (C) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
- (D) apenas as afirmativas II e III estão corretas;
- (E) todas as afirmativas estão corretas.

32 - É correto afirmar com relação às laringites:

- (A) na laringite estridulosa ocorre um edema da região supraglótica, mais freqüente em meninos, que evolui geralmente de forma benigna;
- (B) as lesões mais freqüentes da laringofaringite por refluxo gastroesofágico são: alterações da comissura anterior e da epiglote;
- (C) a epiglote bacteriana é mais comum em crianças, sendo o *Streptococcus β-hemolítico* o agente mais encontrado;
- (D) o edema Reinke é angioneurótico hereditário, alérgico, como uma laringite edematosa aguda;
- (E) a laringite da tuberculose é uma forma altamente contagiosa, atípica e grave da doença.

33 - NÃO é correto afirmar com relação à polipose nasossinusal (PNS):

- (A) incide em 1-4% da população geral e em 36% dos pacientes com intolerância a salicilatos;
- (B) é mais comum em pacientes com asma intrínseca (não alérgica) do que com extrínseca;
- (C) há grande relação entre PNS e alergia. Cerca de 80-85% de positividade em testes cutâneos ou RAST;
- (D) a síndrome de Woakes é uma forma de PNS mais invasiva;
- (E) a sinusite fúngica alérgica é freqüentemente associada à PNS.

34 – Com relação ao câncer da laringe é correto afirmar que:

- (A) na supraglote, os linfáticos são poucos e de pequeno diâmetro, justificando a baixa incidência de metástases nos tumores da região;
- (B) nos tumores glóticos iniciais a queixa mais freqüente é a disфонia, sendo a dispnéia e a disfagia sintomas tardios;
- (C) a laringectomia horizontal deve ser usada para o tratamento dos tumores transglóticos;
- (D) os tumores da banda ventricular são classificados como glóticos;
- (E) o carcinoma “in situ” limitado a uma prega vocal é classificado clinicamente como T1a.

35 – Observe as afirmativas a seguir, em relação ao estudo da laringe:

- I – A rinolaringoscopia flexível é um método direto de observação da atividade funcional faringolaríngea.
 - II – A TC da laringe permite determinar a extensão tumoral, avaliar os espaços pré-epiglótico e paraglótico e a ocorrência de erosão cartilaginosa.
 - III – Os principais parâmetros de vibração das pregas vocais na estroboscopia são: periodicidade, amplitude, onda mucosa, fechamento glótico e simetria.
- (A) apenas a afirmativa I está correta;
 - (B) apenas a afirmativa II está correta;
 - (C) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
 - (D) apenas as afirmativas II e III estão corretas;
 - (E) todas as afirmativas estão corretas.

36 – Observe as afirmativas a seguir, em relação à rinossinusite fúngica:

- I – Com base em evidências de invasão tecidual, a rinossinusite fúngica é classificada em dois grupos principais – invasiva e não invasiva.
 - II – Na rinossinusite fúngica alérgica observa-se: eosinofilia plasmática, elevação de IgE sérica total e específica dos fungos e reatividade imediata aos antígenos nos testes cutâneos.
 - III – A bola fúngica é uma forma de sinusite fúngica invasiva.
- (A) apenas a afirmativa I está correta;
 - (B) apenas a afirmativa II está correta;
 - (C) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
 - (D) apenas as afirmativas II e III estão corretas;
 - (E) todas as afirmativas estão corretas.

37 – Em relação aos papilomas laríngeos NÃO é correto afirmar que:

- (A) são de origem epitelial e de etiologia provavelmente viral (papilovírus humano – HPV);
- (B) podem ocorrer: lesões queratinizadas isoladas - geralmente em adultos, ou lesões múltiplas, confluentes, não queratinizadas – tipo juvenil;
- (C) perfaz 80% dos tumores benignos da laringe;
- (D) o diagnóstico é basicamente por TC;
- (E) alguns casos de papilomatose juvenil podem estar associados ao carcinoma espinocelular.

38 – Observe as afirmativas a seguir, em relação à cirurgia endonasal:

- I - São pontos de referência: septo nasal, artéria etmoidal anterior, lamela vertical, coana e inserção ântero-superior e dorsal-inferior da concha média.
 - II - São estruturas do complexo osteo-meatal: hiato semilunar, processo uncinado, recesso esfeno-etmoidal e a bulla etmoidal.
 - III – O processo uncinado é a primeira lamela do labirinto etmoidal.
- (A) apenas a afirmativa I está correta;
 - (B) apenas a afirmativa II está correta;
 - (C) apenas as afirmativas I e III estão corretas;
 - (D) apenas as afirmativas II e III estão corretas;
 - (E) todas as afirmativas estão corretas.

39 – A respeito dos tumores malignos nasossinusais, NÃO é correto afirmar:

- (A) são mais freqüentes em homens, na 6ª década de vida ou mais;
- (B) são mais freqüentes nos seios frontais e esfenoidais;
- (C) são considerados fatores de risco: tabagismo, exposição à serragem e derivados do petróleo;
- (D) os achados sugestivos na TC são: erosão óssea, invasão tecidual, com alterações líticas e blásticas;
- (E) cerca de 10-15% dão metástases cervicais.

40 – É correto afirmar que:

- (A) os fungos mais encontrados na otomicose são do gênero *Aspergillus* e do gênero *Cândida*;
- (B) o otoematoma é geralmente secundário ao barotrauma em viagens aéreas e em mergulhos submarinos;
- (C) o acompanhamento da otite externa maligna deve ser feito pela dosagem seriada da VHS e por cintilografia seriada com TC 99m MDP;
- (D) as bactérias normalmente envolvidas na otite média aguda são: *P.aeruginosa* e *S.aureus*;
- (E) na otite média secretora observa-se: disacusia condutiva e curva timpanométrica do tipo A.

