



HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA

REAL SOCIEDADE ESPANHOLA DE BENEFICÊNCIA



NÍVEL SUPERIOR

DATA: 17/5/2009

Emprego 14: MÉDICO – CIRURGIÃO PEDIÁTRICO

MANHÃ

TIPO A

INSTRUÇÕES

Confira seus dados pessoais constantes da sua folha de respostas. Verifique também se o nome do emprego e o tipo de prova impressos neste caderno correspondem aos indicados na sua folha de respostas. Em seguida, verifique se este caderno contém **trinta** questões, corretamente ordenadas de **1 a 30**. As provas objetivas são constituídas de questões com quatro opções (A, B, C e D) e **uma única resposta correta**.

Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no caderno de provas, solicite providências ao fiscal de sala mais próximo.

Transcreva as respostas das questões para a sua folha de respostas, que é o **único documento válido** para a correção das provas e cujo preenchimento é de sua exclusiva responsabilidade. Serão consideradas marcações indevidas as que estiverem em desacordo com o estabelecido no edital de abertura ou na folha de respostas, tais como marcação rasurada ou emendada, ou campo de marcação não preenchido integralmente. Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por erro de preenchimento por parte do candidato.

Para a marcação na folha de respostas, utilize somente caneta esferográfica de tinta **preta**. Não é permitida a marcação na folha de respostas por outra pessoa, ressalvados os casos de atendimento especial previamente deferidos.

E vedado amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar a sua folha de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos decorrentes da impossibilidade de realização da leitura óptica.

A duração das provas é de **três horas**. Você deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no mínimo, uma hora após o início das provas e poderá levar este caderno somente no decurso dos últimos quinze minutos anteriores ao horário determinado para o seu término.

A desobediência a qualquer uma das determinações constantes nos editais do processo, no presente caderno ou na folha de respostas implicará a anulação das suas provas.

PROCESSO SELETIVO



CRONOGRAMA

ETAPA	DATA
Divulgação do gabarito oficial preliminar das provas objetivas, no endereço eletrônico www.movens.org.br , a partir das 17 horas	18/5/2009
Data para entrega de recursos contra o gabarito oficial preliminar das provas objetivas	19/5/2009 Das 9h às 18h
Data provável para divulgação do resultado final das provas objetivas e do processo seletivo	1.º/6/2009

ATENÇÃO

Os candidatos aprovados deverão acompanhar as convocações para recrutamento e contratação, que serão publicadas no endereço eletrônico www.movens.org.br.

As convocações serão feitas em conformidade com os itens 11 e 12 do edital de abertura do processo seletivo.

Os candidatos convocados para recrutamento e contratação deverão se apresentar para a comprovação de requisitos munidos da documentação devida (listada nos itens do edital acima referidos).

O não-comparecimento na data prevista na convocação acarretará a eliminação do candidato do processo seletivo público.

CONHECIMENTOS GERAIS

Leia o texto a seguir para responder às questões de 1 a 5.

1 “Trinta minutos de atividade física por dia: receita de saúde”; “Coma menos calorias e ganhe saúde em dobro”; “Beba água, pois faz bem à sua saúde”; “Sal e gordura: um risco para a sua saúde”; “Não fume, sua saúde agradece”;
5 “Proteja-se do sol para a saúde da sua pele”. Esses são exemplos de recomendações/advertências veiculadas em campanhas publicitárias e de saúde pública. Entre elas, além da referência à saúde, há, em comum, o apelo a mudanças no comportamento individual com vistas à
10 melhoria da saúde. Estratégias desse tipo vêm ganhando destaque no campo da saúde pública, mas será que são realmente eficazes?

Evidentemente, não se pode negar o papel do indivíduo na tomada de decisões, inclusive no que diz respeito à sua
15 saúde. Por outro lado, não é possível afirmar que repousa exclusivamente sobre seus ombros toda a responsabilidade pela adoção de certos comportamentos. Isso seria verdadeiro se os indivíduos pairassem sobre a realidade concreta (e dura, para a maior parte dos brasileiros). Na prática, os
20 hábitos apontados como principais fatores de risco para doenças crônicas não-transmissíveis são influenciados pelo contexto sociopolítico-econômico em que as pessoas vivem, pelo salário que recebem, pelas condições de trabalho que têm, pelo tempo livre de que dispõem e pelos serviços de
25 saúde e de educação a que têm acesso.

Os estudos epidemiológicos nos quais a prescrição de estilos de vida se baseia são imprescindíveis, mas não são suficientes no âmbito da saúde pública. Isso porque não dão conta da complexa interação dos condicionantes
30 sociais, biológicos, culturais e psicológicos na produção das doenças. Senão, vejamos: segundo o Ministério da Saúde, “120 mil brasileiros são atingidos pelo câncer de pele por ano e cerca de 70% da população não se protege dos efeitos nocivos do sol”. Sem que se mencionem, por exemplo, os
35 efeitos do desmatamento e da emissão de poluentes no buraco na camada de ozônio; fica parecendo que o câncer de pele decorre única e exclusivamente da falta de cuidado individual.

Quando tomamos o “estilo de vida” como principal
40 fator de risco para doenças crônicas não-transmissíveis e a mera informação como um requisito suficiente para a mudança de comportamento, deixamos de atender para o fato de que avanços significativos e duradouros no campo da saúde só serão possíveis com a redução da pobreza e
45 das desigualdades sociais e com a preservação do meio ambiente. A proliferação de *slogans* como “atividade física é saúde” não pode se sobrepor à noção de saúde como direito de todos e dever do Estado.

Marcos Santos Ferreira. **Saúde: uma questão de estilo de vida?** In: Revista **Radis – Comunicação em saúde**, n.º 78, fev./2009 (com adaptações).

QUESTÃO 1

Em relação ao emprego de palavras no texto, assinale a opção correta.

- (A) Na linha 13, a palavra “Evidentemente” tem função adjetiva e expressa a noção de certeza, de algo que é claro, incontestável.
- (B) Na linha 15, a expressão “Por outro lado” introduz um argumento que se contrapõe à idéia defendida no período anterior e poderia ser corretamente substituída por **Sendo assim**.
- (C) Na linha 19, a expressão “Na prática” está empregada com o sentido de **conseqüentemente**.
- (D) A expressão “Isso porque” (linha 28) introduz uma explicação para a idéia desenvolvida na oração anterior.

QUESTÃO 2

A respeito dos aspectos sintáticos do texto, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – Na linha 7, em “Entre elas”, o pronome refere-se a “campanhas publicitárias”.
- II – Na frase “mas será que são realmente eficazes?” (linhas 11 e 12), está implícita a expressão “Estratégias desse tipo” (linha 10).
- III – Nas linhas 27 e 28, em “mas não são suficientes no âmbito da saúde pública”, o verbo refere-se a “os estudos epidemiológicos” (linha 26).

A seqüência correta é:

- (A) V, V, V.
- (B) V, F, V.
- (C) F, V, V.
- (D) F, V, F.

QUESTÃO 3

Acerca da pontuação do texto, assinale a opção INCORRETA.

- (A) No texto, as aspas têm dois empregos distintos: delimitar citações de outros autores ou fontes e realçar uma expressão.
- (B) Nas linhas 18 e 19, os parênteses enfatizam o pensamento do autor.
- (C) Na linha 31, os dois-pontos introduzem um esclarecimento.
- (D) Na linha 36, o ponto-e-vírgula pode ser substituído por dois-pontos, sem acarretar erro gramatical ou prejuízo ao sentido original do texto.

QUESTÃO 4

De acordo com os argumentos do texto, julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – A argumentação do texto é contrária à adoção de estudos epidemiológicos no âmbito da saúde pública, uma vez que eles não apreendem a influência da realidade social dos indivíduos na promoção da saúde.
- II – O desenvolvimento do texto permite concluir que ações e políticas públicas centradas na informação para a mudança de estilo de vida garantem resultados eficazes no campo da saúde, uma vez que as doenças são decorrentes de maus hábitos, como tabagismo, consumo excessivo de álcool, má alimentação e sedentarismo.
- III – De acordo com a argumentação do texto, a saúde decorre tão-somente de um “estilo de vida” e depende, portanto, da tomada de decisões dos indivíduos.
- IV – Segundo os argumentos desenvolvidos no texto, apesar da importância do comportamento individual em relação aos hábitos de saúde, o chamado “estilo de vida” das pessoas não é o único fator de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas, pois os hábitos de saúde são influenciados pelo contexto sociopolítico-econômico em que as pessoas vivem.

A quantidade de itens certos é igual a

- (A) 1.
- (B) 2.
- (C) 3.
- (D) 4.

QUESTÃO 5

A respeito da tipologia e dos aspectos lingüísticos do texto, assinale a opção correta.

- (A) O texto é essencialmente narrativo e pode ser classificado como crônica jornalística.
- (B) Apesar de os exemplos citados no primeiro parágrafo estarem em linguagem denotativa, há predomínio da linguagem conotativa.
- (C) O texto é de natureza argumentativa e apresenta o ponto-de-vista do autor acerca do tema, com linguagem predominantemente denotativa.
- (D) Trata-se de um artigo de caráter acadêmico-científico.

QUESTÃO 6

As bases legais do Sistema Único de Saúde (SUS) estão definidas na Constituição Federal de 1988 e nas Leis n.º 8.080 e n.º 8.142, ambas de 1990. Quanto a essa legislação, assinale a opção INCORRETA.

- (A) As Conferências de Saúde são fóruns com representação de vários segmentos sociais que se reúnem para propor diretrizes, avaliar a situação da saúde e ajudar na definição da política de saúde.
- (B) Na contratação de serviços privados para complementar o SUS, o serviço privado contratado possui autonomia para determinar seu próprio funcionamento.
- (C) Os Conselhos de Saúde, que devem existir nos três níveis de governo, são órgãos deliberativos, de caráter permanente, compostos com a representatividade de toda a sociedade.
- (D) São diretrizes do SUS estabelecidas na Constituição Federal: descentralização, com direção única em cada esfera de governo; atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; e participação da comunidade.

QUESTÃO 7

Na história da saúde no Brasil, destacam-se dois modelos assistenciais, o modelo sanitaria campanhista e o modelo médico-assistencial privatista. O modelo médico-assistencial privatista, hegemônico na década de 1970, passou ao descrédito por apresentar graves problemas. Foram fatores determinantes para o esgotamento desse modelo:

- I – grave crise financeira, com origem nas fraudes no sistema de pagamento e faturamento, e desvios de verbas da previdência para outros projetos do governo.
- II – aumento dos gastos com internações, consultas e exames complementares efetuados pelo setor privado.
- III – exclusão de parcelas expressivas da população e falta de capacidade de alterar os perfis de morbimortalidade.
- IV – falta de controle das doenças infecto-contagiosas, por meio de medidas adotadas no modelo sanitaria campanhista.

Estão certos apenas os itens

- (A) I, II e III.
- (B) I e III.
- (C) II e IV.
- (D) II, III e IV.

QUESTÃO 8

Sabendo-se que, em todo o país, as ações e os serviços públicos de saúde integram uma rede única e hierarquizada, é correto afirmar que, de acordo com o previsto na legislação, são atribuições do SUS no âmbito do Distrito Federal:

- I – participar na formulação da política de ações de saneamento básico e de seu controle, integrando-as às ações e aos serviços de saúde.
- II – oferecer assistência odontológica preventiva e de recuperação.
- III – garantir atendimento médico-geriátrico ao idoso na rede de serviços públicos e atendimento integral à saúde da criança e do adolescente, por intermédio de equipe multidisciplinar.

Estão certos os itens

- (A) I e II, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, II e III.

QUESTÃO 9

A informação é fundamental para a democratização e o aprimoramento da gestão do setor de saúde. Os sistemas de informação em saúde de abrangência nacional permitem o acompanhamento do SUS em todo o país, possibilitando análises comparativas entre os diversos estados, municípios e regiões, de forma a subsidiar a tomada de decisões em todos os níveis de gestão.

Assinale a opção em que são apresentados apenas sistemas de informação de base de dados nacional.

- (A) Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), Sistema de Informações sobre o Pacto de Gestão (SISPACTO), Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC).
- (B) Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIASUS), Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH-SUS), Sistema de Informações sobre o Programa Saúde da Família (SISPSF).
- (C) Sistema de Informações sobre o Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento (SISPRENATAL), Sistema de Cadastro e Acompanhamento dos Portadores de Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus (SIS-HIPERDIA), Sistema de Informação sobre Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN).
- (D) Sistema de Informações sobre o Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI), Sistema de Informações do Câncer da Mulher (SISCAM), Sistema de Informações de Vigilância Epidemiológica da Malária (SISVEP).

QUESTÃO 10

Os serviços públicos de saúde têm sido organizados conforme os princípios e as diretrizes do SUS e por meio da implantação de Normas Operacionais. De acordo com essas Normas Operacionais, assinale a opção INCORRETA.

- (A) A Norma Operacional Básica – SUS/1992 (NOB 92) adota o processo de regionalização da assistência como estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e de busca de maior equidade, induzindo a organização de sistemas ou redes funcionais.
- (B) A Norma Operacional Básica – SUS/1996 (NOB 96) estabelece níveis de gestão para municípios – Gestão Plena da Atenção Básica e Gestão Plena do Sistema Municipal – e para estados – Gestão Avançada do Sistema Estadual e Gestão Plena do Sistema Estadual.
- (C) A Norma Operacional Básica – SUS/1991 (NOB 91), editada pela presidência do INAMPS, recém-incorporado à estrutura do Ministério da Saúde, transplanta para os serviços públicos a mesma lógica de financiamento de pagamento por produção de serviços com que o INAMPS remunerava os serviços privados contratados.
- (D) A Norma Operacional Básica – SUS/1993 (NOB 93) passou por uma discussão ampla das regras de descentralização da gestão do sistema e dos mecanismos de financiamento. Criou instâncias de negociação, sendo uma em nível nacional, a Comissão Intergestores Tripartite (CIT), e outra em nível estadual, a Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

CONHECIMENTOS BÁSICOS
QUESTÃO 11

Patrício, 22 anos de idade, foi vítima de atropelamento e deu entrada no pronto-socorro com trauma abdominal fechado.

Com relação a essa situação, assinale a opção correta.

- (A) Na hipótese de o paciente apresentar lacerações hepáticas simples e estabilidade hemodinâmica, não há indicação de laparotomia.
- (B) Esse paciente pode apresentar lesão pancreática grau II, em que há lesão ductal importante.
- (C) Uma tomografia de abdome deverá ser solicitada caso esse paciente apresente sinais evidentes de abdome agudo.
- (D) Em casos como esse, o fígado é o órgão mais freqüentemente lesado.

QUESTÃO 12

Estevão é um paciente de 26 anos de idade, com queimadura de contato na face anterior e posterior da coxa e perna esquerda.

A respeito desse quadro clínico, assinale a opção correta.

- (A) Esse paciente possui queimadura em 18% da superfície corporal total.
- (B) Caso essa queimadura atinja músculos, ela é considerada de 3.º grau.
- (C) Nesse caso, existe liberação de mediadores da inflamação apenas no membro comprometido.
- (D) Essa queimadura pode ter ocorrido após o contato com líquidos quentes.

QUESTÃO 13

Acerca da hipertensão-porta, assinale a opção correta.

- (A) O procedimento de Sugiura diminui a pressão no sistema-porta de modo eficiente e prolongado.
- (B) Os critérios de Child incluem, entre outros, dosagens de bilirrubinas e aminotransferases.
- (C) A cirurgia de Warren é uma derivação porto-sistêmica seletiva indicada para tratamento de varizes esofágicas.
- (D) O tratamento cirúrgico de emergência deve ser a primeira opção para boa evolução em episódio de sangramento agudo de varizes esofágicas.

QUESTÃO 14

Considere que uma paciente tenha sido diagnosticada com abdome agudo. Com relação a esse quadro clínico, julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – O sinal de Murphy, caso esteja presente, sugere colecistite aguda.
- II – Existe a possibilidade de pancreatite aguda, caso essa paciente apresente sinais de Cullen e Grey Turner.
- III – Caso essa paciente apresente diverticulite, o reto é o local mais freqüente dos divertículos.
- IV – Se a paciente estiver grávida, uma laparoscopia diagnóstica será contra-indicada.

Estão certos apenas os itens

- (A) I e II.
- (B) I, III e IV.
- (C) I, II e IV.
- (D) II e III.

QUESTÃO 15

Quanto à prevenção de infecção de ferida operatória, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – A remoção de tecidos desvitalizados é importante fator de prevenção de infecção de ferida operatória.
- II – Antibióticos profiláticos estão indicados em operações contaminadas e potencialmente contaminadas.
- III – A perfusão tecidual na ferida operatória pode interferir no poder de fagocitose dos neutrófilos.
- IV – Antibióticos tópicos interferem no nível crítico de microorganismos na ferida operatória.

A seqüência correta é:

- (A) V, V, V, F.
- (B) V, V, F, F
- (C) F, F, V, F.
- (D) V, F, F, V.

QUESTÃO 16

São características do fio vicril, EXCETO:

- (A) é trançado.
- (B) é absorvível.
- (C) é feito de poliglactina.
- (D) contém polilefina.

QUESTÃO 17

Assinale a opção correta em relação às alterações hormonais na resposta metabólica ao trauma.

- (A) Há liberação de glicocorticóides pela medula adrenal.
- (B) A aldosterona é secretada pela córtex adrenal, em resposta à atuação do conjunto hormonal renina-angiotensina.
- (C) Durante o trauma, existe aumento sérico de adrenalina, mas não de noradrenalina.
- (D) O hormônio antidiurético, secretado pela glândula supra-renal, leva à retenção de água.

QUESTÃO 18

Acerca da apendicite, assinale a opção correta.

- (A) Os antibióticos utilizados no tratamento da apendicite devem proporcionar cobertura para bactérias anaeróbicas e Gram-positivas entéricas.
- (B) *Escherichia coli* e *Bacteróides fragilis* são bactérias freqüentemente isoladas na apendicite perforada.
- (C) O evento desencadeante da apendicite é uma rápida proliferação bacteriana na luz do apêndice.
- (D) O sinal de Rovsing tem alta especificidade para apendicite.

QUESTÃO 19

Paulo tem 65 quilos, foi submetido a uma gastrectomia e encontra-se no primeiro dia pós-operatório, sem sondas ou drenos e em jejum.

Considerando o caso clínico apresentado, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – A infusão de 500mL de solução salina 0,9% irá suprir as necessidades diárias de sódio nesse paciente.
- II – A oferta de 35kcal por quilo, por dia, é a necessidade calórica para minimizar o catabolismo protéico nesse paciente.
- III – A operação desse paciente é considerada limpa-contaminada, caso não tenha existido quebra da técnica cirúrgica.
- IV – Nesse caso, durante a indução anestésica do paciente, é indicada a prescrição de antibioticoprofilaxia.

A seqüência correta é:

- (A) F, V, V, F.
- (B) F, F, V, V.
- (C) V, V, F, V.
- (D) V, F, V, V.

QUESTÃO 20

A respeito dos compartimentos de água corporal, julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – A água corporal total divide-se em água intracelular e água extracelular
- II – A água extracelular divide-se em plasma e compartimentos intersticiais.
- III – Líquidos e solutos circulam do compartimento do plasma para os compartimentos intersticiais e retornam ao plasma via linfáticos.
- IV – Potássio é o cátion predominante na água extracelular.

Estão certos apenas os itens

- (A) I, II e III.
- (B) I, II e IV.
- (C) I, III e IV.
- (D) II, III e IV.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

Uma criança de 9 anos de idade apresenta adenomegalia de crescimento progressivo no triângulo posterior cervical esquerdo há dois meses. Ao exame, não são observados sinais flogísticos; o tumor é indolor, de consistência sólida e aderido a planos profundos. Foram solicitadas sorologias para viroses, radiografia simples de tórax. Os resultados de todos os exames foram normais.

Assinale a opção que apresenta os possíveis diagnósticos para o caso clínico acima.

- (A) Quando as adenomegalias são mediastinais, a prevalência de doença maligna varia de 10 a 20%.
- (B) O diagnóstico de leucemia aguda é bem provável, já que a apresentação da adenomegalia é localizada.
- (C) Os tumores mais prevalentes na faixa etária do paciente são: linfoma de Hodgkin, não-Hodgkin e rabdomyossarcoma.
- (D) Os tumores mais prevalentes na faixa etária do paciente são: linfoma não-Hodgkin, neuroblastoma, leucemia e rabdomyossarcoma.

QUESTÃO 22

Assinale a opção que preenche corretamente as lacunas da afirmação a seguir.

A síndrome de Sturge-Weber envolve comprometimento _____. Ela decorre de provável desordem _____.

- (A) ocular e neurológico / no crescimento e na organização dos vasos sanguíneos
- (B) ocular, muscular e cutâneo / no crescimento e na organização dos vasos sanguíneos
- (C) vascular, neurológico e ocular / na migração e na diferenciação de elementos do tubo neural
- (D) neurológico, cutâneo e ocular / na migração e na diferenciação de elementos da crista neural

QUESTÃO 23

A respeito do câncer de tireóide na criança e no adolescente, julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.

- I - O carcinoma da tireóide é o mais freqüente da criança.
- II - Um adolescente com nódulo tireoidiano isolado tem 70% de chance de ter neoplasia maligna.
- III - O carcinoma da tireóide é sete vezes mais freqüente no sexo masculino na idade escolar. Na adolescência, é mais freqüente no sexo feminino.
- IV - O carcinoma papilífero de tireóide é mais freqüente em pacientes submetidos à radioterapia da região cervical.

Estão certos apenas os itens

- (A) I, II e III.
- (B) I, II e IV.
- (C) I, III e IV.
- (D) II, III e IV.

QUESTÃO 24

Recém-nascido com 35 semanas, parto cesariana, nasceu sem problemas respiratórios. Ao exame físico observava-se salivação excessiva e aerada. Na sala de parto, não foi possível a progressão da sonda nasogástrica além do esôfago proximal, para aspiração do estômago. O paciente apresentava ânus imperfurado e genitália externa com transposição penescrotal, bolsa testicular bífida e testículos tópicos. Realizada radiografia simples de tórax/abdome, quando o paciente estava com vinte horas de vida, em que foi evidenciada provável atresia de esôfago com presença de ar até o duodeno. Havia, ainda, malformação sacral. A ecocardiografia fetal não demonstrou cardiopatias. À ultra-sonografia de vias urinárias, observou-se presença de rim único hidronefrótico.

De acordo com o caso clínico acima, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção correta.

- I - O ar deglutido pelo recém-nascido leva em média oito horas para chegar ao reto.
- II - Transposição penescrotal não faz parte do espectro de malformações que podem estar presentes no paciente com atresia de esôfago.
- III - A distância entre os cotos esofágicos costuma ser menor quando a atresia de esôfago está associada a múltiplas malformações.

A seqüência correta é:

- (A) F, F, F.
- (B) F, F, V.
- (C) V, F, V.
- (D) V, V, F.

QUESTÃO 25

Considerando as estruturas embriológicas envolvidas nas anomalias de face e pescoço e as estruturas anatômicas adjacentes às malformações, relacione a primeira coluna à segunda e, em seguida, assinale a opção correta.

- I - fístula de primeira fenda branquial
 - II - fístula de segunda fenda branquial
 - III - apêndices pré-auriculares
 - IV - lábio leporino unilateral
- () broto frontal e maxilar
 - () primeiro e segundo arcos branquiais
 - () conduto auditivo externo e ramo inferior da mandíbula
 - () fossa amigdaliana, bifurcação da carótida

A seqüência correta é:

- (A) I, III, IV, II.
- (B) III, II, I, IV.
- (C) III, II, IV, I.
- (D) IV, III, I, II.

QUESTÃO 26

Uma criança de 2 anos de vida foi vítima de acidente de trânsito e chegou ao pronto-socorro taquipnéica, cianótica e inconsciente. Considerando esse quadro clínico e o conhecimento das peculiaridades anatômicas das vias aéreas da criança, que o médico que a atender deve possuir, assinale a opção INCORRETA.

- (A) As cordas vocais são mais cartilaginosas e distensíveis, sendo facilmente lesadas durante a intubação.
- (B) A laringe é mais alta e por isso as cordas vocais aparecerão anteriorizadas à laringoscopia da criança.
- (C) O nível das cordas vocais, tanto no adulto quanto na criança, constitui-se no menor diâmetro das vias aéreas e determina o tubo endotraqueal a ser utilizado.
- (D) A língua que, proporcionalmente, ocupa maior espaço da orofaringe, dificulta o correto posicionamento do laringoscópio à intubação.

QUESTÃO 27

No tocante aos pontos anatômicos importantes para a avaliação da fisiopatologia do trauma torácico na infância, assinale a opção correta.

- (A) Tórax instável é uma condição pouco freqüente no traumatismo torácico do lactente.
- (B) Como as estruturas mediastinais, nos lactentes, são proporcionalmente mais fixas do que em adultos, o hemo ou pneumotórax não é grave na infância.
- (C) O aumento importante da pressão abdominal no lactente pode dificultar a respiração de forma discreta, pois, devido à grande expansibilidade torácica, há compensação.
- (D) Há maior elasticidade do tórax devido ao menor diâmetro ântero-posterior da caixa torácica e ao menor grau de ossificação das costelas, dessa forma, as fraturas são mais freqüentes.

QUESTÃO 28

Com relação às massas pulmonares, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – O seqüestro pulmonar intralobar pode estar associado à malformação adenomatóide cística.
- II – A sintomatologia do enfisema lobar congênito é geralmente tardia. Ela ocorre principalmente quando a criança aumenta sua atividade física.
- III – A bronquiectasia é compatível com infecções respiratórias crônicas.
- IV – A ultra-sonografia pré-natal não é um exame sensível para fazer o diagnóstico da maioria das malformações pulmonares, tais como: malformação adenomatóide cística, cisto broncogênito e enfisema lobar congênito.

A seqüência correta é:

- (A) F, F, F, V.
- (B) F, V, V, F.
- (C) V, F, V, F.
- (D) V, V, F, V.

QUESTÃO 29

Em relação ao acesso venoso profundo em crianças, assinale a opção correta.

- (A) A punção da veia subclávia esquerda é a preferida devido ao trajeto venoso mais retilíneo, mais calibroso e à cúpula pleural mais baixa.
- (B) A punção da veia femoral não é recomendada em crianças, principalmente devido a tromboflebites e gangrena de membro inferior.
- (C) A punção da veia jugular interna pode ser anterior, posterior ou através do músculo esternocleidomastóide (ápice do ângulo de Sedellot).
- (D) A técnica de colocação de cateter central por meio de punção de veias superficiais não é muito utilizada em lactentes e recém-nascidos, pois há dificuldade de progressão desses cateteres. Esse método fica restrito aos adolescentes e aos adultos.

QUESTÃO 30

Recém-nascido com 35 semanas de vida pré-natal nasceu com celosomia média, sendo diagnosticada gastrosquise. A mãe do paciente não havia feito acompanhamento pré-natal.

Acerca do diagnóstico pré-natal da gastrosquise e suas implicações, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – À ultra-sonografia de um feto que tem gastrosquise, a dilatação do intestino pode ser indicativa de processo obstrutivo.
- II – A dilatação do intestino, detectada no período pré-natal, não muda o prognóstico do paciente.
- III – Nos fetos com gastrosquise observa-se maior incidência de sofrimento fetal. O sofrimento fetal pode ser explicado pela compressão do cordão umbilical pelas alças intestinais dilatadas.
- IV – O risco de morte é sensivelmente reduzido quando é feito o diagnóstico pré-natal da malformação.

A seqüência correta é:

- (A) F, F, V, F.
- (B) F, V, F, V.
- (C) V, F, V, V.
- (D) V, V, F, F.