

**UFF – UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE**  
**CCM – CENTRO DE CIÊNCIAS MÉDICAS**  
**HUAP – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTONIO PEDRO**



## **ODONTOLOGIA/CIRURGIA BUCO-MAXILO-FACIAL**

## Parte I: MÚLTIPLA ESCOLHA

**01** Podemos considerar como fator complicador da exodontia de terceiro molar retido:

- (A) posição distoangular
- (B) dois itens corretos
- (C) três itens corretos
- (D) relação classe I com o ramo
- (E) osso inelástico

**02** Os traumas anteriores de face no adulto são responsáveis por inúmeras lesões que requerem diferentes tratamentos. Nas fraturas dentoalveolares, existe necessidade de estabilização dos fragmentos.

Assinale a opção correta.

- (A) Dente com mobilidade 5 a 8 dias
- (B) Fratura radicular 30 a 45 dias
- (C) Dente reimplantado 20 a 40 dias
- (D) Deslocamento dentário 10 a 13 dias
- (E) NRA

**03** Abscesso dentoalveolar agudo ocorre como resultado secundário de uma necrose pulpar.

Segundo a literatura, a solução mais rápida para este problema é a eliminação do elemento dentário.

Podemos concluir que a infecção aguda é uma contra-indicação para a extração. Baseado no texto acima, assinale a opção correta:

- (A) primeiro e o segundo parágrafos são verdadeiros
- (B) somente o primeiro e o terceiro são verdadeiros
- (C) somente o segundo e o terceiro são verdadeiros
- (D) todos os parágrafos são verdadeiros
- (E) NRA

**04** A aplicação de fios absorvíveis em suturas de face é amplamente utilizada. O mecanismo de eliminação do fio de sutura no organismo ocorre de forma diferenciada em relação ao tempo e à forma de eliminação.

Assinale a opção incorreta.

- (A) O fio catgut é eliminado por ação das enzimas proteolíticas
- (B) O fio catgut cromado é eliminado por hidrólise
- (C) As suturas com fio de ácido poliglicolicos não sofrem degeneração enzimática
- (D) As suturas com fios poliláticos são menos rígidas que as realizadas com catgut
- (E) NRA



**05** As lacerações de lábio são lesões comumente encontradas como resultado de trauma de face. Este tipo de solução de continuidade requer cuidados especiais para sua reparação. Em uma seqüência lógica, o cirurgião deve proceder ao tratamento deste quadro. Nos itens abaixo, encontra-se uma opção que é incorreta no protocolo de atendimento.

Assinale-a.

- (A) Debridamento da ferida
- (B) Hemostasia da ferida
- (C) Fechamento dos 4 planos anatômicos
- (D) Fechamento das 3 camadas
- (E) NRA

**06** O enfizema da bochecha é um sinal e sintoma de:

- (A) fratura de nariz
- (B) fratura de nariz e zigoma
- (C) fratura alveolar inferior posterior
- (D) todas são corretas
- (E) NRA

**07** O gancho de Barros é usado no tratamento de fratura do:

- (A) fratura de zigoma e nariz
- (B) fratura de nariz
- (C) fratura de nariz e órbita
- (D) complexo zigomático
- (E) NRA

**08** O acesso de Caldwell-Luc está contra-indicado em pacientes com menos de 11 anos:

- (A) pela manipulação do seio maxilar
- (B) pelo sangramento nasal pós-operatório
- (C) pela posição dos germes dentários
- (D) pelo traumatismo do nervo infra-orbitário
- (E) NRA

**09** As fraturas de nariz classe I de Kazangian eram aquelas em que o paciente traumatizado apresentava a seguinte situação:

- (A) elementos dentários em ambos os lados da fratura
- (B) presença só de incisivo lateral
- (C) presença de caninos bilateralmente
- (D) paciente desdentado
- (E) paciente usando prótese superior

**10** Numa fratura de nariz podem estar envolvidos:

- (A) vômer
- (B) qualquer outra estrutura óssea ou cartilaginosa do nariz
- (C) processos frontais da maxila
- (D) espinha nasal anterior
- (E) todas as opções acima são corretas

**11** A parte do nariz mais suscetível a fratura é:

- (A) o terço superior
- (B) a parede lateral
- (C) o processo frontal da maxila
- (D) a parte inferior
- (E) a linha média

**12** Nas infecções odontogênicas o espaço submentoniano só não é limitado inferiormente:

- (A) pela pele
- (B) pelo músculo platisma
- (C) pelo músculo digástrico
- (D) pela fascia superficial
- (E) NRA

**13** Na infecção odontogênica chamada face tóxica o paciente apresenta:

- (A) febre
- (B) boca entreaberta
- (C) olhos lacrimejantes
- (D) desidratação
- (E) todas as opções acima são corretas

**14** Não é espaço fascial secundário na infecção odontogênica:

- (A) faringeo medial
- (B) massetérico
- (C) pterigomandibular
- (D) faringeo lateral
- (E) retrofaringeo

- 15** A projeção postero-anterior oblíqua da face evidencia bem:
- (A) Espinha nasal
  - (B) Crista zigomaticomaxilar, contorno orbitário, sutura frontozigomática e um dos seios maxilares
  - (C) Processo frontal da maxila órbita e nariz
  - (D) Crista malar, sutura frontomaxilar
  - (E) NRA
- 16** São indicações formais para realização de cultura e teste de sensibilidade aos antibióticos:
- (A) alveolite
  - (B) presença de pericoronarite grave
  - (C) suspeita de actinomicose
  - (D) abscesso crônico bem localizado
  - (E) infecção não recidivante
- 17** Qual antibiótico está indicado para a prevenção de reabsorção radicular após o replante de um incisivo central superior avulsionado traumaticamente em um paciente adulto?
- (A) Clindamicina
  - (B) Tetraciclina
  - (C) Amoxicilina
  - (D) Cefalosporina
  - (E) Metronidazol
- 18** Qual solução deverá ser usada para imersão de um dente permanente avulsionado a menos de trinta minutos, com rizogênese incompleta, visando a aumentar a probabilidade de revascularização?
- (A) Dixociclina 1 mg/20 ml de soro fisiológico por 15 minutos
  - (B) Clorexidina 1 mg/20 ml de soro fisiológico por 5 minutos
  - (C) Doxiciclina 1 mg/20 ml de soro fisiológico por 5 minutos
  - (D) Rifocina 1 mg/20 ml de soro fisiológico por 10 minutos
  - (E) Clorexidina 1 mg/20 ml de soro fisiológico por 15 minutos
- 19** Qual o pior meio para transporte de um dente avulsionado?
- (A) Leite
  - (B) Via Span
  - (C) Saliva
  - (D) Água destilada
  - (E) Soro fisiológico



Hospital Universitário  
**Antonio Pedro**

**20** Dentre os seguintes locais para progressão de um abscesso dento-alveolar, qual não está relacionado à inserção muscular?

- (A) Espaço bucal
- (B) Palato Mole
- (C) Fundo sublingual
- (D) Palato Duro
- (E) Espaço submandibular



**Parte II: DISCURSIVA**

**1ª Questão:** (2,0 pontos)

Descreva a técnica de Carrol-Girard.

**2ª Questão:** (2,0 pontos)

Cite os sinais e os sintomas de fratura de zigoma.

**3ª Questão:** (2,0 pontos)

Enumere as diferenças entre celulite e abscesso.

**4ª Questão:** (2,0 pontos)

Descreva a classe C de Pell e Gregory.

**5ª Questão:** (2,0 pontos)

Defina uma queimadura de face, de segundo grau, explicando quais cuidados locais devem ser tomados no tratamento imediato e mediato.



Hospital Universitário  
**Antonio Pedro**

Respostas:





Hospital Universitário  
**Antonio Pedro**

Respostas:



Hospital Universitário  
**Antonio Pedro**

Respostas:



Hospital Universitário  
**Antonio Pedro**

Respostas:



Hospital Universitário  
**Antonio Pedro**

Respostas:



Hospital Universitário  
**Antonio Pedro**

Respostas:



Hospital Universitário  
**Antonio Pedro**

Respostas:



Hospital Universitário  
**Antonio Pedro**

Respostas:



Hospital Universitário  
**Antonio Pedro**

Respostas:





Hospital Universitário  
**Antonio Pedro**

Respostas:



Hospital Universitário  
**Antonio Pedro**

Respostas:



Hospital Universitário  
**Antonio Pedro**

Respostas:



Hospital Universitário  
**Antonio Pedro**

Respostas:



Hospital Universitário  
**Antonio Pedro**

Respostas:



Hospital Universitário  
**Antonio Pedro**

Respostas:



Hospital Universitário  
**Antonio Pedro**

Respostas:

