

UFF – UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE  
CCM – CENTRO DE CIÊNCIAS MÉDICAS

HUAP – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTONIO PEDRO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO



Hospital Universitário  
Antonio Pedro

**ÁREA/ESPECIALIDADE: MEDICINA/  
REUMATOLOGIA**

**131**

### INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

- ✘ Além deste CADERNO, você deverá ter recebido o CARTÃO destinado às respostas das 40 (quarenta) questões de múltipla escolha formuladas na prova. Caso não o tenha recebido, peça-o ao fiscal.
- ✘ Verifique se esta prova corresponde à área/especialidade para a qual você se inscreveu.
- ✘ Verifique se o número do seu documento de identificação e seu nome conferem com os que aparecem no CARTÃO DE RESPOSTAS; em caso afirmativo, **assine-o** e leia atentamente as instruções para seu preenchimento.
- ✘ Se este caderno ou o cartão de respostas não contiver o descrito nos itens anteriores, notifique imediatamente ao fiscal.
- ✘ Não é permitido portar ou fazer uso de aparelhos de recebimento central de mensagens (*paggers*), aparelho de telefonia celular, qualquer tipo de aparelho que permita intercomunicação, nem material que sirva para consulta.
- ✘ Não é permitido copiar as respostas assinaladas no cartão.
- ✘ O tempo disponível para esta prova, incluindo o preenchimento do cartão de respostas, é de **quatro horas**.
- ✘ Para preencher o cartão de respostas use, exclusivamente, caneta esferográfica de ponta média com tinta azul. Assinale **apenas uma** dentre as cinco opções de resposta apresentadas para cada questão.
- ✘ Certifique-se de ter assinado a lista de presença.
- ✘ Quando terminar, entregue ao fiscal este CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO DE RESPOSTAS, que será invalidado se você não o assinar.

APÓS O AVISO PARA INÍCIO DA PROVA, VOCÊ  
DEVERÁ PERMANECER NO LOCAL DE REALIZAÇÃO  
DA MESMA POR, NO MÍNIMO, NOVENTA MINUTOS.







- 01** Quais dos seguintes anticorpos são antifosfolipídicos?
- (A) Antitransglutaminase e anti gliadina
  - (B) Anticoagulante lúpico e anti beta-2 glicoproteína I
  - (C) Antimúsculo liso e antimitocondrial
  - (D) Antipeptídeo citrulinado cíclico e antiperoxidase
  - (E) Anticentrômero e anticitoplasma do neutrófilo
- 02** Algumas doenças associadas podem dificultar o diagnóstico de fibromialgia.
- Qual das condições relacionadas é encontrada com maior frequência?
- (A) Hepatite C
  - (B) Doenças do tecido conjuntivo
  - (C) Depressão
  - (D) Doença de Lyme
  - (E) Arterite temporal
- 03** Assinale qual das seguintes nefropatias está associada à espondilite anquilosante?
- (A) Necrose tubular aguda.
  - (B) Glomerulonefrite proliferativa difusa.
  - (C) Glomerulosclerose segmentar focal.
  - (D) Nefropatia por IGA.
  - (E) Glomerulonefrite membranosa.
- 04** A osteonecrose de mandíbula está associada com qual tratamento para osteoporose?
- (A) Vitamina D.
  - (B) Calcitonina.
  - (C) PTH.
  - (D) Estrogênio.
  - (E) Bifosfonatos.
- 05** São manifestações do exame físico articular na osteoartrose, exceto
- (A) eritema.
  - (B) derrame articular.
  - (C) crepitação.
  - (D) osteófitos palpáveis.
  - (E) deformidade articular.
- 06** O tratamento farmacológico de escolha para o tratamento do fenômeno de Raynaud é
- (A) Bloqueador do canal de cálcio.
  - (B) Sildenafil.
  - (C) Nitroglicerina.
  - (D) Hidralazina.
  - (E) Aspirina.
- 07** Uma miopatia induzida por droga pode complicar o tratamento da artrite reumatóide.
- Qual dos tratamentos relacionados não causa doença muscular?
- (A) Estatinas
  - (B) Cloroquina
  - (C) Glicocorticoides
  - (D) Hidroxicloroquina
  - (E) Metotrexate
- 08** Assinale a afirmativa correta em relação às manifestações neuropsiquiátricas no LES.
- (A) Os anticorpos antifosfolipídios caracteristicamente estão associados à neuropatia periférica.
  - (B) O anticorpo antiribossomal P tem baixa sensibilidade e especificidade para o diagnóstico.
  - (C) O complemento está baixo no líquido em mais da metade dos pacientes com manifestações clínicas.
  - (D) Nos pacientes com manifestações psiquiátricas e do SNC, o exame de imagem de escolha é o PET-Scan.
  - (E) O eletroencefalograma quando alterado é indicativo de biópsia cerebral.
- 09** Na crise renal da esclerodermia a droga de escolha para iniciar o tratamento é
- (A) Nifedipina.
  - (B) Nitroprussiato de sódio.
  - (C) Hidralazina.
  - (D) Captopril.
  - (E) Minoxidil.

- 10** De acordo com a classificação pelo predomínio do tamanho dos vasos envolvidos, assinale qual das seguintes vasculites é considerada de pequenos vasos.
- (A) Arterite de células gigantes.
  - (B) Arterite de Takayasu.
  - (C) Arterite de Churg-Strauss.
  - (D) Poliarterite nodosa.
  - (E) Doença de Kawasaki.
- 11** Assinale a afirmativa falsa em relação à associação entre dermatomiosite e neoplasia maligna.
- (A) Os tumores neuroendócrinos, principalmente estômago e intestino, são o tipo mais frequente de câncer associado.
  - (B) A vasculite leucocitoclástica cutânea e a idade avançada por ocasião do diagnóstico são considerados fatores de risco.
  - (C) O diagnóstico do câncer pode anteceder, ser concomitante ou suceder o diagnóstico da DM.
  - (D) Pacientes com DM associada a tumor são menos prováveis de terem anticorpos miosite específicos.
  - (E) A presença concomitante do tumor com a DM não afeta a gravidade da fraqueza muscular e nem o nível de aumento das enzimas musculares.
- 12** O desenvolvimento de linfoma é uma preocupação nas seguintes doenças do tecido conjuntivo, exceto
- (A) Dermatomiosite.
  - (B) Síndrome de Sjogren.
  - (C) Fibromialgia.
  - (D) LES.
  - (E) Artrite reumatóide.
- 13** Qual é a etiologia mais comum para os casos de eritema nodoso?
- (A) Tuberculose.
  - (B) Idiopática.
  - (C) Sarcoidose.
  - (D) Artrite reumatóide.
  - (E) Infecção estreptocócica.
- 14** Em um paciente com monoartrite aguda e suspeita de artrite séptica a conduta inicial deve ser a
- (A) hemocultura e antibioticoterapia empírica.
  - (B) punção do líquido articular para análise e cultura.
  - (C) drenagem cirúrgica da articulação.
  - (D) imobilização e antibioticoterapia empírica.
  - (E) ressonância magnética.
- 15** A inflamação das articulações sacroilíacas, oligoartrite assimétrica e entesite, são manifestações de qual das seguintes doenças?
- (A) Artrites associadas às vasculites.
  - (B) Doença reumatóide.
  - (C) Espondiloartrites.
  - (D) Osteoartrite.
  - (E) Artrite gonocócica.
- 16** Em um paciente com diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico e disfagia, qual é a causa mais provável para essa queixa?
- (A) Osteocondrite.
  - (B) Candiadíase esofagiana.
  - (C) Doença do refluxo gastroesofágico.
  - (D) Compressão extrínseca do esôfago.
  - (E) Hipomotilidade esofagiana.
- 17** São complicações intestinais dos anti-inflamatórios não-hormonais, exceto:
- (A) colite isquêmica.
  - (B) suboclusão intestinal.
  - (C) úlceras.
  - (D) exacerbação de doença inflamatória intestinal.
  - (E) perfuração.

**18** Na fascite plantar, qual é o meio diagnóstico de menor utilidade?

- (A) Ultrassonografia.
- (B) Exame físico.
- (C) Ressonância magnética.
- (D) Testes laboratoriais para inflamação (VHS e PCR).
- (E) Radiografia.

**19** Dentre as doenças relacionadas, assinale aquela cujo tratamento tem maior probabilidade de induzir vasculite ANCA positivo?

- (A) Hipertireoidismo.
- (B) Hipertensão arterial.
- (C) Epilepsia.
- (D) Enxaqueca.
- (E) Endometriose.

**20** Qual das seguintes manifestações não faz parte dos critérios para diagnóstico da doença de Behçet?

- (A) Eritema nodoso.
- (B) Úlceras genitais.
- (C) Glomerulonefrite.
- (D) Uveíte.
- (E) Úlceras orais.

**21** A ferritina é útil para o diagnóstico e para o acompanhamento da resposta ao tratamento de qual doença?

- (A) Doença de Kawasaki.
- (B) Granulomatose de Wegener.
- (C) Poliangeíte microscópica.
- (D) Polimialgia reumática.
- (E) Doença de Still.

**22** Na artrite psoriática, são fatores de risco para dano articular progressivo e artrite deformante, exceto

- (A) comprometimento de mais de cinco articulações.
- (B) FAN positivo.
- (C) uso prévio de corticóide por tempo prolongado.
- (D) presença do antígeno HLA B27.
- (E) VHS elevado.

**23** Para tratamento sintomático da febre reumática aguda qual é a medicação de escolha?

- (A) Prednisona.
- (B) Indometacina.
- (C) Ácido acetil salicílico.
- (D) Penicilina.
- (E) Dipirona.

**24** Devido à possibilidade de adenocarcinoma de esôfago, os bifosfonados não devem ser usados em qual situação?

- (A) Infecção pelo H. pylori.
- (B) Refluxo gastroesofágico.
- (C) Grupo sanguíneo A
- (D) Esôfago de Barrett.
- (E) Hérnia de hiato.

**25** A colangite esclerosante primária está associada com qual das seguintes doenças?

- (A) Síndrome de Sjogren.
- (B) Retocolite ulcerativa.
- (C) Espondilite anquilosante.
- (D) Polimialgia reumática.
- (E) Artrite reumatóide.

**26** Na esclerose sistêmica, a principal causa de morte é decorrente de

- (A) acidente vascular cerebral.
- (B) glomerulonefrite proliferativa difusa.
- (C) infarto agudo do miocárdio.
- (D) hipertensão pulmonar.
- (E) hemorragia digestiva.

**27** Qual é o exame de escolha para diagnóstico de osteomielite vertebral?

- (A) Tomografia computadorizada.
- (B) Cintilografia óssea.
- (C) Radiografia.
- (D) Pet scan.
- (E) Ressonância magnética.

- 28** Mulher, 24 anos, com quadro de artrite de joelho direito e febre, precedido há uma semana por tenosinovite de punhos, tornozelos e algumas lesões vesiculopustulosas nas coxas e região palmar.  
Qual a sua hipótese diagnóstica?
- (A) Artrite gonocócica.  
(B) Síndrome de Reiter.  
(C) Artrite psoriática.  
(D) Febre reumática.  
(E) Lúpus eritematoso sistêmico.
- 29** Com relação à polimialgia reumática assinale a alternativa correta.
- (A) A anemia associada é indicação para biópsia de artéria temporal.  
(B) VHS abaixo de 40 mm/h afasta o diagnóstico.  
(C) A resposta rápida e satisfatória a prednisona é utilizada como um critério diagnóstico.  
(D) O methotrexate está indicado nos casos associados com arterite temporal.  
(E) A associação com neoplasia maligna ocorre em mais da metade dos casos.
- 30** Na catarata provocada pelo uso de corticóide é correto afirmar que
- (A) a reposição do cálcio acelera o processo.  
(B) o acometimento unilateral é o mais frequente.  
(C) os pacientes de olhos claros têm as formas mais graves.  
(D) o uso de vitamina A retarda o aparecimento da catarata.  
(E) crianças são mais susceptíveis do que os adultos.
- 31** Mulher, 48 anos, com perda de peso, fadiga, febre baixa e claudicação no MSE tem diagnóstico firmado de síndrome do roubo da subclávia.  
Qual é a provável etiologia?
- (A) Poliarterite nodosa.  
(B) Arterite de Takayasu.  
(C) Síndrome de Behçet.  
(D) Aterosclerose.  
(E) Poliangeíte microscópica.
- 32** Podem ser usados como alternativa aos anti-inflamatórios no tratamento da osteoartrite, exceto
- (A) Corticóide intrarticular.  
(B) Colchicina.  
(C) Hidroxicloroquina.  
(D) Methotrexate.  
(E) Codeína.
- 33** Qual é a causa mais comum de hemartrose?
- (A) Tumor.  
(B) Doença vascular.  
(C) Trauma.  
(D) Osteoartrite.  
(E) Artrite séptica.
- 34** Assinale a afirmativa correta em relação às manifestações clínicas da doença por deposição de cristais de pirofosfato de cálcio.
- (A) A maioria dos pacientes são assintomáticos em relação ao acometimento articular.  
(B) As articulações mais acometidas são o cotovelo e glenohumeral.  
(C) A febre e leucocitose são frequentes e distinguem da crise de gota.  
(D) O derrame articular está relacionado à hipercalcemia ou excreção urinária diminuída de cálcio.  
(E) A maioria dos pacientes é de jovens com episódios anteriores de cálculo renal.
- 35** Qual é o exame padrão ouro para diagnóstico da angeíte primária do sistema nervoso central?
- (A) Eletroencefalografia.  
(B) c-ANCA.  
(C) Angioressonância magnética.  
(D) Angiotomografia computadorizada.  
(E) Biópsia da leptomeninge e cérebro.

**36** Mulher branca, 48 anos, com diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico há 10 anos e em uso de azatioprina e prednisona para tratamento de nefropatia. Apresenta edema, dor e intenso eritema na orelha direita, sem febre e sem linfonodomegalia adjacente, o segundo episódio em dois meses.

Qual o seu diagnóstico?

- (A) Condrosarcoma.
- (B) Erisipela.
- (C) Otite média maligna.
- (D) Policondrite recidivante.
- (E) Condromalácia.

**37** Assinale a afirmativa correta em relação à episclerite.

- (A) Na maioria dos casos não há uma doença inflamatória sistêmica ou infecciosa associada.
- (B) A baixa da acuidade visual distingue da conjuntivite.
- (C) Tuberculose é a infecção mais comumente associada.
- (D) Na lesão bilateral a associação com doença inflamatória é frequente e corticoide oral deve ser iniciado.
- (E) A principal complicação é o glaucoma.

**38** Como é feito o diagnóstico da doença de Whipple?

- (A) PCR quantitativo para *T. whipplei* na saliva.
- (B) Pela identificação do *T. whipplei* na biópsia do intestino delgado.
- (C) Isolamento do *T. whipplei* na coprocultura.
- (D) PCR qualitativo para *T. whipplei* no líquido sinovial.
- (E) PCR qualitativo para *T. whipplei* no líquido.

**39** São constituintes da síndrome de osteoartropatia hipertrófica, exceto

- (A) Periostose de ossos longos.
- (B) Hipocratismo digital.
- (C) Fibromatose palmar.
- (D) Poliartrite.
- (E) dor articular.

**40** Assinale a afirmativa correta com relação ao uso crônico de baixas doses de methotrexate.

- (A) A mucosite ocorre associada à intolerância gástrica e diarreia.
- (B) Acelera a regressão dos nódulos reumatoides.
- (C) A toxicidade pulmonar ocorre na falta da reposição de ácido fólico.
- (D) A mielosupressão é mais comum quando a dose é semanal.
- (E) Linfoma pode ocorrer com uso por vários anos.