

UFF – UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE  
CCM – CENTRO DE CIÊNCIAS MÉDICAS  
HUAP – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTONIO PEDRO  
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO



ÁREA/ESPECIALIDADE: ODONTOLOGIA/  
CIRURGIA BUCO-MAXILO-FACIAL

134

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

- ✘ Além deste CADERNO, você deverá ter recebido o CARTÃO destinado às respostas das 40 (quarenta) questões de múltipla escolha formuladas na prova. Caso não o tenha recebido, peça-o ao fiscal.
- ✘ Verifique se esta prova corresponde à área/especialidade para a qual você se inscreveu.
- ✘ Verifique se o número do seu documento de identificação e seu nome conferem com os que aparecem no CARTÃO DE RESPOSTAS; em caso afirmativo, **assine-o** e leia atentamente as instruções para seu preenchimento.
- ✘ Se este caderno ou o cartão de respostas não contiver o descrito nos itens anteriores, notifique imediatamente ao fiscal.
- ✘ Não é permitido portar ou fazer uso de aparelhos de recebimento central de mensagens (*paggers*), aparelho de telefonia celular, qualquer tipo de aparelho que permita intercomunicação, nem material que sirva para consulta.
- ✘ Não é permitido copiar as respostas assinaladas no cartão.
- ✘ O tempo disponível para esta prova, incluindo o preenchimento do cartão de respostas, é de **quatro horas**.
- ✘ Para preencher o cartão de respostas use, exclusivamente, caneta esferográfica de ponta média com tinta azul. Assinale **apenas uma** dentre as cinco opções de resposta apresentadas para cada questão.
- ✘ Certifique-se de ter assinado a lista de presença.
- ✘ Quando terminar, entregue ao fiscal este CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO DE RESPOSTAS, que será invalidado se você não o assinar.

APÓS O AVISO PARA INÍCIO DA PROVA, VOCÊ  
DEVERÁ PERMANECER NO LOCAL DE REALIZAÇÃO  
DA MESMA POR, NO MÍNIMO, NOVENTA MINUTOS.







- 01** São anestésicos locais de estrutura química éster:
- (A) Mepivacaína e Prilocaina.
  - (B) Tetracaína e Procaína.
  - (C) Ropivacaína e Procaína.
  - (D) Articaína e Etidocaína.
  - (E) Lidocaína e Articaína.
- 02** Qual o anestésico local que tem efeito de duração longa?
- (A) Lidocaína.
  - (B) Ropivacaína.
  - (C) Clorprocaína.
  - (D) Mepivacaína.
  - (E) Procaína.
- 03** A composição do osso lamelar é aproximadamente
- (A) 80% água.
  - (B) 92% material sólido.
  - (C) 25% água e 75% material sólido.
  - (D) 50% água e 50% sólido.
  - (E) 60% água.
- 04** Na fixação rígida de fratura de colo condíleo devem-se usar
- (A) uma placa e quatro parafusos.
  - (B) uma placa e seis parafusos.
  - (C) duas placas com quatro parafusos cada.
  - (D) duas placas com dois parafusos somente.
  - (E) uma placa com dois parafusos.
- 05** Na trombose do seio carvenoso também se pode usar
- (A) corticoesteróide.
  - (B) rifocina.
  - (C) anti-inflamatório não esteróide somente.
  - (D) calor úmido.
  - (E) Somente antibiótico.
- 06** A técnica de LEG e o parafuso de LEG são usados em
- (A) fraturas múltiplas.
  - (B) fraturas biseladas.
  - (C) fraturas com biséis longos e estáveis.
  - (D) somente em fraturas cominutivas.
  - (E) fraturas em galho verde.
- 07** Não é técnica de fixação maxilo-mandibular a fio de aço:
- (A) técnica de Ivy.
  - (B) com barra de Erich.
  - (C) laçada continua.
  - (D) goteira de Gunning.
  - (E) técnica de LEG.
- 08** O coxim adiposo bucal consiste de um corpo principal e de quatro extensões. Marque o item que não é correto.
- (A) Lingual posterior
  - (B) Pterigoídea
  - (C) Bucal
  - (D) Pterigomandibular
  - (E) Temporal
- 09** No acesso cirúrgico supraorbitário, deve-se obedecer a quantos passos sequenciais?
- (A) 6
  - (B) 4
  - (C) 5
  - (D) 7
  - (E) 8
- 10** São usados no tratamento da candidíase
- (A) Nistatina e Clotrimazol.
  - (B) Nistatina e Tetraciclina.
  - (C) Nistatina e Eritromicina.
  - (D) Eritromicina e Clotrimazol.
  - (E) Eritromicina e Nistatina.
- 11** Segundo Proffit, associando-se o tratamento ortocirúrgico, pode-se
- (A) reposicionar a maxila 15mm para trás.
  - (B) reposicionar 10mm para frente.
  - (C) avançar a mandíbula 12mm
  - (D) retraindo a mandíbula 25mm.
  - (E) avançar a maxila só 2mm para frente.



- 12** Assinale o tumor que não é odontogênico.
- (A) Displasia fibrosa
  - (B) Odontomacoplexo
  - (C) Ameloblastoma
  - (D) Ceratocisto
  - (E) Sarcoma osteogênico
- 13** É espaço facial secundário:
- (A) Retrofaríngeo.
  - (B) Massetérico.
  - (C) Temporal profundo e superficial.
  - (D) Faríngeo lateral.
  - (E) Miloideu.
- 14** O seio cavernoso é um dos seios da meninge
- (A) aracnóide.
  - (B) duramater.
  - (C) aracnóide duramater.
  - (D) somente da piamater.
  - (E) piamater e duramater.
- 15** O que não está associado à fratura de órbita?
- (A) A limitação de abertura de boca.
  - (B) A rinorragia.
  - (C) A diplopia binocular.
  - (D) A oftalmoplegia.
  - (E) A hipofthalmia e a enoftalmia.
- 16** Não faz parte da parede medial da órbita
- (A) processo orbitário do osso palatino.
  - (B) lacrimal.
  - (C) esfenoide.
  - (D) processo frontal da maxila.
  - (E) lâmina orbitária do etimóide.
- 17** Quantos tubetes de lidocaína a 2% com adrenalina a 1:100mil poderão ser usados como anestésico local em um paciente ASA I pesando 65kg, segundo Malamed?
- (A) 5
  - (B) 6
  - (C) 7
  - (D) 8
  - (E) 9
- 18** A principal via de disseminação das infecções odontológicas no seio cavernoso é a
- (A) veia retromandibular.
  - (B) veia jugular interna.
  - (C) veia maxilar interna.
  - (D) veia oftálmica.
  - (E) plexo pterigóide.
- 19** A angina de Ludwig acomete os seguintes espaços faciais:
- (A) submandibular, retrofaríngeo e submentoniano.
  - (B) massetérico, geniano e infraorbitário.
  - (C) submentoniano, sublingual e submandibular.
  - (D) submentoniano, submandibular e massetérico.
  - (E) submandibular, laterofaríngeo e submentoniano.
- 20** Qual a estatística da distribuição anatômica das fraturas de mandíbula em toda a sua extensão?  
Assinale o item correto.
- (A) Côndilo: 3,7%
  - (B) Coronóide: 26%
  - (C) Ângulo: 17%
  - (D) Sínfise: 32%
  - (E) Corpo: 16%
- 21** Assinale a opção que representa a causa química de lesão tecidual.
- (A) Comprometimento do fluxo sanguíneo
  - (B) Frio excessivo
  - (C) Substância de pH não fisiológico
  - (D) Incisão
  - (E) Ressecamento
- 22** Marque a opção errada em relação ao que, comumente, a ansiedade provoca.
- (A) Angina pectoris
  - (B) Insuficiência renal
  - (C) Choque insulínico
  - (D) Infarto do miocárdio
  - (E) Tempestade tireoidiana



- 23** Marque o item incorreto com relação à manifestação de um episódio asmático agudo moderado.
- (A) Sibilos
  - (B) Dispnéia
  - (C) Taquicardia
  - (D) Tosse
  - (E) Sudorese
- 24** Não é característica clínica da Neuralgia do trigêmeo:
- (A) Dor por queimação ou latejante
  - (B) Dor paroxística severa
  - (C) Leve estimulação superficial provocando dor
  - (D) Ter zona gatilho
  - (E) Dor somente ao calor
- 25** Não há necessidade de ser evitado o seguinte medicamento em pacientes grávidas:
- (A) Carbamazepina
  - (B) Diazepam
  - (C) Óxido nítrico
  - (D) Propoxifeno
  - (E) Dipirona
- 26** As fluoroquinolonas
- (A) são bactericidas.
  - (B) não possuem largo espectro.
  - (C) não são tomadas só por via oral.
  - (D) possuem pouco ou nenhum efeito contra bactérias anaeróbicas.
  - (E) São solúveis em flúor.
- 27** A glândula submandibular produz diariamente
- (A) 60% de toda a saliva.
  - (B) 70% de toda a saliva.
  - (C) 25% de toda a saliva.
  - (D) 30% de toda a saliva.
  - (E) 40% de toda a saliva.
- 28** A incidência de produção de pedras radiopacas é maior na
- (A) glândula submandibular 80%.
  - (B) glândula parótida 30%.
  - (C) 50% na parótida e 50% na submandibular.
  - (D) glândulas labiais
  - (E) glândulas sublinguais
- 29** Não é tipo de procedimento cirúrgicos para remoção de tumores dos maxilares:
- (A) ressecção marginal
  - (B) ressecção composta
  - (C) ressecção total
  - (D) ressecção parcial
  - (E) ressecção endoaural somente
- 30** Qual é o teste que se faz para olhos secos na síndrome de Sjögren?
- (A) Teste de Row
  - (B) Teste de Snider
  - (C) Teste de Stensen
  - (D) Teste de Schimer
  - (E) Teste de Rivinus
- 31** Alodinia é:
- (A) Ausência de dor em resposta a um estímulo que normalmente causaria dor
  - (B) Aumento da sensibilidade a um estímulo doloroso
  - (C) Dor causada por estímulo que normalmente é indolor
  - (D) Dor a qualquer estímulo
  - (E) Dor somente a estímulo por gelo
- 32** São condições cardíacas que podem predispor a endocardite:
- (A) Má formação congênita
  - (B) Disfunção valvular adquirida
  - (C) Cardiomiopatia hipertrófica
  - (D) Prolapso de válvula mitral com regurgitação valvular
  - (E) Dislipidemia
- 33** Lesão escura ou branca resultante da presença de leucócitos polimorfonucleares
- (A) Mácula
  - (B) Pústula
  - (C) Erosão
  - (D) Pápula
  - (E) Escama



- 34** A impactação distoangular com relação de classe III com o ramo e profundidade classe C é:
- (A) Difícil de remover
  - (B) Devemos remover somente com osteotomia
  - (C) Sempre de fácil remoção
  - (D) Não há indicação de remoção
  - (E) Depende do paciente
- 35** Num acidente cirúrgico como abração do lábio por instrumento rotatório devemos manter a ferida:
- (A) Coberta com corticosteróide
  - (B) Somente lavar com soro fisiológico frequentemente
  - (C) Coberta com antiinflamatório não esteróide
  - (D) Untar o lábio com vaselina
  - (E) Cobrir com pomada antibiótica
- 36** São prevenções de lesão ao nervo em cirurgia bucal
- (A) Ter conhecimento da anatomia do nervo na área cirúrgica
  - (B) Evitar excesso de anestésico
  - (C) Evitar incisões ou afetar o periosteio na área do nervo
  - (D) Não usar derivados de cefalotina
  - (E) Não usar instrumentos rotatório
- 37** Em extrações múltiplas sequenciais os dentes superiores devem ser extraídos:
- (A) Primeiramente
  - (B) Depois dos inferiores
  - (C) Intercalados
  - (D) Não faz diferença
  - (E) Sempre os inferiores primeiros
- 38** O germe do 3º molar pode ser radiograficamente visualizado a que idade?
- (A) Aos 12 anos de idade
  - (B) Aos 8 anos de idade
  - (C) Aos 6 anos de idade
  - (D) Aos 4 anos de idade
  - (E) Aos 5 anos de idade
- 39** A impactação mesioangular é geralmente:
- (A) Distante do 2º molar
  - (B) Próxima ao 2º molar
  - (C) Próxima ao 2º molar mais a coroa para o ângulo mandibular
  - (D) Próxima ao 2º molar mas para vestibular
  - (E) Próxima ao 2º molar mas lingualmente
- 40** Se há uma fratura de mandíbula na área do 3º molar impactado o dente pode ser:
- (A) Mantido
  - (B) Removido
  - (C) Removido antes da redução da fratura
  - (D) Indiferente
  - (E) Nunca remover

