

Prezado(a) candidato(a):

Assine e coloque seu número de inscrição no quadro abaixo. Preencha, com traços firmes, o espaço reservado a cada opção na folha de resposta.

Nº de Inscrição

Nome

ASSINALE A RESPOSTA CORRETA.

**PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS -
Núcleo comum**

QUESTÃO 01

Sobre o nervo laríngeo recorrente, é **CORRETO** afirmar:

- a) À esquerda o nervo contorna a crista da aorta e retorna à região cervical.
- b) As lesões mais comuns ocorrem quando o nervo relaciona-se com a artéria tireoidiana superior.
- c) À direita o nervo contorna o tronco da artéria pulmonar para retornar à região cervical.
- d) Em seu trajeto cervical descendente, acompanha as fibras do nervo acessório.

QUESTÃO 02

A tireóide lateral aberrante consiste de:

- a) Lateralização dos lobos tireoidianos decorrente de alteração na migração descendente da glândula durante o desenvolvimento embrionário.
- b) Ectopia glandular por agenesia do istmo.
- c) Bócio colóide multinodular.
- d) Metástase ganglionar de tumor tireoidiano.

QUESTÃO 03

Em um paciente politraumatizado, sua avaliação inicial deve seguir uma rotina determinada pelas cinco primeiras letras do alfabeto. Na letra A, incluímos:

- a) A respiração.
- b) A avaliação do aparelho cardiovascular.
- c) As vias aéreas e a coluna cervical.
- d) A avaliação de lesões cutâneas com sangramento.

QUESTÃO 04

No pós-operatório de tireoidectomia total, a hipocalcemia é indicativa de:

- a) Fome óssea pelo cálcio em pacientes com osteopenia.
- b) Excreção urinária de cálcio induzida por elevação do paratormônio.
- c) Hemodiluição causada pelo mixedema.
- d) Hipofunção transitória ou definitiva das glândulas Paratireóides.

QUESTÃO 05

Em relação às cefaléias, é **INCORRETO** afirmar:

- a) O eletroencefalograma no diagnóstico de doenças que causam cefaléia pode ser desprezado.
- b) A arteriografia é um exame sempre solicitado e necessário nos quadros de enxaqueca clássica.
- c) As radiografias de crânio são raramente úteis, podendo também ser desprezadas.
- d) A punção lombar diagnóstica deve ser efetuada em presença de casos agudos acompanhados de febre.

QUESTÃO 06

Em relação às febres, é **INCORRETO** afirmar:

- a) É uma elevação da temperatura corporal acima de 37,5° C.
- b) É comum que os pacientes febris apresentem dor e sensibilidade à palpação em áreas de lesões.
- c) Em adultos considera-se febre de origem indeterminada como uma afecção com mais de 6 (seis) semanas.
- d) Febre com sudorese noturna ocorre em casos de quadros inflamatórios crônicos.

QUESTÃO 07

São causas de edema, **EXCETO**:

- a) Obstruções no nível da circulação linfática.
- b) Lesões inflamatórias diversas.
- c) Doenças com lesões hepáticas parenquimatosas.
- d) Doenças prostáticas com obstrução urinária.

QUESTÃO 08

Em relação às reações alérgicas graves, é **INCORRETO** afirmar:

- a) Reações anafilatóides são mediadas por IgE.
- b) A anafilaxia é uma reação aguda e generalizada.
- c) A pele é também afetada, sendo a urticária a manifestação mais freqüente.
- d) Podem ocorrer isquemia miocárdica e arritmias ventriculares.

QUESTÃO 09

CPS, 24 anos, nuligesta, vida sexual ativa com uso irregular de anticoncepcional oral de ultra-baixa dose, relatando atraso menstrual de 20 dias. Em relação ao diagnóstico de gravidez, neste caso, é **CORRETO** afirmar:

- a) Será possível com dosagem de beta-hCG no soro, que se torna positivo mesmo antes de a paciente perceber o atraso menstrual.
- b) Somente será possível com o auxílio da ultra-sonografia pélvica transabdominal que identifica o saco gestacional e o embrião precocemente (3/4 semanas).
- c) É preciso esperar 30 dias de atraso menstrual para que o citotrofoblasto comece a produzir o hCG em quantidades detectáveis.
- d) O índice de falso positivo do beta-hCG é alto em pacientes usuárias de anticoncepcional oral.

QUESTÃO 10

São medicamentos que contra-indicam o aleitamento materno:

- a) Ergotamina, contraceptivos hormonais combinados e propranolol.
- b) Androgênios, sulfonamidas, hipoglicemiantes orais e metronidazol.
- c) Amiodarona, brometos, tetraciclina e antitireoideanos (exceto propiltiuracil).
- d) Antimetabólitos, esteróides, diuréticos e preparações radioativas.

QUESTÃO 11

Em relação ao uso dos contraceptivos hormonais combinados orais é **CORRETO** afirmar que:

- a) A propedêutica básica antes de se prescrever um contraceptivo hormonal deve incluir uma ecografia pélvica, exclusão de trombofilias, citologia oncológica e perfil lipídico.
- b) Estão contra-indicados em casos de distúrbios tromboembólicos, insuficiência hepática, tabagistas acima de 35 anos, suspeita de gravidez, sangramento genital não-diagnosticado e câncer de mama.
- c) Os efeitos colaterais do seu componente estrogênico incluem: aumento do peso, redução da libido, fadiga, depressão, pele oleosa, hirsutismo, acne e aumento da incidência de doença inflamatória pélvica.
- d) Antibióticos como a rifampicina e griseofulvina tem sua eficácia reduzida pelos anticoncepcionais orais enquanto anticonvulsivantes e psicotrópicos têm sua ação potencializada pelos mesmos.

QUESTÃO 12

Em uma mulher cujos ciclos são anovulatórios, qual dos fenômenos abaixo **NÃO** está ocorrendo?

- a) Recrutamento e seleção do folículo dominante sob ação do hormônio folículo estimulante.
- b) Síntese estrogênica acompanhada de reconstrução e crescimento do endométrio, principalmente da sua camada funcional.
- c) Síntese estrogênica pelo folículo em desenvolvimento e conseqüente transformação secretora do endométrio.
- d) Reinício da meiose do oócito, liberação do 1º corpúsculo polar e transformação secretora do endométrio.

QUESTÃO 13

São considerações verdadeiras a respeito da asma brônquica, **EXCETO**.

- a) Os achados radiológicos na crise aguda são infiltrado intersticial peri-brônquico, hiperinsuflação pulmonar, excepcionalmente atelectasias.
- b) O tratamento da asma objetiva-se diminuir ou eliminar fatores desencadeantes, controlar completamente os sintomas, permitir prática de esportes e evitar hospitalizações.
- c) Antígenos alimentares quase sempre desencadeiam crises.
- d) O tratamento inicial da crise deve ser feito primeiramente com broncodilatador.

QUESTÃO 14

Sobre a infecção do trato urinário é correto afirmar, **EXCETO**:

- a) O coletor urinário deve ser trocado e a higiene refeita a cada 30 minutos até a criança urinar.
- b) O quadro clínico pode variar desde uma bacteriúria assintomática até um quadro grave de pielonefrite associada a sepse.
- c) A bacteriúria assintomática deve ser necessariamente tratada.
- d) Recomenda-se repetir a cultura de urina uma semana após a interrupção do tratamento.

QUESTÃO 15

São causas de insuficiência cardíaca por sobrecarga de pressão, **EXCETO**:

- a) Estenose aórtica.
- b) Comunicação interventricular.
- c) Hipertensão pulmonar.
- d) Coarctação de aorta.

QUESTÃO 16

Sobre a obesidade é correto afirmar, **EXCETO**:

- a) Os principais fatores de risco são: história familiar, sedentarismo, raça branca, mãe obesa e nível sócio econômico mais alto.
- b) A forma mais correta de avaliar a obesidade é pelo índice de massa corporal.
- c) A obesidade secundária é causada por exemplo pelo hipotireoidismo, ovário policístico e síndrome de Prader Willi.
- d) Uma dieta saudável tem em torno de 30% de calorias sob a forma de carboidratos complexos ou secundários.

QUESTÃO 17

Considere os conceitos abaixo, utilizados em Saúde Pública:

- I- Caso autóctone é aquele de doença que teve origem dentro dos limites geográficos de referência ou sob investigação.
- II- Caso confirmado é aquele de pessoa de quem foi isolado e identificado o agente etiológico ou de quem foram obtidas outras evidências laboratoriais da presença do agente etiológico; condicionado às regras estabelecidas pelo Ministério da Saúde.
- III- Caso secundário é o caso de uma doença transmissível, irrelevante para controle epidemiológico.
- IV- Caso-índice de uma determinada doença é o primeiro entre vários de natureza similar e epidemiologicamente relacionados.

São **CORRETAS** as afirmativas:

- a) I, II e IV somente.
- b) I, II, III e IV.
- c) I e II somente.
- d) II, III e IV somente.

QUESTÃO 18

Em relação à Dengue Clássica, podemos afirmar, **EXCETO**:

- a) A transmissão se faz pela picada da fêmea do mosquito *Aedes aegypti* e/ou por contato direto de um doente ou de suas secreções com uma pessoa sadia.
- b) O diagnóstico é clínico e laboratorial nos primeiros casos e em seguida clínico-epidemiológico.
- c) Deve-se estabelecer o diagnóstico diferencial com gripe, rubéola e sarampo.
- d) Como medida de controle, devem-se manter ações continuadas de inspeções domiciliares, eliminação e tratamento de criadouros, com atividades de educação em saúde e mobilização social.

QUESTÃO 19

São doenças de notificação compulsória, em todo o território nacional, **EXCETO**:

- a) Febre reumática.
- b) Sarampo.
- c) Hanseníase.
- d) Poliomielite.

QUESTÃO 20

O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS - conforme a Portaria/GM nº 399/06. Os estados/regiões/municípios devem ter as seguintes prioridades pactuadas, **EXCETO**:

- a) Investimento no sistema hospitalar, aumentando a oferta de leitos hospitalares e de Unidades de Tratamento Intensivo.
- b) Redução da Mortalidade infantil e materna.
- c) Controle do câncer de colo de útero e da mama.
- d) Fortalecimento da atenção básica.

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Alergia e Imunologia

QUESTÃO 21

Qual das frases abaixo melhor define a marcha atópica?

- a) Seqüência de doenças alérgicas que obrigatoriamente segue a seguinte evolução: alergia alimentar, dermatite atópica, rinite e asma.
- b) Seqüência de doenças alérgicas que inclui asma, rinite, urticária e dermatite atópica.
- c) Seqüência de progressão de sinais clínicos de dermatite atópica, asma e rinite, com predominância de alguns sintomas mais do que outros.
- d) Seqüência de doenças alérgicas em que a doença inicial vai determinar o aparecimento de outras patologias alérgicas.

QUESTÃO 22

No lactente sibilante recorrente, prematuro, que recebeu aleitamento materno por apenas um mês, sem agravo pondero-estatural, qual a principal hipótese etiológica?

- a) Hiperreatividade brônquica.
- b) Doença do refluxo gastro-esofágico.
- c) Alergia ao leite de vaca.
- d) Asma brônquica.

QUESTÃO 23

Lactente sibilante que necessita receber corticoterapia inalatória: qual a melhor droga?

- a) Beclometasona com espaçador.
- b) Budesonida por nebulizador.
- c) Beclometasona por nebulizador.
- d) Budesonida com espaçador.

QUESTÃO 24

Com relação a Dermatite Atópica, podemos afirmar que:

- a) É um importante fator de risco ao desenvolvimento de alergia alimentar.
- b) É um importante fator de risco ao desenvolvimento de outras atopias, mas devemos considerar os níveis de IgE.
- c) Seu tratamento pode minimizar a prevalência de asma em crianças sensibilizadas a alimentos.
- d) A utilização de corticosteróides tópicos coíbe o processo inflamatório e minimiza a chance do desenvolvimento de asma.

QUESTÃO 25

Antagonistas dos leucotrienos pode ser a primeira escolha terapêutica em:

- a) No tratamento de lactentes sibilantes intermitentes.
- b) No tratamento de lactentes sibilantes com desencadeantes virais.
- c) No tratamento de lactentes sibilantes com chiado persistente.
- d) No tratamento de lactentes sibilantes com DRGE.

QUESTÃO 26

Em um paciente com reação anafilática grave caracterizada por urticárias, edema labial e palpebral, dispnéia, aperto no tórax e dificuldade pra deglutir, a pressão e o pulso estão normais. Qual das medicações abaixo pode atuar nos diversos aspectos da reação acima caracterizada e seria a primeira escolha:

- a) corticóide intravenoso.
- b) anti-histamínico intramuscular.
- c) salbutamol em nebulímetro.
- d) adrenalina intramuscular.

QUESTÃO 27

Paciente adulto com episódios recorrentes de angioedema hereditário acometendo face e pescoço: o tratamento profilático **mais recomendado** seria

- a) androgênio atenuado (danazol).
- b) plasma fresco congelado.
- c) concentrado de C1-INH purificado em doses diárias.
- d) Corticosteróides.

QUESTÃO 28

Os corticosteróides agem na reversão do remodelamento que ocorre na asma brônquica do seguinte modo, **EXCETO**:

- a) reduzindo o infiltrado celular.
- b) melhorando a morfologia epitelial.
- c) diminuindo a produção de colágeno.
- d) melhorando a reatividade brônquica.

QUESTÃO 29

Na dermatite atópica grave, em relação à corticoterapia sistêmica, assinale a resposta **CORRETA**:

- a) A via intramuscular apresenta menos efeitos colaterais que a oral.
- b) O uso crônico dos corticosteróides sistêmicos reduz a gravidade da doença em longo prazo.
- c) O efeito rebote somente ocorre nos casos que a dose ultrapassa 1 mg/Kg/dia de prednisona.
- d) Não há estudos sistematizados que avaliem a eficácia da corticoterapia no tratamento da dermatite atópica grave.

QUESTÃO 30

Nas alergias, o hemograma pode ser útil para:

- a) Fazer o diagnóstico de alergia alimentar em pacientes com anemia.
- b) Facilitar o diagnóstico em pacientes com eosinofilia acima de 500 cel/mm³.
- c) Avaliar a evolução da doença alérgica monitorando o nível de eosinófilos.
- d) Fazer o diagnóstico avaliando os linfócitos e os leucócitos

QUESTÃO 31

A pesquisa de IgE total pode ser útil para:

- a) Estabelecer a gravidade da dermatite atópica.
- b) Monitorar a evolução dos pacientes com alergia alimentar.
- c) Avaliar a evolução do tratamento da rinite alérgica ou asma brônquica.
- d) Fazer diagnóstico diferencial com parasitoses intestinais.

QUESTÃO 32

Em relação aos anticorpos monoclonais humanizados, assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) Adalimumabe, Alemtuzumabe, Omalizumabe, Trastuzumabe são anticorpos humanizados.
- b) Devido à humanização do anticorpo, a ação é mais específica .
- c) Devido a que apenas 5% do anticorpo monoclonal humanizado ser murínico as reações graves não devem ocorrer.
- d) O Omalizumabe é um anticorpo anti-IgE humanizado e portanto pode ser usado no tratamento das helmintíases com grande aumento de IgE.

QUESTÃO 33

Em relação a um paciente asmático com suspeita de aparecimento de RGE, assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) RGE é raramente encontrado em asmáticos.
- b) RGE pode ser secundário ao uso de altas doses de corticosteróides inalados.
- c) Ainda não está claro se o tratamento do RGE melhora a asma.
- d) A RGE pode ser facilmente diagnosticada pela prova terapêutica com os bloqueadores da bomba de prótons.

QUESTÃO 34

Na asma persistente grave de um adulto, qual dos tratamentos abaixo está **corretamente indicado**?

- a) Beclometasona inalada na dose de 500mcg/dia associada à agente β_2 agonista de longa duração.
- b) Antagonista de receptor de leucotrieno associado à agente β_2 agonista de longa duração.
- c) Corticosteróide inalado em altas doses associado a β_2 agonista de longa duração.
- d) Teofilina de liberação lenta associada a agente β_2 agonista de longa duração.

QUESTÃO 35

Em relação à realização de um teste de puntura, assinale a afirmativa **CORRETA**:

- a) Suspender anti-histamínicos por 24 horas antes do teste.
- b) Verificar se o paciente está usando antidepressivos que podem interferir na reatividade do teste.
- c) Suspender corticosteróides pelo menos 7 dias antes do teste.
- d) Retardar o teste para 7 dias após término de antibiótico em uso.

QUESTÃO 36

O anticorpo monoclonal Omalizumabe (anti-IgE) **está indicado** em qual situação?

- a) Asma persistente grave, alérgica, com IgE total de 600 UI/ml.
- b) Asma persistente grave e com IgE total acima de 1.600 UI/ml.
- c) Asma persistente moderada a grave que não tem parasitose intestinal associada.
- d) Asma persistente grave associada à DPOC.

QUESTÃO 37

Assinale a resposta **CORRETA** em relação aos linfócitos B circulantes:

- a) representam 30 – 40% do total dos linfócitos circulantes no sangue.
- b) representam 50 – 60% do total dos linfócitos circulantes do sangue.
- c) representam 10 - 20% do total dos linfócitos circulantes no sangue.
- d) representam 70 – 80% do total dos linfócitos circulantes do sangue.

QUESTÃO 38

Paciente com história anterior de alergia a medicamento solicita avaliação e orientação. Na anamnese, não são detectados sinais de outras alergias. A **melhor conduta** a ser tomada é:

- a) Ampliar a anamnese e orientar quanto à possível reação adversa a medicamentos.
- b) Avaliar sua sensibilização mediante testes cutâneos de puntura para medicamentos.
- c) Realizar amplo screening de alergia, pois o paciente apresenta antecedentes familiares de atopia.
- d) Orientar o paciente de que nada pode ser feito no momento.

QUESTÃO 39

Com relação ao teste de contato, é **CORRETO** afirmar que:

- a) A primeira leitura deve ser realizada em 24 horas após o teste e a segunda leitura após 36 horas do teste.
- b) Além de usar a Bateria Padrão Brasileira com 30 substâncias, muitas vezes é necessário utilizar substâncias trazidas pelo paciente como de uso comum.
- c) Após a retirada do teste, o paciente deve ser orientado para lavar o local com sabonete anti-séptico.
- d) Havendo exposição ao sol durante o tempo de realização do teste, pode-se dispensar a 2ª leitura.

QUESTÃO 40

Na avaliação diagnóstica de paciente com suspeita de rinite alérgica, qual dos exames é o mais importante?

- a) Dosagem da IgE total.
- b) Rinomanometria.
- c) Tomografia computadorizada de face.
- d) Dosagem das IgEs específicas.

QUESTÃO 41

Na reação de hipersensibilidade do tipo IV, qual dos seguintes mediadores de origem linfocitária é o mais importante para recrutamento de células mononucleares fagocíticas?

- a) IL-4.
- b) IL-3.
- c) IL-1.
- d) INF- γ .

QUESTÃO 42

Com relação à broncoprovocação específica, podemos afirmar que:

- a) Trata-se de exame factível de ser realizado no consultório em 30 minutos.
- b) Trata-se exame indispensável para diagnóstico de asma.
- c) Trata-se exame indispensável ao diagnóstico de asma ocupacional.
- d) Trata-se de exame importante no monitoramento do tratamento da asma.

QUESTÃO 43

Na produção de anticorpos IgE específicos, quais das seguintes células são importantes para que o organismo se sensibilize contra um antígeno?

- a) linfócito T CD3+ CD4+ com fenótipo Th1.
- b) linfócito T CD3+ CD4+ com fenótipo Th2.
- c) linfócito T CD3+ CD8+ com fenótipo Th2.
- d) linfócito T CD3+ CD8+ com fenótipo Th1.

QUESTÃO 44

Em relação ao teste de provocação oral duplo cego placebo controlado, podemos afirmar que:

- a) É considerado o procedimento indispensável para o diagnóstico de alergia alimentar.
- b) É considerado procedimento dispensável para o diagnóstico de alergia alimentar quando os testes de puntura já foram positivos para os alimentos considerados.
- c) Os alimentos a serem testados devem ser apresentados na forma liofilizada a ser diluída na hora do exame.
- d) Pacientes com história de anafilaxia não devem ser considerados para o exame em nenhuma circunstância.

QUESTÃO 45

A ação dos probióticos no tratamento da alergia alimentar decorre principalmente de:

- a) Indução do estado de anergia.
- b) Aumento de citocinas IL-4, IL-5, IL-10.
- c) Indução de tolerância oral.
- d) Proliferação dos linfócitos B.

QUESTÃO 46

Assinale a afirmação **CORRETA** em relação ao refluxo gastro-esofágico:

- a) O secundário decorre de dismotilidade devido a distúrbios sistêmicos, fatores mecânicos, alergias alimentares, etc.
- b) O secundário de um modo geral desaparece após os 2 anos de vida.
- c) O primário, também conhecido como fisiológico, desaparece após os 4 meses de vida.
- d) O secundário raramente se associa a asma brônquica.

QUESTÃO 47

No Brasil, a prevalência de rinite alérgica no último ano em adolescentes situa-se entre:

- a) 30-40%.
- b) 10-15%.
- c) 50 -60%.
- d) 60-80%.

QUESTÃO 48

Assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) Pacientes que têm asma e rinite têm igual número de exacerbações e internamentos do que pacientes apenas com asma.
- b) A presença de rinite não afeta a probabilidade do individuo vir a ter asma.
- c) A presença de rinite alérgica não agrava a asma.
- d) Pacientes que têm asma e rinite têm um maior número de exacerbações e internamentos do que pacientes apenas com asma.

QUESTÃO 49

Assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) Em pacientes com rinite alérgica, deve ser solicitada, de rotina, a radiografia de seios de face.
- b) Em pacientes com rinite alérgica, a presença de espessamento mucoso dos antros maxilares acima de 1 cm na radiografia dos seios da face é indicativa da necessidade de tratamento com antibióticos.
- c) A rinosinusite crônica é fator de agravamento de asma.
- d) A rinite alérgica não é indicativo como fator de agravamento de asma.

QUESTÃO 50

Na evidência de um diagnóstico de rinite vasomotora e não-alérgica, qual dos seguintes tratamentos médicos é o **mais eficaz**?

- a) Descongestionantes orais.
- b) Anticolinérgicos tópicos.
- c) Vasoconstrictores tópicos.
- d) Corticóides tópicos.

QUESTÃO 51

Assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) A imunoterapia sublingual, com extrato de boa concentração e por três anos, é capaz de reduzir o surgimento de asma em pacientes com rinite alérgica.
- b) A imunoterapia sublingual não contribui para reduzir o surgimento de asma em pacientes com rinite alérgica.
- c) Não devemos realizar imunoterapia sublingual em pacientes com rinite alérgica.
- d) A imunoterapia é mandatória em pacientes com rinite alérgica que apresentam asma.

QUESTÃO 52

Diante de um quadro clínico de paciente com tosse crônica e hiperreatividade brônquica, assinalada nas provas de função pulmonar, qual dos seguintes fármacos antihipertensivos pode ser indutor deste quadro:

- a) Furosemida (diurético).
- b) Atenolol (β bloqueador).
- c) Clonidina (inibidor alfa agonista).
- d) Atensina (bloqueador ganglionar).

QUESTÃO 53

Qual das seguintes provas diagnósticas seria a **mais confiável** ante a suspeita de refluxo gastroesofágico em um paciente asmático?

- a) PH-metria.
- b) Manometria.
- c) Endoscopia.
- d) Radiografia com contraste iodado .

QUESTÃO 54

Segundo o GINA 2008, qual dos tratamentos seguintes é considerado o mais acertado para um paciente de 12 anos de idade que sofre de crises leves, com frequência de 1 vez por semana e sem sintomas noturnos?

- a) β_2 inalados de longa duração como tratamento de manutenção para se evitar as crises.
- b) Corticosteróides inalados em baixa dose e β_2 inalados de curta duração de acordo com a necessidade.
- c) β_2 orais de curta duração de acordo com a necessidade e antileucotrienos como tratamento de manutenção.
- d) β_2 inalados de curta duração de acordo com a necessidade.

QUESTÃO 55

Qual dos seguintes grupos terapêuticos tem sido demonstrado padrão ouro de tratamento na asma brônquica em adolescentes?

- a) Broncodilatadores β_2 inalados de longa duração.
- b) inibidores dos leucotrienos.
- c) Corticosteróides inalados.
- d) Teofilinas de ação prolongada.

QUESTÃO 56

Na asma do lactente, qual dos fatores abaixo é o mais importante desencadeador de crises?

- a) infecções virais.
- b) alérgenos alimentares.
- c) tabagismo passivo.
- d) alérgenos ambientais.

QUESTÃO 57

Na Síndrome de DiGeorge de imunodeficiência, qual tem sido observado como o tratamento mais eficaz?

- a) Uso de imunoglobulina intravenosa.
- b) Uso de anti-TNF.
- c) Transplante de timo.
- d) Fator estimulador de crescimento de granulócitos (G-CSF).

QUESTÃO 58

Em relação ao teste de provocação com metacolina, assinale a resposta **CORRETA**:

- a) É um teste extremamente específico, porém com sensibilidade apenas razoável para o diagnóstico de asma.
- b) Quanto maior for a PC20, maior o grau de reatividade brônquica.
- c) Está indicada em pacientes com suspeita clínica de asma, mas com espirometria normal.
- d) Não é indicado em asmáticos que apresentam rinite alérgica, pois esta também influi no grau de reatividade brônquica.

QUESTÃO 59

A administração de corticosteróide oral contínuo para asmáticos graves, preferencialmente, deve seguir à recomendação:

- a) Dose única matinal, administrados com leite.
- b) Uso de formulações de vida média prolongada com a menor dose capaz de controlar os sintomas.
- c) Uso de formulações de depósito uma vez ao mês.
- d) Uso em dias alternados e de formulações de vida média intermediária.

QUESTÃO 60

Em relação aos extratos alergênicos usados nos testes epicutâneos, assinale a afirmativa **CORRETA**:

- a) Os ideais são preparados a partir de toxinas e carboidratos.
- b) Sua qualidade e vida média depende da padronização do extrato, de sua preparação e do armazenamento.
- c) São preparados a partir de toxinas ou substâncias de pH muito ácido.
- d) Depois de preparados são muito estáveis.

QUESTÃO 61

Menino de 13 anos é internado com septicemia. A tentativa de usar penicilina endovenosa é impedida pela informação da mãe de que o mesmo apresentara reação anafilática aos 4 anos ao receber aplicação de penicilina intramuscular para tratar de amigdalite. Qual das alternativas abaixo é a **mais adequada** em relação ao caso?

- a) O teste com penicilina G está relacionado às reações anafiláticas
- b) O paciente pode receber penicilina porque a reação ocorreu há mais de 5 anos.
- c) O teste cutâneo negativo exclui a possibilidade de reação anafilática.
- d) O paciente deve ser submetido ao teste com PPL a fim de prevenir reação anafilática.

QUESTÃO 62

Selecione a citocina que não é produzida por células T regulatórias:

- a) IL-10.
- b) Interferon- γ .
- c) IL-8
- d) TGF- β .

QUESTÃO 63

Em uma criança com menos de 5 anos e com asma leve intermitente qual seria a terapia a se instituir?

- a) corticóide inalado em uso contínuo.
- b) corticóide inalado de acordo com as crises.
- c) agonista adrenérgico de longa duração associado ao corticóide inalado e em uso prolongado.
- d) agonista adrenérgico inalado de acordo com as crises.

QUESTÃO 64

O componente do sistema do complemento que se encontra reduzido na maioria dos casos de angioedema hereditário, e cuja dosagem é considerada o exame de triagem desta condição é:

- a) C3a.
- b) C4.
- c) C5a.
- d) C2.

QUESTÃO 65

Assinale a resposta **CORRETA**:

- a) O eczema de estase é uma doença crônica das pernas causadas pela estase venosa na qual, inicialmente surgem edema e dermatite ocre e, posteriormente, ocorre eczema secretante, que pela coçadura torna-se liquenificado.
- b) O eczema desidrótico é uma erupção aguda e recorrente que acomete as palmas, plantas e, principalmente o tórax, caracterizando-se por lesões vesiculosas, isoladas ou confluentes.
- c) Liquenificação é uma atrofia da pele, com sulcos, descamação seca e, às vezes, escoriações. Caracteriza-se por 2 elementos fundamentais, prurido intenso e hiperplasia da epiderme.
- d) O eczema atópico infantil se caracteriza por lesões eczematosas acometendo principalmente as superfícies extensoras.

QUESTÃO 66

Em um episódio de urticária aguda, qual dos órgãos internos poderá estar mais freqüentemente afetado?

- a) trato respiratório superior.
- b) gênito-urinário.
- c) fígado.
- d) trato respiratório inferior.

QUESTÃO 67

Qual é o fármaco de eleição para se tratar uma crise de urticária aguda por medicamento:

- a) corticóide tópico.
- b) corticóide oral.
- c) anti-histamínico oral .
- d) anti-histamínico tópico.

QUESTÃO 68

Assinale a afirmação **INCORRETA** em relação à asma brônquica em gestante:

- a) A asma pode piorar durante a gestação.
- b) a asma pode melhorar durante a gestação.
- c) A asma vai se estabilizar durante toda a gestação.
- d) O risco de sofrer conseqüências adversas por medicação antiasmática é menor do que o produzido por sofrer crises de asma mal controlada.

QUESTÃO 69

Para um paciente portador de asma por exercício e que pratica esportes ocasionalmente, qual seria o medicamento de escolha?

- a) corticóide inalado em tratamento prolongado.
- b) aminofilina antes do exercício.
- c) salbutamol inalado antes do exercício
- d) brometo de ipatrópio antes do exercício.

QUESTÃO 70

Na dermatite atópica relacionada a IgE, qual seria o tratamento medicamentoso inicial de escolha?

- a) Anti-histamínico oral de uso prolongado.
- b) Corticóide tópico de uso prolongado.
- c) Corticóide de depósito.
- d) Inibidores da calcineurina tópico até o controle das lesões.

ATENÇÃO:

COM SUA LETRA HABITUAL, TRANSCREVA, PARA O ESPAÇO RESERVADO PELA COMISSÃO, NA FOLHA DE RESPOSTAS, A SEGUINTE FRASE:

"A crescente incorporação de tecnologia médica e as novas demandas sociais têm estimulado crescente debate filosófico em torno de problemas de ética prática que não mais encontram respostas no âmbito do modelo ético hipocrático."

Baseado no *Abstract* de:
ALMEIDA, José Luiz Telles de and SCHRAMM, Fermin Roland. Transição paradigmática, metamorfose da ética médica e emergência da bioética. Cad. Saúde Pública [online]. 1999, v. 15, suppl. 1. ISSN 0102-311X - adapt.