

Prezado(a) candidato(a):

Assine e coloque seu número de inscrição no quadro abaixo. Preencha, com traços firmes, o espaço reservado a cada opção na folha de resposta.

Nº de Inscrição

Nome

ASSINALE A RESPOSTA CORRETA.

**PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS -
Núcleo comum**

QUESTÃO 01

Sobre o nervo laríngeo recorrente, é **CORRETO** afirmar:

- a) À esquerda o nervo contorna a crossa da aorta e retorna à região cervical.
- b) As lesões mais comuns ocorrem quando o nervo relaciona-se com a artéria tireoidiana superior.
- c) À direita o nervo contorna o tronco da artéria pulmonar para retornar à região cervical.
- d) Em seu trajeto cervical descendente, acompanha as fibras do nervo acessório.

QUESTÃO 02

A tireóide lateral aberrante consiste de:

- a) Lateralização dos lobos tireoidianos decorrente de alteração na migração descendente da glândula durante o desenvolvimento embrionário.
- b) Ectopia glandular por agenesia do istmo.
- c) Bócio colóide multinodular.
- d) Metástase ganglionar de tumor tireoidiano.

QUESTÃO 03

Em um paciente politraumatizado, sua avaliação inicial deve seguir uma rotina determinada pelas cinco primeiras letras do alfabeto. Na letra A, incluímos:

- a) A respiração.
- b) A avaliação do aparelho cardiovascular.
- c) As vias aéreas e a coluna cervical.
- d) A avaliação de lesões cutâneas com sangramento.

QUESTÃO 04

No pós-operatório de tireoidectomia total, a hipocalcemia é indicativa de:

- a) Fome óssea pelo cálcio em pacientes com osteopenia.
- b) Excreção urinária de cálcio induzida por elevação do paratormônio.
- c) Hemodiluição causada pelo mixedema.
- d) Hipofunção transitória ou definitiva das glândulas Paratireóides.

QUESTÃO 05

Em relação às cefaléias, é **INCORRETO** afirmar:

- a) O eletroencefalograma no diagnóstico de doenças que causam cefaléia pode ser desprezado.
- b) A arteriografia é um exame sempre solicitado e necessário nos quadros de enxaqueca clássica.
- c) As radiografias de crânio são raramente úteis, podendo também ser desprezadas.
- d) A punção lombar diagnóstica deve ser efetuada em presença de casos agudos acompanhados de febre.

QUESTÃO 06

Em relação às febres, é **INCORRETO** afirmar:

- a) É uma elevação da temperatura corporal acima de 37,5° C.
- b) É comum que os pacientes febris apresentem dor e sensibilidade à palpação em áreas de lesões.
- c) Em adultos considera-se febre de origem indeterminada como uma afecção com mais de 6 (seis) semanas.
- d) Febre com sudorese noturna ocorre em casos de quadros inflamatórios crônicos.

QUESTÃO 07

São causas de edema, **EXCETO**:

- a) Obstruções no nível da circulação linfática.
- b) Lesões inflamatórias diversas.
- c) Doenças com lesões hepáticas parenquimatosas.

d) Doenças prostáticas com obstrução urinária.

QUESTÃO 08

Em relação às reações alérgicas graves, é **INCORRETO** afirmar:

- a) Reações anafilactóides são mediadas por IgE.
- b) A anafilaxia é uma reação aguda e generalizada.
- c) A pele é também afetada, sendo a urticária a manifestação mais freqüente.
- d) Podem ocorrer isquemia miocárdica e arritmias ventriculares.

QUESTÃO 09

CPS, 24 anos, nuligesta, vida sexual ativa com uso irregular de anticoncepcional oral de ultra-baixa dose, relatando atraso menstrual de 20 dias. Em relação ao diagnóstico de gravidez, neste caso, é **CORRETO** afirmar:

- a) Será possível com dosagem de beta-hCG no soro, que se torna positivo mesmo antes de a paciente perceber o atraso menstrual.
- b) Somente será possível com o auxílio da ultra-sonografia pélvica transabdominal que identifica o saco gestacional e o embrião precocemente (3/4 semanas).
- c) É preciso esperar 30 dias de atraso menstrual para que o citotrofoblasto comece a produzir o hCG em quantidades detectáveis.
- d) O índice de falso positivo do beta-hCG é alto em pacientes usuárias de anticoncepcional oral.

QUESTÃO 10

São medicamentos que contra-indicam o aleitamento materno:

- a) Ergotamina, contraceptivos hormonais combinados e propranolol.
- b) Androgênios, sulfonamidas, hipoglicemiantes orais e metronidazol.
- c) Amiodarona, brometos, tetraciclina e antitireoideanos (exceto propiltiuracil).
- d) Antimetabólitos, esteróides, diuréticos e preparações radioativas.

QUESTÃO 11

Em relação ao uso dos contraceptivos hormonais combinados orais é **CORRETO** afirmar que:

- a) A propedêutica básica antes de se prescrever um contraceptivo hormonal deve incluir uma ecografia pélvica, exclusão de trombofilias, citologia oncológica e perfil lipídico.
- b) Estão contra-indicados em casos de distúrbios tromboembólicos, insuficiência hepática, tabagistas acima de 35 anos, suspeita de gravidez, sangramento genital não-diagnosticado e câncer de mama.
- c) Os efeitos colaterais do seu componente estrogênico incluem: aumento do peso, redução da libido, fadiga, depressão, pele oleosa, hirsutismo, acne e aumento da incidência de doença inflamatória pélvica.
- d) Antibióticos como a rifampicina e griseofulvina tem sua eficácia reduzida pelos anticoncepcionais orais enquanto anticonvulsivantes e psicotrópicos têm sua ação potencializada pelos mesmos.

QUESTÃO 12

Em uma mulher cujos ciclos são anovulatórios, qual dos fenômenos abaixo **NÃO** está ocorrendo?

- a) Recrutamento e seleção do folículo dominante sob ação do hormônio folículo estimulante.
- b) Síntese estrogênica acompanhada de reconstrução e crescimento do endométrio, principalmente da sua camada funcional.
- c) Síntese estrogênica pelo folículo em desenvolvimento e conseqüente transformação secretora do endométrio.
- d) Reinício da meiose do oócito, liberação do 1º corpúsculo polar e transformação secretora do endométrio.

QUESTÃO 13

São considerações verdadeiras a respeito da asma brônquica, **EXCETO**.

- a) Os achados radiológicos na crise aguda são infiltrado intersticial peri-brônquico, hiperinsuflação pulmonar, excepcionalmente atelectasias.
- b) O tratamento da asma objetiva-se diminuir ou eliminar fatores desencadeantes, controlar completamente os sintomas, permitir prática de esportes e evitar hospitalizações.
- c) Antígenos alimentares quase sempre desencadeiam crises.
- d) O tratamento inicial da crise deve ser feito primeiramente com broncodilatador.

QUESTÃO 14

Sobre a infecção do trato urinário é correto afirmar, **EXCETO**:

- a) O coletor urinário deve ser trocado e a higiene refeita a cada 30 minutos até a criança urinar.
- b) O quadro clínico pode variar desde uma bacteriúria assintomática até um quadro grave de pielonefrite associada a sepse.
- c) A bacteriúria assintomática deve ser necessariamente tratada.
- d) Recomenda-se repetir a cultura de urina uma semana após a interrupção do tratamento.

QUESTÃO 15

São causas de insuficiência cardíaca por sobrecarga de pressão, **EXCETO**:

- a) Estenose aórtica.
- b) Comunicação interventricular.
- c) Hipertensão pulmonar.
- d) Coarctação de aorta.

QUESTÃO 16

Sobre a obesidade é correto afirmar, **EXCETO**:

- a) Os principais fatores de risco são: história familiar, sedentarismo, raça branca, mãe obesa e nível sócio econômico mais alto.
- b) A forma mais correta de avaliar a obesidade é pelo índice de massa corporal.
- c) A obesidade secundária é causada por exemplo pelo hipotireoidismo, ovário policístico e síndrome de Prader Willi.
- d) Uma dieta saudável tem em torno de 30% de calorias sob a forma de carboidratos complexos ou secundários.

QUESTÃO 17

Considere os conceitos abaixo, utilizados em Saúde Pública:

- I- Caso autóctone é aquele de doença que teve origem dentro dos limites geográficos de referência ou sob investigação.
- II- Caso confirmado é aquele de pessoa de quem foi isolado e identificado o agente etiológico ou de quem foram obtidas outras evidências laboratoriais da presença do agente etiológico; condicionado às regras estabelecidas pelo Ministério da Saúde.
- III- Caso secundário é o caso de uma doença transmissível, irrelevante para controle epidemiológico.
- IV- Caso-índice de uma determinada doença é o primeiro entre vários de natureza similar e epidemiologicamente relacionados.

São **CORRETAS** as afirmativas:

- a) I, II e IV somente.
- b) I, II, III e IV.
- c) I e II somente.
- d) II, III e IV somente.

QUESTÃO 18

Em relação à Dengue Clássica, podemos afirmar, **EXCETO**:

- a) A transmissão se faz pela picada da fêmea do mosquito *Aedes aegypti* e/ou por contato direto de um doente ou de suas secreções com uma pessoa sadia.
- b) O diagnóstico é clínico e laboratorial nos primeiros casos e em seguida clínico-epidemiológico.
- c) Deve-se estabelecer o diagnóstico diferencial com gripe, rubéola e sarampo.
- d) Como medida de controle, devem-se manter ações continuadas de inspeções domiciliares, eliminação e tratamento de criadouros, com atividades de educação em saúde e mobilização social.

QUESTÃO 19

São doenças de notificação compulsória, em todo o território nacional, **EXCETO**:

- a) Febre reumática.
- b) Sarampo.
- c) Hanseníase.
- d) Poliomielite.

QUESTÃO 20

O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS - conforme a Portaria/GM nº 399/06. Os estados/regiões/municípios devem ter as seguintes prioridades pactuadas, **EXCETO**:

- a) Investimento no sistema hospitalar, aumentando a oferta de leitos hospitalares e de Unidades de Tratamento Intensivo.
- b) Redução da Mortalidade infantil e materna.
- c) Controle do câncer de colo de útero e da mama.
- d) Fortalecimento da atenção básica.

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Anestesiologia

QUESTÃO 21

Considerando um paciente anestesiado, com hemograma normal, sob ventilação mecânica controlada e gasometria normal, podemos afirmar que:

- a) duplicando a fração inspirada de O₂ a pO₂ praticamente duplica, mas o conteúdo arterial de oxigênio aumenta em menos de 10%.
- b) duplicando a fração inspirada de O₂ a pO₂ aumenta em cerca de 50% e o conteúdo arterial de oxigênio aumenta na mesma proporção.
- c) duplicando a fração inspirada de O₂ a pO₂ praticamente duplica e o conteúdo arterial de oxigênio também aumenta em cerca de 100%.
- d) duplicando a fração inspirada de O₂ a pO₂ praticamente duplica e o conteúdo arterial de oxigênio aumenta em cerca de 50%.

QUESTÃO 22

A resolução 1802/2006 do CFM estabelece:

- a) O médico anestesiológista que realizar a avaliação pré-anestésica deverá ser o mesmo que administrará a anestesia.
- b) Durante a anestesia, deve ser feita monitoração da circulação, incluindo a determinação da pressão arterial, dos batimentos cardíacos com estetoscópio precordial, e determinação contínua do ritmo cardíaco, incluindo cardioscopia.
- c) Durante a anestesia deve ser feita monitoração contínua da ventilação, incluindo os teores de gás carbônico exalados nas seguintes situações: anestesia sob via aérea artificial (como intubação traqueal, brônquica ou máscara laríngea) e/ou ventilação artificial e/ou exposição a agentes capazes de desencadear hipertermia maligna.
- d) O médico anestesiológista que realizou o procedimento anestésico poderá ser substituído por um membro da equipe cirúrgica para acompanhar o transporte do paciente para a SRPA e/ou CTI.

QUESTÃO 23

Considerando os seguintes parâmetros de ventilação em uma anestesia geral: VT = 700 ml, FR = 10 rpm, Relação I/E = 1:2, PEP = 5 mmH₂O, FAG = 2 litros/mim, podemos afirmar que o fluxo inspiratório médio é de:

- a) 1 litro/minuto.
- b) 0,35 litros/minuto.
- c) Aproximadamente 70 litros/minuto.
- d) 21 litros/minuto.

QUESTÃO 24

Em relação à fibra muscular cardíaca, é **CORRETO** afirmar:

- a) Quando despolarizada, o meio externo fica positivo em relação ao meio interno.
- b) A saída de K⁺ é o fator preponderante do processo de despolarização da membrana.
- c) A concentração de sódio intracelular é importante para o processo de contração.
- d) A saída de Cl⁻ é determinante da estabilização da diferença de potencial transmembrana verificada na fase de platô.

QUESTÃO 25

Em relação à alergia ao látex, é **CORRETO** afirmar:

- a) Não está associada à exposição prévia ao produto.
- b) A droga de escolha no tratamento é a Adrenalina.
- c) É uma reação histaminóide.
- d) É mediada por liberação de interleucina 6.

QUESTÃO 26

Em ao Alfentanil, é **CORRETO** afirmar:

- a) É menos lipossolúvel que o fentanil.
- b) Não atravessa a barreira hemato-encefálica.
- c) Apresenta curta meia-vida de eliminação em função do rápido clearance.
- d) É excretado em sua forma não modificada pela urina.

QUESTÃO 27

Hiperpatia é:

- a) Aumento da resposta ao estímulo doloroso pela repetição do estímulo.
- b) Aumento da resposta normal a um estímulo doloroso.
- c) Sensação dolorosa desencadeada por um estímulo não doloroso.
- d) Diminuição da resposta à dor pelo fenômeno da adaptação do receptor.

QUESTÃO 28

Uma linha unindo posteriormente as cristas ilíacas e outra unindo os ângulos inferiores das escápulas são referências anatômicas para, respectivamente:

- a) L4 e T12.
- b) L1 e T12.
- c) L4 e T9.
- d) L4 e T7.

QUESTÃO 29

São dados para a avaliação na escala de Aldrete e Kroulik:

- a) diurese, consciência, resposta motora, oxigenação, respiração.
- b) consciência, resposta motora, oxigenação, circulação, respiração.
- c) consciência, oxigenação, resposta verbal, circulação, respiração.
- d) resposta verbal, respiração, resposta motora, circulação, consciência.

QUESTÃO 30

Paciente vítima de acidente automobilístico que abre os olhos sob estímulo doloroso. Considerando isoladamente os dados da Escala de Coma de Glasgow, este paciente receberá pelo menos:

- a) 6 pontos.
- b) 10 pontos.
- c) 4 pontos.
- d) 12 pontos.

QUESTÃO 31

Em relação ao Esmolol, é **CORRETO** afirmar:

- a) É metabolizado por esterases plasmáticas.
- b) Não deve ser administrado em infusão contínua.
- c) A meia vida de eliminação é de cerca de 3 horas.
- d) Tem meia vida de eliminação maior que a do labetalol.

QUESTÃO 32

A neuro-hipófise secreta:

- a) prolactina.
- b) TSH.
- c) vasopressina.
- d) hormônio do crescimento.

QUESTÃO 33

Tende a permanecer constante durante a gestação:

- a) Capacidade pulmonar total.
- b) Capacidade residual funcional.
- c) Volume de reserva inspiratório.
- d) Volume de reserva expiratório.

QUESTÃO 34

A volemia aproximada de um recém-nascido é de:

- a) 95 a 110 ml/kg.
- b) 115 a 120 ml/kg.
- c) menos de 80 ml/kg.
- d) 85 a 90 ml/kg.

QUESTÃO 35

É característica do choque cardiogênico:

- a) baixa perfusão tecidual e resistência vascular sistêmica diminuída.
- a) baixa perfusão tecidual e inibição da liberação de leucotrienos, bradicinina, citocinas, fator de ativação plaquetária e tromboxano.
- b) baixa perfusão tecidual e pressão de capilar pulmonar elevada.
- c) aumento da circulação esplâncnica.

QUESTÃO 36

É típico da necrose tubular aguda:

- a) relação entre a osmolaridade urinária e plasmática é menor que à encontrada no paciente normal.
- b) baixa concentração de sódio urinário.
- c) osmolaridade urinária maior que 630 mOsm/Kg.
- d) anúria.

QUESTÃO 37

Em relação à gabapentina, podemos afirmar que:

- a) é contra-indicada no tratamento da dor neuropática.
- b) tem efeito anticonvulsivante.
- c) promove diminuição do efeito do GABA no sistema nervoso central.
- d) a função hepática deve ser monitorizada durante o tratamento com a droga considerando a elevada hepatotoxicidade.

QUESTÃO 38

Em relação à reposição sanguínea frente ao sangramento cirúrgico é **CORRETO** afirmar que:

- a) a anemia aguda está mais associada a complicações em pacientes coronariopatas.
- b) a hipovolemia é bem tolerada desde que o hematócrito seja normal.
- c) a reposição sanguínea rigorosa está associada a menor incidência de complicações infecciosas.
- d) independentemente da situação observada e das condições do paciente, não se deve tolerar anemia aguda per-operatória com hemoglobina menor que 9 mg%.

QUESTÃO 39

Em relação ao tratamento do broncoespasmo, é **CORRETO** afirmar que:

- a) o ipatrópio tem efeito broncodilatador superior ao dos beta 2 agonistas.
- b) o ipatrópio é bem absorvido pelo trato gastrointestinal.
- c) os anticolinérgicos têm início de ação mais lento que os betaagonistas.
- d) o uso da atropina por nebulizador provoca menos efeitos sistêmicos que o ipatrópio na mesma via.

QUESTÃO 40

Em relação à Concentração Alveolar Mínima dos anestésicos inalatórios, é **CORRETO** afirmar que:

- a) aumenta com a idade.
- b) aumenta na gestação.
- c) aumenta na hipotermia.
- d) aumenta na hipernatremia.

QUESTÃO 41

Em relação à Síndrome de Infusão de Propofol, é **CORRETO** afirmar que:

- a) tem alta taxa de letalidade.
- b) não tem relação com o tempo de infusão.
- c) hiperlipidemia e alcalose metabólica são achados freqüentes.
- d) o mecanismo fisiopatológico parece associado à supressão da função da adrenal.

QUESTÃO 42

NÃO aumenta na primeira fase da resposta endócrino-metabólica ao trauma:

- a) ACTH.
- b) Insulina.
- c) Cortisol.
- d) Hormônio do crescimento.

QUESTÃO 43

Está associado ao hipertireoidismo:

- a) Oligúria.
- b) aumento da atividade dos glóbulos brancos e trombocitopenia.
- c) diminuição da massa muscular.
- d) diminuição do volume sanguíneo.

QUESTÃO 44

Em relação aos hipoglicemiantes orais, é **CORRETO** afirmar que:

- a) as sulfoniluréias aumentam a liberação de insulina endógena.
- b) os dicumarínicos, o sulfaxazol e os salicilatos diminuem a ação das sulfoniluréias.
- c) não interferem com a absorção intestinal de glicose.
- d) as biguanidas têm ação de 36 a 48 horas.

QUESTÃO 45

Temperatura crítica de um gás é:

- a) a temperatura acima da qual um gás não pode ser liquefeito a uma atmosfera de pressão.
- b) a temperatura na qual a pressão do gás se iguala à pressão atmosférica.
- c) a temperatura a partir da qual um mol do gás excede o volume de 22,4 litros.
- d) a temperatura acima da qual um gás não pode ser liquefeito, qualquer que seja a pressão exercida sobre ele.

QUESTÃO 46

Em relação à composição da água corporal, é **CORRETO** afirmar que:

- a) a proporção de água corporal total do recém-nascido prematuro é menor que a do recém-nascido a termo.
- b) o percentual de água corporal em relação ao peso é diferente entre os sexos, sendo maior no sexo feminino.
- c) a distribuição entre o intra e extracelular se altera marcadamente no primeiro ano de vida.
- d) a maior parte da água corporal está no espaço extracelular.

QUESTÃO 47

Em relação ao equilíbrio ácido-base, é **CORRETO** afirmar que:

- a) o principal sistema tampão, quanto à capacidade de tamponamento ácido-base, é o tampão bicarbonato.
- b) a maior parte da acidez produzida é eliminada por via respiratória.
- c) a acidose láctica está associada à acidose com anion gap normal.
- d) a acidose diminui a ação dos anestésicos e sedativos.

QUESTÃO 48

Tem origem no Fascículo Interno do Plexo Braquial:

- a) Nervo mediano.
- b) Nervo ulnar.
- c) Nervo musculocutâneo.
- d) Nervo radial.

QUESTÃO 49

É contra-indicação relativa ao bloqueio peridural:

- a) Neurofibromatose.
- b) Hemorragia com repercussão hemodinâmica.
- c) Recusa do paciente.
- d) RNI = 2,0.

QUESTÃO 50

Em relação aos meios de contraste radiológicos, é **CORRETO** afirmar que:

- a) a conjugação hepática é uma importante via de eliminação.
- b) em geral não atravessam a barreira hemato-encefálica.
- c) a osmolaridade do meio de contraste está diretamente relacionada à incidência de reações adversas.
- d) a alteração da função renal pelo uso dos meios de contrastes radiológicos é desencadeada, principalmente, por reação imunologicamente mediada.

QUESTÃO 51

São alterações do aparelho respiratório causadas pelo envelhecimento:

- a) aumento do volume de reserva inspiratório e do volume de reserva expiratório.
- b) aumento do espaço morto e da capacidade pulmonar total.
- c) diminuição da capacidade residual funcional e da capacidade residual funcional.
- d) diminuição do volume corrente e aumento da capacidade residual funcional.

QUESTÃO 52

São alterações cardiovasculares fisiológicas próprias da gravidez:

- a) aumento da frequência cardíaca e diminuição da resistência vascular sistêmica.
- b) aumento da resistência vascular sistêmica e do volume sistólico.
- c) diminuição da frequência cardíaca e aumento do volume sistólico.
- d) diminuição da pressão diastólica e aumento da pressão sistólica.

QUESTÃO 53

Relaxam o esfíncter gastroesofágico:

- a) dopamina, ciclizina e domperidona.
- b) dopamina, atropina e glicopirrolato.
- c) perclorperazina, atropina e glicopirrolato.
- d) ciclizina, domperidona e glicopirrolato.

QUESTÃO 54

Em relação à Amiodarona, é **CORRETO** afirmar que:

- a) tem efeito inotrópico positivo.
- b) aumenta a pós-carga do ventrículo esquerdo.
- c) combina ações comuns à dos antiarrítmicos das classes III, I e II.
- d) diminui o período refratário de todos os tecidos cardíacos por bloqueio dos canais de cálcio.

QUESTÃO 55

É característica da extra-sístole supraventricular:

- a) QRS alargado.
- b) Aumento do intervalo QT.
- c) Pausa compensatória incompleta.
- d) Evoluir para arritmia mais grave.

QUESTÃO 56

Em relação ao Metaraminol, pode-se afirmar:

- a) Tem efeito importante sobre a contratilidade miocárdica.
- b) É captado nas terminações pós-ganglionares substituindo a noradrenalina e funcionando como falso neurotransmissor.
- c) Tem efeito vasodilatador sobre os vasos cerebrais.
- d) Tem potência vasoconstritora equivalente a da noradrenalina.

QUESTÃO 57

São dados diagnósticos da Síndrome de Resposta Inflamatória Sistêmica:

- a) Bacteremia, taquipnéia, leucocitose e hipotermia.
- b) Baixo débito cardíaco, taquipnéia, taquicardia, leucocitose, bacteremia.
- c) Febre, taquicardia, baixo débito cardíaco e discrasia.
- d) Febre, taquicardia, leucocitose, hipotermia.

QUESTÃO 58**Considerando-se:**

PPC = Pressão de Perfusão Cerebral, PAM = Pressão Arterial Média, PVC = Pressão Venosa Central e PIC = Pressão Intracraniana, a pressão de perfusão cerebral é dada pela fórmula:

- a) $PPC = PAM - PIC - PVC$
- b) $PPC = PAM - PIC$
- c) $PPC = PAM - PVC$
- d) $PPC = PAM - PVC - PIC$

QUESTÃO 59

Diminui o Fluxo Sanguíneo Cerebral:

- a) Hipercarbia.
- b) PaO₂ Elevada.
- c) Anestesia venosa com propofol.
- d) Anestesia com Isoflurano.


QUESTÃO 60

Os agentes fibrinolíticos agem principalmente através do seguinte mecanismo:

- a) Ativação do plasminogênio.
- b) Bloqueio da degradação da plasmina.
- c) Ativação da antitrombina III.
- d) Inibição da agregação de plaquetas à rede de fibrina.

QUESTÃO 61

Considerando os padrões do tromboelastograma abaixo e que o padrão normal está representado na letra "A", o exame correspondente a trombocitopenia seria o da letra:



- a) D
- b) B
- c) C
- d) E

QUESTÃO 62

Em relação ao reflexo óculo-cardíaco, é **CORRETO** afirmar que:

- a) o bloqueio do gânglio ciliar elimina o reflexo.
- b) está associado a bloqueio ineficaz do terceiro par craniano.
- c) a via aferente é conduzida pelo facial e a eferente pelo vago.
- d) a via aferente é conduzida pelo nervo trigêmeo e a eferente pelo vago.

QUESTÃO 63

Quanto ao tratamento da taquicardia paroxística supra-ventricular, pode-se afirmar que:

- a) a droga de escolha é Adenosina.
- b) a droga de escolha é Verapamil.
- c) a escolha da droga depende da estabilidade hemodinâmica.
- d) a droga de escolha é Adenosina, desde que a TPSV não esteja associada a hipotensão.

QUESTÃO 64

Em relação à técnica 3 em 1 de bloqueio do nervo femoral, é **CORRETO** afirmar que:

- a) bloqueia os nervos femoral, ciático e obturador.
- b) bloqueia os nervos cutâneo lateral da coxa, femoral e obturador.
- c) é eficaz para cirurgias abaixo do joelho.
- d) todos os nervos bloqueados na técnica tem origem no plexo sacral.

QUESTÃO 65

Em relação à inervação autonômica do coração, é **CORRETO** afirmar que:

- a) a inervação do átrio é quase exclusivamente parassimpática.
- b) na desnervação simpática ocorre diminuição da densidade de receptores beta.
- c) no ventrículo predomina a inervação simpática.
- d) no infarto agudo do miocárdio, ocorre diminuição dos receptores beta na área periinfarto.

QUESTÃO 66

Gradiente transpulmonar é:

- a) pressão necessária para expandir os pulmões e a caixa torácica.
- b) diferença entre a pressão pleural e a pressão na abertura das vias aéreas.
- c) diferença entre a pressão intrapleural e a barométrica.
- d) a diferença entre a pressão alveolar e a pressão pleural.

QUESTÃO 67

São dados de prognóstico de sobrevida em pacientes com insuficiência hepática terminal:

- a) Uréia, fosfatase alcalina e creatinina.
- b) RNI, bilirubina e creatinina.
- c) Fosfatase alcalina, creatinina e albumina.
- d) RNI, fosfatase alcalina e albumina.

QUESTÃO 68

Das drogas abaixo, a que apresenta o **maior** efeito depressor cardiovascular é:

- a) Tiopental.
- b) Etomidato.
- c) Propofol.
- d) Midazolan.

QUESTÃO 69

Em uma anestesia geral com o circuito respiratório tendo volume total de 8 litros (canister de cal sodada, tubos, válvulas, e bolsa reservatório) e fluxo de 1 litro por minuto qual o tempo necessário para a troca de 95% do gás presente no circuito:

- a) 15 minutos.
- b) 24 minutos.
- c) 8 minutos.
- d) Os dados são insuficientes para o cálculo.

QUESTÃO 70

A **melhor indicação** para o uso do bicarbonato de sódio em parada cardíaca é:

- a) Hipercalemia.
- b) cetoacidose diabética.
- c) parada cardíaca prolongada.
- d) acidose láctica de origem hipóxica.

ATENÇÃO:

COM SUA LETRA HABITUAL, TRANSCREVA, PARA O ESPAÇO RESERVADO PELA COMISSÃO, NA FOLHA DE RESPOSTAS, A SEGUINTE FRASE:

“A crescente incorporação de tecnologia médica e as novas demandas sociais têm estimulado crescente debate filosófico em torno de problemas de ética prática que não mais encontram respostas no âmbito do modelo ético hipocrático.”

Baseado no *Abstract* de:
ALMEIDA, José Luiz Telles de and SCHRAMM, Fermin Roland. Transição paradigmática, metamorfose da ética médica e emergência da bioética. *Cad. Saúde Pública* [online]. 1999, v. 15, suppl. 1. ISSN 0102-311X - adapt.