

Prezado(a) candidato(a):

Assine e coloque seu número de inscrição no quadro abaixo. Preencha, com traços firmes, o espaço reservado a cada opção na folha de resposta.

Nº de Inscrição

Nome

**ASSINALE A RESPOSTA CORRETA.**

**PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS -  
Núcleo comum**

**QUESTÃO 01**

Sobre o nervo laríngeo recorrente, é **CORRETO** afirmar:

- a) À esquerda o nervo contorna a crossa da aorta e retorna à região cervical.
- b) As lesões mais comuns ocorrem quando o nervo relaciona-se com a artéria tireoidiana superior.
- c) À direita o nervo contorna o tronco da artéria pulmonar para retornar à região cervical.
- d) Em seu trajeto cervical descendente, acompanha as fibras do nervo acessório.

**QUESTÃO 02**

A tireóide lateral aberrante consiste de:

- a) Lateralização dos lobos tireoidianos decorrente de alteração na migração descendente da glândula durante o desenvolvimento embrionário.
- b) Ectopia glandular por agenesia do istmo.
- c) Bócio colóide multinodular.
- d) Metástase ganglionar de tumor tireoidiano.

**QUESTÃO 03**

Em um paciente politraumatizado, sua avaliação inicial deve seguir uma rotina determinada pelas cinco primeiras letras do alfabeto. Na letra A, incluímos:

- a) A respiração.
- b) A avaliação do aparelho cardiovascular.
- c) As vias aéreas e a coluna cervical.
- d) A avaliação de lesões cutâneas com sangramento.

**QUESTÃO 04**

No pós-operatório de tireoidectomia total, a hipocalcemia é indicativa de:

- a) Fome óssea pelo cálcio em pacientes com osteopenia.
- b) Excreção urinária de cálcio induzida por elevação do paratormônio.
- c) Hemodiluição causada pelo mixedema.
- d) Hipofunção transitória ou definitiva das glândulas Paratireóides.

**QUESTÃO 05**

Em relação às cefaléias, é **INCORRETO** afirmar:

- a) O eletroencefalograma no diagnóstico de doenças que causam cefaléia pode ser desprezado.
- b) A arteriografia é um exame sempre solicitado e necessário nos quadros de enxaqueca clássica.
- c) As radiografias de crânio são raramente úteis, podendo também ser desprezadas.
- d) A punção lombar diagnóstica deve ser efetuada em presença de casos agudos acompanhados de febre.

**QUESTÃO 06**

Em relação às febres, é **INCORRETO** afirmar:

- a) É uma elevação da temperatura corporal acima de 37,5° C.
- b) É comum que os pacientes febris apresentem dor e sensibilidade à palpação em áreas de lesões.
- c) Em adultos considera-se febre de origem indeterminada como uma afecção com mais de 6 (seis) semanas.
- d) Febre com sudorese noturna ocorre em casos de quadros inflamatórios crônicos.

**QUESTÃO 07**

São causas de edema, **EXCETO**:

- a) Obstruções no nível da circulação linfática.
- b) Lesões inflamatórias diversas.
- c) Doenças com lesões hepáticas parenquimatosas.
- d) Doenças prostáticas com obstrução urinária.

**QUESTÃO 08**

Em relação às reações alérgicas graves, é **INCORRETO** afirmar:

- a) Reações anafilatóides são mediadas por IgE.
- b) A anafilaxia é uma reação aguda e generalizada.
- c) A pele é também afetada, sendo a urticária a manifestação mais freqüente.
- d) Podem ocorrer isquemia miocárdica e arritmias ventriculares.

**QUESTÃO 09**

CPS, 24 anos, nuligesta, vida sexual ativa com uso irregular de anticoncepcional oral de ultra-baixa dose, relatando atraso menstrual de 20 dias. Em relação ao diagnóstico de gravidez, neste caso, é **CORRETO** afirmar:

- a) Será possível com dosagem de beta-hCG no soro, que se torna positivo mesmo antes de a paciente perceber o atraso menstrual.
- b) Somente será possível com o auxílio da ultra-sonografia pélvica transabdominal que identifica o saco gestacional e o embrião precocemente (3/4 semanas).
- c) É preciso esperar 30 dias de atraso menstrual para que o citotrofoblasto comece a produzir o hCG em quantidades detectáveis.
- d) O índice de falso positivo do beta-hCG é alto em pacientes usuárias de anticoncepcional oral.

**QUESTÃO 10**

São medicamentos que contra-indicam o aleitamento materno:

- a) Ergotamina, contraceptivos hormonais combinados e propranolol.
- b) Androgênios, sulfonamidas, hipoglicemiantes orais e metronidazol.
- c) Amiodarona, brometos, tetraciclina e antitireoideanos (exceto propiltiuracil).
- d) Antimetabólitos, esteróides, diuréticos e preparações radioativas.

**QUESTÃO 11**

Em relação ao uso dos contraceptivos hormonais combinados orais é **CORRETO** afirmar que:

- a) A propedêutica básica antes de se prescrever um contraceptivo hormonal deve incluir uma ecografia pélvica, exclusão de trombofilias, citologia oncológica e perfil lipídico.
- b) Estão contra-indicados em casos de distúrbios tromboembólicos, insuficiência hepática, tabagistas acima de 35 anos, suspeita de gravidez, sangramento genital não-diagnosticado e câncer de mama.
- c) Os efeitos colaterais do seu componente estrogênico incluem: aumento do peso, redução da libido, fadiga, depressão, pele oleosa, hirsutismo, acne e aumento da incidência de doença inflamatória pélvica.
- d) Antibióticos como a rifampicina e griseofulvina tem sua eficácia reduzida pelos anticoncepcionais orais enquanto anticonvulsivantes e psicotrópicos têm sua ação potencializada pelos mesmos.

**QUESTÃO 12**

Em uma mulher cujos ciclos são anovulatórios, qual dos fenômenos abaixo **NÃO** está ocorrendo?

- a) Recrutamento e seleção do folículo dominante sob ação do hormônio folículo estimulante.
- b) Síntese estrogênica acompanhada de reconstrução e crescimento do endométrio, principalmente da sua camada funcional.
- c) Síntese estrogênica pelo folículo em desenvolvimento e conseqüente transformação secretora do endométrio.
- d) Reinício da meiose do oócito, liberação do 1º corpúsculo polar e transformação secretora do endométrio.

**QUESTÃO 13**

São considerações verdadeiras a respeito da asma brônquica, **EXCETO**.

- a) Os achados radiológicos na crise aguda são infiltrado intersticial peri-brônquico, hiperinsuflação pulmonar, excepcionalmente atelectasias.
- b) O tratamento da asma objetiva-se diminuir ou eliminar fatores desencadeantes, controlar completamente os sintomas, permitir prática de esportes e evitar hospitalizações.
- c) Antígenos alimentares quase sempre desencadeiam crises.
- d) O tratamento inicial da crise deve ser feito primeiramente com broncodilatador.

**QUESTÃO 14**

Sobre a infecção do trato urinário é correto afirmar, **EXCETO**:

- a) O coletor urinário deve ser trocado e a higiene refeita a cada 30 minutos até a criança urinar.
- b) O quadro clínico pode variar desde uma bacteriúria assintomática até um quadro grave de pielonefrite associada a sepse.
- c) A bacteriúria assintomática deve ser necessariamente tratada.
- d) Recomenda-se repetir a cultura de urina uma semana após a interrupção do tratamento.

**QUESTÃO 15**

São causas de insuficiência cardíaca por sobrecarga de pressão, **EXCETO**:

- a) Estenose aórtica.
- b) Comunicação interventricular.
- c) Hipertensão pulmonar.
- d) Coarctação de aorta.

**QUESTÃO 16**

Sobre a obesidade é correto afirmar, **EXCETO**:

- a) Os principais fatores de risco são: história familiar, sedentarismo, raça branca, mãe obesa e nível sócio econômico mais alto.
- b) A forma mais correta de avaliar a obesidade é pelo índice de massa corporal.
- c) A obesidade secundária é causada por exemplo pelo hipotireoidismo, ovário policístico e síndrome de Prader Willi.
- d) Uma dieta saudável tem em torno de 30% de calorias sob a forma de carboidratos complexos ou secundários.

**QUESTÃO 17**

Considere os conceitos abaixo, utilizados em Saúde Pública:

- I- Caso autóctone é aquele de doença que teve origem dentro dos limites geográficos de referência ou sob investigação.
- II- Caso confirmado é aquele de pessoa de quem foi isolado e identificado o agente etiológico ou de quem foram obtidas outras evidências laboratoriais da presença do agente etiológico; condicionado às regras estabelecidas pelo Ministério da Saúde.
- III- Caso secundário é o caso de uma doença transmissível, irrelevante para controle epidemiológico.
- IV- Caso-índice de uma determinada doença é o primeiro entre vários de natureza similar e epidemiologicamente relacionados.

São **CORRETAS** as afirmativas:

- a) I, II e IV somente.
- b) I, II, III e IV.
- c) I e II somente.
- d) II, III e IV somente.

**QUESTÃO 18**

Em relação à Dengue Clássica, podemos afirmar, **EXCETO**:

- a) A transmissão se faz pela picada da fêmea do mosquito *Aedes aegypti* e/ou por contato direto de um doente ou de suas secreções com uma pessoa sadia.
- b) O diagnóstico é clínico e laboratorial nos primeiros casos e em seguida clínico-epidemiológico.
- c) Deve-se estabelecer o diagnóstico diferencial com gripe, rubéola e sarampo.
- d) Como medida de controle, devem-se manter ações continuadas de inspeções domiciliares, eliminação e tratamento de criadouros, com atividades de educação em saúde e mobilização social.

**QUESTÃO 19**

São doenças de notificação compulsória, em todo o território nacional, **EXCETO**:

- a) Febre reumática.
- b) Sarampo.
- c) Hanseníase.
- d) Poliomielite.

**QUESTÃO 20**

O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS - conforme a Portaria/GM nº 399/06. Os estados/regiões/municípios devem ter as seguintes prioridades pactuadas, **EXCETO**:

- a) Investimento no sistema hospitalar, aumentando a oferta de leitos hospitalares e de Unidades de Tratamento Intensivo.
- b) Redução da Mortalidade infantil e materna.
- c) Controle do câncer de colo de útero e da mama.
- d) Fortalecimento da atenção básica.

**PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**  
**Oftalmologia**

**QUESTÃO 21**

O ângulo subentendido pelos eixos visual e anatômico (ou pupilar) do olho é denominado de ângulo

- a) Alfa.
- b) Gamma.
- c) Kappa.
- d) Lambda.

**QUESTÃO 22**

Considerando as células germinativas da córnea, é **INCORRETO** afirmar que:

- a) atuam como barreira à conjuntivalização da córnea.
- b) estão mais localizadas, principalmente, nos limbos nasal e temporal.
- c) na deficiência dessas células ocorrem defeitos epiteliais.
- d) na deficiência dessas células ocorre vascularização na superfície corneana.

**QUESTÃO 23**

Segundo os estudos de drenagem do humor aquoso, podemos concluir que:

- a) a malha endotelial é a que oferece maior resistência à drenagem do aquoso.
- b) a malha uveal se estende do esporão escleral à linha de Schwalbe.
- c) o canal de Schlemm é conectado diretamente às veias episclerais.
- d) os espaços intertrabeculares da malha corneo-escleral são maiores que os da malha uveo-escleral.

**QUESTÃO 24**

A mielinização axonal no nervo óptico é fornecida por:

- a) astrócitos.
- b) células ganglionares.
- c) micróglia.
- d) oligodendrócitos.



**QUESTÃO 25**

Considerando os testes de acuidade visual, podemos afirmar que:

- a) a tabela de Bailey-Lovie obedece a escala decimal.
- b) as letras de uma mesma linha da tabela de Snellen são igualmente legíveis.
- c) no teste dos cartões de Teller a escala utilizada é a logarítmica.
- d) o teste com a tabela de Sheridan-Gardner exige o sentido da lateralidade e a coordenação mão-olho.

**QUESTÃO 26**

Considerando o mecanismo da acomodação, é **INCORRETO** afirmar que:

- a) a musculatura ciliar tem inervação parassimpática.
- b) a atropina promove a cicloplegia impedindo a liberação da acetilcolina.
- c) pela teoria de Helmholtz (1855), a presbiopia ocorre pela perda da elasticidade da cápsula do cristalino.
- d) pela teoria de Schachar (1992), a presbiopia ocorre pelo aumento do diâmetro equatorial do cristalino.

**QUESTÃO 27**

A indução prismática, na correção de + 5,00 dioptrias esféricas, quando a distância nasopupilar direita de 35 mm foi substituída pela de 30 mm é de:

- a) 2,5 dioptrias prismáticas de base nasal.
- b) 2,5 dioptrias prismáticas de base temporal.
- c) 5,0 dioptrias prismáticas de base nasal.
- d) 5,0 dioptrias prismáticas de base temporal.

**QUESTÃO 28**

A acuidade visual sem correção, esperada de um olho míope com acuidade visual 20/20 usando lente corretora nos óculos de – 4,00 dioptrias esféricas é

- a) 20/80.
- b) 20/160.
- c) 20/320.
- d) 20/640.

**QUESTÃO 29**

A lente de Hruby, utilizada na lâmpada de fenda para exame do segmento posterior, fornece:

- a) 2,5 X de ampliação, 30° de campo de visão e imagem virtual direta.
- b) 10 X de ampliação, 20° de campo de visão e imagem virtual direta.
- c) 10 X de ampliação, 30° de campo de visão e imagem real invertida.
- d) 12 X de ampliação, 10° de campo de visão e imagem virtual direta.

**QUESTÃO 30**

Considerando os testes para avaliar o campo visual, é **INCORRETO** afirmar que o delineamento da mancha cega é obtido através da:

- a) tela de Amsler.
- b) tela tangente.
- c) perimetria automatizada.
- d) perimetria de Goldmann.

**QUESTÃO 31**

O antibiótico utilizado no tratamento do tracoma em dose única é a

- a) Azitromicina.
- b) Doxicilina.
- c) Eritromicina.
- d) Tetraciclina.

**QUESTÃO 32**

O risco do desenvolvimento de colite pseudomembranosa em paciente tratado de toxoplasmose com clindamicina diminui quando a ele é administrado conjuntamente:

- a) Ácido fólico.
- b) Atovaquona.
- c) Pirimetamina.
- d) Sulfadiazina.

**QUESTÃO 33**

O sinal involuntário de Cogan (*Cogan twitch sign*) ocorre na ptose:

- a) Congênita.
- b) Involucional.
- c) Mecânica.
- d) Miastênica.

**QUESTÃO 34**

A ocorrência de falência da bomba lacrimal é esperada na presença de

- a) Blefarocálase.
- b) Blefarofimose.
- c) Lagoftalmo.
- d) Telecanto.

**QUESTÃO 35**

Considerando as causas de epífora, é **CORRETO** afirmar que na Síndrome de Centurion temos a presença de:

- a) aumento da carúncula.
- b) conjuntivocálase.
- c) mal posicionamento anterior da porção medial da pálpebra com deslocamento do ponto lacrimal para fora do lago lacrimal.
- d) ponto lacrimal edemaciado.

**QUESTÃO 36**

A presença na córnea de pseudogerontoxon e úlcera em escudo pode fazer parte das manifestações da ceratoconjuntivite:

- a) epidêmica.
- b) límbica superior.
- c) seca.
- d) vernal.

**QUESTÃO 37**

Observando um recém-nascido com 7 dias de vida, com infecção ocular por clamídia, é **INCORRETO** afirmar a ocorrência de:

- a) contra-indicação do uso de tetraciclina tópica.
- b) exsudação mucopurulenta.
- c) reação folicular.
- d) reação papilar.

**QUESTÃO 38**

A presença de infiltrados perineurais é observada na ceratite por:

- a) acantameba.
- b) clamídia.
- c) fungos.
- d) herpes.

**QUESTÃO 39**

Um paciente portador de uveíte anterior aguda nos informa que após ocorrência de uretrite, surgiu uma conjuntivite com exsudação purulenta bilateral seguida de artrite periférica durando mais de um mês. É **CORRETO** afirmar que seu diagnóstico mais provável seja:

- a) Doença de Behcet.
- b) Espondilite anquilosante.
- c) Artrite idiopática juvenil.
- d) Síndrome de Reiter.

**QUESTÃO 40**

Constitui um sinal patognomônico de hanseníase a presença na superfície da íris de:

- a) nódulos de Busacca.
- b) nódulos de Koeppe.
- c) nódulos grandes e rosados.
- d) pérolas irianas.

**QUESTÃO 41**

A presença de leucocoria em paciente com dermatite vesiculobolhosa no tronco e extremidades faz parte

- a) da doença de Coats.
- b) da incontinência pigmentar.
- c) do retinoblastoma.
- d) da toxocaríase.

**QUESTÃO 42**

Considerando um paciente com ptose discreta, elevação discreta da pálpebra inferior, miose, reflexos fotomotor e de perto normais, é **CORRETO** afirmar que estamos diante de uma:

- a) irite.
- b) pupila de Adie.
- c) pupila de Argyll Robertson.
- d) Síndrome de Horner.

**QUESTÃO 43**

O glaucoma por pseudo-esfoliação é classificado como:

- a) primário.
- b) secundário pré-trabecular.
- c) secundário trabecular.
- d) secundário pós-trabecular.

**QUESTÃO 44**

Considerando as características do glaucoma de tensão normal, é **CORRETO** afirmar que:

- a) a pressão intra-ocular média é igual ou menor que 25 mmHg.
- b) há perda de campo visual.
- c) na doença assimétrica não há correspondência entre a intensidade da lesão papilar e o valor da pressão intra-ocular.
- d) o ângulo iridocorneano é estreito.

**QUESTÃO 45**

O anel de Vossius na cápsula anterior do cristalino é constituído de pigmento

- a) hematógeno.
- b) Irriano.
- c) medicamentoso.
- d) metálico.

**QUESTÃO 46**

Na catarata em girassol ocorre deposição na cápsula anterior do cristalino, de:

- a) cloroquina.
- b) cobre.
- c) ouro.
- d) prata.

**QUESTÃO 47**

A microfacia pode apresentar o cristalino com forma discóide, podendo então estar associada a síndrome de

- a) Alport.
- b) Lowe.
- c) Ehlers-Danlos.
- d) Stickler.

**QUESTÃO 48**

Catarata caracterizada por opacidade com aspecto de gota de óleo central é encontrada na:

- a) Deficiência de galactoquinase.
- b) Galactosemia.
- c) Rubéola congênita.
- d) Síndrome de Hallermann-Streiff-François.

**QUESTÃO 49**

Considerando as anomalias congênitas que envolvem a córnea, ocorre corectopia na:

- a) Anomalia de Rieger.
- b) Córnea plana.
- c) Megalocórnea.
- d) Microcórnea.

**QUESTÃO 50**

O procedimento de Hotz é utilizado como tratamento cirúrgico de

- a) Coloboma palpebral.
- b) Epibléfaro.
- c) Epicanto.
- d) Telecanto.

**QUESTÃO 51**

Considerando as técnicas de medida do desvio ocular, é **CORRETO** afirmar que no teste de Hirschberg:

- a) cada milímetro de desvio equivale a 7 dioptrias prismáticas.
- b) mede o desvio latente.
- c) o prisma é posicionado na frente do olho preferencial.
- d) o reflexo corneano fica decentrado no olho estrábico na direção oposta do desvio.

**QUESTÃO 52**

Na correção óptica da esotropia acomodativa:

- a) a divisória da lente executive deve estar nivelada com a borda superior da pupila.
- b) bifocais devem ser prescritos quando ocorrer relação AC/A baixa.
- c) deve ser receitada a mínima adição para perto que permite fixação bifoveal.
- d) o aumento da adição deve permanecer após a adolescência.

**QUESTÃO 53**

A detecção de calcificação no diagnóstico por imagens de tumores intra-oculares não é possível através da

- a) ecografia.
- b) radiografia.
- c) ressonância magnética.
- d) tomografia computadorizada.

**QUESTÃO 54**

Considerando os tumores metastáticos da coróide, é **CORRETO** afirmar que têm como localização primária mais freqüente:

- a) mama.
- b) rim.
- c) trato gastrointestinal.
- d) próstata.

**QUESTÃO 55**

Considerando as alterações do nervo óptico, é **CORRETO** afirmar que a:

- a) atrofia óptica primária é precedida de edema do nervo.
- b) neurite retrobulbar é o tipo mais comum de neurite óptica em crianças.
- c) neuroretinite é mais freqüente associada com infecções virais.
- d) escavação papilar na atrofia óptica primária constitui o sinal de Kestenbaum.

**QUESTÃO 56**

Podemos afirmar sobre a Degeneração Macular Relacionada à Idade que:

- a) a forma seca é a mais comum.
- b) a forma exsudativa é a mais benigna.
- c) é mais prevalente na raça negra.
- d) ocorre afinamento local da membrana de Bruch.

**QUESTÃO 57**

Uma paciente com 20 anos de idade é portadora de ptose bilateral de estabelecimento insidioso, limitação dos movimentos oculares e ataxia. A punção lombar mostra aumento da concentração protéica acima de 1 g/l. Entre as hipóteses apresentadas, **a mais provável** é:

- a) Distrofia miotônica.
- b) Homocistinúria.
- c) Miastenia grave.
- d) Síndrome de Kern-Sayre.

**QUESTÃO 58**

O Sinal de Gunn da Retinopatia Hipertensiva aparece no grau de arterioesclerose

- a) 1.
- b) 2.
- c) 3.
- d) 4.

**QUESTÃO 59**

Entre os fatores de risco para Retinopatia Diabética, o mais importante é:

- a) duração do diabetes.
- b) gravidez.
- c) hipertensão Arterial.
- d) obesidade.



**QUESTÃO 60**

O primeiro sinal patognomônico da Retinopatia da Prematuridade é a

- a) crista de demarcação.
- b) linha de demarcação.
- c) proliferação fibrovascular extraretiniana.
- d) retina descolada parcialmente.

**QUESTÃO 61**

Mancha vermelho-cereja na mácula em pacientes com espasmos mioclônicos, dor nos membros e tremores fazem parte do quadro clínico da:

- a) doença de Niemann-Pick.
- b) doença de Tay-Sachs.
- c) doença de Sandhoff.
- d) Sialidoses tipo 1 e 2.

**QUESTÃO 62**

Na doença de Graves, a presença de retração palpebral na posição primária do olhar constitui o sinal de:

- a) Dalrymple.
- b) Kocher.
- c) Munson.
- d) von Graefe.

**QUESTÃO 63**

Quando o grau de ptose reduz após 2 min de aplicação de compressas geladas sobre as pálpebras, o paciente é portador de um tipo de ptose:

- a) aponeurótica.
- b) mecânica.
- c) miogênica.
- d) neurogênica.

**QUESTÃO 64**

Com relação à leucemia, é **INCORRETO** afirmar que pode(m) ocorrer:

- a) depósitos coroidianos com aparência de "pele de leopardo".
- b) envolvimento ocular mais na forma crônica.
- c) manchas de Roth.
- d) Pseudohipópio.

**QUESTÃO 65**

A presença de pólipos edematosos no reto e cólon, osteomas do crânio e mandíbula, e fibromas cutâneos ocorrem na:

- a) Síndrome de Gardner.
- b) Síndrome de Turcot.
- c) doença de Whipple.
- d) Doença de Crohn.

**QUESTÃO 66**

A presença de hematoma anular palpebral bilateral, "olhos de Panda", ocorre na fratura:

- a) do ápice da órbita.
- b) da base do crânio.
- c) da parede lateral da órbita.
- d) do assoalho da órbita.

**QUESTÃO 67**

A presença de enfisema orbitário é esperada na fratura:

- a) da parede medial da órbita.
- b) da parede lateral da órbita.
- c) do assoalho da órbita.
- d) do teto da órbita.

**QUESTÃO 68**

Considerando as complicações dos traumas oculares, é **CORRETO** afirmar que:

- a) *air bag* dispensa o uso de óculos de segurança para proteção dos olhos.
- b) lesões dos nervos oculomotores exigem cirurgia imediata.
- c) oftalmia simpática para ser evitada exige evisceração do olho traumatizado nos dez primeiros dias do trauma.
- d) trauma contuso é considerado de melhor prognóstico visual que o perfurante.

**QUESTÃO 69**

Em relação às queimaduras químicas oculares podemos afirmar que

- a) os ácidos são mais comuns.
- b) os ácidos penetram mais que as bases.
- c) o ácido sulfúrico complica com efeito térmico.
- d) o ácido fluorídrico usado na limpeza e gravação de vidros penetra lentamente.

**QUESTÃO 70**

No tratamento das queimaduras químicas, além da irrigação, a melhora da cicatrização da ferida pela promoção da síntese de colágeno pelos fibroblastos da córnea pode ser feita pelo uso de:

- a) ácido ascórbico.
- b) ácido cítrico.
- c) esteróides.
- d) tetraciclinas.

**ATENÇÃO:**

**COM SUA LETRA HABITUAL, TRANSCREVA, PARA O ESPAÇO RESERVADO PELA COMISSÃO, NA FOLHA DE RESPOSTAS, A SEGUINTE FRASE:**

“A crescente incorporação de tecnologia médica e as novas demandas sociais têm estimulado crescente debate filosófico em torno de problemas de ética prática que não mais encontram respostas no âmbito do modelo ético hipocrático.”

Baseado no *Abstract* de:

ALMEIDA, José Luiz Telles de and SCHRAMM, Fermin Roland. Transição paradigmática, metamorfose da ética médica e emergência da bioética. Cad. Saúde Pública [online]. 1999, v. 15, suppl. 1. ISSN 0102-311X - adapt.