

Prezado(a) candidato(a):

Assine e coloque seu número de inscrição no quadro abaixo. Preencha, com traços firmes, o espaço reservado a cada opção na folha de resposta.

Nº de Inscrição

Nome

ASSINALE A RESPOSTA CORRETA.

**PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS -
Núcleo comum**

QUESTÃO 01

Sobre o nervo laríngeo recorrente, é **CORRETO** afirmar:

- a) À esquerda o nervo contorna a crossa da aorta e retorna à região cervical.
- b) As lesões mais comuns ocorrem quando o nervo relaciona-se com a artéria tireoidiana superior.
- c) À direita o nervo contorna o tronco da artéria pulmonar para retornar à região cervical.
- d) Em seu trajeto cervical descendente, acompanha as fibras do nervo acessório.

QUESTÃO 02

A tireóide lateral aberrante consiste de:

- a) Lateralização dos lobos tireoidianos decorrente de alteração na migração descendente da glândula durante o desenvolvimento embrionário.
- b) Ectopia glandular por agenesia do istmo.
- c) Bócio colóide multinodular.
- d) Metástase ganglionar de tumor tireoidiano.

QUESTÃO 03

Em um paciente politraumatizado, sua avaliação inicial deve seguir uma rotina determinada pelas cinco primeiras letras do alfabeto. Na letra A, incluímos:

- a) A respiração.
- b) A avaliação do aparelho cardiovascular.
- c) As vias aéreas e a coluna cervical.
- d) A avaliação de lesões cutâneas com sangramento.

QUESTÃO 04

No pós-operatório de tireoidectomia total, a hipocalcemia é indicativa de:

- a) Fome óssea pelo cálcio em pacientes com osteopenia.
- b) Excreção urinária de cálcio induzida por elevação do paratormônio.
- c) Hemodiluição causada pelo mixedema.
- d) Hipofunção transitória ou definitiva das glândulas Paratireóides.

QUESTÃO 05

Em relação às cefaléias, é **INCORRETO** afirmar:

- a) O eletroencefalograma no diagnóstico de doenças que causam cefaléia pode ser desprezado.
- b) A arteriografia é um exame sempre solicitado e necessário nos quadros de enxaqueca clássica.
- c) As radiografias de crânio são raramente úteis, podendo também ser desprezadas.
- d) A punção lombar diagnóstica deve ser efetuada em presença de casos agudos acompanhados de febre.

QUESTÃO 06

Em relação às febres, é **INCORRETO** afirmar:

- a) É uma elevação da temperatura corporal acima de 37,5° C.
- b) É comum que os pacientes febris apresentem dor e sensibilidade à palpação em áreas de lesões.
- c) Em adultos considera-se febre de origem indeterminada como uma afecção com mais de 6 (seis) semanas.
- d) Febre com sudorese noturna ocorre em casos de quadros inflamatórios crônicos.

QUESTÃO 07

São causas de edema, **EXCETO**:

- a) Obstruções no nível da circulação linfática.
- b) Lesões inflamatórias diversas.
- c) Doenças com lesões hepáticas parenquimatosas.
- d) Doenças prostáticas com obstrução urinária.

QUESTÃO 08

Em relação às reações alérgicas graves, é **INCORRETO** afirmar:

- a) Reações anafilatóides são mediadas por IgE.
- b) A anafilaxia é uma reação aguda e generalizada.
- c) A pele é também afetada, sendo a urticária a manifestação mais freqüente.
- d) Podem ocorrer isquemia miocárdica e arritmias ventriculares.

QUESTÃO 09

CPS, 24 anos, nuligesta, vida sexual ativa com uso irregular de anticoncepcional oral de ultra-baixa dose, relatando atraso menstrual de 20 dias. Em relação ao diagnóstico de gravidez, neste caso, é **CORRETO** afirmar:

- a) Será possível com dosagem de beta-hCG no soro, que se torna positivo mesmo antes de a paciente perceber o atraso menstrual.
- b) Somente será possível com o auxílio da ultra-sonografia pélvica transabdominal que identifica o saco gestacional e o embrião precocemente (3/4 semanas).
- c) É preciso esperar 30 dias de atraso menstrual para que o citotrofoblasto comece a produzir o hCG em quantidades detectáveis.
- d) O índice de falso positivo do beta-hCG é alto em pacientes usuárias de anticoncepcional oral.

QUESTÃO 10

São medicamentos que contra-indicam o aleitamento materno:

- a) Ergotamina, contraceptivos hormonais combinados e propranolol.
- b) Androgênios, sulfonamidas, hipoglicemiantes orais e metronidazol.
- c) Amiodarona, brometos, tetraciclina e antitireoideanos (exceto propiltiuracil).
- d) Antimetabólitos, esteróides, diuréticos e preparações radioativas.

QUESTÃO 11

Em relação ao uso dos contraceptivos hormonais combinados orais é **CORRETO** afirmar que:

- a) A propedêutica básica antes de se prescrever um contraceptivo hormonal deve incluir uma ecografia pélvica, exclusão de trombofilias, citologia oncológica e perfil lipídico.
- b) Estão contra-indicados em casos de distúrbios tromboembólicos, insuficiência hepática, tabagistas acima de 35 anos, suspeita de gravidez, sangramento genital não-diagnosticado e câncer de mama.
- c) Os efeitos colaterais do seu componente estrogênico incluem: aumento do peso, redução da libido, fadiga, depressão, pele oleosa, hirsutismo, acne e aumento da incidência de doença inflamatória pélvica.
- d) Antibióticos como a rifampicina e griseofulvina tem sua eficácia reduzida pelos anticoncepcionais orais enquanto anticonvulsivantes e psicotrópicos têm sua ação potencializada pelos mesmos.

QUESTÃO 12

Em uma mulher cujos ciclos são anovulatórios, qual dos fenômenos abaixo **NÃO** está ocorrendo?

- a) Recrutamento e seleção do folículo dominante sob ação do hormônio folículo estimulante.
- b) Síntese estrogênica acompanhada de reconstrução e crescimento do endométrio, principalmente da sua camada funcional.
- c) Síntese estrogênica pelo folículo em desenvolvimento e conseqüente transformação secretora do endométrio.
- d) Reinício da meiose do oócito, liberação do 1º corpúsculo polar e transformação secretora do endométrio.

QUESTÃO 13

São considerações verdadeiras a respeito da asma brônquica, **EXCETO**.

- a) Os achados radiológicos na crise aguda são infiltrado intersticial peri-brônquico, hiperinsuflação pulmonar, excepcionalmente atelectasias.
- b) O tratamento da asma objetiva-se diminuir ou eliminar fatores desencadeantes, controlar completamente os sintomas, permitir prática de esportes e evitar hospitalizações.
- c) Antígenos alimentares quase sempre desencadeiam crises.
- d) O tratamento inicial da crise deve ser feito primeiramente com broncodilatador.

QUESTÃO 14

Sobre a infecção do trato urinário é correto afirmar, **EXCETO**:

- a) O coletor urinário deve ser trocado e a higiene refeita a cada 30 minutos até a criança urinar.
- b) O quadro clínico pode variar desde uma bacteriúria assintomática até um quadro grave de pielonefrite associada a sepse.
- c) A bacteriúria assintomática deve ser necessariamente tratada.
- d) Recomenda-se repetir a cultura de urina uma semana após a interrupção do tratamento.

QUESTÃO 15

São causas de insuficiência cardíaca por sobrecarga de pressão, **EXCETO**:

- a) Estenose aórtica.
- b) Comunicação interventricular.
- c) Hipertensão pulmonar.
- d) Coarctação de aorta.

QUESTÃO 16

Sobre a obesidade é correto afirmar, **EXCETO**:

- a) Os principais fatores de risco são: história familiar, sedentarismo, raça branca, mãe obesa e nível sócio econômico mais alto.
- b) A forma mais correta de avaliar a obesidade é pelo índice de massa corporal.
- c) A obesidade secundária é causada por exemplo pelo hipotireoidismo, ovário policístico e síndrome de Prader Willi.
- d) Uma dieta saudável tem em torno de 30% de calorias sob a forma de carboidratos complexos ou secundários.

QUESTÃO 17

Considere os conceitos abaixo, utilizados em Saúde Pública:

- I- Caso autóctone é aquele de doença que teve origem dentro dos limites geográficos de referência ou sob investigação.
- II- Caso confirmado é aquele de pessoa de quem foi isolado e identificado o agente etiológico ou de quem foram obtidas outras evidências laboratoriais da presença do agente etiológico; condicionado às regras estabelecidas pelo Ministério da Saúde.
- III- Caso secundário é o caso de uma doença transmissível, irrelevante para controle epidemiológico.
- IV- Caso-índice de uma determinada doença é o primeiro entre vários de natureza similar e epidemiologicamente relacionados.

São **CORRETAS** as afirmativas:

- a) I, II e IV somente.
- b) I, II, III e IV.
- c) I e II somente.
- d) II, III e IV somente.

QUESTÃO 18

Em relação à Dengue Clássica, podemos afirmar, **EXCETO**:

- a) A transmissão se faz pela picada da fêmea do mosquito *Aedes aegypti* e/ou por contato direto de um doente ou de suas secreções com uma pessoa sadia.
- b) O diagnóstico é clínico e laboratorial nos primeiros casos e em seguida clínico-epidemiológico.
- c) Deve-se estabelecer o diagnóstico diferencial com gripe, rubéola e sarampo.
- d) Como medida de controle, devem-se manter ações continuadas de inspeções domiciliares, eliminação e tratamento de criadouros, com atividades de educação em saúde e mobilização social.

QUESTÃO 19

São doenças de notificação compulsória, em todo o território nacional, **EXCETO**:

- a) Febre reumática.
- b) Sarampo.
- c) Hanseníase.
- d) Poliomielite.

QUESTÃO 20

O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS - conforme a Portaria/GM nº 399/06. Os estados/regiões/municípios devem ter as seguintes prioridades pactuadas, **EXCETO**:

- a) Investimento no sistema hospitalar, aumentando a oferta de leitos hospitalares e de Unidades de Tratamento Intensivo.
- b) Redução da Mortalidade infantil e materna.
- c) Controle do câncer de colo de útero e da mama.
- d) Fortalecimento da atenção básica.

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Reumatologia

QUESTÃO 21

No exame físico do ombro doloroso, várias manobras são empregadas para a avaliação do comprometimento inflamatório e integridade dos tendões. Marque a segunda coluna de acordo com a primeira:

- I - Manobra de Hawkins
- II - Teste de Yergason
- III - Teste de Patte
- IV - Teste de Gerber

- () avaliação do comprometimento da cabeça longa do bíceps.
- () avaliação do comprometimento do supra-espinal.
- () avaliação da integridade do tendão infra-espinal.
- () específico para pesquisa de rotura do tendão subescapular.

A ordem **CORRETA**, de cima para baixo, é:

- a) I, II, III, IV
- b) I, II, IV, III
- c) II, I, IV, III
- d) II, I, III, IV

QUESTÃO 22

Com relação à distrofia simpática reflexa, são reconhecidos como possíveis fatores desencadeantes da mesma, **EXCETO**:

- a) trauma.
- b) acidente vascular cerebral.
- c) drogas inibidoras da enzima conversora da angiotensina (ECA).
- d) tuberculostáticos.

QUESTÃO 23

A partir do reconhecimento de antígenos processados, os linfócitos T ativados proliferam e secretam citocinas efetoras da resposta imune.

Atente para as afirmativas abaixo:

- I - Os linfócitos T CD4+ têm função auxiliar na ativação e proliferação de linfócitos B após contato com o antígeno.
- II - Os linfócitos T CD8+ têm também ação citotóxica e supressora.
- III - Os linfócitos CD8+ diferenciam-se em linfócitos Th1 e Th2.
- IV - As células Th1 contribuem para a maturação e diferenciação de linfócitos B.

Estão **CORRETAS** as afirmativas:

- a) I e II apenas.
- b) I, II, III apenas.
- c) I e III apenas.
- d) I, II, IV apenas.

QUESTÃO 24

Com relação ao sistema do complemento, é **INCORRETO** dizer:

- a) A via clássica é ativada a partir da fixação de C1q por imunocomplexos.
- b) A via alternativa é ativada a partir do produto de clivagem do C3 à superfície de microorganismos.
- c) A via da lectina ligante da manose é ativada a partir da ligação da lectina a resíduos de manose na parede celular de microorganismos, seguindo então os mesmos passos da via alternativa.
- d) Na monitoração do consumo das proteínas do complemento, a fração C2 é a mais precoce ao cair e a última a se normalizar.

QUESTÃO 25

De acordo com o padrão de imunofluorescência de um teste de FAN HEp-2 positivo, **marque a segunda coluna** conforme os dados da primeira:

- I - nuclear homogêneo com placa cromossômica metafisária positiva
- II - nuclear pontilhado com placa cromossômica metafisária positiva
- III - nuclear pontilhado com placa cromossômica metafisária negativa
- IV - nuclear pleomórfico com raros pontos isolados (<10)
- V - nuclear pontilhado fino
- VI - citoplasmático pontilhado fino denso

- () proteína P ribossomal
- () histona
- () proteínas associadas ao centômero
- () U1-RNP
- () PMScl
- () p80 coilina

A ordem **CORRETA**, de cima para baixo, é:

- a) II, I, III, VI, IV, V
- b) III, I, II, VI, IV, V
- c) VI, I, II, III, V, IV
- d) VI, I, III, II, V, IV

QUESTÃO 26

Com relação aos antígenos leucocitários humanos (HLA) e o risco aumentado de doença, associe as colunas:

- I - HLA-DR4
- II - HLA-DR5
- III - HLA-B8/DR3
- IV - HLA-DR2 e DR3

- () artrite reumatóide
- () predisposição à resposta imune
- () artrite idiopática juvenil oligoarticular
- () ocorrência de anticorpos anti-SSA no lúpus eritematoso sistêmico (LES)

Marque a opção que apresenta a ordem **CORRETA**, de cima para baixo:

- a) I, II, III, IV
- b) I, II, IV, III
- c) I, III, IV, II
- d) I, III, II, IV

QUESTÃO 27

Leia as seguintes afirmativas a respeito dos antiinflamatórios não-esteróides (AINEs):

- I - Os AINEs devem ser evitados em pacientes diabéticos devido à ação nefrotóxica dos mesmos, mas não têm efeito, contudo, na metabolização dos hipoglicemiantes orais.
- II - Os inibidores da COX-2 elevam os riscos de eventos tromboembólicos, como resultado de uma inibição seletiva de prostaciclina antitrombótica sem nenhuma inibição do tromboxano gerado pela COX-1.
- III - O uso concomitante de AINEs e derivados cumarínicos potencializa o risco de sangramento devido a um efeito de competição pela mesma proteína carreadora.

Considerando-se as afirmativas acima, pode-se afirmar que:

- a) apenas I é verdadeira.
- b) I e II são verdadeiras.
- c) II e III são verdadeiras.
- d) I, II e III são verdadeiras.

QUESTÃO 28

Na fisiopatologia da fibromialgia (FM), está diretamente associada à sensibilização do sistema nervoso central:

- a) elevação da substância P no líquido.
- b) elevação do fator de crescimento insulina-like 1 (IGF-1).
- c) elevação do 5-hidroxi-triptofano (5-HT) no líquido.
- d) depleção da substância P no líquido.

QUESTÃO 29

Das manifestações clínicas da FM, são considerados sintomas típicos aqueles que ocorrem em mais de 80% dos pacientes. São eles:

- a) cefaléia, parestesias, síndrome do cólon-irritável.
- b) sono não-restaurador, fadiga, fenômeno de Raynaud.
- c) fadiga, rigidez matinal, sintomas de boca e/ou olhos secos.
- d) sono não-restaurador, fadiga, rigidez matinal.

QUESTÃO 30

Sobre a hemocromatose, é **INCORRETO** afirmar que:

- a) é mais prevalente no sexo masculino.
- b) as manifestações articulares ocorrem em menos de 25% dos casos.
- c) condrocalcinose pode estar presente.
- d) o termo “diabetes de bronze” refere-se ao comprometimento simultâneo do fígado (cirrose), pâncreas (diabetes) e pele (hiperpigmentação).

QUESTÃO 31

Na sarcoidose, a síndrome de Löfgren, refere-se à presença dos seguintes achados, **EXCETO**:

- a) adenopatia hilar bilateral.
- b) eritema nodoso.
- c) artrite.
- d) comprometimento do parênquima pulmonar característico com uma aparência de “árvore em brotamento”.

QUESTÃO 32

Sobre o comprometimento articular da sarcoidose, é falso dizer:

- a) pode ser a primeira manifestação da doença, ocorrendo como monoartrite, eventualmente oligoartrite e raramente poliartrite
- b) em mais da metade das vezes ocorre associado ao eritema nodoso
- c) a associação com níveis elevados da ECA é observada em 50% dos casos, e sugere doença pulmonar ativa
- d) a artrite crônica é rara, usualmente poliarticular, ocasionalmente monoarticular

QUESTÃO 33

É considerado marcador da hepatite auto-imune do tipo II:

- a) anti-músculo liso
- b) anti- LKM1
- c) anti-mitocôndria
- d) p-ANCA

QUESTÃO 34

Na pancreatite auto-imune, **quais dos anticorpos abaixo** devem ser considerados para a avaliação diagnóstica?

- I - anti-lactoferrina (ALA)
- II - anti-anidrasecarbônica (ACA)
- III - anti-antígeno solúvel hepático/ fígado-pâncreas (anti-SLA/LP)
- IV - anti-receptor da asialoglicoproteína (anti-ASGPR)

- a) apenas I.
- b) apenas I e II.
- c) apenas I, II, III.
- d) I, II, III e IV.

QUESTÃO 35

Sobre a doença de Still do adulto, é **INCORRETO** afirmar que:

- a) a ferritina encontra-se elevada na fase ativa da doença, mas não é considerada específica para a mesma, uma vez que se altera em outras doenças inflamatórias.
- b) artralgias são relatadas em virtualmente todos os pacientes, e sua intensidade varia com os picos febris.
- c) o acometimento das inter-falangianas distais é um achado notório, uma vez que essas articulações são poupadas na maioria das poliartrites.
- d) o acometimento de ombros e/ou quadris na fase inicial da doença é preditivo de um curso mais benigno.

QUESTÃO 36

São manifestações associadas à acromegalia, **EXCETO**:

- a) fraqueza muscular proximal simétrica acompanhada por alterações da eletromiografia e elevação das enzimas musculares.
- b) síndrome do túnel do carpo.
- c) fenômeno de Raynaud.
- d) hipertrofia da cartilagem articular.

QUESTÃO 37

Com relação à osteoporose, é **INCORRETO** dizer que:

- a) o uso de corticóide é a principal causa de osteoporose secundária e a segunda causa mais freqüente de osteoporose em mulheres.
- b) o fumo e o hipogonadismo são as principais causas de osteoporose em homens.
- c) a densitometria óssea deve ser sempre requisitada para a mulher acima de 65 anos.
- d) na impossibilidade da avaliação da densidade de massa óssea no fêmur proximal ou coluna lombar, deve-se utilizar o antebraço dominante.

QUESTÃO 38

São drogas tanto anti-reabsortivas quanto pró-formadoras de massa óssea:

- a) bisfosfonatos.
- b) moduladores seletivos para receptores estrogênicos (SERMs).
- c) ranelato de estrôncio.
- d) calcitonina.

QUESTÃO 39

Sobre a doença de Paget, é **CORRETO** afirmar que:

- a) a forma monostótica é a mais comum.
- b) a forma poliestótica é mais comum em homens.
- c) o crânio e vértebras são os sítios mais freqüentemente afetados.
- d) a fosfatase alcalina encontra-se alterada em virtualmente todos os casos.

QUESTÃO 40

A hiperostose esquelética idiopática difusa (DISH) encontra-se associada a todas as condições abaixo, **EXCETO**:

- a) diabetes.
- b) acromegalia.
- c) obesidade.
- d) doença coronariana.

QUESTÃO 41

São condições associadas à deposição de cristais de pirofosfato de cálcio, **EXCETO**:

- a) hipertireoidismo.
- b) hipomagnesemia.
- c) hemocromatose.
- d) hipofosfatase.

QUESTÃO 42

À microscopia de luz polarizada, os cristais de monourato de sódio apresentam:

- a) birrefringência positiva fraca.
- b) birrefringência negativa forte.
- c) birrefringência positiva forte.
- d) aspecto rombóide.

QUESTÃO 43

Leia as afirmativas sobre a gota no idoso:

- I - Distribuição semelhante entre os sexos.
- II - apresentação poliarticular freqüente.
- III - uso crônico de diuréticos e de aspirina em baixas doses são considerados fatores associados.
- IV - incidência menor de tofos.

Pode-se afirmar, sobre as afirmativas acima, que:

- a) todas estão corretas.
- b) I, II, IV estão corretas.
- c) II, III estão corretas.
- d) I, II, III estão corretas.

QUESTÃO 44

A síndrome mão-pé é uma manifestação de qual das doenças abaixo relacionadas?

- a) Talassemia.
- b) Anemia falciforme.
- c) Hemofilia.
- d) Histiocitose.

QUESTÃO 45

Com relação às artrites piogênicas, considere as afirmativas:

- I - *Staphylococcus aureus*, *Neisseria gonorrhoeae* e *Streptococcus* são os microorganismos mais freqüentemente envolvidos na artrite piogênica em indivíduos adultos previamente saudáveis.
- II - *Staphylococcus aureus* e gram-negativos anaeróbios são os agentes mais freqüentes nas artrites piogênicas em neonatos e crianças até os 6 anos de idade.
- III - a antibioticoterapia empírica deve ser iniciada o mais precocemente possível.
- IV - a drenagem articular seriada deve ser evitada sob o risco de novas contaminações.

Estão **CORRETAS**:

- a) I, II, III apenas.
- b) I, II, IV apenas.
- c) I, III, IV apenas.
- d) I, II, III, IV.

QUESTÃO 46

Quanto ao mecanismo desencadeante e mantenedor da artrite/destruição óssea na artrite reumatóide, as interações entre vários tipos celulares e seus mediadores solúveis (citocinas, quimiocinas e fatores de crescimento) são responsáveis pela destruição tecidual.

Marque **(V)** - VERDADEIRO ou **(F)** - FALSO nas afirmativas abaixo:

___ O TNF (previamente "TNF-alfa) é produzido principalmente por macrófagos da membrana sinovial e induz a liberação de várias outras citocinas.

___ a IL-1 (interleucina 1) é produzida principalmente por monócitos e macrófagos sinoviais e age sinergicamente com o TNF para indução de IL-6 (interleucina 6).

___ a IL-6, por sua vez, age como estimuladora de linfócitos B e induz a liberação de proteínas de fase aguda pelo fígado.

___ o GM-CSF (Fator estimulador de colônias granulócitos-macrófagos) é um produto exclusivo de linfócitos T.

___ as quimiocinas, produzidas especialmente por macrófagos e sinoviócitos B, atuam não apenas como agentes quimiotáticos, mas também como ativadores de linfócitos e da angiogênese.

___ a IL-17 é expressa em linfócitos T (Th17) e tem papel inibitório da osteoclastogênese, mas uma atividade pró-inflamatória como indutora da IL-6.

___ a destruição óssea é provocada pela interação entre RANKL ao receptor RANK, ligação esta que é estimulada na presença da osteoprotegerina.

A ordem **CORRETA**, de cima para baixo, é:

- a) V, V, F, F, F, F, V
- b) V, V, V, V, F, F, F
- c) V, V, V, F, V, F, F
- d) V, V, F, F, V, F, V

QUESTÃO 47

Com relação à patogênese da artrite reumatóide, pode-se dizer sobre a função dos linfócitos B nesse mecanismo:

I - produção de anticorpos.

II - apresentação de antígenos aos linfócitos CD4+.

III - produção de citocinas.

Estão **CORRETAS**:

- a) apenas I e II.
- b) apenas II e III.
- c) apenas I e III.
- d) I, II e III.

QUESTÃO 48

Ao optar pela prescrição de metotrexato (MTX) na dose de 15mg/semana e prednisona 15mg/dia como primeiro esquema terapêutico para seu paciente com diagnóstico recente de artrite reumatóide, você detectou uma melhora parcial após 3 meses de tratamento. De acordo com o Consenso Brasileiro no Diagnóstico e Tratamento da Artrite Reumatóide, seria **INCORRETO** como próximo passo a ser tomado:

- a) aumento progressivo da dose do MTX a cada 4-6 semanas até alcançar a dose máxima.
- b) acrescentar outra(s) droga modificadora do curso da doença (DMCD).
- c) substituir o MTX por leflunomida, uma vez que seu paciente queixou-se de intolerância ao aumento da dose do MTX.
- d) anti-TNF.

QUESTÃO 49

Em relação ao paciente da questão anterior, você, ao concluir que deveria modificar seu esquema terapêutico, em relação ao paciente da questão anterior, baseou-se na avaliação do DAS28 no início do tratamento e no terceiro mês:

- a) 5,7 e 3,8
- b) 5,7 e 1,2
- c) 0,6 e 1,2
- d) 0,6 e 3,8

QUESTÃO 50

Você é chamado para avaliação de uma paciente internada no CTI há quatro dias com o seguinte quadro clínico: LES há 16 anos sem controle regular com reumatologista, em uso de prednisona 5mg/dia. Admitida para internação após crises convulsivas e alteração cognitiva acompanhada por febre. Hemoculturas e cultura do líquido sem infecção. Anemia normocítica com reticulocitose, linfopenia, plaquetopenia e consumo de complemento. Alteração do sedimento urinário e elevação da creatinina. O esfregaço de sangue periférico detecta a presença de esquizócitos. Seu diagnóstico é:

- a) LES e síndrome antifosfolípide catastrófica.
- b) LES e síndrome de Evans.
- c) LES e CID.
- d) LES e púrpura trombocitopênica trombótica.

QUESTÃO 51

De acordo com o Consenso de LES, nos pacientes com glomerulonefrite membranosa pura, o tratamento deve ser realizado com corticoterapia e agentes imunossupressores na vigência de síndrome nefrótica. Dentre os imunossupressores elegíveis, marque a alternativa **INCORRETA**:

- a) ciclofosfamida oral.
- b) ciclofosfamida EV.
- c) ciclosporina.
- d) micofenolato mofetil.

QUESTÃO 52

Com relação à vacinação de pacientes com o diagnóstico de LES, é **CORRETO** afirmar:

- a) vacinação contra influenza é segura e deve ser indicada para todos os pacientes em uso de imunossupressores.
- b) vacinação contra rubéola, na vigência de risco de epidemia, deve ser indicada.
- c) vacina contra hepatite B não deve ser indicada a pacientes em uso de prednisona em doses superiores a 20mg/dia.
- d) vacina contra pneumococo deve ser evitada em pacientes com doença ativa.

QUESTÃO 53

Na paciente lúpica grávida devem ser evitadas o uso das seguintes medicações, **EXCETO**:

- a) Micofenolato mofetil.
- b) Azatioprina.
- c) Ciclofosfamida.
- d) Metotrexato.

QUESTÃO 54

De acordo com os fatores de risco atribuídos com base nos níveis de evidência para o efeito de drogas no feto, marque a segunda coluna de acordo com a primeira:

- A - Estudos controlados sem evidência de risco.
- B - Estudos animais sem risco fetal, sem estudos controlados em humanos.
- C - Estudos em animais revelaram efeitos teratogênicos, sem comprovação de riscos em humanos.
- D - Evidências de risco humano fetal. Utilizadas em casos extremos.
- X - Anomalias fetais em animais e humanos.

- () hidroxicloroquina
- () azatioprina
- () ciclosporina
- () sulfasalazina
- () AINEs
- () betametasona
- () leflunomida

A correspondência **CORRETA**, de cima para baixo, é:

- a) B, C, C, B, C, B, X
- b) C, D, C, B, B, C, X
- c) C, C, D, C, B, B, X
- d) B, D, D, B, B, C, X

QUESTÃO 55

Na síndrome antifosfolípide catastrófica, é considerada terapia de 2^a/3^a linha:

- a) Gamaglobulina EV.
- b) Heparina EV.
- c) Corticoterapia EV.
- d) Rituximabe.

QUESTÃO 56

Com relação à artrite idiopática juvenil (AIJ), é **INCORRETO** afirmar:

- a) Segundo os critérios da International League of Associations for Rheumatology (ILAR), para todas as formas de AIJ deve ser excluída a presença do HLA-B27.
- b) A AIJ forma sistêmica apresenta distribuição igual entre os sexos e pode ocorrer em qualquer período da infância.
- c) A AIJ forma poliarticular com fator reumatóide negativo predomina em meninas e ocorre em qualquer período da infância.
- d) A AIJ forma oligoarticular pode ocorrer sob as formas persistente (até 4 articulações comprometidas) ou estendida (mais de 4 articulações nos 6 primeiros meses de doença).

QUESTÃO 57

Na febre reumática, a profilaxia secundária deve se estender:

- a) até 1 ano após o último surto, quando não há evidência de doença cardíaca.
- b) até 5 anos após último surto, para cardite documentada sem seqüelas.
- c) até 25 anos, para cardite com valvulopatia.
- d) até os 25 anos ou 10 anos após o último surto, para cardite documentada sem seqüelas.

QUESTÃO 58

É considerado critério diagnóstico obrigatório na doença de Kawasaki:

- a) exantema polimorfo.
- b) hiperemia conjuntival bilateral.
- c) artrite.
- d) febre.

QUESTÃO 59

Sobre a angiite granulomatosa do sistema nervoso central, é **CORRETO**:

- a) comprometimento de vasos de médio calibre.
- b) início súbito com febre e cefaléia.
- c) arteriografia com estenoses e dilatações dos vasos intracranianos.
- d) líquido alterado com pleocitose.

QUESTÃO 60

O eritema nodoso é classificado em bases anátomo-patológicas como:

- a) paniculite lobular.
- b) paniculite septal.
- c) paniculite nodular.
- d) paniculite mista.

QUESTÃO 61

De acordo com o Critério Europeu para o diagnóstico da síndrome de Sjögren, é **CORRETO** dizer:

- a) Schirmer ≤ 5 mm em 15 minutos é considerado critério para alteração do exame oftalmológico.
- b) Presentes os sintomas de boca e olhos secos, para o diagnóstico da síndrome primária, na ausência de anticorpos, deve-se recorrer à biópsia labial.
- c) Os sintomas de boca e olhos secos, para serem considerados critérios, devem estar presentes todos os dias por mais de 1 mês.
- d) O fluxo salivar não estimulado $\leq 1,5$ ml em 15 minutos é mais sensível e específico do que a sialografia de parótidas.

QUESTÃO 62

É considerado como manifestação renal associada à síndrome de Sjögren:

- I - acidose tubular renal.
- II - glomerulonefrite membranosa.
- III - vasculite da artéria renal.

São corretas as manifestações apresentadas em:

- a) I e II apenas.
- b) II e III apenas.
- c) I e III apenas.
- d) I, II, III.

QUESTÃO 63

Após realização de um teste isquêmico do antebraço, foram observadas: elevação acima de 3 vezes o valor basal de lactato, com os níveis de amônia discretamente alterados. Qual entre as miopatias metabólicas abaixo descritas é a mais provável como hipótese diagnóstica?

- a) Glicogenose.
- b) Deficiência de carnitina
- c) Miopatia mitocondrial.
- d) Deficiência de MADA.

QUESTÃO 64

É **INCORRETO** dizer sobre os anticorpos miosite-específicos:

- a) São anticorpos dirigidos contra aminoacil-sintetases, enzimas citoplasmáticas que catalizam a ligação de aminoácidos ao tRNA.
- b) Destes, o mais freqüente é o Jo-1, que predomina na polimiosite com doença intersticial pulmonar.
- c) Os anticorpos anti-SRP são marcadores de polimiosite mais branda com boa resposta à corticoterapia.
- d) O anti-Mi-2 é dirigido contra proteínas nucleares e ocorre praticamente restrito à dermatomiosite.

QUESTÃO 65

Quanto aos métodos de imagem para avaliação de sacroiliite, qual apresenta maior sensibilidade e especificidade?

- a) Radiografia simples das sacroilíacas (Ferguson).
- b) Tomografia computadorizada das sacroilíacas.
- c) Cintilografia óssea.
- d) Ressonância magnética das sacroilíacas.

QUESTÃO 66

Além da artrite, outras manifestações músculo-esqueléticas podem estar associadas à artrite psoriásica:

- I dactilite
- II entesite
- III edema periférico
- IV síndrome SAPHO

Estão **CORRETAS**:

- a) apenas I e II.
- b) apenas I, II e III.
- c) apenas I, II e IV.
- d) I, II, III, IV.

QUESTÃO 67

Com relação às manifestações articulares da doença de Chron (DC) e retocolite ulcerativa (RCU), marque a alternativa **INCORRETA**:

- a) A artrite periférica apresenta, em geral, um curso autolimitado, não evoluindo para destruição articular
- b) O envolvimento axial é mais comum em pacientes com RCU do que com DC.
- c) O envolvimento axial apresenta um curso crônico e independe da evolução da doença intestinal.
- d) A sacroiliite radiológica é, em geral, bilateral e simétrica.

QUESTÃO 68

Associe a segunda coluna de acordo com a primeira, para os sítios de acometimento de osteonecrose:

- I Doença de Preiser
- II Doença de Köhler
- III Doença de Freiberg
- IV Doença de Kienböck

- () lunato
- () escafóide
- () tarso-navicular
- () segunda cabeça metatársica

A ordem **CORRETA**, de baixo para cima, é:

- a) IV, I, II, III.
- b) IV, I, III, II.
- c) III, II, I, IV.
- d) III, II, IV, I.

QUESTÃO 69

As articulações podem ser classificadas de acordo com sua estrutura e disposição. De acordo com esta classificação, marque a alternativa **CORRETA**:

- a) Nas sinartroses ou articulações cartilaginosas primárias, os ossos estão unidos por cartilagem hialina.
- b) As sincondroses ou articulações cartilaginosas secundárias são ligeiramente móveis.
- c) A sínfise púbica e as articulações entre os corpos vertebrais são exemplos de diartroses.
- d) As sindesmoses são exemplos de sinartroses.

QUESTÃO 70

Em relação ao planejamento de um tratamento fisioterápico, marque a opção **INCORRETA**:

- a) A termoterapia deve ser sempre evitada em artrites pós-traumáticas agudas.
- b) A diatermia deve ser evitada em pacientes com marca-passo.
- c) Neuropatia periférica e implantes metálicos representam contra-indicações para prescrição de ondas curtas.

- d) O ultra-som não é contra-indicado para sua aplicação sobre implantes metálicos.

ATENÇÃO:

COM SUA LETRA HABITUAL, TRANSCREVA, PARA O ESPAÇO RESERVADO PELA COMISSÃO, NA FOLHA DE RESPOSTAS, A SEGUINTE FRASE:

“A crescente incorporação de tecnologia médica e as novas demandas sociais têm estimulado crescente debate filosófico em torno de problemas de ética prática que não mais encontram respostas no âmbito do modelo ético hipocrático.”

Baseado no *Abstract* de:

ALMEIDA, José Luiz Telles de and SCHRAMM, Fermin Roland. Transição paradigmática, metamorfose da ética médica e emergência da bioética. *Cad. Saúde Pública* [online]. 1999, v. 15, suppl. 1. ISSN 0102-311X - adapt.