



CONCURSO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA IGUAÇU - RJ

CONCURSO PÚBLICO

PROVAS OBJETIVAS – TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Leia atentamente as INSTRUÇÕES:

1. Confira seus dados no cartão-resposta: nome, número de inscrição, cargo para o qual se inscreveu.
2. Confira se a prova que recebeu é para o cargo ao qual se inscreveu.
3. Assine seu cartão-resposta.
4. Aguarde a autorização do Fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem do fiscal, confira o caderno de provas com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de questões ou falha de impressão será aceita depois de iniciada a prova.
5. Sua prova tem **40** questões, com **4** alternativas.
6. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com caneta esferográfica (tinta azul ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas ou rasuradas ou marcadas diferente do modelo estabelecido no cartão-resposta poderão ser anuladas.
7. O cartão-resposta não será substituído, salvo se contiver erro de impressão.
8. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma interferência.
9. A prova será realizada com duração máxima de **3h**, incluído o tempo para a realização da prova objetiva e o preenchimento do cartão-resposta.
10. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas depois de decorrida **1h** do início das mesmas. Contudo, não poderá levar consigo o caderno de provas enquanto não obtiver autorização expressa para tanto, sob pena de ser excluído do concurso.
11. O candidato somente poderá se retirar da sala de provas levando o caderno de provas depois **1h30min** do início das mesmas.
12. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar o cartão-resposta preenchido e assinado, ao fiscal de sala.
13. Os **3** (três) últimos candidatos que realizarem a prova devem permanecer na sala para acompanhar o fechamento do envelope contendo os cartões-resposta dos candidatos presentes e ausentes e assinar a ata de sala atestando que o envelope foi devidamente lacrado.

BOA PROVA!

**PROVAS OBJETIVAS – TÉCNICO DE ENFERMAGEM
LÍNGUA PORTUGUESA**

Lavar as mãos te deixa livre de culpas, literalmente.



Então é por isso que Pôncio Pilatos lavou as mãos.

Se você tiver tomado uma decisão difícil e quer que ela seja cumprida, lave as mãos. Uma equipe de psicólogos descobriu que o simples ato de lavar as mãos faz após tomar uma decisão faz com que as pessoas se sintam mais confortáveis com as escolhas que fizeram, apagando todas as dúvidas sobre as escolhas cotidianas.

O estudo, da Universidade de Michigan, observou que o ato parece afastar as dúvidas de que a pessoa fez a coisa certa. A pesquisa aponta que pessoas que lavaram a mão logo após a tomada de uma decisão importante estavam felizes com suas escolhas, em comparação com aqueles que não o fizeram.

Um grupo de jovens estudantes foi avaliado para observar a preferência deles por CDs. Os jovens analisaram 30 capas de CD e eles escolheram 10 CDs que eles gostariam de possuir e classificaram pela preferência. O estudo então incluiu uma “recompensa” ao teste: que os estudantes escolhem ficar com o quinto ou sexto álbum da lista. Em seguida, metade dos participantes lavou as mãos. Os pesquisadores descobriram que aqueles que lavaram as suas mãos estavam mais felizes com sua decisão do que aqueles que não o fizeram.

Kleyson Barbosa - 10 de maio de 2010. Acesso em <http://super.abril.com.br/blogs/cienciamaluca/lavar-as-maos-te-deixa-livre-de-culpas-literalmente/>

01. Segundo o texto, é CORRETO inferir:

- a) O ato de lavar as mãos após uma tomada de decisão deixa as pessoas mais confortáveis com as escolhas que fizeram.
- b) O ato de lavar as mãos antes de uma tomada de decisão deixa as pessoas mais confortáveis com as escolhas que fizeram.
- c) O ato de lavar as mãos após uma tomada de decisão deixa as pessoas menos confortáveis com as escolhas que fizeram.
- d) O ato de lavar as mãos antes de uma tomada de decisão deixa as pessoas menos confortáveis com as escolhas que fizeram.

02. A intertextualidade é uma forma de diálogo entre textos, que pode se dar de forma mais implícita ou mais explícita e em diversos gêneros textuais. Qual das frases abaixo é um exemplo de intertextualidade?

- a) Em seguida, metade dos participantes lavou as mãos.
- b) Então é por isso que Pôncio Pilatos lavou as mãos.
- c) Um grupo de jovens estudantes foi avaliado para observar a preferência deles por CDs.
- d) Se você tiver tomado uma decisão difícil e quer que ela seja cumprida, lave as mãos.

03. A linguagem empregada no texto é:

- a) Predominantemente regionalista.
- b) Predominantemente vulgar.
- c) Predominantemente conotativa.
- d) Predominantemente denotativa.

04. Em qual das alternativas abaixo se encontra um exemplo de oração condicional?

- a) Os pesquisadores descobriram que aqueles que lavaram as suas mãos estavam mais felizes com sua decisão.
- b) Se você tiver tomado uma decisão difícil e quer que ela seja cumprida, lave as mãos.
- c) Um grupo de jovens estudantes foi avaliado para observar a preferência deles por CDs.
- d) Em seguida, metade dos participantes lavou as mãos.

Leia com atenção ao poema de autoria de Vinícius de Moraes a seguir:

TERNURA

Eu te peço perdão por te amar de repente
 Embora o meu amor
 seja uma velha canção nos teus ouvidos
 Das horas que passei à sombra dos teus gestos
 Bebendo em tua boca o perfume dos sorrisos
 Das noites que vivi acalentando
 Pela graça indizível
 dos teus passos eternamente fugindo
 Trago a doçura
 dos que aceitam melancolicamente.
 E posso te dizer
 que o grande afeto que te deixo
 Não traz o exaspero das lágrimas
 nem a fascinação das promessas
 Nem as misteriosas palavras
 dos véus da alma...
 É um sossego, uma unção,
 um transbordamento de carícias
 E só te pede que te repouses quieta,
 muito quieta
 E deixes que as mãos cálidas da noite
 encontrem sem fatalidade
 o olhar estático da aurora.

Texto extraído da antologia "Vinicius de Moraes - Poesia completa e prosa", Editora Nova Aguilar - Rio de Janeiro, 1998, pág. 259.

05. O poema "Ternura":

- a) Tem predominância das 1ª e 3ª pessoas do singular.
- b) Tem predominância das 2ª e 3ª pessoas do plural.
- c) Tem predominância das 1ª e 2ª pessoas do singular.
- d) Tem predominância das 1ª e 2ª pessoas do plural.

06. A linguagem deste poema é:

- a) Predominantemente irônica.
- b) Predominantemente conotativa.
- c) Predominantemente denotativa.
- d) Predominantemente coloquial.

07. O trecho "E posso te dizer que o grande afeto que te deixo (...) É um sossego, uma unção, um transbordamento de carícias" contém um exemplo de:

- a) Catacrese.
- b) Metonímia.
- c) Sinestesia.
- d) Gradação.

08. A oração "Trago a doçura dos que aceitam melancolicamente." apresenta que tipo de sujeito?

- a) Sujeito inexistente.
- b) Sujeito oculto.
- c) Sujeito simples.
- d) Sujeito indeterminado.

09. Em qual das alternativas abaixo temos os sinônimos, segundo o que se pode inferir do poema lido, das palavras apresentadas, respectivamente?

- I – Exaspero;
- II – Unção;
- III – Cálidas.

- a) Desespero, dádiva, ardente.
- b) Esperança, consagração, piedade.
- c) Caridade, repetição, carinho.
- d) Desespero, repetição, caridade.

10. Na construção sintática “Eu te peço perdão por te amar de repente(I) / Embora o meu amor seja uma velha canção nos teus ouvidos(II)”, a relação estabelecida entre os períodos I e II é de:

- a) Concessão.
- b) Condição.
- c) Comparação.
- d) Conclusão.

Leia com atenção o texto a seguir:



Acesso em 10.05.2010. <http://pandjango.com/wpcontent/uploads/2009/02>

11. Do que pode ser entendido da frase acima, é CORRETO afirmar:

- a) A ironia do texto é alcançada através da interpretação figurativa do verbo ler, ação que é desempenhada pela senhora que está manuseando o caixa eletrônico.
- b) A graça do texto é alcançada através da interpretação conotativa do verbo ler, ação que é desempenhada pelo caixa eletrônico.
- c) O humor do texto é alcançado através da interpretação literal do verbo ler, ação que é desempenhada pela senhora que está com o papel em suas mãos.
- d) O sarcasmo do texto é alcançado através da interpretação não-litera do verbo ler, ação que é desempenhada pela senhora que está com o papel em suas mãos.

12. Sobre o nível da linguagem utilizada nos balões de falas das personagens componentes da charge acima é CORRETO afirmar que:

- a) É exemplo de linguagem formal e culta.
- b) É exemplo de linguagem regionalista e formal.
- c) É exemplo de linguagem coloquial e informal.
- d) É exemplo de linguagem culta e de efeito retórico.

13. Sobre o uso das reticências, é CORRETO afirmar que:

- a) São utilizadas para indicar ironia na fala da senhora que manuseia o caixa eletrônico e faz referência à dificuldade que as senhoras têm sobre a maneira correta de se fazer ler o código de barras.
- b) São utilizadas para indicar uma pausa na fala da senhora que manuseia o caixa eletrônico e faz referência à dúvida que as senhoras têm sobre a maneira correta de se fazer ler o código de barras.
- c) São utilizadas para indicar aceleração na fala da senhora que manuseia o caixa eletrônico e faz referência à facilidade que as senhoras têm sobre a maneira correta de se fazer ler o código de barras.
- d) São utilizadas para indicar emoção repentina na fala da senhora que manuseia o caixa eletrônico e faz referência à dificuldade que as senhoras têm sobre a maneira correta de se fazer ler o código de barras.

14. A palavra “hmmm” utilizada no primeiro balão de falas na charge acima pode ser classificada como:

- a) Substantivo.
- b) Conjunção.
- c) Preposição.

d) Interjeição.

15. No segundo balão de falas, as palavras “fino” e “grosso” são caracterizadas como:

a) Adjetivos substantivados, pois toda palavra precedida de artigo se torna um substantivo, desde que já não seja um substantivo originalmente. São palavras putativas, tidas e havidas de uma categoria gramatical, mas exercendo outra função.

b) Substantivos adjetivados, pois toda palavra precedida de artigo se torna um adjetivo, desde que já não seja um adjetivo originalmente. São palavras putativas, tidas e havidas de uma categoria gramatical, mas exercendo outra função.

c) Pronomes substantivados, pois toda palavra precedida de artigo se torna um substantivo, desde que já não seja um substantivo originalmente. São palavras putativas, tidas e havidas de uma categoria gramatical, mas exercendo outra função.

d) Verbos adjetivados ou formas nominais do verbo, pois toda palavra precedida de artigo se torna um adjetivo, desde que já não seja um adjetivo originalmente. São palavras putativas, tidas e havidas de uma categoria gramatical, mas exercendo outra função.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. A mulher possui fases da vida assim como o homem. Fases essas que têm nomenclaturas diferentes em cada fase. A mulher está no período de puerpério quando:

a) Quando está em um período que corresponde aos 45 dias após o parto.

b) Quando está em um período que corresponde aos 30 dias após o parto.

c) Quando está em um período que corresponde aos 42 dias após o parto.

d) Quando está em um período que corresponde aos 28 dias após o parto.

17. É considerado período neonatal:

a) Período correspondente aos primeiros 45 dias de vida do recém-nascido.

b) Período correspondente as primeiras 28 horas de vida do recém-nascido.

c) Período correspondente aos primeiros 28 dias de vida do recém-nascido.

d) Período correspondente as primeiras 48 horas de vida do recém-nascido

18. O Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento foi instituído pelo MS pela Portaria/GM nº 569, para base nas análises das necessidades de atenção específica à gestante, ao recém nascido e à mãe em seu período pós-parto tendo como algumas prioridades:

I - O de concentrar seus esforços para redução de altas taxas de morbimortalidade materna, peri e neonatal no país.

II - O estímulo ao parto normal onde o nascimento deve ser visto como o melhor para a mãe e o recém-nascido.

III - O de adotar medidas para uma melhoria de acesso, da cobertura e qualidade do acompanhamento pré-natal, da assistência ao parto, puerpério e neonatal.

IV - O de capacitar as gestantes de baixo risco e também as de alto risco, para a realização de seus partos sozinha ou acompanhada de entes queridos.

Está (ão) correta(s):

a) I,III, somente.

b) I,II, III, somente.

c) II, III, somente.

d) II, IV, somente.

19. A equipe de enfermagem deve acolher e acompanhar o pré-natal, fornecendo uma assistência à gestante e à puérpera, fornecendo meios para que a equipe multidisciplinar realize as seguintes atividades:

I - Realização de, no mínimo, 6 consultas de acompanhamento pré-natal, onde seja preferencialmente, duas no primeiro trimestre, uma no segundo e 3 no terceiro trimestre da gestação.

II - Uma consulta de puerpério, até 42 dias após o nascimento.

III - A realização dos seguintes exames: ABO-Rh, VDRL, Urina e Glicemia de jejum somente na primeira consulta.

IV - A classificação de risco gestacional deve ser realizada nas consultas subsequentes e não na primeira, pois uma classificação dessas no início da gestação pode traumatizar a gestante.

Está (ão) correta(s):

a) I, somente.

b) II, somente.

c) I e II, somente.

d) III, IV, somente.

20. No Brasil, são poucos os dados de mortalidade materna com recorte racial/étnico. Sobre a morte materna:

- a) A morte materna é a morte de uma mulher durante a gravidez, parto ou até 42 dias após o término da gestação dependendo da duração ou da localização.
- b) A morte materna é a morte de uma mulher durante a gravidez, parto ou até 42 dias após o término da gestação, independentemente da duração ou da localização da gravidez.
- c) A morte materna é quando o óbito ocorre num período superior a 42 dias e inferior a 60 dias.
- d) A morte materna é quando o óbito ocorre num período superior a 60 dias.

21. Sobre a morte materna tardia:

- a) É quando a morte materna ocorre em um período de 60 dias.
- b) É quando a morte materna ocorre num período superior a 42 dias e inferior a um ano após o fim da gravidez.
- c) É quando a morte materna ocorre num período superior a 60 dias e inferior a um ano após o fim da gravidez.
- d) É quando a morte materna ocorre em um período de 28 dias.

22. A principal causa de morte em adultos no Brasil são as doenças cardiovasculares. A hipertensão arterial é a mais frequente. Inicia-se mais precocemente e apresenta uma evolução mais grave na população negra. Sobre assistência de enfermagem básica para o acompanhamento de gestantes no voltadas nos cuidados com hipertensão:

I - Toda gestante deve ter a pressão arterial verificada sempre que for à consulta de pré-natal.

II - Embora a hipertensão arterial seja uma doença crônica e sem cura, ela é perfeitamente controlável com a educação em saúde – que promova na gestante a adoção de um estilo de vida saudável.

III - Com a administração de medicamentos prescritos por médico, se necessário.

IV - A administração paliativa de insulina para melhora de pressão arterial que pode ser prescrita por necessidade da equipe de enfermagem.

- a) I, II, III, somente.
- b) I, II, IV, somente.
- c) II, III, somente.
- d) I, somente.

23. Sobre a Triagem neonatal, mas conhecida como Teste do Pezinho:

- a) Deve ser realizado a partir do 5º dia de vida, para detectar doenças como o hipotireoidismo, fenilcetonúria, anemia falciforme e fibrose cística.
- b) Deve ser realizado a partir dos 15 minutos de vida, para detectar doenças como o hipotireoidismo, hipertensão genética, anemia falciforme.
- c) Deve ser realizado a partir da segunda semana de vida, para detectar doenças como o hipotireoidismo, fenilcetonúria, anemia cerebral, fibrose cística.
- d) Deve ser realizado a partir do 1º mês de vida, para detectar muitas doenças.

24. As vantagens da amamentação são inúmeras, inegáveis e inquestionáveis tanto para a criança quanto para sua mãe, a família e a sociedade. Até quando deve ser mantido o aleitamento exclusivo:

- a) Até o 3º mês de vida da criança.
- b) Até o 6º mês de vida da criança.
- c) Até o 11º mês de vida da criança.
- d) Até o 1º mês de vida da criança.

25. São muitas as ações em DST/HIV/aids voltadas para crianças, ações essas que têm procurado, primordialmente, diminuir o risco da transmissão do HIV e da sífilis de forma vertical (mãe para filho). São ações que devem ser seguidas no caso de recém-nascido (RN) de mãe soropositivo:

I - O RN deve receber quimioprofilaxia imediatamente após o nascimento e durante as seis primeiras semanas de vida (42 dias).

II - O aleitamento materno é contra-indicado e é garantido o suprimento da fórmula láctea infantil por seis meses. E a mãe deverá receber inibidores de lactação. (Portaria GM/MS n.º 2.104, de 19 de novembro de 2002).

III - Deve ser assegurado o acompanhamento da criança em serviço de saúde especializado para crianças expostas ao HIV;

IV - O bebê deve ter alta da maternidade com consulta agendada nesse serviço, onde será seguido o fluxograma para utilização de testes de acordo com orientação do Ministério da Saúde.

V - É direito de toda criança soropositivo ter acesso ao tratamento com anti-retrovirais.

Está (ão) correta(s):

- a) I, III, IV.
- b) I, III, IV, V.
- c) I, II, III, IV, V.
- d) III, IV, V.

26. A Reforma Psiquiátrica fez que houvesse uma mudança no modo de tratamento e acolhimento da Saúde Mental. Em pouco mais de cinco anos, 91% dos recursos da saúde mental no SUS se concentravam em hospitais psiquiátricos e apenas 9% no sistema ambulatorial, caracterizando a grande distorção do modelo. Sobre o modelo de saúde mental adotado:

- a) Pode-se dizer que com a Reforma Psiquiátrica o modelo a ser mantido é o hospitalocêntrico.
- b) Pode-se dizer que com a Reforma Psiquiátrica o modelo a ser mantido deixa de ser o hospitalocêntrico para o extra-hospitalar.
- c) Pode-se dizer que com a Reforma Psiquiátrica o modelo é o da internação em alas psiquiátricas hospitalares de hospitais filantrópicos.
- d) Pode-se dizer que com a Reforma Psiquiátrica o modelo adotado é o do asilo para acolhimento dos pacientes para tratamento de saúde mental.

27. Sobre o Acolhimento Universal para os serviços públicos de saúde mental infanto-juvenil:

- a) Significa que todos os serviços públicos de saúde mental infanto-juvenil devem estar com portas abertas a todo aquele que chega, ou seja, toda e qualquer demanda dirigida ao serviço de saúde do território, deve ser acolhida, isto é, recebida, ouvida e respondida.
- b) Significa que todos os serviços públicos de saúde mental infanto-juvenil devem estar abertos a tratar como um todo cada paciente.
- c) Significa que os serviços particulares de saúde, que são os responsáveis pelo atendimento de saúde mental infanto-juvenil, devem estar com portas abertas a todo aquele que chega, ou seja, toda e qualquer demanda dirigida ao serviço de saúde do território, deve ser acolhida, isto é, recebida, ouvida e respondida.
- d) Significa que os serviços filantrópicos de saúde mental infanto-juvenil devem tratar igualmente a todos os pacientes para que possam respeitar o princípio de acolhimento universal.

28. A integração da assistência de enfermagem às novas políticas públicas de atenção à saúde mental da criança, assim como todos os serviços públicos de saúde mental infanto-juvenis, em particular os de base territorial e voltados para a atenção intensiva, deverão seguir as seguintes diretrizes operacionais em suas ações de cuidado:

I - Reconhecer aquele que necessita e/ou procura o serviço – seja a criança, o adolescente ou o adulto que o acompanha – como o portador de um pedido legítimo a ser levado em conta, implicando uma necessária ação de acolhimento;

II - Conduzir a ação do cuidado de modo a sustentar, em todo o processo, a condição da criança ou do adolescente como sujeito de direitos e de responsabilidades, o que deve ser tomado tanto em sua dimensão subjetiva quanto social;

III – Não comprometer os responsáveis pela criança ou adolescente a ser cuidado – sejam familiares ou agentes institucionais – no processo de atenção, não situando-os, igualmente, como sujeitos da demanda;

IV - Manter abertos os canais de articulação da ação com outros equipamentos do território, de modo a operar com a lógica da rede ampliada de atenção. As ações devem orientar-se de modo a tomar os casos em sua dimensão territorial, ou seja, nas múltiplas, singulares e mutáveis configurações, determinadas pelas marcas e balizas que cada sujeito vai delineando em seus trajetos de vida.

Está (ão) correta(s):

- a) I, II, somente.
- b) II, III, somente.
- c) I, II, IV, somente.
- d) IV, somente.

29. A função básica dos indicadores de saúde (coeficientes ou taxas) é a de resumir, em alguns poucos números, uma série de dados que de outra forma se tornariam confusos e de difícil interpretação. Os coeficientes de morbidade têm por função:

- a) Relacionar pessoas doentes com a população de onde estas advêm, dentro de um intervalo de tempo determinado.
- b) Relacionar a taxa de nascidos vivos e comparar com as taxas de quantos morrem, para poder encontrar um número.
- c) Relacionar a taxa de mortalidade específica por área de abrangência.
- d) Relacionar a taxa de nascidos vivos e a taxa de esperança de vida.

30. Sobre os indicadores de mortalidade, reconhece-se uma certa incoerência ao se trabalhar ou estimar a saúde de uma população, a partir dos dados de morte. Porém, o óbito, por possuir a propriedade de ser um evento único e importante em qualquer sociedade, possui um registro muito mais fidedigno que a ocorrência das doenças, permitindo conclusões muito mais próximas da realidade. Sobre a mortalidade geral:

I - Mortalidade Geral = Número de óbitos /população X 10 ou uma potência de 10;

II - É uma das maneiras pelas quais a epidemiologia trata a comparação entre duas comunidades;
III - É representada pela razão entre o número de óbitos de menores de um ano de idade pelos nascidos vivos. Este indicador é sempre relacionado a mil nascidos vivos.

- a) I, somente.
- b) I,II, somente.
- c) II, III, somente.
- d) III, somente.

31. A Lei Orgânica da Saúde conceitua Vigilância Epidemiológica (VE) como:

- a) O “conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos”.
- b) O “conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade organizar a forma de tratamento das águas poluídas e lixo hospitalar”.
- c) O “conjunto de medidas para captura de animais peçonhentos que saíram da zona rural para a cidade”.
- d) O “ato de proteger o ambiente natural de animais peçonhentos dando oportunidade para que todos os animais possam se restabelecer em locais próprios”.

32. A amebíase é uma infecção causada por protozoário que se apresenta em duas formas: cisto e trofozoíto. Para uma assistência de enfermagem eficaz na prevenção e controle dessa doença infecto-parasitária, a equipe de enfermagem deve conhecer o básico, de cada doença. Sobre o modo de transmissão da amebíase, está CORRETO afirmar:

- a) Ocorre principalmente em sua forma de transmissão sexual, devido a contato oral-anal.
- b) Os portadores assintomáticos, que manipulam alimentos, não são importantes disseminadores dessa protozoose.
- c) A fonte de transmissão se dá somente pela ingestão de alimentos contaminados.
- d) As principais fontes de infecção são a ingestão de alimentos ou água contaminados por fezes contendo cistos amebianos maduros.

33. Sobre a Ascariíase, está CORRETO afirmar:

I - Doença parasitária do homem, causada por um helminto.

II - Habitualmente, não causa sintomatologia, mas pode manifestar-se por dor abdominal, diarreia, náuseas e anorexia.

III - Tem como agente etiológico - *Ascaris lumbricoides*.

IV - Tem como Reservatório - *Ascaris lumbricoides*.

V- Tem como Reservatório - O homem.

Está (ão) correta(s):

- a) II, III, somente.
- b) II, IV, somente.
- c) II, somente.
- d) I, II,III,V, somente.

34. Uma das atividades de Enfermagem perioperatória, em sua fase de admissão na Unidade ou Centro cirúrgico:

I - Completa o histórico pré-operatório;

II - Reporta os achados inesperados ou quaisquer desvios de normalidade;

III - Se o paciente ficar instável, espera até 30 minutos para reportar, afinal, a tensão pré-operatória é aceita.

Está (ão) correta(s):

- a) I, somente.
- b) I, II, somente.
- c) II, somente.
- d) I, III, somente.

35. São consideradas fatores de risco para complicações cirúrgicas:

I - Hipovolemia;

II - Infecção e sepse;

III - Gravidez;

IV - Incapacidade física ou mental preexistente.

Está (ão) CORRETA(s):

- a) I, somente.
- b) I,II,III, IV.
- c) II,IV, somente.

d) II, V, somente.

36. A assistência de enfermagem a pacientes em situação de urgência, constituem de ações de suma importância na manutenção e/ou restauração da vida do paciente. Sobre o conceito de urgência, está CORRETO afirmar:

- a) Categoria de triagem que significa lesões com risco de vida, real ou potencial, ou doenças que exijam tratamento imediato.
- b) Significa lesões com risco de vida, real ou potencial, ou doenças que exijam tratamento imediato em 60 minutos.
- c) Categoria de triagem que significa doença ou lesão grave que não comporta risco de vida imediato.
- d) Qualquer ato de atendimento que se caracteriza em um tempo inferior a 30 minutos.

37. São exemplos de ações de enfermagem com relação à aferição de sinais vitais:

- a) Aferição de pressão arterial, frequência de pulso, frequência respiratória e temperatura corporal, que são obtidas e registradas.
- b) Verificar a frequência de pulso, frequência respiratória, pressão venosa e temperatura corporal, que são obtidas e registradas.
- c) Somente a aferição de pressão arterial e temperatura devem ser obtidas e registradas, as outras não interferem no quadro do paciente.
- d) Somente a aferição de pressão arterial, frequência de pulso devem ser obtidas.

38. Temos a seguinte prescrição de um medicamento X: 100mg. Porém, o frasco disponível na sala de medicação é de 500mg/5ml. Com isso quantos ml o paciente deverá tomar?

- a) 10 ml.
- b) 5 ml.
- c) 2 ml.
- d) 1 ml.

39. Temos a seguinte prescrição: 250mg injetável de um medicamento X. Porém, na sala de medicação só temos em ampolas de 5ml com 500mg. Com isso, quantos ml deverá ser aplicado no paciente?

- a) 5 ml.
- b) 1ml.
- c) 2,5 ml.
- d) 10 ml.

40. São considerados fatores de risco para Doença da Artéria Coronária:

I - História pregressa;

II - Idade;

III - Sexo;

IV - Raça.

Está (ão) CORRETA(s):

- a) I,II,III.
- b) I,II,III,IV.
- c) I,II, somente.
- d) I,II,IV, somente.

RASCUNHO