

Prezado(a) candidato(a):

Assine e coloque seu número de inscrição no quadro abaixo. Preencha, com traços firmes, o espaço reservado a cada opção na folha de resposta.

Nº de Inscrição	Nome
<input type="text"/>	<input type="text"/>

ASSINALE A RESPOSTA CORRETA.

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Centro Clínico – Dermatologia

QUESTÃO 01

A reação de Mitsuda é uma reação do tipo:

- a) Tipo IV (hipersensibilidade tardia)
- b) Tipo II (citolítica ou citotóxica)
- c) Tipo III (de complexos antígeno-anticorpos solúveis)
- d) Tipo I (anafilática)
- e) Tipo V (de complexos antígeno-anticorpos)

QUESTÃO 02

Qual coloração é usada no exame histopatológico para detecção de mucopolissacárides neutros?

- a) Ácido periódico Schiff.
- b) Verhoef.
- c) Azul toluidina.
- d) Azul Alcian (*Alcian blue*).
- e) Orceina-Giemsa.

QUESTÃO 03

A rede pigmentar (padrão em “favo de mel”) visto à dermatoscopia corresponde a:

- a) Globos de queratina intraepidérmicos sem conexão com a superfície.
- b) Globos de queratina intraepidérmicos com conexão com a superfície.
- c) Pigmento melânico da junção dermoepidérmica e dos cones epidérmicos.
- d) Desordem da arquitetura da junção dermoepidérmica.
- e) Proliferação de células basalóides hiperpigmentadas.

QUESTÃO 04

Assinale a alternativa correta em relação à classificação dos agentes biológicos:

- a) Efalizumab: anticorpo monoclonal humano.
- b) Infliximab: anticorpo monoclonal quimérico.
- c) Adalimumab: anticorpo monoclonal humanizado.
- d) Etanercept: anticorpo monoclonal quimérico.
- e) Alefacept: anticorpo monoclonal humano.

QUESTÃO 05

São drogas que podem exacerbar a psoríase, **EXCETO**:

- a) β -bloqueadores.
- b) Lítio.
- c) Antimaláricos.
- d) Antiinflamatórios não hormonais.
- e) Anticoncepcional VO.

QUESTÃO 06

Todas as questões estão corretas em relação às urticárias, **EXCETO**:

- a) A urticária adrenérgica caracteriza-se por urticas circundadas por halo branco.
- b) A urticária colinérgica caracteriza-se por urticas de 1-3 mm de tamanho e halo de eritema, muito pruriginosas, surgindo em qualquer região, exceto palmas e plantas.
- c) O dermatografismo é devido a uma dilatação capilar (eritema inicial), dilatação arteriolar axônica (eritema reflexo) e edema por extravasamento (urtica).
- d) Nas diferentes formas de urticária ao frio, as lesões são somente na área exposta ao frio.
- e) O dermatografismo branco pode ser observado na dermatite atópica, liquenificações, psoríase, dermatite seborréica, líquen plano, pitiríase rubra pilar.

QUESTÃO 07

Qual indicação dermatológica para o uso do danazol?

- a) Micose fungóide.
- b) Vasculites leucocitoclásticas.
- c) Angioedema hereditário.
- d) Síndrome de Sweet.
- e) Dermatite herpetiforme.

QUESTÃO 08

Qual achado histopatológico mais importante é visto na acrodermatite contínua de Hallopeau?

- a) Células disqueratóticas nas porções inferiores da epiderme.
- b) Hiperqueratose com aumento focal da granulosa.
- c) Degeneração hidrópica da camada basal.
- d) Bolha subepidérmica.
- e) Cavidade subcórnea com neutrófilos (pústula espongiforme).

QUESTÃO 09

Todas as questões estão corretas em relação às doenças bolhosas, **EXCETO**:

- a) O pênfigo vegetante é uma forma incomum de pênfigo foliáceo.
- b) As neoplasias mais freqüentemente associadas ao pênfigo paraneoplásico são: linfoma não-Hodgkin, leucemia linfocítica crônica e tumor de Castleman.
- c) O penfigóide bolhoso geralmente acomete pessoas acima dos 60 anos.
- d) O exame histopatológico de uma lesão recente de dermatose por IgA linear mostra bolha subepidérmica com infiltrado inflamatório rico em neutrófilos.
- e) A dermatite herpetiforme geralmente não acomete as mucosas.

QUESTÃO 10

A epidermólise bolhosa é uma doença bolhosa associada com auto-imunidade ao colágeno:

- a) Tipo IV.
- b) Tipo VII.
- c) Tipo I.
- d) Tipo V.
- e) Tipo III.

QUESTÃO 11

Todas as questões estão corretas em relação à pustulose subcórnea de Sneddon e Wilkinson, **EXCETO**:

- a) Não há acantólise, a não ser excepcionalmente em lesões antigas, pela ação de proteases neutrofílicas sobre as células epidérmicas.
- b) A erupção tende a ocorrer simetricamente, afetando principalmente as axilas, região inguino-crural, abdome e áreas flexoras dos membros.
- c) Não há sintomas sistêmicos.
- d) É uma dermatose rara que atinge mais freqüentemente homens abaixo dos 40 anos.
- e) As mucosas nunca são acometidas.

QUESTÃO 12

O granuloma radial de Miescher é um achado histopatológico característico da seguinte afecção:

- a) Granuloma facial.
- b) Eritema nodoso.
- c) Granuloma anular.
- d) Pioderma gangrenoso.
- e) Tuberculose verrucosa.

QUESTÃO 13

São ictioses congênicas autossômicas recessivas (ou geralmente autossômicas recessivas), **EXCETO**:

- a) Ictiose lamelar.
- b) Eritrodermia ictiosiforme congênita não bolhosa.
- c) Síndrome de Netherton.
- d) Síndrome de Sjögren-Larsson.
- e) Ictiose histrix de Curth-Macklin

QUESTÃO 14

São ictioses que geralmente já se manifestam ao nascimento, **EXCETO**:

- a) Hiperqueratose epidermolítica.
- b) Ictiose lamelar.
- c) Ictiose vulgar.
- d) Eritrodermia ictiosiforme congênita não bolhosa.
- e) Ictiose bolhosa de Siemens.

QUESTÃO 15

Assinale a alternativa **correta** em relação às desordens acantolíticas da pele:

- a) Anormalidades ungueais são raras na doença de Darier.
- b) A Doença de Grover é uma doença rara que apresenta evidente predisposição genética.
- c) A doença de Hailey-Hailey geralmente se manifesta nos primeiros anos de vida.
- d) A maioria dos pacientes com doença de Darier desenvolve as primeiras lesões cutâneas entre os 10 a 20 anos de idade.
- e) A erupção cutânea da doença de Grover geralmente é assintomática.

QUESTÃO 16

Todas as questões estão corretas em relação ao eritema nodoso, **EXCETO**:

- a) É um tipo de paniculite predominantemente lobular sem vasculite.
- b) Não cursa com ulceração das lesões.
- c) É uma síndrome de hipersensibilidade que pode ser devida a vários agentes.
- d) Na sarcoidose, a associação do eritema nodoso com tumefação de linfonodos do hilo pulmonar constitui a síndrome de Löefgren.
- e) A erupção geralmente dura de 3 a 6 semanas e recorrências são freqüentes.

QUESTÃO 17

Assinale a alternativa **correta** em relação à tuberculose cutânea:

- a) A tuberculose verrucosa cútis ocorre por disseminação endógena da micobactéria.
- b) É comum na tuberculose verrucosa cútis o encontro de bacilos no exame histopatológico.
- c) O escrofuloderma geralmente resulta da propagação à pele de lesões tuberculosas pulmonares.
- d) No lúpus vulgar, é raro o encontro de granulomas tuberculóides no exame histopatológico.
- e) O lúpus vulgar ocorre por disseminação endógena da micobactéria.

QUESTÃO 18

Todas as questões estão corretas em relação à lipoidoproteinose, **EXCETO**:

- a) Trata-se de uma desordem autossômica recessiva com fenótipo variável, até entre a mesma família.
- b) A blefarose moniliforme é um achado clínico clássico.
- c) Além do acometimento cutâneo e mucoso, não há acometimento de outros locais do organismo.
- d) O achado mais precoce é a rouquidão pela infiltração das cordas vocais, que ocorre ao nascimento ou nos primeiros anos de vida.
- e) Hiperqueratose pode ocorrer em áreas sujeitas a fricção ou traumas como joelhos, cotovelos, dedos.

QUESTÃO 19

São desordens genéticas que cursam com risco aumentado de neoplasias, **EXCETO**:

- a) Síndrome de Bloom.
- b) Síndrome de Cockaine.
- c) Síndrome de Werner.
- d) Síndrome de Rothmund-Thomson.
- e) Ataxia telangiectasia.

QUESTÃO 20

Qual lesão cutânea é patognomônica da dermatomiosite?

- a) Telangiectasias periungueais.
- b) Pápulas de Gottron.
- c) Eritema heliotrópico.
- d) Poiquilodermia atrofiante vascular.
- e) Calcinose cutânea.

QUESTÃO 21

A doença de Schamberg é um tipo de:

- a) Vasculite.
- b) Malformação vascular.
- c) Linfoma cutâneo.
- d) Paniculite.
- e) Púrpura pigmentosa crônica.

QUESTÃO 22

São dermatoses causadas ou que podem ser causadas por bactéria do gênero *Corynebacterium*, **EXCETO**:

- a) Rinoscleroma.
- b) Tricomiose axilar.
- c) Eritrasma.
- d) Difteria cutânea.
- e) Queratólise plantar sulcada.

QUESTÃO 23

A bainha interna da raiz do pêlo compreende:

- a) A membrana basal hialina, a camada de Huxley e a camada de Henle.
- b) O bulbo e as células germinativas.
- c) A papila, o bulbo e a medula.
- d) A cutícula da bainha, a camada de Huxley e a camada de Henle.
- e) A membrana basal hialina, a papila e o bulbo.

QUESTÃO 24

São formas clínicas de apresentação da psoríase, **EXCETO**:

- a) Pustulose exantemática aguda generalizada.
- b) Psoríase pustular do tipo Von Zumbusch.
- c) Pustulose palmo-plantar.
- d) Impetigo herpetiforme.
- e) Acrodermatite contínua de Hallopeau.

QUESTÃO 25

Qual desordem genética é caracterizada por pigmentação reticulada da pele, distrofias ungueais, leucoqueratose e falência da medula óssea?

- a) Síndrome de Bloch-Sulzberger.
- b) Síndrome de Zinsser-Engman-Cole.
- c) Lipoidoproteinose.
- d) Síndrome de Waardenburg.
- e) Síndrome de Chediak-Higashi.

ATENÇÃO:

COM SUA LETRA HABITUAL, TRANSCREVA, PARA O ESPAÇO RESERVADO PELA COMISSÃO, NA FOLHA DE RESPOSTAS, A SEGUINTE FRASE:

“A crescente incorporação de tecnologia médica e as novas demandas sociais, inclusive de saúde, impuseram importantes transformações na prática médica.”

Extraída do *abstract* de:
ALMEIDA, José Luiz Telles de and SCHRAMM, Fermin Roland. Transição paradigmática, metamorfose da ética médica e emergência da bioética. Cad. Saúde Pública, 1999.