

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

01. “Tratar de forma diferenciada os desiguais, oferecendo mais a quem precisa mais, procurando reduzir as desigualdades”. Esse enunciado é um dos princípios éticos/doutrinários do Sistema Único de Saúde (SUS), conhecido por:

- A) equidade.
- B) integralidade.
- C) universalidade.
- D) humanização.

02. A organização da Atenção Terciária em Saúde é feita em pólos macrorregionais, através do sistema de referência. No Ceará esses pólos estão localizados nas seguintes cidades:

- A) Fortaleza, Sobral e Crato.
- B) Fortaleza, Sobral e Juazeiro do Norte.
- C) Fortaleza, Quixadá e Juazeiro do Norte.
- D) Fortaleza, Sobral, Quixadá e Juazeiro do Norte.

03. O Conselho de Saúde (Nacional, Estadual e Municipal) possui a seguinte característica:

- A) tem caráter provisório e deliberativo, reunindo-se anualmente.
- B) é somente composto por representantes do governo e prestadores de serviço.
- C) atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde.
- D) cumpre as decisões do chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.

04. Para cadastrar um novo estabelecimento de saúde ou qualificar uma nova Equipe de Saúde da Família, assim como para deliberar sobre assuntos relacionados às Políticas Nacionais, o processo deve obedecer a um fluxo já estabelecido, que se inicia

- A) no município, por intermédio do Conselho Municipal de Saúde.
- B) na micro-região de saúde, através da Comissão Intergestores Bipartite (CIB-Regionais).
- C) na macro-região de saúde, via Comissão Intergestores Bipartite do Ceará (CIB-CE).
- D) na Secretaria Estadual da Saúde, por meio da Conselho Estadual de Saúde (CESAU).

05. Considere as seguintes responsabilidades:

I. Promover as condições e incentivar o poder municipal para que assuma a gestão da atenção à saúde de seus municípios, sempre na perspectiva da atenção integral.

II. Assumir, em caráter transitório, a gestão da atenção à saúde daquelas populações pertencentes a municípios que ainda não tomaram para si esta responsabilidade.

III. Promover a harmonização, integração e a modernização dos sistemas municipais, compondo, assim, o SUS – Estadual.

IV. Participar do financiamento do SUS, juntamente com os governos federal e municipais.

Ao gestor estadual, compete:

- A) apenas I e III

- B) apenas I, II e IV
- C) apenas II, III e IV
- D) I, II, III e IV

06. A Emenda Constitucional N.º 29/2000 determinou que os Estados, já em 2004, deveriam vincular, de sua receita de impostos e de transferências recebidas, para as despesas com saúde, a seguinte percentagem:

- A) 10%
- B) 12%
- C) 15%
- D) 20%

07. Marque o ordenador de despesas do Fundo Municipal de Saúde – FMS.

- A) Prefeito do Município.
- B) Secretário Municipal de Saúde.
- C) Secretário Municipal de Fazenda e/ou Finanças.
- D) Secretário Municipal de Planejamento.

08. Considere as seguintes afirmativas sobre os Planos de Saúde.

I. São documentos de intenções políticas, de diagnóstico, de estratégias, de prioridades e de metas.

II. Devem ser submetidos, na íntegra, aos Conselhos de Saúde correspondentes em cada nível de gestão do SUS.

III. Neles deverá constar o Quadro de Metas, com os indicadores.

IV. O Quadro de Metas deve conter as metas prioritárias de cada exercício mensal.

Estão corretos:

- A) apenas I e II
- B) apenas I, II e III
- C) apenas II, III e IV
- D) I, II, III e IV

09. Marque uma condição para ser um Agente Comunitário de Saúde.

- A) Morar na comunidade onde trabalha há pelo menos um ano.
- B) Ter idade mínima de 21 anos.
- C) Saber ler e escrever (preferencialmente ter o 1.º grau escolar).
- D) Ter disponibilidade de 6 horas diárias para exercer seu trabalho.

10. “Um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle de doenças e outros agravos”. Esse enunciado é a definição de:

- A) Vigilância à Saúde.
- B) Vigilância Ambiental.
- C) Vigilância Epidemiológica.
- D) Vigilância Ocupacional.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO

11. Toda substância capaz de impedir a proliferação das bactérias, inativando-as ou destruindo-as é:

- A) bactericida.
- B) bacteriostática.
- C) desinfetante.
- D) anti-séptica.

12. O procedimento que deve ser adotado com a seringa e a agulha após administração de uma injeção intramuscular é:

- A) desconectar a agulha da seringa, reencapá-la e desprezar no lixo comum do hospital.
- B) não desconectar a agulha da seringa, reencapá-la e desprezar no lixo comum.
- C) desconectar a agulha da seringa, reencapá-la e desprezar em recipiente de parede dura a prova de perfuração.
- D) não desconectar a agulha da seringa, não reencapá-la e desprezar em recipiente de parede dura a prova de perfuração.

13. O principal risco ao fazer uma injeção intramuscular na região glútea é a lesão do nervo

- A) ilíaco.
- B) tibial.
- C) ciático.
- D) radial.

14. São anormalidades que um paciente com venóclise pode apresentar:

- A) hematoma e lipodistrofia.
- B) hematoma e lesão de nervos.
- C) choque pirogênico e flebite.
- D) flebite e irritação gástrica.

15. Ao administrar medicação intramuscular na região glútea a área de aplicação deve ser o quadrante

- A) superior externo.
- B) inferior externo.
- C) superior interno.
- D) inferior interno.

16. A frequência normal da respiração no adulto varia de

- A) 16 a 20 vezes por minuto.
- B) 20 a 25 vezes por minuto.
- C) 25 a 30 vezes por minuto.
- D) 30 a 40 vezes por minuto.

17. As artérias mais comuns para verificação do pulso são:

- A) radial, safena, temporal, carótida e femural.
- B) radial, basílica, temporal, carótida e femural.
- C) radial, temporal, carótida, femural e dorsal dos pés.
- D) radial, basílica, carótida, femural e dorsal dos pés.

18. A complicação da ferida após uma laparotomia exploradora que ocorre com abertura da incisão cirúrgica, geralmente após distensão abdominal acentuada, tosse ou grande esforço físico, é denominada

- A) infecção.
- B) deiscência.
- C) evisceração.
- D) edema.

19. A complicação urinária em um paciente idoso, cujos sintomas são ausência de micção por mais de 12 horas ou eliminação de pequena quantidade de urina em intervalos freqüentes, é denominada

- A) infecção urinária.
- B) piúria.
- C) retenção urinária.
- D) bexiga preguiçosa.

20. Os enemas são contra-indicados para pacientes que serão submetidos a craniotomia porque

- A) aumentam a pressão arterial.
- B) diminuem a pressão arterial.
- C) aumentam a pressão intracraniana.
- D) diminuem a pressão intracraniana.

21. Um paciente que se encontra com drenagem torácica deve ser mantido no leito em posição de

- A) Sims.
- B) litotômica.
- C) Trendelenburg.
- D) semi-Fowler.

22. A vacinação anti-tetânica da gestante deverá ser feita:

- A) 2.º, 4.º e 6.º mês de gestação.
- B) 3.º, 6.º e 8.º mês de gestação.
- C) 2.º, 5.º e 7.º mês de gestação.
- D) 4.º, 6.º e 8.º mês de gestação.

23. O aquecimento do recém-nascido (RN) é uma das necessidades mais importantes durante as primeiras horas de vida; porém, deve-se ter cuidado para evitar o superaquecimento, pois pode levar o RN a ter

- A) lesões cerebrais, desidratação e morte.
- B) desidratação, infecção e morte.
- C) queimaduras, desidratação e infecção.
- D) queimaduras, lesões cerebrais e infecção.

24. Um cuidado de enfermagem indispensável ao recém-nascido que se encontra em fototerapia devido à icterícia é:

- A) verificar sinais vitais de 2 em 2 horas.
- B) proteger os olhos do RN durante todo o tempo.
- C) manter o RN vestido.
- D) banhar o RN 2 vezes por dia.

25. Antes da administração de cada dose de digitálicos a um paciente em unidade coronariana, a enfermagem deve verificar:

- A) temperatura e pulso.
- B) pulso e freqüência cardíaca.
- C) respiração e pulso.
- D) temperatura e freqüência cardíaca.

26. A síndrome de abstinência alcoólica pode evoluir para um quadro clínico complicado e dramático, que requer internação. Esse quadro clínico é denominado:

- A) deficiência mental.
B) *Delirium tremens*.
C) esquizofrenia.
D) transtorno de ansiedade.
- 27.** A infecção transmitida entre pacientes é denominada infecção
A) comunitária.
B) sanitária.
C) cruzada.
D) restrita.
- 28.** São cuidados da enfermagem ao realizar curativos:
A) iniciar os curativos pelos mais limpos (assépticos) e fazer os infectados (sépticos) por último.
B) iniciar os curativos pelos infectados (sépticos) e fazer os limpos (assépticos) por último.
C) iniciar os curativos de acordo com o pedido do paciente e destreza do profissional.
D) fazer os curativos limpos (assépticos) e infectados (sépticos) ao mesmo tempo.
- 29.** O tempo de exposição e a temperatura para esterilização em autoclave de material de densidade, por exemplo: gazes, compressas e campos é:
A) 15 minutos a 121°C.
B) 30 minutos a 160°C.
C) 15 minutos a 160°C.
D) 30 minutos a 121°C.
- 30.** Para evitar o ressecamento excessivo das mucosas do nariz e da garganta de um paciente em oxigenoterapia, o oxigênio deve ser
A) puro.
B) umedecido.
C) seco.
D) vigiado.
- 31.** O auxiliar de enfermagem deve orientar e estimular o paciente no pós-operatório mediato para deambulação precoce com a finalidade de prevenir:
A) pneumonia.
B) parotidite.
C) peritonite.
D) tuberculose.
- 32.** Ferida é toda e qualquer lesão que impede o desempenho das funções básicas da pele. São classificadas de acordo com o agente causador, o volume do exsudato e o conteúdo bacteriano. Assim sendo, de acordo com o conteúdo bacteriano, as feridas operatórias são
A) contaminadas.
B) laceradas.
C) sépticas.
D) assépticas.
- 33.** O objetivo da enfermagem em relação à segurança do paciente é evitar, principalmente, a ocorrência de
A) erros de diagnósticos.
B) erros de prescrições de enfermagem.
C) acidentes ou traumatismos.
D) erros de diagnóstico e prescrições de maneira geral.
- 34.** Em emergências psiquiátricas, constitui-se o último recurso necessário para proteger o paciente com agitação psicomotora:
A) uso de contenções.
B) administração de psicotrópicos.
C) observação criteriosa.
D) estímulo à participação em grupos.
- 35.** A posição indicada para exames de coluna vertebral e da região cervical é:
A) lateral.
B) ventral.
C) Sims.
D) genupeitoral.
- 36.** A injeção é chamada hipodérmica quando administrada por via
A) subcutânea.
B) intramuscular.
C) endovenosa.
D) intradérmica.
- 37.** Na administração de medicamento por via intradérmica deve-se introduzir a agulha seguindo um ângulo de
A) 15°
B) 30°
C) 45°
D) 90°
- 38.** A artéria preferencial para verificação da pressão arterial é a
A) braquial.
B) radial.
C) pediosa.
D) temporal.
- 39.** De acordo com o tipo, a alucinação em que o paciente sente pequenos animais andando sobre a pele é denominada alucinação
A) auditiva.
B) olfativa.
C) tátil.
D) visual.
- 40.** São sintomas de intoxicação digitálica que devem ser observados pela equipe de enfermagem que cuida de pacientes com insuficiência cardíaca em uso de digitálicos:
A) hipertensão arterial, anorexia, taquicardia, cefaléia e alterações comportamentais.
B) hipertensão arterial, hipertermia, bradicardia, cefaléia e alterações comportamentais.

C) arritmias, anorexia, bradicardia, cefaléia e alterações comportamentais.

D) arritmias, hipertermia, taquicardia, anorexia e alterações comportamentais.

41. Um adolescente internado na unidade de clínica médica, após administração da insulina, apresentou sonolência, tremores, sudorese, taquicardia, irritabilidade, confusão mental e convulsão. Estes sintomas indicam, provavelmente:

- A) hiperglicemia.
- B) coma.
- C) choque hipoglicêmico.
- D) choque pirogênico.

42. A seqüência ideal para verificação de sinais vitais nas crianças pequenas é:

- A) verificação do pulso, da temperatura, da pressão arterial e da respiração.
- B) verificação da respiração, do pulso, da temperatura e pressão arterial.
- C) verificação do pulso, da pressão arterial, da respiração e da temperatura.
- D) verificação temperatura, pressão arterial, da respiração e do pulso.

43. A variação da frequência respiratória em crianças acima de 6 anos de idade é:

- A) 18 – 20mrpm.
- B) 20 – 25mrpm.
- C) 25 – 35mrpm.
- D) 40 – 45mrpm.

44. A introdução de uma pequena quantidade de líquido no intestino é denominada:

- A) lavagem intestinal ou enteróclise.
- B) enteróclise ou lavagem gástrica.
- C) clister ou enema.
- D) lavagem gástrica ou sondagem gástrica.

45. É uma das finalidades da lavagem intestinal:

- A) aliviar a distensão abdominal.
- B) diminuir o peristaltismo.
- C) intesificar a flatulência.
- D) combater infecção.

46. Um dos cuidados de enfermagem, no pré-operatório, para prevenir complicações anestésicas é:

- A) jejum.
- B) retirada de prótese dentária.
- C) tricotomia.
- D) banho com solução anti-séptica.

47. Além da observação permanente, um dos cuidados básicos que deve ser realizado no pós-operatório imediato é verificar:

- A) gotejamento do soro.
- B) funcionamento dos drenos.
- C) sinais vitais.
- D) pressão venosa.

48. O auxiliar de enfermagem ao realizar uma técnica de maneira incorreta, por desconhecê-la, está cometendo uma infração caracterizada como:

- A) imprudência.
- B) imperícia.
- C) displicência.
- D) negligência.

49. Toda substância capaz de impedir a proliferação das bactérias, inativando-as ou destruindo-as é:

- A) bactericida.
- B) bacteriostática.
- C) desinfetante.
- D) anti-séptica.

50. A complicação que pode ser evitada mediante a mobilização dos membros inferiores e a deambulação precoce no pós-parto é:

- A) ingurgitamento mamário.
- B) deiscência de sutura.
- C) flebite.
- D) infecção puerperal.