

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

01. “Tratar de forma diferenciada os desiguais, oferecendo mais a quem precisa mais, procurando reduzir as desigualdades”. Esse enunciado é um dos princípios éticos/doutrinários do Sistema Único de Saúde (SUS), conhecido por:

- A) eqüidade.
- B) integralidade.
- C) universalidade.
- D) humanização.

02. A organização da Atenção Terciária em Saúde é feita em pólos macrorregionais, através do sistema de referência. No Ceará esses pólos estão localizados nas seguintes cidades:

- A) Fortaleza, Sobral e Crato.
- B) Fortaleza, Sobral e Juazeiro do Norte.
- C) Fortaleza, Quixadá e Juazeiro do Norte.
- D) Fortaleza, Sobral, Quixadá e Juazeiro do Norte.

03. O Conselho de Saúde (Nacional, Estadual e Municipal) possui a seguinte característica:

- A) tem caráter provisório e deliberativo, reunindo-se anualmente.
- B) é somente composto por representantes do governo e prestadores de serviço.
- C) atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde.
- D) cumpre as decisões do chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.

04. Para cadastrar um novo estabelecimento de saúde ou qualificar uma nova Equipe de Saúde da Família, assim como para deliberar sobre assuntos relacionados às Políticas Nacionais, o processo deve obedecer a um fluxo já estabelecido, que se inicia

- A) no município, por intermédio do Conselho Municipal de Saúde.
- B) na micro-região de saúde, através da Comissão Intergestores Bipartite (CIB-Regionais).
- C) na macro-região de saúde, via Comissão Intergestores Bipartite do Ceará (CIB-CE).
- D) na Secretaria Estadual da Saúde, por meio da Conselho Estadual de Saúde (CESAU).

05. Considere as seguintes responsabilidades:

I. Promover as condições e incentivar o poder municipal para que assuma a gestão da atenção à saúde de seus municípios, sempre na perspectiva da atenção integral.

II. Assumir, em caráter transitório, a gestão da atenção à saúde daquelas populações pertencentes a municípios que ainda não tomaram para si esta responsabilidade.

III. Promover a harmonização, integração e a modernização dos sistemas municipais, compondo, assim, o SUS – Estadual.

IV. Participar do financiamento do SUS, juntamente com os governos federal e municipais.

Ao gestor estadual, compete:

- A) apenas I e III
- B) apenas I, II e IV

C) apenas II, III e IV

D) I, II, III e IV

06. A Emenda Constitucional N.º 29/2000 determinou que os Estados, já em 2004, deveriam vincular, de sua receita de impostos e de transferências recebidas, para as despesas com saúde, a seguinte percentagem:

- A) 10%
- B) 12%
- C) 15%
- D) 20%

07. Marque o ordenador de despesas do Fundo Municipal de Saúde – FMS.

- A) Prefeito do Município.
- B) Secretário Municipal de Saúde.
- C) Secretário Municipal de Fazenda e/ou Finanças.
- D) Secretário Municipal de Planejamento.

08. Considere as seguintes afirmativas sobre os Planos de Saúde.

I. São documentos de intenções políticas, de diagnóstico, de estratégias, de prioridades e de metas.

II. Devem ser submetidos, na íntegra, aos Conselhos de Saúde correspondentes em cada nível de gestão do SUS.

III. Neles deverá constar o Quadro de Metas, com os indicadores.

IV. O Quadro de Metas deve conter as metas prioritárias de cada exercício mensal.

Estão corretos:

- A) apenas I e II
- B) apenas I, II e III
- C) apenas II, III e IV
- D) I, II, III e IV

09. Marque uma condição para ser um Agente Comunitário de Saúde.

- A) Morar na comunidade onde trabalha há pelo menos um ano.
- B) Ter idade mínima de 21 anos.
- C) Saber ler e escrever (preferencialmente ter o 1.º grau escolar).
- D) Ter disponibilidade de 6 horas diárias para exercer seu trabalho.

10. “Um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle de doenças e outros agravos”. Esse enunciado é a definição de:

- A) Vigilância à Saúde.
- B) Vigilância Ambiental.
- C) Vigilância Epidemiológica.
- D) Vigilância Ocupacional.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO

- 11.** Para se fazer uma injeção intradérmica, um dos locais mais indicados é a face
- A) interna da coxa.
 - B) interna do antebraço.
 - C) externa da coxa.
 - D) posterior do braço.
- 12.** Condição que predispõe ao acidente vascular cerebral (AVC):
- A) tuberculose pulmonar.
 - B) contipação intestinal.
 - C) bronquiectasia.
 - D) hipertensão arterial.
- 13.** Manter vigilância constante, isolamento acústico e aspiração freqüente são cuidados de enfermagem ao paciente com
- A) tuberculose.
 - B) AIDS.
 - C) tétano.
 - D) sarampo.
- 14.** O HIV, vírus que causa a AIDS, é inativado pelo seguinte agente:
- A) calor a 30°C por 15 minutos.
 - B) frio a 1°C por 20 minutos.
 - C) etanol a 25% por 5 minutos.
 - D) irradiação ultravioleta por 10 minutos.
- 15.** São cuidados de enfermagem ao paciente com febre tifóide:
- A) isolamento respiratório, incentivar a deambulação e controle de sinais vitais.
 - B) isolamento entérico, oferecer bastante líquido e controle de sinais vitais.
 - C) isolamento respiratório, oferecer bastante líquido e incentivar a deambulação.
 - D) isolamento entérico, incentivar a deambulação e controle da respiração.
- 16.** É uma antroponose, causada por um vírus, que atinge o Sistema Nervoso Central, desenvolvendo uma encefalite aguda.
- A) Poliomielite.
 - B) Leishmaniose.
 - C) Raiva.
 - D) Esquistossomose.
- 17.** A vacina contra sarampo deve ser administrada na criança
- A) ao nascer.
 - B) aos 9 meses de idade.
 - C) aos 12 meses de idade.
 - D) aos 2 anos de idade.
- 18.** Nas aplicações de insulina **NÃO** se deve
- A) fazer anti-sepsia.
 - B) aspirar antes de injetar a droga.
 - C) orientar o paciente.
 - D) fazer massagem após a administração.
- 19.** São doenças preveníveis por vacina:
- A) hepatite B, sarampo e tétano.
 - B) hepatite C, AIDS e tétano.
 - C) hepatite B, leishmaniose e hepatite C.
 - D) AIDS, hepatite A e sarampo.
- 20.** É um dos mais importantes cuidados da enfermagem quando se está auxiliando a realização de uma broncoscopia:
- A) colocar o paciente em decúbito dorsal.
 - B) verificar sinais vitais de 30 em 30 minutos.
 - C) deixar preparado medicamento broncodilatador.
 - D) incentivar a ingestão de líquidos.
- 21.** De acordo com a classificação de dosagem de medicamento, a quantidade de uma droga que ultrapassa a dosagem terapêutica e que, portanto, causa perturbações, por vezes de muita gravidade, é definida como dose
- A) mediana.
 - B) máxima.
 - C) tóxica.
 - D) letal.
- 22.** A escovação tem por propósito ajudar a prevenir a possibilidade de contaminação da ferida operatória por bactérias das mãos e dos braços. Assim sendo, a técnica de escovação deve começar
- A) pelas unhas.
 - B) pelas mãos.
 - C) pelo cotovelo.
 - D) pelo antebraço.
- 23.** Numa sala de recuperação, são dispensados cuidados a múltiplos pacientes. Os riscos de infecção e infecção cruzada são elevados. As medidas contra infecção devem ser tão cuidadosas quanto as utilizadas nas salas de cirurgias. Portanto, o cuidado básico que deve ser tomado é
- A) usar máscara descartável sempre.
 - B) usar avental descartável sempre.
 - C) lavar as mãos entre o atendimento de um paciente e de outro.
 - D) usar luvas para realizar qualquer cuidado.
- 24.** Segundo a classificação de instrumental cirúrgico, o porta-agulha faz parte do grupo de material de:
- A) densidade.
 - B) diérese.
 - C) síntese.
 - D) superfície.
- 25.** Para que se efetue a esterilização pelo calor seco, exceto substâncias oleosas, o período de exposição e a temperatura necessários são, respectivamente:
- A) 2 horas a 160°C.
 - B) 2 horas a 120°C.
 - C) 1 hora a 160°C.
 - D) 1 hora a 120°C.

- 26.** É um dos sinais característicos da insuficiência respiratória aguda:
- A) cianose.
 - B) tosse.
 - C) febre.
 - D) bradicardia.
- 27.** O número de pulsações ou frequência normal do pulso no lactente varia de
- A) 60 a 70 pulsações por minuto.
 - B) 65 a 80 pulsações por minuto.
 - C) 20 a 125 pulsações por minuto.
 - D) 125 a 130 pulsações por minuto.
- 28.** Quando o técnico de enfermagem comete uma infração ética, as penalidades são impostas
- A) pela Associação Brasileira de Enfermagem.
 - B) pelo Código Civil Brasileiro.
 - C) pelos Conselhos Federal e/ou Regional de Enfermagem.
 - D) pelo Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem.
- 29.** É uma das finalidades da lavagem vesical:
- A) assegurar esvaziamento completo da bexiga e eliminar a dor.
 - B) obter urina asséptica e controlar débito urinário.
 - C) prevenir ou combater infecção e desobstruir a sonda.
 - D) controlar débito urinário e relaxar a musculatura.
- 30.** Alguns fatores alteram os resultados da pressão arterial na criança; dentre eles, está o uso de manguito inadequado. Portanto, o tamanho do manguito deve ser adequado ao tamanho do indivíduo. Como regra geral, o manguito deve cobrir
- A) um terço do braço da criança.
 - B) metade do braço da criança.
 - C) dois terços do braço da criança.
 - D) um quarto do braço da criança.
- 31.** Uma criança de 5 anos internada em uma unidade de pediatria apresenta frequência respiratória de 35 movimentos respiratórios por minuto. O termo utilizado para descrever esta frequência é:
- A) eupnéica.
 - B) normal.
 - C) bradipnéica.
 - D) taquipnéica.
- 32.** O Técnico ou Auxiliar de Enfermagem, durante uma punção lombar, deve ajudar ao paciente que fará punção a manter-se na seguinte posição:
- A) em decúbito lateral, com dorso em flexão mínima, joelhos semi-fletidos e a nuca curvada para trás.
 - B) em decúbito lateral, com dorso em flexão máxima, joelhos fletidos e nuca curvada para frente.
 - C) em decúbito lateral, apenas com a nuca curvada para frente.
 - D) em decúbito lateral, apenas com os joelhos fletidos.
- 33.** A presença de ar no espaço intrapleural recebe a denominação de
- A) hemotórax.
 - B) empiema.
 - C) quilotórax.
 - D) pneumotórax.
- 34.** São tratamentos realizados pelas vias respiratórias:
- A) instilação, oxigenoterapia e inalação.
 - B) instilação, nebulização e inalação.
 - C) inalação, nebulização e oxigenoterapia.
 - D) instilação, nebulização e aerosolterapia.
- 35.** Além de reduzir a carga do trabalho cardíaco e aliviar a dor, a terapêutica da angina tem como objetivo prevenir
- A) a hipertensão arterial.
 - B) o acidente vascular cerebral.
 - C) o edema agudo.
 - D) o infarto do miocárdio.
- 36.** Cada bolsa nova de colostomia pode permanecer fixada à pele por um período de
- A) apenas 1 dia.
 - B) 1 a 2 dias.
 - C) 2 a 4 dias.
 - D) 3 a 7 dias.
- 37.** Um dos meios utilizados pela equipe de enfermagem para estimular a micção em uma paciente com retenção urinária é
- A) fazer lavagem da genitália com água morna, gotejando a água sobre o clitóris.
 - B) fazer lavagem da genitália com água gelada, gotejando a água sobre o clitóris.
 - C) colocar bolsa de água gelada sobre a bexiga.
 - D) colocar aparadeira e esperar pelo menos 10 minutos.
- 38.** A destruição de microorganismos patogênicos nos materiais e ambientes, sem que haja destruição de esporos, denomina-se:
- A) esterilização.
 - B) desinfecção.
 - C) anti-sepsia.
 - D) assepsia.
- 39.** O técnico de enfermagem ao fazer anotações no prontuário deve usar uma linguagem clara, concisa e evitar códigos pessoais, taquigráficos, e sobretudo, a grafia ilegível, porque o prontuário é um instrumento de
- A) humanização.
 - B) admissão.
 - C) observação.
 - D) comunicação.
- 40.** Os medicamentos utilizados na psiquiatria são classificados de acordo com a indicação clínica. Assim sendo, os medicamentos que atuam na insônia são classificados como
- A) ansiolíticos.
 - B) neurolépticos.

- C) hipnóticos.
- D) antidepressivos.

41. Um paciente com depressão, principalmente quando começa a manifestar sinais de melhora, requer muito da enfermagem, devido

- A) à diminuição dos reflexos.
- B) às alucinações.
- C) ao pânico.
- D) ao risco de suicídio.

42. São complicações psiquiátricas no alcoolista, decorrentes da síndrome de abstinência:

- A) hepatomegalia e hipertensão arterial.
- B) insônia e pesadelos.
- C) arritmias e insônia.
- D) hipertensão arterial e pesadelos.

43. São doenças causadas por vírus:

- A) dengue e hepatite B.
- B) tuberculose e AIDS.
- C) dengue e hanseníase.
- D) AIDS e tétano.

44. Em um curativo simples, a anti-sepsia da lesão deve ser feita

- A) com movimentos leves.
- B) do centro para as bordas.
- C) das bordas para o centro.
- D) em sentido horário.

45. Após administrar alimentação por sonda nasogástrica, para evitar a sua obstrução, deve-se

- A) colocar o paciente em decúbito lateral.
- B) introduzir um pouco de ar.
- C) introduzir um pouco de água.
- D) manter a sonda aberta.

46. É um dos cuidados de enfermagem após a morte de um paciente:

- A) retirar próteses dentárias.
- B) observar venóclise.
- C) administrar compressas.
- D) tamponar orifícios naturais.

47. É uma das finalidades da lavagem intestinal:

- A) diminuir o peristaltismo.
- B) intensificar a flatulência.
- C) aliviar a distensão abdominal.
- D) prevenir infecção.

48. As medidas utilizadas na Saúde Pública que dizem respeito à promoção da saúde e à proteção específica, são respectivamente:

- A) diagnóstico precoce e reabilitação.
- B) educação sanitária e imunização.
- C) diagnóstico precoce e isolamento.
- D) prevenção das incapacidades e isolamento.

49. Após cirurgia de resvascularização do miocárdio, um paciente apresentou choque hipovolêmico. Os sintomas indicativos desta anormalidade são:

- A) hipertensão, calafrios e anúria.

- B) afasia, hipertensão e pulso rápido.
- C) extremidades frias, hipotensão e nistagmo.
- D) taquicardia, hipotensão e palidez.

50. As artérias que devem ser puncionadas para realização de gasometria são:

- A) pediosa e safena.
- B) radial e femoral.
- C) braquial e pediosa.
- D) jugular e safena.