

LEGISLAÇÃO DO SUS

01. O Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Vigilância em Saúde, publicou em 2006 a Política Nacional de Promoção da Saúde. São ações prioritárias dessa Política:

- A) incentivo à amamentação, campanha de prevenção as DST/aids, prevenção e controle do tabagismo
- B) alimentação saudável, redução da morbimortalidade por acidentes de trânsito
- C) redução da morbimortalidade em decorrência do uso abusivo de álcool e outras drogas, estímulo a atividade física e redução de gravidez na adolescência
- D) promoção do desenvolvimento sustentável, controle da obesidade infanto-juvenil, redução da mortalidade infantil

02. O financiamento das ações básicas de saúde se dá pelo Piso de Atenção Básica (PAB), composto por uma parte fixa e outra variável. Os investimentos aplicados por meio do PAB variável têm por objetivo:

- A) estimular a implantação de estratégias nacionais de reorganização do modelo de atenção à saúde
- B) ampliar o montante de recursos destinados à qualificação da média e da alta complexidade
- C) financiar ações de saúde em municípios de pequeno porte
- D) assegurar a autonomia dos municípios na sua utilização

03. A estratégia de Saúde da Família tem como objetivo central a reorientação da atenção básica no âmbito do Sistema Único de Saúde. São princípios dessa estratégia:

- A) ter caráter complementar em relação à atenção básica, realizar cadastramento das famílias e atuar de forma intersetorial
- B) desenvolver atividades com base no diagnóstico situacional, ter como foco o indivíduo e buscar parcerias para as ações de saúde
- C) dirigir as ações aos problemas de saúde de maneira pactuada com a comunidade, priorizar as ações recuperadoras e manter postura pró-ativa frente aos problemas de saúde-doença da população
- D) atuar no território, ofertar cuidado longitudinal e ser um espaço de construção da cidadania

Sobre as Diretrizes Operacionais do Pacto pela Saúde, publicadas pelo Ministério da Saúde no ano de 2006, responda às questões de números 4 a 7

04. É uma diretriz e uma ação do Pacto em Defesa do SUS, respectivamente:

- A) expressar os compromissos entre gestores do SUS com a consolidação da Reforma Sanitária Brasileira; implantar serviços de atenção domiciliar
- B) desenvolver e articular ações que visem assegurar o SUS como política pública; publicação da Carta dos Direitos dos Usuários do SUS
- C) garantir financiamento de acordo com as necessidades do SUS; apoiar o desenvolvimento de estudos e pesquisas
- D) articular e apoiar a mobilização social pela promoção da cidadania; reorganizar o processo de acolhimento nas unidades de saúde

05. “O Pacto pela Vida é o compromisso entre gestores do SUS em torno de prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira.” São prioridades pactuadas:

- A) saúde bucal; controle do câncer do colo de útero e da mama; fortalecimento da atenção básica
- B) redução da mortalidade infantil e materna; controle da dengue, tuberculose e malária; controle de hipertensão e diabetes
- C) promoção da saúde; fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias; saúde do idoso
- D) aumento da produção de imunobiológicos; redução da transmissão vertical do HIV; atenção às doenças negligenciáveis

06. É diretriz para o trabalho da Educação na Saúde:

- A) ampliar a compreensão dos conceitos de formação e educação permanente para adequá-los às distintas lógicas e especificidades
- B) capacitar recursos humanos do SUS para a difusão de informações sobre prevenção de doenças e auto-cuidado
- C) considerar a Educação Continuada como a estratégia de formação e de desenvolvimento de trabalhadores para o setor
- D) centrar o planejamento e o acompanhamento das atividades educativas em saúde com vistas à aquisição de conhecimentos e mudança de hábitos

- 07.** Racionalizar os gastos e otimizar os recursos, possibilitando ganho em escala nas ações e serviços de saúde oferecidos para um determinado território, é objetivo da:
- descentralização
 - universalização
 - regionalização
 - hierarquização
- 08.** De acordo com a Lei 8.142/90, o segmento que tem representação paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos participantes dos Conselhos e das Conferências de Saúde é o dos:
- profissionais de saúde
 - usuários
 - representantes do governo
 - prestadores de serviço
- 09.** O significado da expressão “concepção ampliada de saúde”, que marca conceitualmente a Política Nacional de Promoção de Saúde, é o de que:
- a saúde e o adoecimento refletem as escolhas individuais, mais que o acesso aos cuidados e as tecnologias médicas
 - a saúde e a doença são um binômio inseparável, determinando necessidades curativas
 - a saúde envolve tanto aspectos físicos como os processos mentais, singulares em cada sujeito
 - o processo saúde-doença não é somente resultante da vontade dos sujeitos e/ou comunidades, mas expressa o contexto da própria vida
- 10.** De acordo com a Lei 8.080/90, pode-se afirmar que é competência da direção nacional do SUS:
- executar serviços de vigilância epidemiológica e sanitária
 - planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde
 - participar na formulação e na implementação de políticas relativas às condições e aos ambientes de trabalho
 - acompanhar, avaliar e divulgar os indicadores de morbidade e mortalidade no âmbito da unidade federada

ESPECÍFICO DO CARGO

- 11.** A lavagem otológica para a retirada de um corpo estranho do meato acústico externo é formalmente contra indicada quando o paciente apresenta:
- descamação epitelial
 - bola fúngica
 - obstrução tubária
 - perfuração timpânica
- 12.** Paciente jovem do sexo masculino, que após um exercício de luta livre, queixa-se de dor no pavilhão auricular, e ao exame observa-se um derrame sero hemático entre o pericôndrio e a cartilagem, caracterizam o:
- coloboma auris
 - oto hematoma
 - osteoma
 - granuloma
- 13.** A infecção estafilocócica de um folículo piloso do meato acústico externo, causada pelo hábito de coçar o ouvido com diversos objetos, denomina-se otite externa:
- circunscrita
 - difusa
 - hemorrágica
 - viral
- 14.** O processo inflamatório do meato acústico externo causado por cogumelos do gênero *Cândida Albicans* e *Aspergillus* caracterizam a otite denominada:
- maligna
 - eczematosa
 - granulosa
 - otomicose
- 15.** Criança com temperatura elevada, diarreia aquosa, rebelde ao tratamento, vômitos, perda de peso, em que à otoscopia a membrana timpânica apresenta aspecto normal, constitui o quadro de otite média:
- necrosante
 - supurativa
 - latente
 - difusa
- 16.** Criança de baixa idade que no decurso de uma moléstia infecto-contagiosa, como o sarampo, apresenta à otoscopia perfuração ampla e central da membrana timpânica com supuração mucóide fétida. Trata-se de um quadro de otite:
- colestomatosa
 - necrosante
 - congestiva
 - bolhosa

17. O processo normal de envelhecimento que atinge todas as estruturas do sistema auditivo, com predominância na orelha interna denomina-se:
- A) disacusia
 - B) timpanosclerose
 - C) otosclerose
 - D) presbiacusia
18. A vertigem rotatória, acompanhada de hipoacusia de percepção e zumbidos em uma só orelha, constituem a tríade sintomática da doença de Ménière. Essa diminuição da audição é de origem:
- A) vascular
 - B) tóxica
 - C) viral
 - D) traumática
19. O nistágmo que ocorre pelo aumento de pressão no meato acústico externo, por meio de um espéculo pneumático é patognomônico de:
- A) surdez psicogênica
 - B) desarticulação estapediana
 - C) fístula perilinfática
 - D) membrana flácida
20. Nos traumatismos cranianos em que ocorre comprometimento do nervo facial, o tipo de fratura do osso temporal observado com maior frequência é o:
- A) axial
 - B) longitudinal
 - C) transversal
 - D) oblíqua
21. O teste de função labiríntica capaz de estimular separadamente os canais laterais denomina-se:
- A) rastreio pendular
 - B) rastreio optocinético
 - C) prova calórica
 - D) prova rotatória
22. Num exame audiométrico em que a perda aérea e óssea ocorrem na mesma proporção, caracteriza a disacusia denominada:
- A) mista
 - B) condutiva
 - C) transmissão
 - D) neurosensorial
23. O exame audiométrico de um paciente que apresenta perda neurosensorial severa e discriminação muito melhor do que a esperada, nos leva a suspeita clínica de:
- A) anomalia vascular
 - B) otospongiose coclear
 - C) trauma acústico
 - D) labirintite serosa
24. Quando há suspeita da presença de líquido ou massa na orelha média, a curva timpanométrica a ser encontrada num exame impedanciométrico é do tipo:
- A) An
 - B) Ar
 - C) B
 - D) C
25. O exame auditivo que mais precocemente detecta o aparecimento do neurinoma do acústico é:
- A) audiometria de tronco cerebral
 - B) audiometria tonal liminar
 - C) eletrococleografia
 - D) impedanciometria
26. Num exame eletrococleográfico de um paciente com suspeita de disacusia condutiva, a forma de onda encontrada é:
- A) alargada
 - B) normal
 - C) difásica
 - D) disassociada
27. Quando há suspeita clínica de que o paciente apresenta um neurinoma do acústico, o exame por imagem a ser solicitado para confirmação diagnóstica e planificação da cirurgia deve ser a:
- A) tomografia computadorizada
 - B) ultra-sonografia
 - C) cintilografia
 - D) ressonância magnética
28. A rinite que se caracteriza por obstrução nasal, acompanhada de crises de espirros, coriza e, eventualmente, perda de olfato denomina-se:
- A) alérgica
 - B) bacteriana
 - C) gripal
 - D) tumoral

29. Fossas nasais amplas, recobertas por crostas amareladas sem ulceração da mucosa e com odor fétido são características da rinite:
- A) vasomotora
 - B) espasmódica
 - C) ozenosa
 - D) gripal
30. A massa calcária que se forma ao redor de um corpo estranho devido a sais insolúveis da secreção nasal é denominada:
- A) rinólito
 - B) pólipos
 - C) nódulo
 - D) papiloma
31. Paciente jovem do sexo masculino, com 14 anos de idade, apresentando hemorragia nasal freqüente, acompanhada inicialmente de obstrução nasal unilateral, evoluindo para obstrução bilateral persistente e irreduzível, podendo levar à diminuição da audição, são características do tumor benigno denominado de:
- A) adenoma
 - B) condroma
 - C) angiofibroma
 - D) condrossarcoma
32. A pulverização de calomelano ou iodofórmio no interior das fossas nasais é utilizado no tratamento da:
- A) lepra
 - B) miíase
 - C) sífilis
 - D) blastomicose
33. O exame clínico da olfação é realizado com o emprego de substâncias com odores característicos, de fácil reconhecimento. A interpretação errônea de uma sensação olfativa denomina-se:
- A) parosmia
 - B) cacosmia
 - C) hiperosmia
 - D) anosmia
34. Em adultos, a disfunção unilateral da tuba auditiva, leva à suspeita diagnóstica de:
- A) fenda palatina
 - B) vegetações adenóides
 - C) conchas hipertrofiadas
 - D) tumor de cavo
35. Paciente apresentando dor na região geniana, com irradiação para a arcada dentária correspondente e no território do nervo infra orbitário, leva à suspeita diagnóstica de sinusite maxilar. A melhor incidência radiológica a ser solicitada para a confirmação do diagnóstico é:
- A) frontonasal
 - B) axial
 - C) mentonasal
 - D) lateral
36. Paralisia facial periférica unilateral, parcial ou total, que evolui em 48 horas, sem perda da audição ou vertigem, que na maioria dos casos regride sem deixar seqüelas e que ocorre com maior freqüência é a de causa:
- A) traumática
 - B) tumoral
 - C) infecciosa
 - D) idiopática
37. Nas paralisias faciais periféricas, o teste topográfico mais objetivo e de fácil reprodução e que nos permite avaliar a evolução clínica dessa paralisia é o teste do:
- A) lacrimejamento
 - B) reflexo estapediano
 - C) fluxo salivar
 - D) paladar
38. Criança que apresenta obstrução nasal permanente, acarretando respiração nasal de suplência, tendência a surtos de otite média aguda, que dorme de boca aberta, baba no travesseiro, ronca à noite, apresenta características da hipertrofia das tonsilas:
- A) palatina
 - B) tubária
 - C) faringéica
 - D) lingual
39. Criança com sete anos de idade, com queixa de dor de garganta e pequena elevação de temperatura, que ao exame de faringe é observada falsa membrana acinzentada recobrendo as tonsilas palatinas que resistem ao ser destacadas e não se dissociam em água, caracterizam a angina denominada:
- A) diftérica
 - B) tifóide
 - C) eritematosa
 - D) gangrenosa

40. Como complicação das anginas inespecíficas, o abscesso observado com maior frequência é o:
- A) pósterio inferior
 - B) ântero superior
 - C) retrofaríngeo
 - D) laterofaríngeo
41. Nas tonsilas palatinas, o tumor maligno encontrado com maior frequência é o:
- A) epiteloma
 - B) sarcoma
 - C) melanoma
 - D) adenoma
42. Paciente com tosse produtiva, rouquidão e odinofagia, em que à laringoscopia observa-se monocordite ou lesões irregulares nas pregas vocais, a suspeita diagnóstica é de:
- A) sífilis
 - B) leishmania
 - C) lepra
 - D) tuberculose
43. Dentre as más formações congênitas do laringe, a mais comum, que ocorre devido à deficiência de cálcio nas cartilagens, e que provoca um ruído característico à inspiração, denomina-se:
- A) membranosa
 - B) laringomalacia
 - C) atresia
 - D) estenose
44. A dispnéia que ocorre em crianças, acompanhada de tosse rouca, respiração ruidosa, face congesta e cianótica, caracterizam a laringite:
- A) estridulosa
 - B) erisipelatosa
 - C) herpética
 - D) hipertrófica
45. A hemiplegia laríngea pode ocorrer após a seguinte intervenção cirúrgica:
- A) sinusectomia
 - B) septoplastia
 - C) tireoidectomia
 - D) mastoidectomia
46. O meio mais eficaz para o diagnóstico de uma anomalia congênita do laringe em um recém-nascido é:
- A) laringoscopia indireta
 - B) laringoscopia direta
 - C) tomografia simples
 - D) tomografia computadorizada
47. Dos tumores das glândulas salivares, derivados do epitélio de revestimento, o mais comumente encontrado na parótida é o:
- A) adenoma pleomórfico
 - B) hemangioma benigno
 - C) citadenoma papilar
 - D) carcinoma adenocístico
48. Quando há suspeita que um tumor maligno do laringe não é primário, o primeiro órgão a ser investigado é o:
- A) fígado
 - B) baço
 - C) pâncreas
 - D) rim
49. Quando há suspeita de que um paciente apresenta um tumor maligno na glândula salivar, o exame por imagem a ser solicitado é:
- A) sialografia
 - B) ultra-sonografia
 - C) radiografia simples
 - D) radiografia contrastada
50. O aumento da produção de saliva que se acumula no interior da boca, que acaba por escorrer pelos lábios é denominado:
- A) sialoectasia
 - B) sialadenite recorrente
 - C) sialadenite crônica
 - D) sialorréia