

**QUESTÃO 01**

A Classificação de Goldman é utilizada na avaliação pré-operatória de pacientes cirúrgicos. Esta classificação é específica para avaliar:

- A) Risco anestésico.
- B) Risco de fenômenos tromboembólicos.
- C) Risco cardíaco.
- D) Risco de sangramentos pós-operatórios.
- E) Risco de fistulas gastrointestinais.

**QUESTÃO 02**

Com relação à Classificação de Goldman, pacientes com pontuação acima de 25 pontos apresentam índices de complicações de:

- A) Em torno de 2%
- B) Em torno de 100%
- C) Em torno de 10%
- D) Em torno de 78%
- E) Em torno de 37%

**QUESTÃO 03**

Com relação à Classificação de Child-Pugh um tempo de protombina 5 segundos acima do normal, representa uma pontuação de:

- A) 0 pontos.
- B) 1 ponto.
- C) 2 pontos.
- D) 3 pontos.
- E) 4 pontos.

**QUESTÃO 04**

Durante a reposição hidroeletrólítica de um paciente apresentando hiponatremia, o médico assistente prescreve 1 litro de Ringer lactato e 2 litros de Soro Glicosado. Quantos mEq/L de sódio existem no soro glicosado:

- A) 0
- B) 35
- C) 50
- D) 175
- E) 250

**QUESTÃO 05**

A hipermagnesemia é definida com níveis de magnésio sérico acima de:

- A) 0,5 mEq/L
- B) 1,0 mEq/L
- C) 1,5 mEq/L
- D) 2,0 mEq/L
- E) 2,5 mEq/L

**QUESTÃO 06**

Dentre as alternativas abaixo relacionadas qual a que é utilizada no tratamento da hipercalemia como intuito de transferir potássio do extracelular para o compartimento intracelular?

- A) A utilização de diuréticos como a furosemida.
- B) A utilização de resinas trocadoras de íons.
- C) A infusão de gluconato de cálcio.
- D) A utilização de poliestirenosulfonato de cálcio.
- E) A infusão de glicose a 50% e insulina regular.

**QUESTÃO 07**

Dentre as trombofilias abaixo enumeradas, qual a que apresenta a maior probabilidade de desenvolver fenômenos tromboembólicos no pós-operatório?

- A) Fator V Leiden.
- B) Deficiência da proteína C.
- C) Deficiência da proteína S.
- D) Deficiência da antitrombina III.
- E) Prtotombina mutante (20210 A).

**QUESTÃO 08**

Vários são os métodos de prevenção de fenômenos tromboembólicos no pós-operatório. A utilização de heparina, de um modo geral, consegue reduzir a incidência de Trombose Venosa Profunda em cerca de:

- A) 68%
- B) 10%
- C) 30%
- D) 100%
- E) 5%

**QUESTÃO 09**

Com relação aos princípios básicos da cirurgia oncológica, podemos afirmar que as margens recomendadas de ressecção de um melanoma com mais de 4 mm de profundidade deva ser de:

- A) 5 mm
- B) 1 cm
- C) 1-2 cm
- D) 2-3 cm
- E) mais de 10 cm

**QUESTÃO 10**

Em algumas situações devem-se realizar cirurgias preventivas ao desenvolvimento de tumores malignos. Dentre as alternativas abaixo, pode-se afirmar que há relação da doença com o surgimento de tumores malignos *exceto* em:

- A) Esôfago de Barrett com displasia – Câncer de Esôfago.
- B) Colite ulcerativa – Câncer de cólon.
- C) Criptoquirdia – Câncer de testículo.
- D) Polipose adenomatosa familiar – Câncer de cólon.
- E) Colelitíase – Adenocarcinoma de fígado.

**QUESTÃO 11**

O Fator de necrose tumoral tem importante papel na fisiopatologia da sepse. Dentre os muitos efeitos determinados pela liberação do fator de necrose tumoral podemos dizer que também estimula a produção de, exceto:

- A) Proteína C reativa
- B) Interleucina 1
- C) Interleucina 6
- D) Interleucina 8
- E) Prostaglandinas

**QUESTÃO 12**

A compreensão do HLA (antígeno leucocitário humano) é de fundamental importância para se compreender o mecanismo de rejeição de órgãos. Aonde se localiza o HLA:

- A) Cromossomo 2
- B) Cromossomo 8
- C) Cromossomo 16
- D) Cromossomo 18
- E) Cromossomo 6

**QUESTÃO 13**

Dentre as drogas imunossupressoras abaixo relacionadas, a que apresenta ação inibindo a calcineurina é:

1. Ciclosporina.
2. Tacrolimus.
3. Azotioprina.

Está(ão) correta(s)

- A) 1 e 3, apenas.
- B) 1 e 2, apenas.
- C) 2 e 3, apenas.
- D) 1, 2 e 3
- E) 3, apenas.

**QUESTÃO 14**

O sistema de avaliação fisiológica aguda e da saúde crônica – APACHE II, é bastante utilizado como fator prognóstico do trauma e na infecção. Dentre os parâmetros utilizados podemos citar todos os abaixo, exceto:

- A) Temperatura.
- B) pH arterial.
- C) Frequência cardíaca.
- D) Amilase sérica.
- E) Potássio sérico.

**QUESTÃO 15**

Dentre os antibióticos abaixo relacionados, qual o que apresenta uma excreção essencialmente hepática?

- A) Cefepima.
- B) Imipenem.
- C) Cloranfenicol.
- D) Ceftazidima.
- E) Genatmicina.

**QUESTÃO 16**

Dentre as alternativas abaixo relacionadas qual a de maior impacto na prevenção da infecção urinária, em um paciente com sonda vesical de demora, com previsão de utilização de cerca de 7 dias?

- A) Utilizar sonda de Foley revestido de silicone.
- B) Utilizar antibiótico preventivo por 7 dias.
- C) Cuidados de antisepsia na introdução e utilizar coletor fechado.
- D) Evitar usar xilocaina geléia no meato uretral.
- E) Trocar a sonda diariamente.

**QUESTÃO 17**

No pós-operatório imediato, ainda na sala de recuperação anestésica, um paciente submetido a uma apendicectomia apresenta um pico hipertensivo. Dentre as alternativas abaixo relacionadas, qual a principal etiologia desta crise hipertensiva:

- A) Retenção urinária.
- B) Embolia pulmonar.
- C) Dor.
- D) Hipovolemia.
- E) Efeito residual do anestésico.

**QUESTÃO 18**

A técnica de Seldinger é utilizada na:

- A) punção de veia central.
- B) correção da hérnia inguinal direta.
- C) correção da hérnia inguinal indireta.
- D) cirurgia de hemorróida do terceiro grau.
- E) cirurgia de fistula de margem anal.

**QUESTÃO 19**

Dentre os antissépticos abaixo relacionados o que apresenta menores taxas de infecção relacionada ao cateter de veia central é:

- A) Álcool iodado.
- B) Clorexidina.
- C) Solução degermante de iodo.
- D) Álcool absoluto.
- E) Hexaclorofeno.

**QUESTÃO 20**

Paciente submetido a gastroplastia vertical com reconstituição em Y de Roux apresenta aproximadamente que percentual de chance de desenvolver colelitíase:

- A) 0%
- B) 100%
- C) 5%
- D) 15-30%
- E) 80%

**QUESTÃO 21**

Dentre os fatores humorais abaixo relacionados o que determina vasodilatação arterial sem aumentar a permeabilidade protéica na membrana capilar é:

- A) Bradicinina.
- B) Fator atrial natriurético.
- C) Histamina.
- D) Fator ativador de plaquetas.
- E) Oxido nítrico.

**QUESTÃO 22**

Qual a associação abaixo descrita, que se encontra **incorreta** em relação a concentração de sódio:

- A) Secreção pancreática = aproximadamente 140 mEq/L.
- B) Suor = aproximadamente 40 mEq/L.
- C) Ileostomia = 125 mEq/L.
- D) Saliva = 100 mEq/L.
- E) Secreção gástrica = 50 mEq/L.

**QUESTÃO 23**

Na avaliação pré-operatória de um paciente portador de um tumor de adrenal direita identificamos um cálcio sérico de 13,5 mg/dL. Dentre as medicações abaixo relacionadas a que **não** devemos recomendar ou suspender a sua utilização é:

- A) Diuréticos tiazídicos.
- B) Bifosfonatos.
- C) Mitramicina.
- D) Calcitonina.
- E) Corticosteróides.

**QUESTÃO 24**

Na resposta metabólica ao trauma é de fundamental importância o conhecimento dos hormônios envolvidos e seus efeitos. Com relação ao controle de produção do ACTH e a atividade simpática, são controladas na (o):

- A) Área hipotalâmica posterior.
- B) Núcleo supra-óptico.
- C) Núcleo paraventricular.
- D) Núcleo ventromedial.
- E) Núcleo arcuado.

**QUESTÃO 25**

Em relação ao paciente diabético submetido a um procedimento de sigmoidectomia, é **incorreto** afirmar:

- A) Insulinas de longa duração devem ser substituídas no pré-operatório por insulinas de ação intermediária.
- B) Níveis elevados de hemoglobina glicosilada resultam em um aumento nas taxas de complicações pós-operatórias.
- C) A hemoglobina glicosilada representa 4-7% da hemoglobina total.
- D) Procedimentos cirúrgicos deste porte resultam em uma elevação dos níveis de glicose e cetose.
- E) Manusear o paciente com insulina de curta duração é recomendado no pós-operatório.

**QUESTÃO 26**

A apnéia do sono está presente em cerca de 25% dos pacientes obesos mórbidos (IMC > 40). A apnéia do sono pode determinar todas as condições abaixo relacionadas, **exceto**:

- A) Insuficiência ventricular direita.
- B) Hipoxemia.
- C) Hipercapnia.
- D) Policitemia.
- E) Insuficiência ventricular esquerda.

**QUESTÃO 27**

A incidência de trombose venosa profunda em paciente obesos mórbidos submetidos a gastroplastias, é favorecida por todas as condições abaixo relacionadas, **exceto**:

- A) Policitemia.
- B) Estase venosa.
- C) Sedentarismo.
- D) Duração da cirurgia.
- E) Incidência aumentada de doença isquêmica do coração.

**QUESTÃO 28**

Mulher de 40 anos, apresentando cerca de 4 horas depois da ceia de Natal, na qual reconhece que exagerou na quantidade e na variedade de comidas, dor epigástrica com irradiação para o quadrante superior direito. Refere episódios anteriores de menor intensidade e que cedeu após algumas horas. Neste episódio, no entanto, as dores são persistentes e acompanhadas de febre e vômitos.

Dentre as alternativas abaixo relacionadas selecione a que melhor se enquadra no quadro clínico apresentado.

- A) Úlcera perfurada.
- B) Pancreatite aguda.
- C) Apendicite aguda.
- D) Colecistite aguda.
- E) Diverticulite aguda.

**QUESTÃO 29**

Homem de 58 anos, alcoólatra, acorda às 2 horas da manhã com uma dor de forte intensidade, inicialmente de localização epigástrica, mas tornando-se difusa após algumas horas. Dentre as alternativas abaixo relacionadas selecione a que melhor se enquadra no quadro clínico apresentado.

- A) Úlcera perforada.
- B) Pancreatite aguda.
- C) Apendicite aguda.
- D) Colecistite aguda.
- E) Diverticulite aguda.

**QUESTÃO 30**

Mulher de 25 anos apresenta dor periumbilical com posterior localização em fossa ilíaca direita seguida de anorexia e vômitos. Ao aferir a temperatura identificou-se T=37,9°C. Dentre as alternativas abaixo relacionadas selecione a que melhor se enquadra no quadro clínico apresentado.

- A) Úlcera perforada.
- B) Pancreatite aguda.
- C) Apendicite aguda.
- D) Colecistite aguda.
- E) Diverticulite aguda.

**QUESTÃO 31**

Paciente vítima de um acidente automobilístico da entrada na emergência do Hospital da Restauração com uma suspeita clínica de contusão miocárdica com repercussão clínica. Dentre os exames abaixo enumerados qual o de maior significado na identificação de complicações decorrentes da contusão miocárdica?

- A) Determinação seriada da CPK.
- B) Tomografia computadorizada sem contraste do tórax.
- C) Ecocardiograma.
- D) Estudo angiográfico do ventrículo.
- E) Eletrocardiograma seriado.

**QUESTÃO 32**

Com relação ao trauma em pacientes grávidas podemos afirmar:

- A) Com a progressão da gravidez há uma diminuição do volume sanguíneo circulante com um aumento da pressão arterial, hematócrito e da concentração de bicarbonato.
- B) Algumas complicações da gravidez aumentam o risco de desenvolvimento de coagulação intravascular disseminada.
- C) A análise do líquido amniótico não é capaz de nos fornecer informações da viabilidade fetal.
- D) Paciente no nono mês de gravidez deve ser posicionada em decúbito lateral direito quando transportada e examinada.
- E) Fratura pélvica com 3 semanas de evolução é contraindicação formal para parto vaginal.

**QUESTÃO 33**

Com relação ao trauma colônico podemos afirmar que:

- A) São prontamente diagnosticados com a tomografia contrastada de abdome.
- B) É indicação formal de colostomia.
- C) Lacerações colônicas devem ser tratadas com ressecção.
- D) Hematomas do mesentério colônico não devem ser abordados.
- E) Estão associados em cerca de 5-15% com abscessos intra-abdominais.

**QUESTÃO 34**

Durante uma laparotomia para tratamento de um trauma abdominal severo, você identifica uma lesão importante de lobo direito do fígado, com sangramento ativo importante. Qual a seqüência correta de manobras que se deve realizar?

- A) 1. Comprimir temporariamente o fígado com compressas; 2. Ligadura da artéria hepática direita; 3. Hepatotomia com ligadura seletiva dos vasos; 4. Manobra de Pringle; 5. Comprimir o fígado com compressas e fechar o abdome.
- B) 1. Ligadura da artéria hepática direita; 2. Comprimir temporariamente o fígado com compressas; 3. Manobra de Pringle; 4. Hepatotomia com ligadura seletiva dos vasos; 5. Comprimir o fígado com compressas e fechar o abdome.
- C) 1. Comprimir temporariamente o fígado com compressas; 2. Hepatotomia com ligadura seletiva dos vasos; 3. Manobra de Pringle; 4. Ligadura da artéria hepática direita; 5. Comprimir o fígado com compressas e fechar o abdome.
- D) 1. Manobra de Pringle; 2. Comprimir temporariamente o fígado com compressas; 3. Hepatotomia com ligadura seletiva dos vasos; 4. Ligadura da artéria hepática direita; 5. Comprimir o fígado com compressas e fechar o abdome.
- E) 1. Comprimir temporariamente o fígado com compressas; 2. Manobra de Pringle; 3. Hepatotomia com ligadura seletiva dos vasos; 4. Ligadura da artéria hepática direita; 5. Comprimir o fígado com compressas e fechar o abdome.

**QUESTÃO 35**

Dentre as manobras abaixo relacionadas qual a mais apropriada no manuseio de uma fratura pélvica aberta com ferida perineal:

- A) Colostomia em alça com irrigação distal do cólon só está indicado nos casos de lesão retal associada.
- B) Colostomia em alça com irrigação distal do cólon está indicado independente da presença de lesão retal associada.
- C) Zerar dieta e iniciar nutrição parenteral total.
- D) Laparotomia com irrigação contínua da pelve e da região perineal.
- E) Sutura primária da lesão perineal após debridamento e irrigação.

**QUESTÃO 36**

Dentre os agentes tópicos usados em queimaduras abaixo relacionados, pode(m) determinar leucopenia transitória:

1. Nitrato de prata a 0,5%.
2. Sulfadiazida de prata a 1%.
3. Acetato de sulfonamida.

Está(ão) correto(s)

- A) 1, apenas.
- B) 2, apenas.
- C) 1 e 3, apenas.
- D) 2 e 3, apenas.
- E) 1, 2 e 3.

**QUESTÃO 37**

Com relação à utilização de antibióticos em pacientes queimados podemos afirmar que:

- A) Antibioticoprofilaxia é mandatório em todos os pacientes queimados.
- B) Na sepse pós-queimadura só devemos iniciar a antibioticoterapia após a confirmação da cultura.
- C) Doses subterapêuticas de antibióticos são comuns em pacientes queimados.
- D) Sempre que houver o resultado positivo de uma cultura devemos iniciar antibioticoterapia sistêmica.
- E) Cobertura contra bactérias anaeróbias é mandatório na sepse pós-queimaduras.

**QUESTÃO 38**

Dentre os gases abaixo relacionados, utilizados no pneumoperitônio laparoscópico o que apresenta a maior solubilidade em água é:

- A) Dióxido de carbono.
- B) Óxido nitroso.
- C) Hélio.
- D) Argônio.
- E) Ar ambiente.

**QUESTÃO 39**

Dentre os gases abaixo relacionados, utilizados no pneumoperitônio laparoscópico suporta(m) combustão:

1. Dióxido de carbono.
2. Óxido nitroso.
3. Hélio.
4. Argônio.

Está(ão) correto(s)

- A) 1, apenas.
- B) 2, apenas.
- C) 4, apenas.
- D) 1 e 3, apenas.
- E) 1 e 2, apenas.

**QUESTÃO 40**

Dentre os gases abaixo relacionados, utilizados no pneumoperitônio laparoscópico pode (m) causar hipercapnia e acidose:

1. Dióxido de carbono.
2. Óxido nitroso.
3. Hélio.
4. Argônio.

Está(ão) correto(s)

- A) 1, apenas.
- B) 2, apenas.
- C) 4, apenas.
- D) 1 e 3, apenas.
- E) 1 e 4, apenas.

**QUESTÃO 41**

Dentre os fios de sutura abaixo relacionados qual o que é absorvido através de um processo de proteólise com perda de 50% de sua força após 1 semana?

- A) Ácido poliglicólico (Dexon).
- B) Fio de seda.
- C) Catgut cromado.
- D) Fio de Nylon.
- E) Poligalactina 910 (Vicryl).

**QUESTÃO 42**

Dentre os fios de sutura abaixo relacionados qual o que é absorvido através de um processo de hidrólise com perda lenta de sua força de 10-15% ao 1 ano.

- A) Ácido poliglicólico (Dexon).
- B) Fio de seda.
- C) Catgut cromado.
- D) Fio de Nylon.
- E) Poligalactina 910 (Vicryl).

**QUESTÃO 43**

Dentre as possíveis complicações de uma colangiopancreatografia retrograda com papilotomia, as duas mais frequentes são:

- A) Hemorragia e pancreatite.
- B) Colangite e perfuração.
- C) Hemorragia e hematoma hepático.
- D) Perfuração e pancreatite.
- E) Colangite e hematoma hepático.

**QUESTÃO 44**

A maioria dos pacientes com câncer de esôfago são diagnosticados em uma fase avançada da doença. Com relação ao estágio da doença podemos afirmar:

- A) Paciente no estágio IIB tem uma chance maior de 50% de sobrevida acima de 5 anos.
- B) Mesmo com linfonodos comprometidos a sobrevida chega a mais de 50% em 5 anos.
- C) Mesmo com invasão da muscular própria a sobrevida chega a mais de 50% em 5 anos.
- D) Após quimioterapia neoadjuvante seguido de cirurgia, até 25% dos pacientes apresentam T0 no exame histopatológico.
- E) Pacientes portadores de metaplasia colunar são classificados como estágio 0.

**QUESTÃO 45**

Dentre as opções abaixo relacionadas a(s) que aumenta(m) a pressão do esfíncter inferior do esôfago:

- A) Metoclopramida e dieta protéica.
- B) Atropina e cigarro.
- C) Café e álcool.
- D) Bacon e ovos.
- E) Cigarro e café.

**QUESTÃO 46**

Dentre os testes abaixo relacionados, qual o mais sensível no diagnóstico do refluxo gastroesofágico?

- A) Estudo contrastado com bário.
- B) Manometria esofágica.
- C) Teste de Bernstein.
- D) PHmetria de 24 horas.
- E) Endoscopia digestiva alta.

**QUESTÃO 47**

Dentre as apresentadas abaixo, as principais etiologias de sangramentos massivos do cólon são:

- A) Câncer e angiodisplasia.
- B) Diverticulose e câncer.
- C) Angiodisplasia e diverticulose.
- D) Colite ulcerativa e angiodisplasia.
- E) Diverticulose e colite ulcerativa.

**QUESTÃO 48**

A esplenectomia parcial é a cirurgia de escolha no tratamento da:

- A) Síndrome de Felty.
- B) Doença de Gaucher.
- C) Talassemia maior.
- D) Hemangioma esplênico.
- E) Esferocitose hereditária em uma criança de 3 anos.

**QUESTÃO 49**

Paciente de 39 anos em programa de esclerose endoscópica de varizes esofagianas desenvolve hemorragia digestiva alta. Ao exame endoscópico é identificado uma mucosa gástrica granular e com múltiplos pontos vermelhos difusos no fundo e antro gástrico. O diagnóstico mais provável deste paciente é:

- A) Hiperplasia do tipo enterocromafina.
- B) Gastrite hipertrófica.
- C) Gastropatia hipertensiva portal.
- D) Varizes gástricas.
- E) Trombose da veia esplênica.

**QUESTÃO 50**

Com relação à colecistite acalculosa é correto afirmar:

- A) A fisiopatologia primária envolve estase da vesícula.
- B) Na maioria das vezes envolve pacientes idosos fora do ambiente hospitalar.
- C) A cintilografia é normal na maioria das vezes.
- D) A imagem ultrassonográfica é usualmente normal.
- E) Colecistostomia é o tratamento inicial de escolha.