

QUESTÃO 01

Ao receber um recém-nascido ativo logo após o parto, a equipe neonatológica deve colocá-lo sob calor radiante, secar o líquido amniótico da pele da criança e

- A) avaliar a escala de Apgar, para ajudar a manter a estabilidade térmica do bebê.
- B) remover os campos úmidos, para ajudar a manter a estabilidade térmica do bebê.
- C) fazer oxigênio suplementar, para ajudar a manter a estabilidade térmica do bebê.
- D) remover os campos úmidos e fazer oxigênio sob pressão, para ajudar a manter a estabilidade térmica do bebê.
- E) fazer oxigênio sob pressão, para ajudar a manter a estabilidade térmica do bebê.

QUESTÃO 02

Pontos importantes devem ser observados no bebê logo após o seu nascimento, a saber:

- A) a avaliação seqüencial dos movimentos respiratórios, a frequência cardíaca e a cor do recém-nascido.
- B) a avaliação seqüencial dos movimentos respiratórios, a frequência cardíaca e o choro do recém-nascido.
- C) a avaliação seqüencial da frequência cardíaca e a cor e o choro do recém-nascido.
- D) a avaliação seqüencial da frequência cardíaca, os movimentos respiratórios e a cor do recém-nascido.
- E) a avaliação seqüencial do choro e movimentos respiratórios.

QUESTÃO 03

A concentração de oxigênio oferecida inicialmente a um neonato, na sala de parto, que apresenta respiração rítmica e regular, frequência cardíaca superior a 100 bpm e que está cianótico, deve ser a mais próxima possível de

- A) 75%.
- B) 85%.
- C) 90%.
- D) 95%.
- E) 100%.

QUESTÃO 04

Antes do nascimento de um recém-nascido, foi observado mecônio particulado no líquido amniótico. Com o objetivo de se prevenir a aspiração pulmonar de mecônio pelo bebê, deve-se:

- A) levar o recém-nascido rapidamente para o berço aquecido e aspirar a boca, a faringe e o nariz.
- B) logo após a liberação do pólo cefálico, aspirar rapidamente a boca.
- C) logo após a liberação do pólo cefálico, aspirar rapidamente a boca, a faringe e o nariz.
- D) levar o recém-nascido rapidamente para o berço aquecido, secar a pele, remover os campos úmidos e aspirar a boca, a faringe e o nariz.
- E) levar o recém-nascido rapidamente para o berço aquecido e aspirar a boca e o nariz.

QUESTÃO 05

No neonato, a bradicardia resulta, geralmente, da oxigenação insuficiente. Portanto, a decisão de iniciar a massagem cardíaca deve ser baseada na frequência cardíaca após

- A) 20 a 30 segundos de ventilação com pressão positiva e oxigênio a 95%, frequência cardíaca > 40 ou entre 60 e 80 bpm sem aumento.
- B) 20 a 30 segundos de ventilação com pressão positiva e oxigênio a 90%, frequência cardíaca <60 ou entre 60 e 80 bpm sem aumento.
- C) 15 a 30 segundos de ventilação com pressão positiva e oxigênio a 75%, frequência cardíaca >60 ou entre 60 e 80 bpm sem aumento.
- D) 15 a 30 segundos de ventilação com pressão positiva e oxigênio a 100%, frequência cardíaca <60 ou entre 60 e 80 bpm sem aumento.
- E) 15 a 30 segundos de ventilação com pressão positiva e oxigênio a 100%, frequência cardíaca >60 ou entre 60 e 80 bpm sem aumento.

QUESTÃO 06

O método canguru é um tipo de assistência neonatal que implica contato precoce pele a pele entre a mãe e o recém-nascido de baixo peso. Dessa forma, a posição canguru consiste em manter o recém-nascido de baixo peso contra o peito adulto, levemente vestido, na posição

- A) horizontal.
- B) semi-sentado.
- C) vertical.
- D) sentado.
- E) deitado.

QUESTÃO 07

O Método Canguru é um tipo de assistência eficiente e de baixo custo que vem sendo adotado na atenção ao recém-nascido. Em relação aos procedimentos corretos do Método Canguru, analise as afirmativas abaixo.

1. O método respeita a livre escolha da família.
2. Inclui todos os bebês desde que sejam prematuros.
3. Permite o contato entre a mãe e o bebê desde a admissão na Unidade Neonatal.
4. Permite o contato pele a pele entre a mãe e o bebê, pelo tempo que ambos entenderem ser prazeroso.

Estão **corretas**:

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 1, 2 e 3, apenas.
- C) 2 e 3, apenas.
- D) 1 e 3, apenas.
- E) 1, 3 e 4, apenas.

QUESTÃO 08

Na 2ª etapa do Método Canguru, mãe e bebê devem ficar alojados na enfermaria. Analise as afirmativas a seguir e identifique os critérios para elegibilidade dos bebês:

1. Estabilidade respiratória, peso mínimo de 1800g.
2. Nutrição enteral por gavagem.
3. Peso mínimo de 1800g., nutrição parenteral, ganho de peso diário maior que 20 g.
4. Estabilidade clínica, nutrição enteral plena, peso mínimo de 1250 g., ganho de peso diário maior que 15g.

Está(ão) **correta(s)**:

- A) 1, apenas.
- B) 2, apenas.
- C) 3, apenas.
- D) 1 e 2, apenas.
- E) 1 e 3, apenas.

QUESTÃO 09

A prescrição de inalação com soro fisiológico, atrovent e berotec tem o objetivo de, respectivamente:

- A) Melhorar a crise asmática.
- B) Broncodilatar, hidratar e desinflamar os brônquios.
- C) Dissolver coágulos e secreções, promovendo expectoração.
- D) Fluidificar as secreções, diminuir a inflamação e promover a broncodilatação.
- E) Diminuir secreção e promover a broncodilatação.

QUESTÃO 10

Em ações educativas para adolescentes grávidas, o enfermeiro deverá enfatizar as seguintes orientações:

- A) Importância da Imunização, do aleitamento materno, cuidados com o corpo, vestuário e alimentação.
- B) Cuidados com o vestuário e a higiene do corpo.
- C) Importância do aleitamento materno e observação da presença de manchas esbranquiçadas pelo corpo.
- D) Cuidados com vestuário, alimentação e quadro de cianose de extremidades.
- E) Cuidados com a higiene corporal e quadro de cianose de extremidades.

QUESTÃO 11

No cartão da criança, o Ministério da Saúde apresenta como obrigatórias as seguintes vacinas:

- A) febre amarela; sarampo; tríplice; pólio; BCG.
- B) pólio; tríplice (DPT); hepatite B; sarampo; BCG.
- C) pólio; sarampo; tríplice (DPT); meningite; BCG.
- D) toxóide tetânico (TT); pólio; hepatite A; BCG; sarampo.
- E) meningite meningocócica; raiva humana; pólio; BCG; hepatite B.

QUESTÃO 12

Em relação às características físicas e fisiológicas do recém-nascido, assinale a alternativa **correta**.

- A) O recém-nascido apresenta micção freqüente devido à pequena capacidade da bexiga, que, ao nascer, não contém urina, devendo a eliminação ser iniciada até em 24 horas.
- B) A icterícia fisiológica pode surgir do segundo ao quarto dia de vida, sendo geralmente benigna e raramente auto-reversível.
- C) A respiração do lactente é nasal, regular e predominantemente abdominal (diafragmática).
- D) O trânsito gastrointestinal é lento pela imaturidade, sendo o leite materno ideal neste período, uma vez que a digestão é inicialmente limitada.
- E) Inicialmente o perímetro cefálico é maior do que o torácico, invertendo-se posteriormente.

QUESTÃO 13

O Programa de Acompanhamento do Crescimento e Desenvolvimento de uma Criança deve ser feito, de forma sistematizada, até que ela complete:

- A) 6 meses.
- B) 1 ano.
- C) 3 anos.
- D) 5 anos.
- E) 10 anos.

QUESTÃO 14

No primeiro ano de vida o crescimento de um bebê é muito rápido, principalmente durante os 6 primeiros meses. Em decorrência, a cada mês, o lactente:

- A) ganha em média 1200g, a altura aumenta em torno de 4,0 cm. e o perímetro cefálico aumenta aproximadamente 0,5 cm.
- B) ganha em média 2500g, a altura aumenta em torno de 3,0 cm e o perímetro cefálico aumenta aproximadamente 3,5 cm.
- C) ganha em média 2000g, a altura aumenta em torno de 1,0 cm e o perímetro cefálico aumenta aproximadamente 3,0 cm.
- D) ganha em média 400g por mês, a altura aumenta em torno de 4,0 cm por mês e o perímetro cefálico aumenta aproximadamente 0,5 cm.
- E) ganha em média 680g, a altura aumenta em torno de 2,5 cm e o perímetro cefálico aumenta aproximadamente 1,5 cm.

QUESTÃO 15

A mensuração da temperatura corporal da criança indica calor do organismo e expressa o equilíbrio entre o calor produzido e o eliminado. Na avaliação deste, são considerados verdadeiros todos os sinais e ações abaixo, exceto:

- A) A temperatura se torna mais acentuada com: excitação, emoção, roupa, superalimentação, desidratação e infecção.
- B) Usar somente água fria, as compressas úmidas podem ser aplicadas em locais de circulação importante, como: abdômen, axilas, pescoço e região inguinal.
- C) Os valores normais da temperatura são diferenciados de acordo com o local de verificação, sendo: axilar 35,9 a 36,7°C, oral 35,8 a 37,2°C e retal 36,2 a 38°C.
- D) Quando a temperatura estiver acima de 38,5°C, é ideal que ela baixe por métodos físicos e não eliminada, como ocorre nos métodos químicos.
- E) Um dos métodos para abaixar a temperatura da criança é a hidratação pela oferta freqüente de líquidos.

QUESTÃO 16

Diante da preocupação de uma mãe com a falta de apetite e de ganho de peso de sua filha de 15 meses de idade e, considerando que há 3 meses a criança vem ganhando 300 gr por mês, se mantendo com percentil 8 da curva de crescimento e com exame físico normal qual deve ser a conduta do enfermeiro nessa situação?

- A) Tranqüilizar a mãe, pois, nessa idade é considerada normal uma diminuição do apetite.
- B) Orientar a mãe sobre um cardápio mais calórico, acrescido de óleo vegetal.
- C) Encaminhar a criança ao pediatra, pois esse quadro é sugestivo de infecção urinária.
- D) Solicitar hemograma e parasitológico de fezes, encaminhando a criança ao pediatra para avaliação.
- E) Encaminhar a criança para o pediatra para avaliação.

QUESTÃO 17

Em relação à nutrição infantil e necessidades diárias nutricionais, assinale a alternativa correta.

- A) O leite de vaca contém uma boa biodisponibilidade e concentração adequada de ferro, constituindo-se numa boa fonte nutricional de ferro para evitar carência de ferro.
- B) Os estoques orgânicos de ferro não variam com a idade gestacional do recém-nascido.
- C) A partir do 6º mês de vida as necessidades diárias de ferro não são mais supridas pelo estoque orgânico, sendo então necessário a manutenção do leite materno para suprir essa deficiência.
- D) O leite materno contém uma pequena concentração de ferro e uma boa biodisponibilidade, constituindo-se na melhor fonte nutricional de ferro, suficiente até o 6º mês de vida.
- E) O leite de vaca contém uma boa biodisponibilidade e uma pequena concentração de ferro, constituindo-se a melhor fonte nutricional de ferro, suficiente até o 6º mês de vida.

QUESTÃO 18

A anemia megaloblástica por deficiência de ácido fólico ocorre em crianças alimentadas exclusivamente por:

- A) mingau de cereais.
- B) mingau de farinha de mandioca.
- C) leite de cabra.
- D) leite de búfalo.
- E) carne de búfalo.

QUESTÃO 19

Em relação ao calendário de vacinação, analise as alternativas abaixo.

1. O PNI (Programa Nacional de Imunização) do Ministério da Saúde prevê a administração de vacinas contra: hepatite B, tuberculose, difteria, tétano, coqueluche, hemófilos tipo B, poliomielite, sarampo, rubéola e caxumba.
2. A DPT é contra-indicada na presença de história familiar de reação adversa após administração de DPT.
3. Se a primeira dose da vacina contra hepatite B for administrada nas primeiras 12h de vida pode evitar a transmissão vertical dessa patologia.

Está(ão) **correta(s)**:

- A) 1, 2 e 3.
- B) 2, apenas.
- C) 3, apenas.
- D) 1 e 3, apenas.
- E) 1 e 2, apenas.

QUESTÃO 20

Um bebê primogênito de 1 mês de vida, amamentado exclusivamente ao peito, não ganhou peso adequado. A sua genitora se queixa de que o mesmo “mama de hora em hora” e urina pouco. Informa que fez pré-natal completo, sem intercorrências e seu parto foi normal. O bebe nasceu a termo, pesando 3.600gr, com Apgar 8 no primeiro minuto e 10 no quinto. Ao exame físico apresenta-se normal. Esse quadro requer a seguinte orientação:

- A) manter a aleitamento materno exclusivo e pesar o lactente em 10 dias.
- B) explicar a mãe a importância do aleitamento materno.
- C) avaliar se mãe segue a técnica correta de amamentação.
- D) introduzir complementação alimentar.
- E) Introduzir complementação alimentar e reavaliar o lactente em 10 dias.

QUESTÃO 21

O recém-nascido com testículos localizados no canal inguinal apresenta descida espontânea e localização final no saco escrotal até a idade de:

- A) 15 meses.
- B) 5 meses.
- C) 6 meses.
- D) 12 meses.
- E) 3 meses.

QUESTÃO 22

A imunização é um procedimento indispensável à prevenção de doenças infantis. Com essa finalidade, no primeiro mês de vida é aplicada a BCG, prioritariamente, na:

- A) inserção inferior do deltóide esquerdo.
- B) inserção inferior do deltóide direito.
- C) porção média do antebraço direito.
- D) porção superior do braço direito.
- E) face externa do antebraço esquerdo.

QUESTÃO 23

Nas crianças infectadas pelo HIV e sintomáticas, é contra-indicado que tipo de imunizante?

- A) DTP
- B) TT
- C) DT
- D) BCG
- E) Sabin

QUESTÃO 24

O Conselho Tutelar é normatizado no título V do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Em relação ao ECA analise as afirmativas abaixo.

1. O Conselho Tutelar é o órgão jurisdicional e temporário encarregado de julgar os casos de não cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.
2. A autoridade judiciária poderá determinar que o pai agressor seja afastado da moradia comum, em caso de maus-tratos, opressão ou abuso sexual.
3. A escolha dos membros do Conselho Tutelar é realizada sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Está(ão) **correta(s)**:

- A) 1, 2 e 3.
- B) 1 e 2, apenas.
- C) 1 e 3, apenas.
- D) 2 e 3, apenas.
- E) 3, apenas.

QUESTÃO 25

L.M.A., de 14 anos, internou-se na clínica médica com o diagnóstico de Leucemia Mielóide Aguda. Os exames realizados constataram anemia, leucopenia e trombocitopenia. Foi puncionada uma veia periférica e iniciada antibioticoterapia e quimioterapia. Em relação aos cuidados prestados a tal paciente, é **incorreto** afirmar que:

- A) devido à leucopenia, em todos os procedimentos invasivos há um risco maior de infecção.
- B) troca do local de punção da veia periférica deve ser feita a cada 24 horas devido ao risco aumentado de infecção.
- C) deve-se proporcionar uma boa hidratação oral ao paciente para contribuir para a eliminação das drogas.
- D) as eliminações urinárias e fecais devem ser observadas com rigor para detectar possíveis sangramentos.
- E) a sessão de quimioterapia só deve ser iniciada se a paciente se encontrar em condições hematológicas normais.

QUESTÃO 26

Com relação à respiração do recém-nascido, é **correto** afirmar:

- A) A respiração dos recém-nascidos é predominantemente costal superior.
- B) A frequência respiratória média do recém-nascido a termo é de 20 movimentos respiratórios por minuto.
- C) A frequência respiratória média é de 40 movimentos respiratórios por minuto no recém-nascido a termo e de até 60 movimentos respiratórios por minuto no prematuro.
- D) Movimentos torácicos amplos e retrações inter e/ou subcostais são indícios de boa ventilação.
- E) A frequência respiratória média no prematuro é de 20 movimentos respiratórios por minuto.

QUESTÃO 27

A forma mais adequada para o acompanhamento do crescimento de uma criança, nos serviços básicos de saúde, é o registro periódico do (a):

- A) peso/idade.
- B) peso/altura.
- C) altura/perímetro cefálico.
- D) altura /perímetro braquial.
- E) perímetro braquial/prega cutânea.

QUESTÃO 28

Em relação às imunizações ativas na infância, assinale a alternativa **incorreta**:

- A) crianças que recebem BCG, raramente, quando adoecem, desenvolvem meningoencefalite ou tuberculose miliar.
- B) as vacinas contra difteria, tétano e coqueluche são preparadas com vírus vivos atenuados.
- C) a principal complicação da vacina anticoqueluche é o aparecimento de encefalopatia pós-vacinal.
- D) em condições ótimas de vacinação, a vacina Sabin confere cerca de 95% de imunidade.
- E) a vacina contra caxumba deve ser aplicada, em dose única, no 15º mês de vida.

QUESTÃO 29

Numa criança com 4 meses de idade e quadro de pneumonia aguda, o agente bacteriano mais provável é:

- A) *Staphylococcus aureus*.
- B) *Corynebacterium sp.*
- C) *Mycoplasma pneumoniae*.
- D) Estreptococo do grupo B.
- E) *Haemophilus influenzae*.

QUESTÃO 30

Uma das complicações mais frequentes do sarampo é:

- A) Púrpura trombocitopênica.
- B) Furunculose e abscessos de pele.
- C) Diarréia.
- D) Otite média.
- E) Úlcera de córnea.

QUESTÃO 31

Em relação ao crescimento físico, assinale a alternativa **incorreta**:

- A) A perda de peso é da ordem de 15% após o nascimento.
- B) O Perímetro Cefálico é um dos índices de menor variação para os diferentes grupos etários.
- C) No 5º e no 12º mês de vida, a criança dobra e triplica seu peso de nascimento, respectivamente.
- D) O pré-escolar cresce, em média, 6,5 cm por ano.
- E) No primeiro ano de vida, o perímetro cefálico ultrapassa sempre o torácico.

QUESTÃO 32

Em relação à avaliação do crescimento físico da criança, assinale a alternativa correta:

- A) O peso é considerado o segundo melhor parâmetro de crescimento da criança.
- B) Crianças com peso acima do percentil 95 para a idade são consideradas obesas.
- C) Crianças com evolução de peso e altura entre o percentil 10 e 90 apresentam crescimento adequado.
- D) O ganho de peso aumenta sua velocidade no segundo semestre de vida.
- E) Crianças com peso abaixo do percentil 3 para a idade são consideradas desnutridas.

QUESTÃO 33

Todos os parâmetros abaixo são utilizados para a avaliação de crescimento físico em crianças, exceto:

- A) Peso.
- B) Perímetro Torácico.
- C) Perímetro Cefálico.
- D) Perímetro braquial.
- E) Comprimento.

QUESTÃO 34

Em relação ao desenvolvimento da criança, assinale a alternativa incorreta:

- A) Em torno dos quatro meses de idade, os lactentes podem sentar-se sozinhos, inclinando-se para diante sobre suas mãos.
- B) Em torno de doze a treze meses de idade, os infantes caminham sozinhos, usando movimentos largos para ampliar o equilíbrio.
- C) Ao término do segundo ano de vida, a criança consegue subir escadas alternando os pés.
- D) Aos três anos de idade, o pré-escolar anda de triciclo e caminha na ponta dos pés.
- E) Aos cinco anos, a criança salta em pés alternados e pula corda.

QUESTÃO 35

Em relação ao uso de drogas, entre crianças e adolescentes, assinale a alternativa incorreta:

- A) A proporção de usuários de drogas entre jovens mantém estreita relação com as situações de violência em casa.
- B) As conseqüências do consumo de drogas estão relacionadas à violência, à disseminação do HIV e a doenças transmitidas por contato pele a pele, como a escabiose.
- C) O consumo abusivo de drogas está relacionado aos acidentes de trânsito e a ocorrência de envenenamentos.
- D) Os fatores de risco para o uso de drogas podem estar relacionados a conflitos no ambiente familiar e no convívio social.
- E) A proporção de usuários é maior em jovens que se encontram defasados nos estudos.

QUESTÃO 36

São ações do programa saúde da criança, desenvolvidas pelo enfermeiro em saúde pública:

- A) Acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento, promoção do aleitamento e realização do esquema vacinal.
- B) Acompanhamento do crescimento e planejamento alimentar.
- C) Realização de esquema vacinal, promoção do aleitamento materno e higiene corporal.
- D) Apenas promoção do aleitamento materno.
- E) Promoção do aleitamento materno, higiene oral e realização do esquema vacinal.

QUESTÃO 37

Dentre as complicações abaixo, é incomum na gravidez de adolescentes

- A) Eclampsia.
- B) Nascimento de bebês de baixo peso.
- C) Parto pós-maturo.
- D) Aparecimento de anemia ferropriva.
- E) Desproporção cefalopélvica.

QUESTÃO 38

Em relação à maturação sexual em meninas, o aparecimento dos brotos mamários é um evento conhecido como:

- A) Menarca
- B) Adrenarca
- C) Genarca
- D) Pubarca
- E) Telarca

QUESTÃO 39

Em relação à violência contra crianças, assinale a alternativa correta:

- A) Na maioria dos casos de abuso sexual na infância o agressor é alguém externo à família da vítima e, os membros da família, geralmente, são as pessoas mais interessadas na denúncia do agressor.
- B) Antes de realizar o exame físico da criança e/ou adolescente vítima de abuso sexual ou outros maus-tratos, deve ser providenciada higiene corporal para promover melhor conforto.
- C) Em adolescentes, a mudança constante de humor e a rebeldia com os pais são sintomas característicos do abuso sexual.
- D) A convivência da mãe com o indivíduo que abusa da criança é causa de dificuldade de identificação da situação de abuso.
- E) É incomum a associação entre violência física e abuso sexual de crianças e adolescentes.

QUESTÃO 40

Em relação ao desenvolvimento neuropsicomotor de um lactente, assinale a alternativa que mais corresponde a um padrão de desenvolvimento normal para um lactente com 10 meses de vida:

- A) Põe-se sentado permanece firme, pega objetos bem pequenos com dedos em pinça, troca passos apoiado em móveis, bate palminha, fala “mama” e “au-au” (específicos), não consegue empilhar cubos.
- B) Manipula objetos trocando os de mãos, anda bem, fala 5 palavras, bate palminha.
- C) Põe-se assentado, engatinha, suporta parcialmente o peso sobre as pernas, faz uma torre de 8 cubos.
- D) Põe-se sentado por poucos minutos, não consegue pegar um objeto em cada mão nem passar um objeto de uma mão para outra, dá gritinhos estridentes, mas não fala nenhuma palavra.
- E) Não consegue sentar, manipula objetos, anda bem, bate palminha.

QUESTÃO 41

Em relação ao tratamento da obesidade na infância e na adolescência, analise as afirmativas abaixo:

- 1. A reeducação alimentar é a medida mais importante e, no primeiro momento, o essencial é corrigir as distorções alimentares observadas e ensinar a identificar os alimentos mais e menos calóricos, aumentando o consumo desses e reduzindo a ingestão daqueles.
- 2. O efeito das atividades físicas sobre o ganho de peso é bem mais intenso que o efeito da restrição alimentar.
- 3. As causas endocrinológicas são muito frequentes e precisam ser pesquisadas extensivamente antes de submeter a criança desnecessariamente a uma dieta restritiva.
- 4. O uso do índice de massa corporal (peso em Kg dividido pelo quadrado da altura em metros), muito usado em adultos, é de pouca utilidade na criança, sendo preferível usar as curvas de percentil de peso e altura e as pregas cutâneas para o diagnóstico de obesidade.

Está (ão) correta(s):

- A) 1, apenas.
- B) 1 e 2, apenas.
- C) 2 e 3, apenas.
- D) 4, apenas.
- E) 3, apenas.

QUESTÃO 42

Em relação à hipertensão na infância e na adolescência, analise as afirmativas abaixo

- 1. Crises de palidez, cefaléia, sudorese, dor abdominal, taquicardia e picos de hipertensão são típicos do feocromocitoma.
- 2. Os inibidores da ECA e a nifedipina vêm se consolidando como as drogas mais importantes no tratamento da hipertensão crônica grave na criança.
- 3. Ao contrário dos adultos nos quais a hipertensão arterial essencial é quase sempre assintomática, na criança quase sempre existe algum sintoma como cefaléia, epistaxe, zumbidos, alterações visuais, desconforto abdominal ou mal estar.
- 4. A maioria dos casos de hipertensão arterial secundária na criança é devido a doenças nefro-urológicas.

Está (ão) correta(s):

- A) 1, apenas.
- B) 1 e 2, apenas.
- C) 1, 2 e 4, apenas.
- D) 4, apenas.
- E) 1, 2 e 3, apenas.

QUESTÃO 43

Em relação à insuficiência cardíaca na infância e na adolescência, analise as afirmativas abaixo

1. Uma das etapas mais importantes do tratamento da insuficiência cardíaca é o tratamento de fatores agravantes como anemia, acidose, hipoxemia, hipertensão e infecção.
2. Uma área cardíaca aumentada, ausência de sopros e fração de ejeção muito baixa no ecocardiograma apontam para o diagnóstico de miocardite ou miocardiopatia.
3. Quando se usa a dobutamina em um paciente com insuficiência cardíaca, é comum um aumento da frequência cardíaca e um aumento da pressão diastólica devido a vasoconstrição.
4. Nas miocardiopatias com insuficiência cardíaca muito grave, o repouso é muito importante e, quando necessário, deve-se sedar a criança para manter o repouso.

Está (ão) correta(s):

- A) 1, apenas.
- B) 1, 3 e 4, apenas.
- C) 1, 2 e 4, apenas
- D) 4, apenas.
- E) 1, 2 e 3, apenas.

QUESTÃO 44

A Unidade de Saúde onde você trabalha recebeu várias crianças que após serem vacinadas com BCG intradérmico (BCG-ID) apresentaram reações adversas locais e regionais tais como: úlcera com diâmetro maior que 1 cm, abscesso e linfadenopatia regional supurada. Esse fato começou a ocorrer após a entrada de novos funcionários. O enfermeiro responsável pelo serviço deve:

- A) suspender todas as atividades na sala de vacina da Unidade de Saúde.
- B) observar por mais um período e, se as reações adversas continuarem, toma providências.
- C) devolver os lotes de vacina BCG-ID para o nível regional e faz novo pedido.
- D) analisar a cobertura vacinal para promover uma estratégia que aumente a cobertura para os níveis desejados.
- E) promover um treinamento em serviço sobre a técnica de aplicação da vacina BCG-ID para os vacinadores.

QUESTÃO 45

Os procedimentos de reanimação cardiopulmonar, no suporte básico de vida pré-hospitalar, seguem na criança a mesma seqüência que nos adultos, ou seja, vias aéreas (A), ventilação (B) e circulação (C). Considere as afirmativas abaixo relativas à reanimação cardiopulmonar em crianças.

1. Na ausência de respiração, realizar manobras de abertura de vias aéreas como no adulto: inclinação de cabeça e elevação de mandíbula.
2. A ventilação recomendada para crianças maiores de um ano é a boca-boca/nariz.
3. Se o pulso da criança estiver presente, mas ela continuar em apnéia, não é necessário prosseguir as manobras de ventilação.
4. As compressões torácicas são feitas em decúbito dorsal, sobre superfície rígida; e em lactentes, pode ser utilizado o antebraço do socorrista como apoio.

Estão corretas:

- A) 1, 2 e 3, apenas.
- B) 1 e 4, apenas.
- C) 2 e 3, apenas.
- D) 2 e 4, apenas.
- E) 3 e 4, apenas.

QUESTÃO 46

Quanto ao desenvolvimento da criança, assinale a alternativa incorreta:

- A) Em torno dos quatro meses de idade, os lactentes podem sentar-se sozinhos, inclinando-se para diante sobre suas mãos.
- B) Em torno de doze a treze meses de idade, os infantes caminham sozinhos, usando movimentos largos para ampliar o equilíbrio.
- C) Ao término do segundo ano de vida, a criança consegue subir escadas alternando os pés.
- D) Aos três anos de idade, o pré-escolar anda de triciclo e caminha na ponta dos pés.
- E) Aos cinco anos, a criança salta em pés alternados e pula corda.

QUESTÃO 47

Dentre as doenças renais, a glomerulonefrite aguda responde pela maioria das admissões na Unidade Pediátrica. A causa mais comum é uma reação imunitária à infecção, produzida por:

- A) *corynebacterium*.
- B) *staphylococcus*.
- C) *streptococcus*.
- D) *salmonella*.
- E) *haemophilus*.

QUESTÃO 48

Com relação à Atenção à Saúde da Criança, é **correto** afirmar que:

- A) no crescimento com curva de traçado ascendente deve-se pesquisar problema de saúde.
- B) o processo de desmame do leite materno deve ser iniciado aos cinco meses.
- C) o crescimento e desenvolvimento infantil são processos geneticamente programados, que independem de fatores ambientais.
- D) primeira infância é o período que vai do nascimento até o segundo ano de vida.
- E) a circunferência craniana alterada é indicativa de anormalidade do SNC.

QUESTÃO 49

Em crianças com AIDS e com desnutrição, o mineral contraindicado para suplementação, por apresentar baixa capacidade de ligação a proteínas e permitir a proliferação de organismos dependentes é o:

- A) magnésio.
- B) cobre.
- C) cálcio.
- D) zinco.
- E) ferro.

QUESTÃO 50

A Estratégia de AIDIPI ajuda bastante no acompanhamento de bebês e crianças maiores, possibilitando ao Enfermeiro visualização de sinais de perigo que significam doença grave. Dentre estes sinais encontram-se:

- A) feridas e pedículos.
- B) palidez e resfriado.
- C) astenia e disfagia.
- D) febre e convulsões.
- E) escabiose e *tinea corporis*.

RAASCUNHO