

## ENFERMAGEM

**QUESTÃO ÚNICA**

10,000 pontos distribuídos em 50 itens

**Marque no cartão de respostas a única alternativa que responde de maneira correta ao pedido de cada item.**

1. Sobre o Art. 1º da Lei nº 10.424/2002, que trata do atendimento domiciliar e da internação domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), é correto afirmar que:
  - (A) a internação domiciliar é realizada por indicação e por meio de relatório feito pela enfermeira responsável pelo paciente no hospital.
  - (B) incluem-se principalmente os procedimentos médicos, de enfermagem, de fisioterapia, de psicólogos e de assistência social.
  - (C) o atendimento ao paciente em internação domiciliar visa atuar, fundamentalmente, na reabilitação.
  - (D) inclui-se apenas o atendimento médico e de enfermagem.
  - (E) a internação domiciliar é realizada por meio de relatório feito pela enfermeira responsável pelo setor de internação domiciliar da Secretaria de Saúde.
2. São finalidades do Sistema Nacional de Auditoria (SNA):
  - (A) determinar as não conformidades dos serviços prestados e apontar os responsáveis.
  - (B) avaliar as atividades, identificar as ações inadequadas e capacitar os profissionais para o desenvolvimento de melhores práticas.
  - (C) analisar os gastos e fazer um estudo de viabilidade financeira do atendimento das especialidades contratadas.
  - (D) aferir os indicadores e padrões estabelecidos e proceder ao levantamento de dados que permitam conhecer a qualidade, a quantidade, os custos e os gastos da atenção à saúde.
3. Quanto às instâncias colegiadas de que trata a Lei 8.142/1990 é correto afirmar que:
  - (A) o Conselho de Saúde é um órgão colegiado, tem caráter provisório e periódico; e conta com a participação de representantes do governo, profissionais de saúde e usuários do SUS.
  - (B) o Conselho de Saúde se reúne anualmente para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a formulação de políticas de melhoria.
  - (C) são três: Conferência de Saúde, Conselho Nacional de Saúde e Conselho dos Secretários de Saúde (CONASS).
  - (D) a Conferência de Saúde se reúne a cada quatro anos, podendo ser convocada extraordinariamente pelo Poder Executivo ou pelo Conselho de Saúde, fora desse período.
  - (E) têm sua organização e normas de funcionamento definidas pelo Congresso Nacional.
4. De acordo com a Lei 7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem, são quatro as categorias de profissionais que desenvolvem atividades de enfermagem:
  - (A) atendente de enfermagem, auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem e o enfermeiro.
  - (B) enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteiras.
  - (C) enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e cuidador.
  - (D) enfermeiro, auxiliar de enfermagem, atendente de enfermagem e cuidador.
  - (E) cuidador, parteiras, técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem.
5. A terapia medicamentosa através da via venosa é administrada e controlada pela equipe de enfermagem. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta.
  - (A) A velocidade do fluxo é diretamente proporcional ao diâmetro do equipo.
  - (B) A velocidade de fluxo de uma venoclise é inversamente proporcional à altura em que é fixado o frasco do soro.
  - (C) A velocidade do fluxo é diretamente proporcional ao comprimento do equipo.
  - (D) Diminuindo-se a extensão de um equipo, diminui-se a velocidade do fluxo.
  - (E) Quanto menor a viscosidade de um líquido, maior a necessidade de um equipo calibroso.

~~(E) avaliar a qualidade e a efetividade dos serviços prestados à comunidade, considerando a relação entre a satisfação dos usuários e o menor gasto de materiais utilizados.~~

Diretor de Ensino

Diretor de Ensino

6. Em relação aos cuidados de enfermagem aos pacientes com alterações vasculares periféricas, assinale a alternativa correta.

- (A) Na insuficiência arterial periférica, o paciente deve ser estimulado a deambular pelo menos 45 min diariamente e praticar exercícios de médio impacto.
- (B) No caso de insuficiência venosa devemos evitar o uso de meias de compressão.
- (C) Para melhorar o edema na insuficiência arterial periférica devemos manter os membros inferiores elevados.
- (D) Deve-se aplicar compressas geladas para diminuir a dor na insuficiência arterial.
- (E) Na insuficiência venosa, orientar o uso de meias pneumáticas tendo o cuidado de retirá-las a cada 8 horas por 15 a 20 min.

7. Quantos gramas de Bicarbonato de sódio são necessários para administrar 500ml de uma solução a 3%?

- (A) 10g
- (B) 12g
- (C) 15g
- (D) 20g
- (E) 25g

8. Quando falamos de curativo à base de hidrogel é correto afirmar que:

- (A) o propilenoglicol (PPG), componente encontrado nos hidrogéis, mantém o meio úmido.
- (B) a carboximetilcelulose, componente encontrado nos hidrogéis, facilita a reidratação celular e o desbridamento.
- (C) os hidrogéis não são indicados em tecidos necróticos.

~~(D) os hidrogéis podem ser utilizados em pele íntegra como medida de prevenção, evitando as úlceras de pressão.~~

(E) os hidrogéis são indicados em feridas cirúrgicas fechadas.

9. Em relação às teorias de enfermagem, analise as afirmativas abaixo e, a seguir, assinale a alternativa correta.

- I. Quando a enfermagem estimula as atividades do auto-cuidado está utilizando como base a teoria da Irmã Callista Roy.
- II. A assistência de enfermagem direcionada a grupos indígenas deve ter como base a teoria de Leininger.
- III. No cuidado transpessoal, a enfermagem está direcionada à compreensão da intermediação entre saúde, doença e comportamento humano, como preconiza a teoria de Orem.
- IV. A abordagem Holística da enfermagem tem como base a teoria de Neuman.

- (A) Somente I, II e III estão corretas.
- (B) Somente I e III estão corretas.
- (C) Somente I e IV estão corretas.
- (D) Somente II, III e IV estão corretas.
- (E) Somente II e IV estão corretas.

10. Durante o exame físico do sistema neurológico, examina-se os pares de nervos cranianos através da realização de testes. Em relação a esses testes, associe a segunda coluna de acordo com a primeira e, a seguir, assinale a alternativa com a seqüência correta.

NERVOS	FINALIDADE
1. Trigêmio (V par)	( ) Teste quanto a condução aérea e óssea (Rinne).
2. Vago (X par)	( ) Testar sensibilidade à temperatura.
3. Craniano (II par)	( ) Teste da capacidade de distinção entre o salgado e o doce.
4. Glossofaríngeo (IX par)	( ) Testar o reflexo de Vômito.
5. Acústico (VIII par)	

\_\_\_\_\_  
Diretor de Ensino

- (A) 5 – 4 – 3 – 2  
(B) 1 – 4 – 2 – 5  
(C) 2 – 1 – 5 – 4  
(D) 5 – 1 – 4 – 2  
(E) 4 – 2 – 5 – 3

11. No tratamento do câncer são utilizados agentes anti-neoplásicos que trazem diversos efeitos colaterais. Nos casos da administração desses agentes por via endovenosa, havendo extravasamento durante a sua administração, qual das substâncias abaixo pode ser utilizada para reduzir a lesão tissular?

- (A) Gluconato de cálcio.  
(B) Ifosfamida.  
(C) Hialuronidase.  
(D) Sulfato de potássio.  
(E) Asparaginase.

12. O equilíbrio hidroeletrólítico é um processo orgânico essencial para a manutenção da vida. O profissional de enfermagem precisa compreender a fisiologia desse equilíbrio para prever, identificar e prestar a assistência de enfermagem. Associe a segunda coluna de acordo com a primeira e, a seguir, assinale a alternativa com a seqüência correta.

**SINTOMAS****CARACTERÍSTICAS**

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1. Alcalose metabólica   | ( ) PH arterial baixo devido à concentração reduzida de bicarbonato. |
| 2. Alcalose respiratória | ( ) PH arterial baixo devido a PCO <sub>2</sub> aumentada.           |
| 3. Acidose metabólica    | ( ) PH arterial alto com a concentração aumentada de bicarbonato.    |
| 4. Acidose respiratória  | ( ) PH arterial alto devido a PCO <sub>2</sub> reduzida.             |

- (A) 2 – 4 – 3 – 1  
(B) 4 – 1 – 2 – 3  
(C) 3 – 2 – 4 – 1  
(D) 1 – 3 – 2 – 4  
(E) 3 – 4 – 1 – 2

13. É cuidado específico de enfermagem direcionado aos pacientes em uso de pulsoterapia:

- (A) solicitar à equipe médica punção de acesso central (subclávia).

- (B) fazer balanço hídrico.  
(C) monitorar rigorosamente a temperatura corporal.  
(D) monitorar a glicemia capilar.  
(E) realizar a pulsoterapia no período vespertino.

14. Em relação à infecção pelo vírus do dengue, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. As manifestações hemorrágicas, bem como a plaquetopenia, podem ser observadas em todas as apresentações clínicas de dengue.  
II. A dor abdominal intensa e vômitos persistentes são sinais de alarme que significam a evolução para um quadro de dengue hemorrágica.  
III. A prova do laço é um exame baseado no grau de fragilidade capilar, estando positiva nos casos de dengue hemorrágica.  
IV. A diminuição do valor do hematócrito, identificado pelo hemograma, é um sinal de agravamento da doença.

- (A) Somente I e II estão corretas.  
(B) Somente I, II e III estão corretas.  
(C) Somente II e III estão corretas.  
(D) Somente II, III e IV estão corretas.  
(E) Somente III e IV estão corretas.

15. Sobre a enfermagem perioperatória é correto afirmar que:

- (A) é uma especialidade da enfermagem que direciona o cuidado exclusivamente para o problema cirúrgico dos pacientes.  
(B) a assistência perioperatória de enfermagem começa no diagnóstico, quando é decidido pela intervenção cirúrgica até o momento da alta hospitalar.  
(C) é um processo dinâmico, cognitivo, comportamental e técnico dirigido para a provisão de qualidade da assistência ao paciente antes, durante e após a intervenção cirúrgica.  
(D) a assistência de enfermagem perioperatória inicia-se no momento da admissão do paciente até a alta anestésica do centro cirúrgico.

Diretor de Ensino

(E) é uma especialidade da enfermagem que se preocupa com os cuidados do paciente cirúrgico no momento da intervenção cirúrgica, nos períodos pré-operatório imediato, intra-operatório e pós-operatório imediato.

16. Sobre o processo de desinfecção, associe a segunda coluna de acordo com a primeira e, a seguir, assinale a alternativa com a seqüência correta.

**CLASSIFICAÇÃO****FINALIDADE**

- |  |  |
|--|--|
| <p>1. Desinfecção de Alto Nível.</p> <p>2. Desinfecção de Nível Intermediário.</p> <p>3. Desinfecção de Baixo Nível.</p> | <p>( ) Elimina todas as bactérias na forma vegetativa, porém não age contra o bacilo da tuberculose, os esporos e vírus não lipídicos. Tem ação relativa sobre os fungos. O composto mais utilizado é o quaternário de amônia.</p> <p>( ) Destrói todas as bactérias vegetativas, as microbactérias, os fungos e os vírus, mas não todos os esporos bacterianos. É indicado para artigos como lâminas de laringoscópio, equipamentos de terapia respiratória, de anestesia e endoscópios de fibra flexível. Os agentes mais usados são o glutaraldeído e o ácido paracético.</p> <p>( ) Tem ação virucida e bactericida para formas vegetativas, inclusive contra o bacilo da tuberculose, porém não destrói esporos. Os compostos mais utilizados são o cloro, os iodóforos, os fenólicos e os álcoois.</p> |
|--|--|

- (A) 3 – 2 – 1  
 (B) 1 – 2 – 3  
 (C) 2 – 3 – 1  
 (D) 3 – 1 – 2  
 (E) 1 – 3 – 2

17. Muitas afecções gastrointestinais são tratadas por meio de procedimentos cirúrgicos. A visualização dos órgãos abdominais pode ser por uma incisão na parede abdominal ou por via laparoscópica. É exemplo de cirurgia abdominal:

- (A) Colonoscopia.  
 (B) Enterectomia.  
 (C) Postectomia.  
 (D) Safenectomia.  
 (E) Colposcopia.

18. O tabagismo é um dos principais fatores de risco para o enfisema pulmonar, porém, há casos em que essa patologia é causada por fatores ambientais e genéticos, inclusive na ausência do tabagismo. Entre os fatores genéticos destaque:

- (A) deficiência de surfactante.  
 (B) deficiência de proteinases.  
 (C) excesso de streptolisinas.  
 (D) deficiência de alfa1-antitripsina.  
 (E) excesso de colinesterase.

19. Em uma prescrição pede-se 1,5g de sulfato de magnésio. Temos ampola de 20 ml de sulfato de Mg a 10%. Quantos mililitros dessa ampola serão utilizados para atender à prescrição?

- (A) 5 ml  
 (B) 10 ml  
 (C) 15 ml  
 (D) 20 ml  
 (E) 25 ml

20. Um paciente que após a ocorrência de um acidente vascular encefálico, teve os seguintes sintomas: dificuldade para seguir comandos, dificuldade em formar palavras e dificuldade de realizar tarefas do auto-cuidado, apresentou respectivamente:

- (A) agnosia, afasia e ataxia.  
 (B) confusão, afasia e disartria.  
 (C) agnosia, afasia e confusão.  
 (D) ataxia, agnosia e disartria.  
 (E) confusão, disartria e ataxia.

21. São vários os tipos de anestesia e drogas utilizadas em cirurgias. Dentre estas drogas comumente usadas estão os analgésicos opiáceos, como por exemplo:

- (A) Diazepam e Fentanil.
- (B) Fentanil e Midazolam.
- (C) Sulfato de Morfina e Halotano.
- (D) Atracurium e Sulfentanil.
- (E) Afentanil e Sulfato de Morfina.

22. A validação do processo de esterilização precisa confirmar que a letalidade do ciclo seja suficiente para garantir uma probabilidade de sobrevivência microbiana mínima. Sobre os testes de controle desse processo, podemos afirmar que:

- (A) o teste de Bowie & Dick é um indicador de processo, classe I. Deve ser realizado diariamente e comprova que o material foi exposto à temperatura adequada.
- (B) o controle dos processos de esterilização é realizado através de indicadores químicos e biológicos, semanalmente. Porém, na presença de alguma alteração, os testes devem ser repetidos diariamente até a solução do problema.
- (C) o teste de Bowie & Dick é um indicador químico, classe II. Deve ser realizado no primeiro ciclo do dia, apenas nos equipamentos assistidos por bomba de vácuo.
- (D) os testes com indicadores biológicos de primeira geração são os mais utilizados atualmente. Apresentam alto grau de segurança nos seus resultados e devem ser realizados semanalmente.
- (E) os testes com indicadores microbiológicos de terceira geração devem ser realizados diariamente. As ampolas são incubadas e o resultado é dado após 24 horas.

23. É exemplo de cirurgia asséptica:

- (A) Colectomia.
- (B) Apendicectomia.
- (C) Hemorroidectomia.
- (D) Colostomia.
- (E) Craniotomia.

24. As medicações inotrópicas são primariamente utilizadas em qual dos sistemas orgânicos abaixo citados?

- (A) Endócrino
- (B) Digestório
- (C) Neurológico
- (D) Geniturinário
- (E) Cardiovascular

25. A administração de medicação pela técnica em Z é indicada no seguinte caso:

- (A) injeção intramuscular em pessoas muito magras.
- (B) administração de ferro intramuscular.
- (C) realização de testes alérgicos.
- (D) administração de medicação por via subcutânea.
- (E) injeção intramuscular em crianças.

26. No tratamento de feridas infectadas, na ausência de necrose está indicado o uso de papaína em que diluição?

- (A) 3g em 50 ml.
- (B) 5g em 50 ml.
- (C) 6g em 50 ml.
- (D) 7g em 50 ml.
- (E) 10g em 50 ml.

27. O tratamento da Trombose Venosa Profunda (TVP) baseia-se na utilização de anticoagulantes, entre eles a heparina. Entre as complicações no uso da heparina, podemos citar:

- (A) trombocitopenia, alergia e dilatação de veias superficiais.
- (B) edema, taquicardia e necrose tecidual.
- (C) dilatação de veias superficiais, edema muscular e hemorragia.
- (D) hemorragia, trombocitopenia e necrose tecidual.
- (E) taquicardia, mal-estar e trombocitopenia.

28. O choque caracteriza-se por perfusão tissular e vascular inadequada que, se não tratada, resulta em morte celular. Sobre o choque hipovolêmico podemos afirmar que:

Diretor de Ensino

- (A) resulta de uma infecção grave que provoca hipovolemia relativa.
- (B) trauma, cirurgia, diabetes insípido, queimaduras e ascite são alguns dos seus fatores de risco.
- (C) ocorre quando a capacidade do coração de se contrair e bombear o sangue está comprometida e o suprimento de oxigênio é inadequado para o coração e tecidos.
- (D) o tratamento farmacológico é feito basicamente com droga antiarrítmica visando restaurar o débito cardíaco adequado.
- (E) os sintomas iniciais são bradicardia, pele seca e quente.
29. No tratamento da hipertensão arterial, qual é a ação dos bloqueadores dos canais de cálcio?
- (A) Reduzir a resistência vascular periférica pela vasodilatação sistêmica.
- (B) Diminuir a pressão arterial ao bloquear a conversão da angiotensina I em angiotensina II, prevenindo a vasoconstrição e a retenção de líquidos.
- (C) Diminuir a pressão arterial ao combinar-se com receptores beta-adrenérgicos no coração, artérias e arteríolas para bloquear a resposta aos impulsos nervosos simpáticos.
- (D) Diminuir a pressão arterial ao reduzir a reabsorção de sódio e água pelos rins.
- (E) Atuar no músculo liso arteriolar para causar relaxamento e reduzir a resistência vascular periférica.
30. Dentre os objetivos dos cuidados de enfermagem para um paciente que apresenta angina, inclui-se:
- (A) alívio da dor, redução da ansiedade e a ausência de dificuldade respiratória.
- (B) obtenção e manutenção de perfusão tissular adequada, ausência de hipoxemia e a integridade da pele.
- (C) ausência de edema periférico, alívio da dor e manutenção da temperatura corporal normal.
- (D) redução da ansiedade, equilíbrio hidroeletrólítico e obtenção do sono repousante.
- (E) ausência da dificuldade respiratória, manutenção da temperatura corporal adequada e ausência de hipoxemia.
31. São exemplos de cuidados de enfermagem durante uma crise convulsiva:
- (A) deitar o paciente no chão, se possível; promover privacidade; e conter o paciente para evitar que ele se machuque.
- (B) afrouxar as roupas; colocar o paciente em decúbito dorsal com a cabeceira elevada; e instalar oxigenoterapia.
- (C) fornecer privacidade; se estiver no leito, remover travesseiros e elevar as grades; e colocar o paciente em decúbito lateral, com a cabeça flexionada para diante, logo que possível.
- (D) instalar oxigenoterapia; abrir a boca e fazer manobra para segurar a língua; e acalmar o paciente.
- (E) abrir a boca e fazer manobra para segurar a língua; conter o paciente para evitar lesões; e instalar oxigenoterapia.
32. A síndrome parkinsoniana é um distúrbio de movimento que ocorre com frequência na senescência. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta.
- (A) A instabilidade postural é comum nas fases iniciais de evolução do parkinsonismo.
- (B) Na síndrome parkinsoniana o tremor aumenta com a movimentação voluntária do segmento afetado.
- (C) Drogas que podem causar o parkinsonismo secundário são os antieméticos e a levodopa.
- (D) O tremor típico da síndrome parkinsoniana mantém-se mesmo durante o sono.
- (E) A rigidez encontrada na síndrome parkinsoniana é definida como hipertonia plástica.
33. As contrações uterinas durante o trabalho de parto ativo e bem estabelecido normalmente se dão, aproximadamente, a cada:
- (A) 2 minutos
- (B) 3 minutos
- (C) 5 minutos
- (D) 8 minutos
- (E) 10 minutos

Diretor de Ensino

34. As hepatites virais podem ser provocadas por diferentes vias de contato e agentes etiológicos. Sobre o processo de acometimento de indivíduos por estas patologias, assinale a alternativa correta.
- (A) A hepatite A raramente é transmitida por via parenteral.  
(B) O risco de transmissão por via sexual da hepatite C é maior que o da hepatite B.  
(C) O vírus tipo E é transmitido principalmente pela relação sexual.  
(D) A vacina para a hepatite B está contra-indicada para pacientes HIV positivos.  
(E) A hepatite delta é endêmica na região sul do Brasil.
35. Analise as afirmativas abaixo sobre ventilação não-invasiva (VNI), colocando entre parênteses a letra “V”, quando se tratar de afirmativa verdadeira e a letra “F” quando se tratar de afirmativa falsa e, a seguir, assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta.
- ( ) Está indicada em situações em que o paciente é incapaz de proteger sua via aérea, como na perda de consciência, nos casos de hipersecreção pulmonar e instabilidade hemodinâmica.  
( ) A familiarização da equipe multiprofissional com esse método de ventilação, a otimização da adaptação da máscara ao paciente, a vigilância à sincronização adequada entre respiração e ventilação são fatores de sucesso para a VNI.  
( ) Dentre as principais indicações para o uso da VNI temos: a exacerbação de DPOC, a pneumonia em imunocomprometidos, o edema agudo de pulmão e a IRpA.  
( ) O emprego da VNI ocasiona diminuição da pressão intratorácica e o aumento da capacidade funcional dos pulmões, melhorando, dessa forma, a oxigenação e a ventilação alveolar.  
( ) O uso da VNI nas doenças neuromusculares age causando o repouso do diafragma e diminuindo as atelectasias.
- (A) V – F – F – V – F  
(B) F – V – V – F – V  
(C) V – V – F – V – F  
(D) F – F – V – V – V  
(E) V – V – V – F – F
36. Em relação ao diabetes em pacientes idosos, assinale a alternativa correta.
- (A) Para critério de controle da doença é aceitável uma glicemia em jejum entre 100 e 130mg/dl.  
(B) As glicemias pós-prandiais somente serão consideradas como aceitáveis para controle da glicemia, se estiverem menores que 140mg/dl.  
(C) Todos os idosos com glicosúria devem iniciar o tratamento medicamentoso para diabetes, para evitar as complicações crônicas da doença.  
(D) As pessoas idosas raramente desenvolvem cetoacidose, mas podem entrar em estado de hipo-osmolaridade e fazer sua apresentação inicial com confusão, coma ou sinais neurológicos focais.  
(E) No idoso, a imobilidade prolongada pode elevar temporariamente a glicemia.
37. Assinale a alternativa correta em relação à incontinência fecal em idosos.
- (A) É mais comum em homens do que em mulheres.  
(B) Uma lesão no esfíncter anal externo constitui-se em um dos principais fatores que levam à incontinência fecal completa.  
(C) A impactação fecal é uma das causas da perda involuntária de material fecal em idosos.  
(D) A característica das fezes na incontinência fecal provocada por seqüela de acidente vascular encefálico é a eliminação de fezes diarréicas.  
(E) Na incontinência fecal idiopática, o idoso mantém o reflexo anal, mas não diferencia a presença de fezes ou gases na região anorretal.
38. A Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres em parceria com o Ministério da Saúde desenvolveu um Plano Integrado de Enfrentamento à Feminização da Epidemia da AIDS e outras DST, visando nortear as ações de saúde nas esferas federal, estadual e municipal. Sobre este Plano, analise as afirmativas abaixo e, a seguir, assinale a alternativa correta.
- I. Seu objetivo é a promoção da saúde sexual e da saúde reprodutiva, por meio do desenvolvimento de ações intersetoriais que acelerem o acesso aos insumos de prevenção, diagnóstico e tratamento das DST e da AIDS, para as mulheres das diferentes regiões do nosso país.  
II. Entre as suas diretrizes está promover a equidade racial, étnica, de gênero e de orientação sexual das mulheres no acesso a informação, diagnóstico e tratamento das DST/AIDS.

Diretor de Ensino

**II.** Este plano tem como ação estratégica a integração entre a rede de mulheres, redes de serviço de saúde, segurança pública, justiça e assistência social.

- (A) Somente I está correta.
- (B) Somente I e II estão corretas.
- (C) Somente I e III estão corretas.
- (D) Somente II e III estão corretas.
- (E) Todas estão corretas.

**39.** Sobre gestações de alto risco, assinale a alternativa que apresenta algumas das complicações que determinam o risco gravídico.

- (A) Morte fetal, vômito pernicioso e gestação prolongada.
- (B) Edema, poliidrânio e placenta prévia.
- (C) Placenta prévia, doenças isoimunes e edema.
- (D) Toxemia, vômito pernicioso e síndrome de Down.
- (E) Síndrome de Down, edema e trabalho de parto prematuro.

**40.** Muitas preocupações na área de saúde da mulher estão relacionadas com as alterações normais ou anormais do ciclo menstrual. Educar as mulheres sobre o ciclo menstrual e suas alterações constitui um aspecto importante no papel da enfermeira no cuidado de qualidade voltado para a saúde da mulher. Dessa forma, é necessário o conhecimento de alguns termos e seus significados. Logo, relacione a coluna da direita com a da esquerda e, a seguir, assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta.

TERMOS

DEFINIÇÕES

1. Dismenorrêi ( ) Sangramento prolongado ou excessivo no período do fluxo menstrual regular.
    - a. ( ) Ausência de fluxo menstrual.
  2. Dispareunia. ( ) É a menstruação dolorosa, ocorre durante ou após a menarca.
  3. Metrorragia. ( ) Relação sexual difícil ou dolorosa.
  4. Amenorréia. ( ) Sangramento vaginal entre os períodos menstruais regulares.
  5. Menorragia.
  6. Menopausa.
- (A) 6 – 4 – 3 – 1 – 5
  - (B) 1 – 5 – 2 – 3 – 6
  - (C) 5 – 4 – 1 – 2 – 3
  - (D) 2 – 3 – 4 – 6 – 5
  - (E) 5 – 6 – 4 – 3 – 1

**41.** Em relação a pneumonia na infância é correto afirmar que:

- (A) é um processo infeccioso do perênquima pulmonar, muito comum no período da segunda infância.
- (B) clinicamente a pneumonia está relacionada a uma doença como gripe, alergia, rinite, sinusite e asma.
- (C) os sinais e sintomas da pneumonia bacteriana incluem febre, tosse e dor torácica, dor abdominal, calafrios e meningismo.
- (D) a pneumonia viral é uma forma da doença mais grave que a pneumonia bacteriana, pois exige internamento hospitalar devido, normalmente, ao aparecimento do derrame pleural.
- (E) os cuidados de enfermagem à criança com pneumonia requer basicamente o cuidado com o dreno de tórax, avaliação da dor e das alterações respiratórias.

**42.** São cuidados de enfermagem com o recém-nascido (RN):



- (A) encaminhar o RN diariamente para tomar banho com a mãe e orientar a higiene íntima.
- (B) oferecer hidratação oral e suplemento alimentar visando fortalecer o aleitamento.
- (C) manter o RN bem aquecido e fazer uso do termômetro anal para medir a temperatura mais precisamente.
- (D) proporcionar ambiente tranqüilo para o sono e posicionar o RN em decúbito ventral durante o sono ajudando na sua percepção de segurança.
- (E) avaliar a força de sucção e a coordenação com a deglutição e observar o padrão de evacuação.
43. Um indivíduo que apresenta falta de persistência de cuidados com sua higiene pessoal e falta de persistência no trabalho e nos estudos, está apresentando:
- (A) alergia.
- (B) embotamento afetivo.
- (C) Abulia.
- (D) ataxia.
- (E) catatonia.
44. Em relação à ocorrência de episódios convulsivos, relacione a primeira coluna de acordo com a segunda e, a seguir, assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta.
- | SINTOMA           | DEFINIÇÃO  |
|-------------------|--|
| 1. Tônico-clônica | ( ) Contratura simétrica e semi-rítmica.                         |
| 2. Clônica        | ( ) Contratura corporal breve e súbita.                          |
| 3. Mioclônica     | ( ) Presença de contratura rítmica e enrijecimento.              |
| 4. Atônica        | ( ) Perda súbita do tônus e conseqüente queda da própria altura. |
- (A) 1 – 4 – 3 – 2
- (B) 2 – 3 – 1 – 4
- (C) 3 – 2 – 4 – 1
- (D) 4 – 3 – 2 – 1
- (E) 4 – 1 – 2 – 3
45. A dependência ao álcool produz diversas alterações orgânicas, uma delas é a síndrome de Korsakoff, que tem como principal sintoma:
- (A) amnésia.
- (B) ascite.
- (C) icterícia.
- (D) tremores.
- (E) inapetência.
46. Na assistência de enfermagem nas emergências de intoxicação por drogas é correto afirmar que:
- (A) o uso abusivo de cocaína provoca hipopirexia, por este motivo deve-se realizar o monitoramento da temperatura corporal.
- (B) na ingestão de cocaína deve ser evitada a indução do vômito.
- (C) uma das características do abuso de heroína é a presença de pupilas puntiformes.
- (D) uso abusivo de anfetaminas provoca sonolência e letargia.
- (E) o ácido lisérgico (LSD) diminui a pressão arterial.
47. Em situações de acidentes de trabalho relacionados à exposição a agentes biológicos são tomadas várias medidas de proteção ao trabalhador. Sobre o assunto assinale a alternativa correta.
- (A) No caso de exposição ocupacional ao vírus da hepatite B (VHB), se, mesmo após as doses vacinais, o trabalhador continuar a apresentar o anti HBs negativo, deve ser utilizada a imunoglobulina hiperimune contra hepatite B.
- (B) A probabilidade de infecção pelo vírus da hepatite B após exposição percutânea é significativamente menor do que a probabilidade de infecção pelo HIV.
- (C) Após exposição ocupacional ao vírus da hepatite C os profissionais não imunizados deverão fazer uso de imunoglobulina hiperimune para hepatite C, reduzindo dessa forma o risco de infecção.
- (D) O acompanhamento sorológico anti-HIV (ELISA) deverá ser realizado no momento do acidente, sendo repetido após a 4ª e 8ª semanas e no 6º mês.
- (E) Um profissional de saúde vítima de acidente com pérfuro-cortante e que ao realizar o teste de detecção rápida apresentar anti-HIV reativo, deverá iniciar a quimioprofilaxia até 2 horas depois deste acidente.

48. Nos centros urbanos as unidades básicas sem programa de saúde da família podem atender a uma população de até:

- (A) 10 mil habitantes.
- (B) 15 mil habitantes.
- (C) 20 mil habitantes.
- (D) 25 mil habitantes.
- (E) 30 mil habitantes.

49. A aplicação de vacinas de bactérias ou vírus vivos atenuados é totalmente contraindicada para o caso de:

- (A) desnutrição.
- (B) prematuridade ou baixo peso no nascimento.
- (C) aplicação de vacina contra a raiva.
- (D) toda pessoa em uso de corticosteróides.
- (E) pessoas acometidas por neoplasia maligna.

50. Os pacientes diabéticos devem estar devidamente orientados em relação à insulino terapia para evitar possíveis problemas. No acompanhamento hospitalar ou ambulatorial a enfermagem deverá realizar educação em saúde e oferecer informações sobre o uso e conservação da insulina. No que se refere a essa terapia, assinale a alternativa correta.

- (A) Ao realizar o transporte de insulina em viagens, colocar o frasco dentro de um saco com gelo seco, isopor ou bolsa térmica.
- (B) A insulina que está em uso poderá ser mantida em temperatura ambiente (15°C a 30°C), por até um mês.
- (C) As seringas e agulhas utilizadas para aplicação de insulina, independente de terem sido usadas pelo mesmo paciente, nunca devem ser reutilizadas.
- (D) Ao realizar a mistura de insulina regular com insulina intermediária, aspirar primeiro o frasco com a insulina intermediária e depois com a mesma seringa e agulha aspirar a insulina regular.
- (E) Na auto-aplicação da insulina deve-se utilizar a via intradérmica.



### GABARITO

01	A	B	C	D	E
02	A	B	C	D	E
03	A	B	C	D	E
04	A	B	C	D	E
05	A	B	C	D	E
06	ANULADO				
07	A	B	C	D	E
08	A	B	C	D	E
09	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E

13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E
17	A	B	C	D	E
18	A	B	C	D	E
19	A	B	C	D	E
20	A	B	C	D	E
21	A	B	C	D	E
22	A	B	C	D	E
23	A	B	C	D	E
24	A	B	C	D	E
25	A	B	C	D	E
26	A	B	C	D	E
27	A	B	C	D	E
28	A	B	C	D	E
29	A	B	C	D	E

\_\_\_\_\_  
Diretor de Ensino

30	A	B	C	D	E
31	A	B	C	D	E
32	A	B	C	D	E
33	A	B	C	D	E
34	A	B	C	D	E
35	A	B	C	D	E
36	A	B	C	D	E
37	A	B	C	D	E
38	A	B	C	D	E
39	A	B	C	D	E
40	A	B	C	D	E
41	A	B	C	D	E
42	A	B	C	D	E
43	A	B	C	D	E
44	A	B	C	D	E
45	A	B	C	D	E
46	A	B	C	D	E
47	A	B	C	D	E
48	A	B	C	D	E
49	A	B	C	D	E
50	A	B	C	D	E