

**PROVA DE CONHECIMENTOS  
ESPECÍFICOS**

**ENFERMAGEM**

**QUESTÃO ÚNICA**

10,000 pontos distribuídos em 40 itens

41. O debate acerca das mudanças necessárias na gestão e organização do trabalho em saúde tem sido crescente entre os gestores da área. Um dos métodos de trabalho adotado por enfermeiros gestores é o Planejamento Estratégico Situacional (PES). O PES se configura no processamento de problemas atuais, problemas potenciais e macroproblemas. Os momentos que compõem e se interrelacionam nessa estratégia são:

- (A) estratégico, situacional, tático-operacional e técnico-operacional.
- (B) explicativo, normativo, estratégico e tático-operacional.
- (C) estratégico, normativo, técnico-operacional e tático-operacional.
- (D) explicativo, situacional, normativo e estratégico.
- (E) situacional, estratégico, normativo e técnico-operacional.

42. Dos princípios e diretrizes que norteiam o Sistema Único de Saúde, qual ocorre diretamente através dos Conselhos de Saúde, nas três esferas de governo?

- (A) Integralidade.
- (B) Universalidade.
- (C) Equidade.
- (D) Participação comunitária.
- (E) Regionalização.

43. Identifique, nas opções abaixo, os critérios utilizados pela enfermagem para a alta de pacientes no período pós-operatório de cirurgias ambulatoriais:

- I. o paciente deverá apresentar sinais vitais estáveis por, pelo menos 3 horas.
- II. o paciente deverá conseguir ficar de pé sem tonturas e náuseas.
- III. o paciente deverá estar confortável e sem dor ou sangramento excessivo.
- IV. o paciente deverá apresentar capacidade de ingerir líquido e urinar.
- V. o paciente deverá estar orientado no tempo e no espaço, mas podendo ser liberado com um grau leve de alteração no estado mental.

Das afirmativas acima estão corretas.

- (A) II e IV.
- (B) I, II e IV.
- (C) II, III e IV.
- (D) II, IV e V.
- (E) III, IV e V.

44. Associe a segunda coluna de acordo com a primeira e, a seguir, assinale a alternativa com a sequência correta, considerando as responsabilidades gerais de cada esfera de governo na gestão do SUS, estabelecidas no Pacto de Gestão.

**ESFERA**

**RESPONSABILIDADE**

- |   |     |   |
|---|-----|---|
| 1. Responsabilidade do município.                 | ( ) | Responder solidariamente pela integralidade da atenção à saúde da população.                                |
| 2. Responsabilidade do estado.                    |     |   |
| 3. Responsabilidade da União                      |     |   |
| 4. Responsabilidade do município, estado e União. | ( ) | Garantir a integralidade das ações de saúde prestadas no seu território, com abordagem integral e contínua. |
| 5. Responsabilidade do estado e da União.         | ( ) | Prestar cooperação técnica e financeira as unidades subnacionais.   |
|   | ( ) | Coordenar o processo de configuração do desenho da rede de atenção à saúde nas relações intermunicipais.    |
|   | ( ) | Participar do financiamento tripartite do SUS.  |

- (A) 1 – 5 – 4 – 2 – 3
- (B) 2 – 1 – 4 – 5 – 3
- (C) 3 – 5 – 4 – 2 – 1
- (D) 5 – 1 – 3 – 2 – 4
- (E) 4 – 2 – 3 – 1 – 5

45. Considerando o trabalho e a qualidade em serviços de saúde na contemporaneidade, analise as afirmativas abaixo, colocando entre parênteses a letra “V”, quando se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra “F”, quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
- ( ) Os serviços se definem, essencialmente, por sua utilidade imediata.  
( ) A qualidade dos serviços de saúde está assegurada pelo uso de tecnologias de ponta e pela oferta de serviços mais especializados.  
( ) A decomposição do trabalho em saúde em tarefas parciais facilita a prestação do cuidado e assegura sua qualidade.  
( ) A dinâmica efetiva das equipes de saúde e a integração dos processos de trabalho asseguram a qualidade dos serviços produzidos.  
( ) A rígida hierarquização do trabalho em enfermagem conduz a perda de responsabilidade intelectual pelos atos produzidos comprometendo a qualidade dos serviços.
- (A) F – V – V – F – V  
(B) V – V – F – V – F  
(C) V – F – F – V – V  
(D) F – F – V – F – V  
(E) F – V – V – V – F
46. Em se tratando das doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo relacionado ao trabalho é correto afirmar que:
- (A) a carga de trabalho é determinada, principalmente, pelos aspectos físicos do trabalho.  
(B) a organização temporal da atividade é considerada importante na caracterização da exposição.  
(C) não é pressuposto para o estabelecimento do plano terapêutico do portador de LER/DORT o diagnóstico precoce.  
(D) toda atividade profissional é orientada para a execução de uma produção dentro de um contexto material, independente da definição de tempo.  
(E) o retorno ao trabalho por parte do portador de LER/DORT depende, indiretamente, das possibilidades que tem ou teve para extrair dessa experiência elementos positivos.
47. Um desafio para a organização do processo de trabalho em enfermagem é o trabalho em equipe. Nossa história traduz-se em uma posição hierarquizada e rígida entre as trabalhadoras em enfermagem. Para avançar na constituição de uma equipe de enfermagem/saúde é necessário:
- I. construir um trabalho em equipe-interação, onde os agentes desenvolvem ações por meio da interação de práticas e de saberes.  
II. manter o modelo de organização da equipe agrupamento, em que os agentes e saberes estão em um mesmo serviço, mas não constroem processos coletivos de cuidar.  
III. considerar a subjetividade e a produção do trabalhador no trabalho.  
IV. buscar a harmonia entre as (os) trabalhadoras(es), neutralizando suas diferenças.  
V. controlar os processos conflitivos para que não se tornem visíveis, garantindo colocar o trabalho na direção de sua finalidade.
- (A) Somente I e III estão corretas.  
(B) Somente II e IV estão corretas.  
(C) Somente II e V estão corretas.  
(D) Somente III e IV estão corretas.  
(E) Somente IV e V estão corretas.
48. Sobre a História da Enfermagem, assinale a alternativa correta.
- (A) As estudantes das primeiras escolas de enfermagem tinham que ter entre 25 e 35 anos.  
(B) Na década de 70 começou a haver um interesse na promoção à saúde e na prevenção da doença.  
(C) Nas primeiras escolas de enfermagem as estudantes podiam cuidar de enfermarias de ambos os sexos.  
(D) No século XX os enfermeiros graduados trabalhavam como empregados particulares, prestando assistência nos hospitais.  
(E) A filosofia das escolas de Florence Nightingale tinha um único princípio: treinamento de enfermeiras era tão importante quanto qualquer outra forma de ensino, assim como ser mantido pelo dinheiro privado.

49. A Reformulação do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, aprovada pela Resolução do COFEN nº 311/2007, prevê na totalidade a composição da equipe de Enfermagem que deverá possuir além de enfermeiros:
- (A) auxiliares de enfermagem e técnicos de enfermagem.
  - (B) parteiras e técnicos de enfermagem.
  - (C) técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras.
  - (D) auxiliares de enfermagem, atendentes de enfermagem e parteiras.
  - (E) auxiliares de enfermagem e atendentes de enfermagem.
50. De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, é proibido a qualquer profissional de enfermagem:
- (A) prestar serviços que por sua natureza competem a outro profissional, mesmo em caso de emergência.
  - (B) provocar, cooperar, ser conivente ou omissivo com qualquer forma de violência.
  - (C) provocar aborto, ou cooperar em prática destinada a interromper a gestação, inclusive nos casos previstos em Lei.
  - (D) prescrever medicamentos, exceto em situações de emergência.
  - (E) delegar suas atividades privativas a outros profissionais da equipe de saúde, excetuando os demais membros da equipe de enfermagem.
51. Em relação à administração de medicamento por injeção intramuscular, assinale a alternativa correta.
- (A) O volume máximo a ser aplicado é de 4 ml.
  - (B) Os sítios: vasto lateral, ventroglúteo, dorsoglúteo e deltoide são locais recomendados para aplicação.
  - (C) O músculo Deltoide é facilmente acessível e não apresenta potencial para lesão de nervos ou vasos sanguíneos.
  - (D) Os ângulos de inserção da agulha, em relação à pele, deve ser 45°, para garantir que o medicamento alcance o músculo.
  - (E) Na aplicação no sítio ventroglúteo deve ser utilizado baixo volume e atentar para não lesar as inervações que são encontradas no local.
52. Analise as afirmativas abaixo sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), atividade privativa da(o) enfermeira(o), colocando entre parêntesis a letra “V”, quando se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra “F”, quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
- ( ) É a maneira sistemática e dinâmica de prestar cuidado de enfermagem, promovendo cuidado humanizado, orientado a resultados e de baixo custo.
  - ( ) A SAE estimula as(os) enfermeiras(os) a analisar constantemente as suas ações e a analisarem como poderiam fazê-lo melhor.
  - ( ) A SAE é essencial para que a(o) enfermeira(o) possa gerenciar e desenvolver uma assistência de enfermagem organizada, segura, dinâmica e competente.
  - ( ) A SAE possui cinco etapas distintas, porém inter-relacionadas, que são: investigação, diagnóstico, planejamento, execução e avaliação.
  - ( ) A utilização do processo de enfermagem traz apenas benefícios tais como: redução da incidência e tempo das internações hospitalares; redução de custos; eliminação de erros.
- (A) F – F – V – F – F
  - (B) F – V – F – V – V
  - (C) V – V – F – F – V
  - (D) V – F – V – F – V
  - (E) V – V – V – V – F
53. São sinais e sintomas de déficit de líquido isotônico:
- (A) anorexia, náuseas e vômitos.
  - (B) olhos encovados, edema pulmonar e confusão mental.
  - (C) fadiga, apatia e torpor.
  - (D) espasmos musculares, pressão venosa elevada e oligúria.
  - (E) sede, aumento do débito cardíaco e convulsões.

54. Analise as afirmativas abaixo sobre demência, colocando entre parênteses a letra “V”, quando se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra “F”, quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
- ( ) São causas reversíveis de demência: neurológica, nutricionais e metabólicas.
  - ( ) A Demência Vasculare pode ter como etiologia as angiopatias hereditárias, a vasculite e o uso abusivo de medicamentos psicotrópicos.
  - ( ) O treinamento cognitivo e de reabilitação da memória passa pela identificação dos déficits funcionais gerais e a intervenção é feita por meio de estratégias limitadas e já instituídas pelos centros de referência.
  - ( ) O tratamento não farmacológico das Demências envolve o desenvolvimento de atividades de estimulação cognitiva, realizadas primordialmente pela equipe de saúde especializada e em menor proporção pela família.
- (A) F – F – V – V  
(B) V – F – V – V  
(C) V – V – F – F  
(D) F – V – V – F  
(E) V – F – F – F
55. Na abordagem ao portador de queimaduras é correto afirmar que:
- (A) a filtração glomerular poderá estar aumentada na lesão extensa.
  - (B) a reação fisiológica a uma queimadura é semelhante ao processo inflamatório.
  - (C) todo tecido inviável deve ser removido, primordialmente, por desbridamento mecânico.
  - (D) diminuição de volume sanguíneo circulante acarreta aumento do débito cardíaco inicialmente e elevação da frequência do pulso.
  - (E) fazem parte da avaliação do enfermeiro ao paciente queimado: análise contínua do estado hemodinâmico e respiratório e posicionamento para aumentar o retorno venoso.
56. Tratando-se de cuidados de enfermagem perioperatórios, assinale a alternativa correta.
- (A) Não são necessários os cuidados monitorizados da anestesia, quando nos referimos aos reflexos, por estes estarem deprimidos.
  - (B) O risco de complicação referente à lesão de nervos periféricos se dá por conta da hipotermia.
  - (C) Nas raqui-anestésias os agentes usados são procaína, tetracaína, lidocaína e bupivacaína.
  - (D) Na indução anestésica é menos importante ajudar com dispositivos de monitorização.
  - (E) Na sala de recuperação pós-anestésica a ação primordial é fazer o paciente acordar e respirar espontaneamente.
57. Em relação à organização da assistência domiciliar para pessoa idosa, assinale a alternativa correta.
- (A) A equipe saúde da família deve estar organizada para acolher a demanda que é espontânea.
  - (B) A identificação da pessoa idosa para inclusão na assistência domiciliar pode advir de visitas do agente comunitário de saúde.
  - (C) A caderneta de saúde da pessoa idosa é um instrumento pouco valioso para identificação da necessidade de assistência domiciliar.
  - (D) A equipe da atenção básica deixa de acompanhar a pessoa idosa, quando esta passa a ser atendida em outro nível de complexidade do sistema.
  - (E) A definição da necessidade de assistência domiciliar para o idoso pela atenção básica, parte essencialmente do grau da perda de funcionalidade.
58. Baseado na Portaria MS 2.616/98, que regulamenta as ações de controle de infecção hospitalar no país, em substituição a Portaria MS 930/92, e considerando o Programa de Controle de Infecção Hospitalar, assinale a alternativa correta.
- (A) O diagnóstico das infecções hospitalares deve valorizar informações oriundas de biópsia e endoscopia.
  - (B) Os membros da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) só podem exercer atividades de ordem consultiva.
  - (C) A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) deverá ser composta por profissionais da área de saúde, de nível médio e superior, formalmente designados.
  - (D) A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) não tem autonomia para escolher o método de Vigilância Epidemiológica mais adequado às características do hospital, à estrutura de pessoal e à natureza do risco da assistência.
  - (E) À Coordenação de Controle de Infecção Hospitalar do Ministério da Saúde, compete: constituir formalmente a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) e nomear os componentes da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), por meio de ato próprio.
59. Quanto aos critérios de elegibilidade de pacientes para trombólise cerebral, assinale a alternativa correta.
- (A) Idade inferior a 18 anos.
  - (B) Hemorragia interna ativa.
  - (C) A glicemia capilar deve ser <50 ou > 400 mg/dL.
  - (D) Tomografia de crânio com ausência de anormalidades.
  - (E) É critério de inclusão o tempo de início dos sintomas em 190 minutos.

60. Assinale a classificação correta da Síndrome Clínica do Choque:
- (A) anafilático, distributivo, neurológico e farmacológico.
  - (B) hipovolêmico, cardiogênico, neurológico e mecânico.
  - (C) anafilático, neurológico, cardiogênico e mecânico.
  - (D) hipovolêmico, cardiogênico, obstrutivo e distributivo.
  - (E) hipovolêmico, cardiogênico, farmacológico e neurológico.
61. A avaliação primária e a avaliação secundária fazem parte da abordagem básica da enfermeira nos cuidados de emergência. Assinale a alternativa que descreve ações da avaliação secundária.
- (A) Verificar frequência e padrão respiratório.
  - (B) Avaliar o nível de consciência e as pupilas.
  - (C) Verificar a qualidade do pulso (fraco, forte, lento, rápido).
  - (D) Obter o conjunto completo de sinais vitais (pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiração e temperatura).
  - (E) Verificar a existência de obstrução nas vias aéreas tais como próteses dentárias, objetos estranhos, sangramento, vômitos e outras secreções.
62. A história e desenvolvimento das Unidades de Tratamento Intensivo estão fortemente atrelados ao progresso das técnicas de suporte ventilatório. Em relação a ventilação mecânica é correto afirmar que:
- (A) a adoção do termo PEEP está associado ao uso de respiração com pressão negativa.
  - (B) a adoção do termo CPAP está associado ao uso de pressão intermitente e positiva em vias aéreas.
  - (C) o modo ventilatório assistido-controlado é adotado como prioritário no desmame ventilatório mecânico.
  - (D) a ventilação por pressão controlada garante uma pressão e um volume pré-selecionados a cada ciclo respiratório.
  - (E) o barotrauma, a fadiga dos músculos respiratórios e a dissincronia paciente-ventilador podem ser complicações associadas à ventilação mecânica.
63. Os fármacos que mais comumente são considerados os principais agentes iatrogênicos em idosos são:
- (A) broncodilatador, antibióticos e anti-inflamatórios.
  - (B) analgésicos, cardiotônicos e anti-inflamatórios.
  - (C) anticoagulantes, antibióticos e analgésicos.
  - (D) anti-inflamatórios, antibióticos e anticoagulantes.
  - (E) broncodilatador, anticoagulantes e analgésicos.
64. Analise as afirmativas abaixo sobre cuidados paliativos em enfermagem aos pacientes terminais, colocando entre parêntesis a letra “V”, quando se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra “F”, quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
- ( ) As(os) enfermeiras(os) têm papel importante nos cuidados paliativos. São responsáveis pelo provimento de informações, aconselhamento e educação dos pacientes e familiares.
  - ( ) As(os) enfermeiras(os) são responsáveis principalmente pela manutenção do elo entre o domicílio e o hospital.
  - ( ) Uma vez que a decisão sobre o tratamento paliativo tenha sido tomada, a transição entre o tratamento curativo e o paliativo deve ocorrer rapidamente.
  - ( ) As escolhas sobre os cuidados paliativos referem-se exclusivamente sobre o controle de sintomas (medicações e outras intervenções específicas).
  - ( ) O local do cuidado e da morte (casa, hospital ou outro lugar) é de competência da equipe hospitalar.
- (A) V – F – V – F – F
  - (B) F – V – V – F – F
  - (C) F – V – F – V – V
  - (D) V – V – F – F – F
  - (E) V – F – F – V – V
65. Em relação ao aleitamento materno é correto afirmar que:
- (A) a classificação do leite materno se divide em: aleitamento materno exclusivo, predominante materno, complementado e misto ou parcial.
  - (B) a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde recomendam o aleitamento materno exclusivo por seis meses e complementado até 1 (um) ano ou mais.
  - (C) os hormônios envolvidos na lactogênese - fase I são o estrogênio, responsável pela formação dos lóbulos e o progesterônio, responsável pela ramificação dos ductos lactíferos.
  - (D) em geral, um bebê em aleitamento materno exclusivo mama de 12 a 20 vezes ao dia.
  - (E) no ingurgitamento mamário, há três componentes básicos: (1) congestão/aumento da vascularização da mama; (2) retenção de leite nos alvéolos; e (3) edema decorrente da congestão e obstrução da drenagem do sistema linfático.

66. A manobra de Leopold, realizada em gestantes, informa sobre:
- (A) maturidade, tamanho e localização.
  - (B) comprimento, localização e posição.
  - (C) posição, maturidade e situação do feto.
  - (D) situação do feto, localização e tamanho.
  - (E) situação do feto, apresentação e posição.
67. São fatores que contribuem para a diminuição da surfactante em recém-nascidos:
- (A) hipertensão e diabetes.
  - (B) parto cesariano eletivo e hipertensão.
  - (C) hipóxia e diabetes.
  - (D) hipovolemia e hipertensão.
  - (E) hipóxia e hipervolemia.
68. Entre as principais causas de mortalidade de jovens e adolescentes em nosso país, as que demonstram mais claramente a situação de vulnerabilidade social desse grupo populacional são:
- (A) homicídios e aborto.
  - (B) acidentes de trânsito e desnutrição.
  - (C) uso abusivo de drogas e acidentes.
  - (D) homicídios e envolvimento com drogas ilícitas.
  - (E) doenças sexualmente transmissíveis e violência doméstica.
69. Identifique os objetivos prioritários das atividades de educação em saúde voltadas para grupos de adolescentes, analise as afirmativas abaixo e, a seguir, assinale a alternativa correta.
- I. Triar jovens que estejam em situação de vulnerabilidade e encaminhá-los para atendimento especializado.
  - II. Desenvolver a capacidade de ouvir, de falar e de comunicar-se.
  - III. Desenvolver ações a partir das necessidades identificadas pelos próprios adolescentes e pelos indicadores epidemiológicos.
  - IV. Realizar imunizações de acordo com o calendário vacinal.
  - V. Desenvolver vínculos que favoreçam um diálogo aberto sobre questões de saúde e outros interesses.
- (A) Somente I, II e IV estão corretas.
  - (B) Somente I, III e IV estão corretas.
  - (C) Somente I, III e V estão corretas.
  - (D) Somente II, III e V estão corretas.
  - (E) Somente II, IV e V estão corretas.
70. Considere o que dispõe a Agenda de Compromissos para a Saúde Integral da Criança e Redução da mortalidade infantil, analise as afirmativas abaixo e, a seguir, assinale a alternativa correta.
- I. O recém-nascido de mãe soropositivo deve receber quimioprofilaxia imediatamente após o nascimento e durante as cinco primeiras semanas de vida (35 dias).
  - II. No nascimento, o Cartão da Criança deve ser preenchido pela maternidade e entregue à família, preferencialmente, orientando sobre a importância da "Primeira Semana Saúde Integral" na Unidade Básica de Saúde.
  - III. Considerando-se as principais causas de morbidade e mortalidade infantil no país, uma linha de cuidado que deve ser priorizada nas ações de saúde dirigidas à atenção à criança é a abordagem das doenças respiratórias e digestivas.
  - IV. No cuidado pré-natal é protocolo a realização da sorologia IgM para rubeola em todas as gestantes.
  - V. São fatores de risco ao nascer: peso < 2500g, recém-nascidos de mães com instrução escolar inferior a 04 (quatro) anos e recém-nascidos de mães com idade inferior a 18 (dezoito) anos.
- (A) Somente II está correta.
  - (B) Somente III está correta.
  - (C) Somente V está correta.
  - (D) Somente I e II estão corretas.
  - (E) Somente III e IV estão corretas.
71. Em relação ao atendimento numa emergência psiquiátrica, pode-se afirmar que:
- (A) deve-se evitar aproximação física com o paciente.
  - (B) a meta imediata é obter o controle da situação.
  - (C) as contenções devem ser imediatamente colocadas.
  - (D) o paciente deve ficar sozinho em alguns momentos para não se sentir vigiado.
  - (E) deve-se evitar dizer seu nome ao paciente ou qualquer verdade, se implicar algo que o desagrade.
72. Considerando as alterações vinculadas à Saúde Mental, assinale a alternativa correta.
- (A) Anedonia é um sintoma comum nas situações de transtorno depressivo maior e distúrbio distímico.
  - (B) São três os subtipos da Esquizofrenia: paranoide, desorganizada e catatônica.
  - (C) Ecolalia refere-se ao processo de alteração da percepção, caracterizada por repetição patológica das palavras de outra pessoa.
  - (D) São sintomas do distúrbio do pânico: despersonalização, sudorese e torpor emocional.
  - (E) O Delírio é causado por distúrbios fisiopatológicos.

73. Para Campos (2008), a origem das atuais características que hoje representam sérios desafios para o cumprimento dos preceitos constitucionais brasileiros de 1988 quanto à saúde, está relacionada a:
- (A) criação das Caixas de Aposentadorias e Pensões.
  - (B) criação do Instituto Nacional de Seguridade Social.
  - (C) criação do Sistema Único de Saúde.
  - (D) extinção do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social.
  - (E) extinção do Instituto Nacional de Seguridade Social.
74. Sobre cardioversão elétrica é correto afirmar que:
- (A) a realização requer uso de equipamento específico e a ativação do dispositivo de sincronismo.
  - (B) o protocolo da cardioversão elétrica recomenda que o paciente, após o procedimento, realize ecocardiograma.
  - (C) o paciente que será submetido ao procedimento deve ser mantido em uso de oxigênio durante todas as etapas da sua realização.
  - (D) é a terapia de escolha para o tratamento de taquiarritmias com instabilidade hemodinâmica como, por exemplo, a fibrilação ventricular.
  - (E) as pás (eletrodos) devem ser colocadas, uma na região apical, na linha hemiclavicular e a outra, à esquerda do esterno, no segundo espaço intercostal.
75. Em relação à susceptibilidade e imunidade à meningite, pode-se afirmar que:
- (A) o grupo de menores de 5 anos são os mais vulneráveis.
  - (B) os neonatos apresentam riscos significativos de adquirirem meningite.
  - (C) o grupo entre 5 a 12 anos são os mais susceptíveis a meningite meningocócica.
  - (D) a susceptibilidade é geral, mas os grupos que apresentam maiores riscos são as crianças e os adolescentes.
  - (E) idosos e indivíduos portadores de doenças crônicas ou imunossupressoras apresentam risco elevado de adoecimento pela meningite tuberculosa.
76. Considerando o Protocolo de Vigilância Epidemiológica de Eventos Adversos Pós-Vacinação do Ministério da Saúde – vacinação contra o Vírus Influenza Pandêmico (H1N1), analise as afirmativas abaixo, colocando entre parênteses a letra “V”, quando se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra “F”, quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
- ( ) São dois os instrumentos de vigilância dos Efeitos Adversos Pós-Vacinação (EAPV): Ficha própria de notificação/investigação e Relatório Periódico de Farmacovigilância.
  - ( ) São considerados Efeitos Adversos Pós-Vacinação (EAPV) graves: Síndrome de Guillain-Barré e Anafilaxia.
  - ( ) Em caso da suspeita de evento adverso temporalmente associado à vacina Influenza Pandêmico (H1N1), a gestante deverá ser avaliada e ser encaminhada diretamente para um serviço especializado de atendimento às gestantes.
  - ( ) Os EAPV mais frequentes detectados consistem em reações locais, vermelhidão e/ou dor no local de aplicação da vacina.
- (A) V – V – F – F
  - (B) F – V – V – F
  - (C) F – F – V – V
  - (D) V – F – F – V
  - (E) F – V – F – V
77. Em relação ao tratamento medicamento da hipertensão arterial consta no Manual de Hipertensão e Diabetes Mellitus do Ministério da Saúde, dentre outros medicamentos, hidroclorotiazida, propranolol e captopril. É correto afirmar que essas drogas correspondem, respectivamente às seguintes classes de anti-hipertensivos:
- (A) diurético de alça, IECA e betabloqueador.
  - (B) diurético de ação rápida, IECA e betabloqueador.
  - (C) diurético de ação ultra rápida, betabloqueador e IECA.
  - (D) diurético, inibidor adrenérgico e inibidor da enzima de conversão de angiotensina.
  - (E) diurético de ação rápida, inibidor alfa-adrenérgico e inibidor da enzima de conversão de angiotensina.

78. São atribuições específicas da enfermeira na atenção básica/estratégia saúde da família:

- I. diagnosticar e tratar precocemente os agravos/doenças, conforme orientações dos manuais e protocolos do Ministério da Saúde.
- II. realizar assistência domiciliar quando necessário, realizar consulta de enfermagem e solicitar exames complementares.
- III. prescrever medicações, conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor municipal.
- IV. planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS e orientar os auxiliares/técnicos de enfermagem, ACS (Agente Comunitário de Saúde) e ACE (Agente de Controle de Endemias).
- V. propor e executar atividades de educação permanente para os membros da equipe quanto à prevenção, manejo do tratamento, ações de vigilância epidemiológica e controle das doenças.

Das afirmativas acima estão corretas.

- (A) II e IV.
- (B) II e V.
- (C) I, II e III.
- (D) I, IV e V.
- (E) II, III e IV.

79. A Lei 7.498/86 e o Decreto 94.406/87, que regulamenta o exercício de Enfermagem, dispõem uma relação de atividades privativas do enfermeiro, dentre as quais se incluem:

- (A) consulta, prescrição, evolução de Enfermagem.
- (B) consulta, prescrição e observação de Enfermagem.
- (C) cuidados diretos a paciente graves com e sem risco de morte.
- (D) consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de Enfermagem e de Saúde.
- (E) cuidados de Enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões mediatas.

80. Sobre a forma clínica da tuberculose, analise as afirmativas abaixo e, a seguir, assinale a alternativa correta.

- I. Qualquer órgão pode ser atingido pela tuberculose. Frequentemente são atingidos pulmões, gânglios linfáticos, pleura, laringe, rins, cérebro e ossos.
- II. Dentre as condições que debilitam o sistema imunitário e que podem contribuir para o adoecimento pela tuberculose estão: infecção pelo HIV; diabetes; tratamento prolongado com corticosteroides; terapia imunossupressora; doenças renais crônicas e desnutrição proteico-calórica.
- III. O Exame Bacteriológico Direto do Escarro é o método fundamental para o diagnóstico. Esse exame, quando executado corretamente, permite detectar de 70 a 80% dos casos de tuberculose pulmonar.
- IV. A tuberculose não é uma doença grave. É curável em praticamente 100% dos casos, desde que os princípios da quimioterapia sejam seguidos.
- V. A busca de casos deve ser feita apenas entre os contatos de casos de tuberculose.

- (A) Somente I e IV estão corretas.
- (B) Somente I, II e III estão corretas.
- (C) Somente I, II e V estão corretas.
- (D) Somente II, III e IV estão corretas.
- (E) Somente II, IV e V estão corretas.

FINAL DA PROVA