

# **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS**

**ESTADO DO PARANÁ**

**CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL - 15/05/2010 - TARDE - EDITAL 26/2010**

## **CARGO: ENFERMEIRO**

**Nº DE INSCRIÇÃO \_\_\_\_\_**

**Prezado Candidato, leia atentamente as instruções a seguir:**

- 1. Coloque o seu número de inscrição na capa da prova;*
- 2. Assine o cartão resposta no verso;*
- 3. A prova terá 3 (três) horas de duração;*
- 4. O candidato somente poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início da prova;*
- 5. Use caneta esferográfica azul ou preta;*
- 6. Cada questão possui somente uma resposta correta;*
- 7. Você poderá responder no caderno de prova, utilizando-o como rascunho se necessário, mas, deverá assinalar no cartão resposta que acompanha o mesmo;*
- 8. Não serão permitidas consultas de espécie alguma durante a aplicação da prova;*
- 9. A prova conterà trinta questões de múltipla escolha, avaliadas na escala de 00 a 100;*
- 10. A resposta assinalada no cartão resposta não poderá apresentar dúvidas e/ou rasuras, nesse caso será anulada a questão;*
- 11. Ao terminar a prova, o candidato entregará obrigatoriamente ao fiscal de sala todo o material recebido, exceto o folheto fornecido aos candidatos que desejarem anotar suas respostas;*
- 12. Tenha calma para não prejudicar seu desempenho.*

**Boa Prova!**

Acho que foi o Hemingway quem disse que olhava cada coisa à sua volta como se a visse pela última vez. Pela última ou pela primeira vez? Pela primeira vez foi outro escrito quem disse. Essa idéia de olhar pela última vez tem algo de deprimente. Olha de despedida, de quem não crê que a vida continua, não admira que o Hemingway tenha acabado como acabou. Fugiu enquanto pôde do \_\_\_\_\_ que o roía – e daquele tiro brutal.

Se eu morrer, morre comigo um certo modo de ver, disse o poeta. Um poeta é só isto: um certo modo de ver. O diabo é que, de tanto ver, a gente \_\_\_\_\_ o olhar. Vê não-vendo. Experimente ver pela primeira vez o que você vê todo dia, sem ver. Parece fácil, mão não é. O que nos cerca, o que nos é familiar, já não desperta \_\_\_\_\_. O campo visual da nossa rotina é como um vazio.

Você sai todo dia, por exemplo, pela mesma porta. Se alguém lhe perguntar o que é que você vê no seu caminho, você não sabe. De tanto ver, você não vê. Sei de um profissional que passou 32 anos a fio pelo mesmo *hall* do prédio do seu escritório. Lá estava sempre, pontualíssimo, o mesmo porteiro. Dava-lhe bom-dia e às vezes lhe passava um recado ou uma correspondência. Um dia o porteiro cometeu a descortesia de falecer.

Como era ele? Sua cara? Sua voz? Como se vestia? Não fazia a mínima idéia. Em 32 anos, nunca o viu. Para ser notado, o porteiro teve que morrer. Se um dia no seu lugar estive uma girafa, cumprindo o rito, pode ser também que ninguém desse por sua ausência. O hábito suja os olhos e lhes baixa a voltagem. Mas há sempre o que ver. Gente, coisas, bicho. E vemos? Não, não vemos.

Uma criança vê o que o adulto não vê. Tem olhos atentos e para o espetáculo do mundo. O poeta é capaz de ver pela primeira vez o que, de fato, ninguém vê. Há pai que nunca viu o próprio filho. Marido que nunca viu a própria mulher, isso existe às pampas. Nossos olhos são opacos, se gastam no dia-a-dia. É por aí que se instala no coração o monstro da indiferença.

Jornal *Folha de S. Paulo*, 23 fev. 1992.

**01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto:**

- a) dezespero – banalisa – curiosidadã.
- b) dizespero – banaliza – curiosidade.
- c) desespero – banaliza – curiosidade.
- d) dizespero – banalisa – curiosidadã.

**02 - Analise as afirmações quanto à acentuação gráfica e assinale a alternativa incorreta:**

- a) As paroxítonas “*prédio*”, “*escritório*” e “*ausência*” são acentuadas porque são terminadas em ditongo.
- b) As palavras “*roía*”, “*idéia*” e “*ai*” obedecem à mesma regra de acentuação.
- c) As palavras “*última*”, “*hábito*” e “*espetáculo*” são acentuadas porque são proparoxítonas.
- d) Os monossílabos tônicos “*lá*”, e “*só*” são acentuados porque terminam em a, e o.

**03 - Analise as afirmações:**

**I – Notado tem como sinônimo – reparado, conhecido.**

**II – Cumprimento e Comprimento são palavras parônimas.**

**III – Em “*Tem olhos atentos e lípidos*” e “*Nossos olhos são opacos...*” (5º parágrafo) os termos sublinhados são antônimos.**

**Assinale a alternativa em que as afirmações estejam corretas:**

- a) apenas I e II.
- b) apenas I e III.
- c) apenas II e III.
- d) I, II e III.

04 - Em “– Mas há sempre o que ver...” (4º parágrafo) O termo sublinhado é um fator de coesão que determina uma relação de sentido de:

- a) oposição.
- b) explicação.
- c) adição.
- d) causa.

05 - Analise as afirmativas quanto ao gênero dos substantivos e assinale a incorreta:

- a) Os substantivos “criança” e “gente” são sobrecomuns – um só gênero para masculino e feminino.
- b) O substantivo “poeta” é comum de dois gêneros – o poeta = a poeta.
- c) “Girafa” é um substantivo epiceno. Girafa macho – girafa fêmea.
- d) Os substantivos “pai” e “marido” formam o feminino com radical diferente do masculino – mãe / esposa.

06 - Atente para as afirmações:

I – O autor do texto compartilha com a opinião de Hemingway sobre a maneira de olhar as coisas.


II – Para o autor o poeta tem um modo todo peculiar de ver o mundo. Consegue captar muita coisa da vida rotineira que passa despercebida para a grande maioria das pessoas.

III – Segundo o autor é difícil ver as coisas que estão ao nosso redor como se fosse pela primeira vez porque no campo visual nossa rotina não existe.

Assinale a alternativa em que as afirmações relacionadas ao texto estão corretas:

- a) apenas I e II.
- b) apenas I e III.
- c) apenas II e III.
- d) I, II e III.

07 - Um fio foi esticado do topo de um prédio até a base de outro, conforme indica a figura abaixo. O valor mais próximo da medida do comprimento do fio é de:



- a) 34,5 cm
- b) 35,05 cm
- c) 36,05 cm
- d) Nenhuma das alternativas anteriores


08 - Um senhor tem um terreno retangular cujo perímetro é de 104 m. Se diminuirmos do comprimento o triplo da largura sobram 4 m. Quais são as dimensões do terreno que ele tem?

- a) 12 m e 40 m
- b) 18 m e 34 m
- c) 16 m e 36 m
- d) Nenhuma das alternativas anteriores

09 - Determine dois números inteiros negativos que sejam consecutivos e cuja soma dos quadrados seja 365.

- a) -13 e -14
- b) -15 e 16
- c) -17 e -18
- d) Nenhuma das alternativas anteriores

10 - No triângulo abaixo estão indicadas as medidas de um ângulo e de um cateto. Utilizando a relação tangente, calcule o valor de x.



- a) 1,5

- b) 3
- c) 4,5
- d) Nenhuma das alternativas anteriores

**11 - O atual Presidente da Assembléia Legislativa do Paraná é:**

- a) Hermas Brandão
- b) Nelson Justus
- c) Nelson Garcia
- d) Nenhuma das alternativas anteriores

**12 - São símbolos do Município de Arapongas:**

- a) Bandeira do Município, Brasão do Município e Hino Municipal
- b) Bandeira do Município, Hino Estadual e Brasão do Município
- c) Brasão do Município, Bandeira do Município e Escudo do Município
- d) Nenhuma das alternativas anteriores

**13 - O descobrimento do Brasil foi fruto da investida de povos vindo de qual País?**

- a) Espanha
- b) Alemanha
- c) Itália
- d) Nenhuma das alternativas anteriores

**14 - As cores da Bandeira do Município de Arapongas são:**

- a) azul, amarela e com pombinhas brancas
- b) verde, amarela e com pombinhas brancas
- c) marrom, amarela e com pombinhas brancas
- d) nenhuma das alternativas anteriores

**15 - Assinale cada afirmativa com V (verdadeira) ou F (Falsa):**

( ) O bloco da atenção básica um dos cinco blocos de financiamento que, a partir da definição do Pacto pela Saúde, passaram a compor os recursos federais destinados ao custeio de ações e serviços da Saúde. É formado por dois componentes: o Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) e o Piso da Atenção Básica Variável (PAB Variável).

( ) As conferências nacionais são construídas de maneira descentralizada, iniciando-se nas conferências municipais de saúde. As conferências nacionais de saúde devem ocorrer a cada cinco anos, com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de Saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.

( ) Os conselhos de gestão participativa são criados por lei municipal ou por ato do executivo e devem ter composição tripartite (50% de representantes de usuários, 25% de representantes dos trabalhadores da unidade e 25% de representantes da direção da respectiva unidade). Devem reunir-se regularmente (pelo menos a cada dois meses) e extraordinariamente, quando convocado por seu presidente ou coordenador(a) ou por, no mínimo, 1/3 (um terço) de seus membros, devendo ser suas reuniões públicas e abertas.

( ) Conselhos e conferências são garantidos nas três esferas de gestão do SUS pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.

( ) Os municípios recebem os recursos do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde (TFVS), sendo que na programação pactuada integrada de vigilância em Saúde (PPI-VS) são pactuadas as ações relativas à prevenção e ao controle da dengue a serem executadas. Os insumos destinados ao controle do mosquito são repassados pelo gestor municipal (Secretário de Saúde), conforme acordado na Política de Gestão de Insumos Estratégicos.

( ) O SUS, pressupõe doutrinas e princípio a serem seguidos, universalidade, equidade, Integralidade e regionalização e hierarquização, resolubilidade, descentralização, participação dos cidadãos e complementariedade do setor privado.

Assinale a alternativa que representa a seqüência correta, de cima pra baixo:

- a) V- F- V- V- F- V.
- b) F- V- F- V- F- F.
- c) V- V- F- F- V- V.
- d) Nenhuma das alternativas anteriores.

**16 - Segundo o artigo 200 da Constituição Federal, compete ao SUS:**

- 1 - Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos.
- 2 - Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
- 3 - Incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico.

**4 - Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano.**

**5 - Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.**

**Assinale a alternativa correta:**

- a) 1- 2- 3- 4 apenas.
- b) 1- 2- 3 apenas.
- c) 1- 2- 3- 4- 5 apenas.
- d) nenhuma das alternativas anteriores.

**17 - Nos últimos anos, principalmente após o início da epidemia de AIDS, as DST readquiriram importância como problemas de saúde pública. Entretanto, alguns fatos negativos têm sido percebidos no contexto da atenção às DST em nosso País. Assinale V se for (verdadeiro) ou F (Falso) para as seguintes afirmativas:**

**( ) São escassos os dados epidemiológicos relativos às DST; apenas a AIDS e a sífilis congênita são de notificação compulsória. Entretanto, raros são os serviços onde a notificação é realizada de forma sistemática.**

**( ) Os portadores de DST continuam sendo discriminados nos vários níveis do sistema de saúde. O atendimento é muitas vezes inadequado, resultando em segregação e exposição a situações de constrangimento. Tal se dá, por exemplo, quando os pacientes têm que expor seus problemas em locais sem privacidade ou a funcionários despreparados que, muitas vezes, demonstram seus próprios preconceitos ao emitirem juízos de valor. Essas situações ferem a confidencialidade, discriminam as pessoas com DST e contribuem para afastá-las dos serviços de saúde.**

**( ) A regularidade na disponibilização de medicamentos específicos é mais uma das causas de afastamento dos indivíduos com DST dos serviços de saúde. Isso ocorre por provisão insuficiente ou pelo uso para tratamento de outras enfermidades.**

**( ) Para muitas das DST, as técnicas laboratoriais existentes não apresentam a sensibilidade e/ ou a especificidade satisfatórias. Nenhuma das unidades são capazes de oferecer resultados de testes conclusivos no momento da consulta.**

**( ) São quatro os critérios para a priorização de agravos em saúde pública: magnitude, transcendência, vulnerabilidade e factibilidade.**

**Assinale a alternativa que representa a seqüência correta, de cima para baixo:**

- a) V- F- V- V- F.
- b) V- V- F- V- V.
- c) V- V- V- F- V.
- d) Nenhuma das alternativas anteriores.

**18 - Na medida que, no processo de aconselhamento, a “demanda” do paciente, entendida como suas necessidades, dúvidas, preocupações, medos, angústias, etc., relacionadas ao seu problema de saúde, é identificada e acolhida, torna-se possível o desenvolvimento de uma relação de confiança e a promoção de apoio emocional. Dessa forma, o nível de estresse do paciente é reduzido, propiciando as condições para o alcance dos seguintes objetivos EXCETO:**

- a) Trocar informações sobre DST, HIV e aids, suas formas de transmissão, prevenção e tratamento.
- b) Realizar avaliação de riscos, permitindo a compreensão/consciência a respeito dos riscos pessoais de infecção para a DST atual e para o HIV.
- c) Identificar os limites e as possibilidades existentes para a adoção de medidas preventivas, estimulando o cuidado de si e dos parceiros
- d) Promover a adesão ao tratamento apenas dos pacientes com risco de passarem de soropositivos para HIV à pacientes de AIDS.

**19 - Sobre o Calendário Básico de Vacinação da Criança é CORRETO afirmar:**

**1 - A primeira dose da vacina contra a hepatite B deve ser administrada na maternidade, nas primeiras 12 horas de vida do recém-nascido. O esquema básico se constitui de 03 (três) doses, com intervalos de 30 dias da primeira para a segunda dose e 180 dias da primeira para a terceira dose.**

**2 - O esquema de vacinação atual é feito aos 2, 4 e 6 meses de idade com a vacina Tetravalente e dois reforços com a Tríplice Bacteriana (DTP). O primeiro reforço aos 15 meses e o segundo entre 4 e 6 anos.**

**3 - É possível administrar a primeira dose da Vacina Oral de Rotavírus Humano a partir de 1 mês e 15 dias a 3 meses e 7 dias de idade (6 a 14 semanas de vida).**

**4 - É possível administrar a segunda dose da Vacina Oral de Rotavírus Humano a partir de 3 meses e 7 dias a 5 meses e 15 dias de idade (14 a 24 semanas de vida). O intervalo mínimo preconizado entre a primeira e a segunda dose é de 4 semanas.**

**5 - A vacina contra febre amarela está indicada para crianças a partir dos 09 meses de idade, que residam ou que irão viajar para área endêmica (estados: AP, TO, MA MT, MS, RO, AC, RR, AM, PA, GO e DF), área de transição (alguns municípios dos estados: PI, BA, MG, SP, PR, SC e RS) e área de risco potencial (alguns**

**municípios dos estados BA, ES e MG). Se viajar para áreas de risco, vacinar contra Febre Amarela 15 (quinze) dias antes da viagem.**

**Assinale a alternativa correta:**

- a) Somente as afirmativas 1, 2, 3 e 5 estão corretas.
- b) Somente as afirmativas 2 e 5 estão corretas.
- c) Somente as afirmativas 2, 3, 4 e 5 estão corretas.
- d) Nenhuma das alternativas anteriores.

**20 - Em relação aos Calendários de Vacinação do Adolescente e Vacinação do Adulto e do Idoso é INCORRETO afirmar:**

**1 - A partir dos 20 (vinte) anos, gestante, não gestante, homens e idosos que não tiverem comprovação de vacinação anterior, seguir o esquema de primeira dose de 11 a 19 anos, segunda dose 2 meses após a primeira, terceira dose 4 meses após a primeira e posteriormente cada 10 anos. Apresentando documentação com esquema incompleto, completar o esquema já iniciado.**

**2 - Adulto/idoso que resida ou que for viajar para área endêmica (estados: AP, TO, MA, MT, MS, RO, AC, RR, AM, PA, GO e DF), área de transição (alguns municípios dos estados: PI, BA, MG, SP, PR, SC e RS) e área de risco potencial (alguns municípios dos estados BA, ES e MG). Em viagem para essas áreas, vacinar 20 (vinte) dias antes da viagem.**

**3 - A vacina tríplice viral - SCR (Sarampo, Caxumba e Rubéola) deve ser administrada em mulheres de 12 a 49 anos que não tiverem comprovação de vacinação anterior e em homens até 39 (trinta e nove) anos.**

**4 - Mulher grávida que esteja com a vacina (dT) em dia, mas recebeu sua última dose há mais de 05 (cinco) anos, precisa receber uma dose de reforço. A dose deve ser aplicada no mínimo 20 dias antes da data provável do parto. Em caso de ferimentos graves, a dose de reforço deverá ser antecipada para cinco anos após a última dose.**

**5 - A vacina contra pneumococo é aplicada durante a Campanha Nacional de Vacinação do Idoso nos indivíduos que convivem em instituições fechadas, tais como casas geriátricas, hospitais, asilos e casas de repouso, com apenas um reforço cinco anos após a dose inicial.**

**6 - Adolescente grávida, que esteja com a vacina dupla tipo adulto (dT) em dia, mas recebeu sua última dose há mais de 5 (cinco) anos, não precisa receber uma dose de reforço. A dose deve ser aplicada no mínimo 20 dias antes da data provável do parto.**

**Assinale a alternativa correta, de cima para baixo:**

- a) Somente as afirmativas 1, 3, 5 e 6 estão corretas.
- b) Somente as afirmativas 2 e 6 estão corretas.
- c) Somente as afirmativas 1, 3, 4 e 5 estão corretas.
- d) Nenhuma das alternativas anteriores.

**21 - A cirurgia de Tireóidectomia é conceituada como a exereses da glândula tireóide. Sobre a assistência de enfermagem pré operatória é correto afirmar EXCETO:**

- a) Após a recuperação pós anestésica, manter o leito em semi-fowler, para favorecer a drenagem, regredir o edema e reduzir a dor.
- b) Estimular expirações profundas.
- c) Enteroclise na noite de véspera da cirurgia.
- d) Realizar tricotomia cervical anterior e facial, quando houver pêlos e verificar sinais vitais.

**22 - Sobre as fórmulas a serem utilizadas no preparo das doses medicamentosas é condição prioritária para que o paciente receba a dosagem certa e se produza o efeito desejado e volumes de soluções no tempo estimado, prevenindo danos. Sobre o exposto, assinale cada afirmativa com V (verdadeiro) ou F (falso):**

**( ) Precisa-se administrar 1,5mg da droga X, e está disponível um frasco contendo a mesma droga na concentração de 2mg/ml. Neste caso, a técnica deverá aspirar 0,75ml da droga cuja proporção é 2mg/ml.**

**( ) Um adulto recebeu 0,50g de um determinado medicamento, uma criança receberá 0,03g.**

**( ) A fórmula de cálculo para crianças de até 1 ano, a partir da dose de adulto é IDADE DA CRIANÇA x DOSE = DOSE CRIANÇA. 150 ADULTO**

**( ) Foi prescrito 500ml de solução fisiológica para correr em 6 horas. Com equipo macro gotas 27,7 (ou 28 gotas/min) e com o equipo micro gotas 83,3 mgt/min.**

**Assinale a alternativa que representa a seqüência correta, de cima para baixo:**

- a) V- F- V- V- F.
- b) V- V- F- V-V.
- c) V- V- V- V- V.
- d) Nenhuma das alternativas anteriores.

**23 - Em relação ao TRM (Traumatismo Raquimedular), considere as seguintes afirmativas. São manifestações clínicas: perda da consciência, dor local aguda, perda das funções motoras, sensitivas e vesical:**

**1 - O cuidado imediato com suspeita de lesão medular é imobilização cervical com colar cervical apropriado, não movimentar o pescoço e coluna vertebral alinhada na horizontal.**

**2 - Após ser examinado, retirar o colete cervical sem movimentos bruscos e curvaturas e passar o paciente da maca para o leito.**

**3 - Verificar sinais vitais de 15/15 minutos, presença de lesões pelo corpo e punção arterial de grosso calibre.**

**4 - Uma transeção completa da medula, torna o paciente paralisado a baixo do nível da lesão.**

**Assinale a alternativa correta:**

- a) Somente as afirmativas 1, 2 e 5 estão corretas.
- b) Somente as afirmativas 2 e 5 estão corretas.
- c) Somente as afirmativas 3 e 4 estão corretas.
- d) Nenhuma das alternativas anteriores.

**24 - O processo de assistir em enfermagem na saúde da mulher consiste das seguintes fases:**

- a) Interação entre cliente e o enfermeiro, ações educativas e avaliação das metas terapêuticas.
- b) Diagnóstico de enfermagem, avaliação e ações de intervenções.
- c) Análise das condições de saúde da cliente, avaliação dos serviços de saúde e tomada de decisões.
- d) Avaliação da cliente e análise da intervenção de enfermagem.

**25 - A ação hipoglicemiante da insulina é diferenciada de acordo com cada tipo de insulina. Sobre os tipos de insulina relacione:**

**(1) Insulina simples (cristalina- normal- regular).**

**(2) NPH (zinco + protamina).**

**(3) Insulina Protamina cinco (PZI ou IPZ).**

**( ) Ação rápida (30 minutos) e duração de 6 a 8 horas.Sua ação é regulada no tecido subcutâneo para corrente sanguínea.**

**( ) Indicada no tratamento e manutenção do diabetes. Ação regular ou intermediária (2 a 4 horas e duração de 16 a 24 horas).**

**( ) Indicada quando o uso da NPH fica sem atividade hipoglicemiante a noite. Ação ultra lenta (seis a oito horas e duração de 24 a 30 horas ).**

**Assinale a seqüência correta de cima para baixo:**

- a) 1- 3- 2
- b) 2- 1- 3
- c) 1- 2- 3
- d) nenhuma das alternativas anteriores

**26 - O esquema de vacinação antitetânica, segundo Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, recomenda:**

**1 - A vacinação antitetânica da gestante deverá ser feita no 3º, no 6º e 8º mês de gestação.**

**2 - A gestante que não sabe informar passado vacinal ou não é vacinada deve receber esquema completo de 3 doses.**

**3 - Gestante com vacinação completa, sendo que a última dose foi feita há mais de cinco anos, aplicar uma dose reforço, tão logo seja possível.**

**4 - Gestante atendida em fase avançada de gestação, o intervalo entre as doses poderá ser diminuído para o mínimo de 4 semanas e completar o esquema no puerpério.**

**Assinale a alternativa que representa a seqüência correta, de cima para baixo:**

- a) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 estão corretas.
- b) Somente a afirmativas 2, 3 e 4 estão corretas.
- c) Somente a afirmativas 1 e 2 estão corretas.
- d) Todas as afirmativas estão corretas.

**27 - Em relação a verificação da presença de edema e verificado no tornozelo, na perna, na região sacral pressionando-se com o polegar por alguns segundos, logo após passa-se o dedo para verificar se apareceu depressão no local. A intensidade dessa depressão marca-se em cruces da seguinte maneira:**

a) (-) ausência de edema, (+) edema de tornozelo, (++) edema de membros inferiores (pernas), (+++) edema generalizada (face, tronco e membros), ou que já se manifesta pela manhã, quando a gestante acorda.

b) ( 0 ) ausência de edema, (++) edema de tornozelo, (+++) edema de membros inferiores (pernas), (++++) edema generalizada (face, tronco e membros), ou que já se manifesta pela manhã, quando a gestante acorda.

c) ( 0 ) ausência de edema, (-) edema de tornozelo, (+) edema de membros inferiores (pernas), (++) edema generalizada (face, tronco e membros), ou que já se manifesta pela manhã, quando a gestante acorda.

d) (-) ausência de edema, (+) edema de tornozelo, (++) edema de membros inferiores (pernas), (++++) edema generalizada (face, tronco e membros), ou que já se manifesta pela manhã, quando a gestante acorda.

**28 - Os (TCE) Traumatismos Crânio Encefálicos estão incluídos entre as mais freqüentes e mais graves alterações neurológicas decorrentes de acidentes de trânsito, de quedas acidentais domésticas ou no trabalho. Sobre o TCE é INCORRETO afirmar:**

- a) O mais importante a se considerar em TCE é a lesão local ou não do encéfalo.
- b) As manifestações clínicas, além daquelas da lesão local, dependem da intensidade e da distribuição da lesão cerebral.
- c) Deitar o paciente em superfície rígida, tendo cuidado de não realizar movimentos bruscos é um cuidado necessário.
- d) Todo paciente com TCE, mesmo que se apresente aparentemente bem, deverá ser observado rigorosamente por vários dias se esteve em coma.

**29 - A Enfermagem Brasileira, face às transformações sócio-culturais, científicas e legais, entendeu ter chegado o momento de reformular o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE). Frente ao exposto é CORRETO afirmar:**

- 1) No Art. 42 - Assinar as ações de Enfermagem que não executou, bem como permitir que suas ações sejam assinadas por outro profissional é permitido, desde que seja devidamente justificado pela administração do hospital ou outro tipo de unidade de saúde.
- 2) Aceitar cargo, função ou emprego vago em decorrência de fatos que envolvam recusa ou demissão de cargo, função ou emprego motivado pela necessidade do profissional em cumprir o presente código e a legislação do exercício profissional não é permitido.
- 3) O segredo profissional referente ao menor de idade deverá ser mantido, mesmo quando a revelação seja solicitada por pais ou responsáveis, desde que o menor tenha capacidade de discernimento, exceto nos casos em que possa acarretar danos ou riscos ao mesmo.
- 4) No Art. 31 Prescrever medicamentos e praticar ato cirúrgico, exceto nos casos previstos na legislação vigente e em situação de emergência é proibido.

**Assinale a alternativa correta:**

- a) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 estão corretas
- b) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 estão corretas
- c) Somente as afirmativas 1 e 2 estão corretas
- d) Nenhuma das alternativas anteriores

**30 - Sobre assistência de enfermagem em cirurgias específicas, coloque V (verdadeiro) e F (falso):**

Na Assistência de Enfermagem no pré operatório de cirurgia de histerectomia, realizar tricotomia da região abdominal, pubiana, perianal e sinais vitais.

A Tração e a aplicação de uma forma externa é contínua sobre um segmento corporal diminuindo a dor, restaurar o comprimento de membros, reduzir luxações e corrigir deformidades e atua como complementação cirúrgica.

Tração transesqueléticas refere-se sobre (força aplicada sobre os ossos) a tração cutânea (força aplicada sobre a pele e ossos).

Assistência de enfermagem no pós operatório imediato pela enfermagem na toracotomia (abertura da caixa torácica) é recomendada mudanças de decúbito apenas cada 12 horas e estimular a deambulação após 24 horas.

Na assistência de enfermagem pós operatória em cirurgia de craniotomia, manter o leito em Fowler, lateralizando a cabeça do paciente e mudanças de decúbito de 2/2 horas.

**Assinale a alternativa que representa a seqüência correta, de cima pra baixo:**

- a) V-F-F-V-F
- b) V-V-F-F-V
- c) F-V-F-V-F
- d) Nenhuma das alternativas anteriores