

MARINHA DO BRASIL
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA

***(PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO CORPO
DE SAÚDE DA MARINHA / PS-CSM/2006)***

ENFERMAGEM

- 1) Coloque F(falso) ou V(verdadeiro) nas afirmativas abaixo em relação ao leite materno/aleitamento, e assinale, a seguir, a opção correta.
- () A liberação de prolactina durante a produção de leite induz a contração uterina.
 - () Amamentar no período imediato pós-parto promove a diminuição do sangramento uterino neste período.
 - () O colostro, secreção produzida pela glândula mamária, possui alto teor de cálcio e fibras.
 - () Devido a presença de lactoferrina, há uma diminuição da absorção de ferro e do risco de infecção gastrointestinal.
 - () A gordura acumulada durante a gestação tem finalidade de fornecer reservas calóricas durante o período de amamentação.
- (A) (F) (F) (V) (F) (V)
(B) (V) (F) (V) (V) (F)
(C) (F) (V) (F) (V) (F)
(D) (F) (V) (F) (F) (V)
(E) (V) (V) (F) (V) (F)
- 2) O paciente cardiopata com angina refratária apresenta
- (A) dor torácica aos esforços, aliviada pelo repouso.
 - (B) dor torácica grave e intratável.
 - (C) dor torácica aos esforços, aliviada com analgésico.
 - (D) ausência de sintomas.
 - (E) dor torácica ao inspirar.
- 3) Nas cefaléias, após punção lombar, são procedimentos recomendados para o tratamento:
- (A) elevar a cabeceira e reduzir a hidratação.
 - (B) utilizar analgésicos e elevar a cabeceira.
 - (C) repousar no leito e hidratar.
 - (D) deambular precocemente e utilizar analgésicos.
 - (E) manter o paciente sentado e hidratar.
- 4) Segundo BRUNNER, a análise da gasometria arterial, cujo resultado é: pH 7,20, PaCO₂ 40mmHg e HCO₃⁻ 15mEq/l, sugere
- (A) acidose respiratória.
 - (B) alcalose respiratória.
 - (C) acidose metabólica.
 - (D) alcalose metabólica.
 - (E) alcalose mista.

Prova : Verde
Profissão : ENFERMAGEM

Concurso : PS-CSM

- 5) A Doença de Parkinson, distúrbio neurológico degenerativo, apresenta três sinais cardeais. São eles:
- (A) tremor, flacidez muscular e taquicinesia.
 - (B) mioclonia, fraqueza muscular e acinesia.
 - (C) tremor, rigidez muscular e bradicinesia.
 - (D) convulsões, miastenia grave e catatonia.
 - (E) movimentos involuntários anormais, euforia e convulsões.
- 6) A vacina que é composta por bactéria viva atenuada é utilizada contra
- (A) a poliomielite.
 - (B) a febre amarela.
 - (C) a tuberculose.
 - (D) a caxumba.
 - (E) o sarampo.
- 7) Segundo BRUNNER, em relação a biópsia do linfonodo sentinela nas cirurgias oncológicas de mama, é correto afirmar que, se o linfonodo é negativo,
- (A) não é necessário o esvaziamento axilar.
 - (B) não se faz necessária a mastectomia.
 - (C) a quimioterapia deve ser evitada.
 - (D) é necessário fazer o esvaziamento axilar.
 - (E) é indicado o tratamento local e esvaziamento axilar radical.
- 8) À síndrome clínica, rapidamente progressiva, de etiologia desconhecida, envolvendo os nervos cranianos espinhais e periféricos, dá-se o nome de
- (A) esclerose múltipla.
 - (B) doença de Huntington.
 - (C) miastenia grave.
 - (D) epilepsia.
 - (E) Guillain-Barré.
- 9) Nos casos de intoxicação por monóxido de carbono, o objetivo principal do atendimento de emergência é
- (A) melhorar a circulação sanguínea.
 - (B) diminuir a eliminação do monóxido de carbono.
 - (C) acelerar a formação de carboxihemoglobina.
 - (D) reverter a hipóxia cerebral e miocárdica.
 - (E) evitar a palidez cutâneo mucosa e a cefaléia.

Prova : Verde
Profissão : ENFERMAGEM

Concurso : PS-CSM

- 10) Que tipo de reposição hídrica deve ser evitada, no choque hemorrágico, por interferência com a agregação plaquetária?
- (A) Cloreto de sódio à 0,9%.
 - (B) Ringer lactato.
 - (C) Soro fisiológico hipertônico.
 - (D) Soro glicosado 5%.
 - (E) Dextran.
- 11) Qual o exame que representa um estudo radiológico do útero e trompas após a injeção de um contraste radiológico?
- (A) Histeroscopia.
 - (B) Salpingoscopia.
 - (C) Histerossalpingografia.
 - (D) Ultrasonografia.
 - (E) Laparoscopia.
- 12) O sangramento após biópsia renal pode ocorrer vários dias após o procedimento. Com a finalidade de diminuir este risco, o paciente deve ser orientado a
- (A) fazer inspeção visual da urina e medir a diurese.
 - (B) evitar bebidas cafeinadas ou gaseificadas.
 - (C) aplicar compressas mornas no local por 72 horas.
 - (D) levantar-se e caminhar precocemente.
 - (E) evitar esportes por no mínimo duas semanas.
- 13) Na elaboração das Rotinas de Enfermagem, padronizam-se os procedimentos aplicando-se a Teoria da Administração com ênfase na
- (A) estrutura organizacional.
 - (B) tarefa.
 - (C) pessoa.
 - (D) empresa.
 - (E) tecnologia.
- 14) Segundo BRUNNER, no pós-operatório de artroplastia total de quadril, um cuidado de enfermagem importante é manter o quadril afetado em
- (A) adução.
 - (B) pronação.
 - (C) supinação.
 - (D) abdução.
 - (E) oposição.

Prova : Verde
Profissão : ENFERMAGEM

Concurso : PS-CSM

- 15) Correlacione as etapas do Processo de Enfermagem às suas respectivas atividades, assinalando, a seguir a opção correta.

ETAPAS	ATIVIDADES
I - Diagnóstico	() Identificação dos problemas de saúde do paciente.
II - Planejamento	() Criação de metas.
III- Avaliação	() Elaboração do plano de cuidados.
	() Determinação da extensão dos resultados alcançados.

- (A) (I) (II) (II) (III)
- (B) (I) (I) (II) (III)
- (C) (II) (II) (I) (III)
- (D) (I) (II) (III) (II)
- (E) (III) (II) (I) (II)

- 16) Segundo BRUNNER, um ciclo na diálise peritoneal, corresponde a:

- (A) infusão, aspensão e retenção do dializado.
- (B) difusão, retenção e aspensão do dialisado.
- (C) infusão, retenção e drenagem do dialisado.
- (D) difusão, aspensão e drenagem do dialisado.
- (E) retenção, difusão e drenagem do dialisado.

- 17) Assinale a opção INCORRETA.

Para ser realizado o dimensionamento do pessoal de enfermagem, o enfermeiro deve fundamentar-se no parâmetro

- (A) da caracterização da filosofia da instituição.
- (B) analítico do preparo técnico específico dos elementos da equipe.
- (C) analítico das horas de trabalho semanal.
- (D) das atividades desenvolvidas nos turnos de trabalho.
- (E) do absenteísmo anual dos elementos da equipe.

Prova : Verde
Profissão : ENFERMAGEM

Concurso : PS-CSM

18) Coloque F(falso) ou V(verdadeiro) nas afirmativas abaixo em relação à assistência de enfermagem ao paciente cardiopata e assinale, a seguir, a opção correta.

- () O infarto agudo do miocárdio pode apresentar como complicações: tromboembolismo e ruptura de ventrículo esquerdo.
- () A taquicardia ventricular deve ser considerada como uma arritmia potencialmente letal pois pode converter-se abruptamente em fibrilação ventricular.
- () Taquicardia juncional pode ser uma das manifestações de intoxicação digitálica.
- () O registro da atividade elétrica cardíaca por meio de monitorização telemétrica só poderá ser realizado com o paciente internado em unidade intensiva.
- () O deslocamento da ponta do catéter-eletrodo, do marca-passo transvenoso temporário, nunca está relacionado à mudança de decúbito do paciente.

- (A) (V) (V) (F) (F) (V)
- (B) (F) (V) (F) (V) (F)
- (C) (F) (F) (V) (F) (V)
- (D) (V) (F) (V) (V) (F)
- (E) (V) (V) (V) (F) (F)

19) Segundo CHIAVENATO, liderança é a capacidade de influenciar as pessoas a fazerem aquilo que devem fazer. Neste contexto, um supervisor de enfermagem que é atuante, consultivo e orientador dos subordinados, exerce o estilo de liderança

- (A) democrática.
- (B) autocrática.
- (C) autoritária.
- (D) centrada na tarefa.
- (E) liberal.

20) A relação lecitina/esfingomielina é determinada para avaliar qual tipo de desenvolvimento do feto?

- (A) Neurológico.
- (B) Digestivo.
- (C) Cardiológico.
- (D) Pulmonar.
- (E) Urinário.

Prova : Verde
Profissão : ENFERMAGEM

Concurso : PS-CSM

- 21) Segundo BRUNNER, como é denominada uma fratura que ocorra na ausência de trauma ou queda, que seja acometida na região óssea afetada por um tumor?
- (A) Impactada.
 - (B) Patológica.
 - (C) Cominutiva.
 - (D) Simples.
 - (E) Avulsão.
- 22) Assinale a opção que apresenta uma das vantagens em utilizar hemofiltração venovenosa contínua, e não hemofiltração arteriovenosa contínua, na insuficiência renal aguda, segundo BRUNNER.
- (A) Baixo custo.
 - (B) O sistema pode ser estabelecido pela enfermeira da UTI.
 - (C) Ultrafiltração mais rápida e contínua.
 - (D) Facilitar o clearance mais rápido da uréia.
 - (E) Dispensar o uso da bomba sanguínea para bombear o sangue.
- 23) Ao eleger o acesso venoso periférico para terapia endovenosa é INCORRETO afirmar que
- (A) devem ser evitadas as veias das pernas por causa do alto risco de tromboembolia.
 - (B) o local mais distal é geralmente utilizado em primeiro lugar.
 - (C) as características do medicamento a ser infundido e a idade do paciente não influem na seleção do acesso.
 - (D) o braço do mesmo lado da mastectomia é evitado devido ao comprometimento do fluxo linfático.
 - (E) a veia que será puncionada deverá estar firme elástica, ingurgitada e arredondada.
- 24) Um paciente com 22 anos de idade foi recebido na emergência, em coma, com constrição pupilar e depressão respiratória. Essa tríade sugere superdosagem de
- (A) opióide.
 - (B) álcool.
 - (C) cocaína.
 - (D) maconha.
 - (E) barbitúrico.

Prova : Verde
Profissão : ENFERMAGEM

Concurso : PS-CSM

- 25) Segundo o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), qual das opções abaixo apresenta o resíduo de Serviço de Saúde classificado como pertencente ao grupo A?
- (A) Desinfetante.
 - (B) Descarte de vacinas de microrganismos vivos ou atenuados.
 - (C) Resíduo contaminado com radionuclídeos.
 - (D) Anti-neoplásico.
 - (E) Material pérfuro-cortante.
- 26) São deveres do enfermeiro no exercício profissional, exceto:
- (A) Exercer sua atividade com zelo e probidade.
 - (B) Manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento.
 - (C) Respeitar o natural pudor e a intimidade do cliente.
 - (D) Assumir seu papel na determinação de padrões. Desejáveis de ensino.
 - (E) Receber de laboratório ou estabelecimento congêneres remuneração que não corresponda a serviço prestado.
- 27) Como é denominado o sinal precoce de gravidez, caracterizado pelo aspecto púrpura ou azul escuro da mucosa vulvar e vaginal, resultado do grande aumento da vascularidade?
- (A) Hegar.
 - (B) Lamaze.
 - (C) Chadwick.
 - (D) Goodell.
 - (E) Braxton-Hicks.
- 28) A protusão herniária de um cisto, em forma de saco, das meninges repleto de líquido espinhal é denominada
- (A) hidrocele.
 - (B) meningocele.
 - (C) mielomeningocele.
 - (D) meningoencefalite.
 - (E) exancefaloccele.
- 29) Um paciente, no pós-operatório imediato de laparotomia exploradora, apresenta palidez, pele fria e úmida, taquipnéia, cianose dos lábios, pulso rápido e fino, hipotensão arterial e oligúria. Estes são sinais clássicos de
- (A) hipoglicemia.
 - (B) choque.
 - (C) hipocalemia.
 - (D) infecção.
 - (E) insuficiência renal.

Prova : Verde
Profissão : ENFERMAGEM

Concurso : PS-CSM

- 30) Na reposição volêmica, o uso da solução de ringer lactato deve ser evitado em caso de
- (A) queimaduras e diarreia.
 - (B) perda sangüínea aguda.
 - (C) hipocalemia e perda hídrica.
 - (D) diarreia e hipovolemia.
 - (E) acidose láctica e insuficiência renal.
- 31) A enfermagem utiliza vários princípios das Teorias da Administração no desempenho de suas tarefas, dentre eles a competência técnica. A teoria da burocracia, na qual se identificam características da organização formal voltada exclusivamente para a racionalidade e para a eficiência, tem, como seu fundador,
- (A) Max Weber.
 - (B) Henri Fayol.
 - (C) Frederick Taylor.
 - (D) Henri Ford.
 - (E) Herbert Simon.
- 32) Utilizando-se a Regra de Naegele, qual a data provável do parto para uma gestante cuja data da última menstruação foi 02 de junho de 2005?
- (A) 6 de março de 2006.
 - (B) 7 de março de 2006.
 - (C) 8 de março de 2006.
 - (D) 9 de março de 2006.
 - (E) 10 de março de 2006.
- 33) Mantido sob temperatura adequada e adotados os cuidados que previnam sua contaminação, o frasco de multidoses da vacina tríplice (DPT), após abertura, terá validade até
- (A) 4 horas.
 - (B) 6 horas.
 - (C) 24 horas.
 - (D) 5 dias úteis.
 - (E) o término das doses.
- 34) Segundo WONG, para prevenir ou minimizar o medo e a angústia da criança durante a hospitalização, recomenda-se:
- (A) mantê-la contida e levemente sedada até que se acalme.
 - (B) limitar as visitas, para que se acostume com a equipe de saúde.
 - (C) incentivar a permanência dos pais e participação nos cuidados.
 - (D) utilizar o serviço de psicologia para modificar hábitos já existentes.
 - (E) evitar atividades recreativas ou proibi-las.

Prova : Verde
Profissão : ENFERMAGEM

Concurso : PS-CSM

- 35) São sinais de intoxicação apresentados por um usuário de cocaína:
- (A) taquicardia, midríase e hipertensão.
 - (B) midríase, hipotensão e vômitos.
 - (C) miose, hipertensão e calafrios.
 - (D) calafrios, miose e hipertermia.
 - (E) hipertermia, hipotensão e alucinações visuais.
- 36) Assinale opção que indica a ação de enfermagem correta para o paciente com drenagem torácica.
- (A) Durante o transporte, o sistema de drenagem deverá estar pinçado e mantido sobre o tórax do paciente.
 - (B) Encorajar o paciente a respirar profundamente e a tossir em intervalos freqüentes.
 - (C) Orientar o paciente para evitar a mobilização no leito
 - (D) Preencher o frasco do selo d'água com, no máximo, 2cm de água esterilizada.
 - (E) Orientar o paciente a expirar profundamente durante a retirada do dreno.
- 37) Analise as afirmativas abaixo quanto a reposição de potássio.
- I - Administrado por via oral, pode causar distensão abdominal, dor ou sangramento intestinal.
 - II - Sua administração deve ser por via intramuscular profunda.
 - III- Quando a solução é preparada para administração por via intravenosa periférica deve ser infundida lentamente, evitando a irritação da veia.
 - IV - Sua concentração sérica pode ser elevada a níveis perigosos, se o paciente apresentar oligúria.

Assinale a opção correta

- (A) Apenas as afirmativas II e IV são verdadeiras.
- (B) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.
- (C) Apenas a afirmativa III é verdadeira.
- (D) Apenas a afirmativa IV é verdadeira.
- (E) Apenas as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.

Prova : Verde
Profissão : ENFERMAGEM

Concurso : PS-CSM

- 38) Quando uma criança, entre 2 e 8 anos de idade, apresenta um quadro de ganho ponderal evolutivo, edema generalizado, irritabilidade, diminuição do débito urinário sem hematúria macroscópica, com palidez, fadiga e exames laboratoriais que acusam proteinúria maciça e hipoalbuminemia, qual o provável diagnóstico?
- (A) Glomerulonefrite aguda.
 (B) Tumor de Wilms.
 (C) Uropatia obstrutiva.
 (D) Síndrome nefrótica.
 (E) Síndrome hemolítico urêmica.
- 39) A toxemia gravídica, doença da última metade da gestação, é caracterizada por
- (A) hipotensão, edema e proteinúria.
 (B) hipertensão, edema e glicosúria.
 (C) hipotensão, proteinúria e glicosúria.
 (D) hipertensão, edema e proteinúria.
 (E) hipotensão, edema e glicosúria.
- 40) Segundo WONG, com quantos meses de vida, espera-se o fechamento das fontanelas em crianças com o desenvolvimento normal?
- (A) seis.
 (B) doze.
 (C) dezoito.
 (D) vinte e quatro.
 (E) trinta.
- 41) Correlacione a idade da criança com os surgimentos dos respectivos marcos do desenvolvimento psicomotor e, em seguida, assinale a opção que apresenta a seqüência correta.
- | IDADE | MARCOS DE DESENVOLVIMENTO |
|------------------|--|
| I - 1 ano e meio | () sobe escadas segurando com uma das mãos. |
| II - 2 anos | () pula sobre um pé só. |
| III - 3 anos | () pula sobre pés alternados. |
| IV - 4 anos | () anda sozinho. |
| V - 5 anos | () fica momentaneamente sobre um só pé. |
- (A) (I) (III) (II) (V) (IV)
 (B) (II) (V) (I) (III) (IV)
 (C) (I) (V) (IV) (II) (III)
 (D) (III) (IV) (I) (V) (II)
 (E) (II) (IV) (V) (I) (III)

Prova : Verde
 Profissão : ENFERMAGEM

Concurso : PS-CSM

- 42) Qual exame avalia a extensão e identifica com precisão o sítio da obstrução da lesão aterosclerótica coronariana?
- (A) Arteriografia coronariana.
 - (B) Eletrocardiografia.
 - (C) Radiografia de tórax.
 - (D) Eletrocardiografia com Holter.
 - (E) Ecocardiografia.
- 43) Segundo TAMES, entende-se como exsangüíneo transfusão:
- (A) a transfusão sanguínea com trocas totais ou parciais da volemia do recém-nato.
 - (B) a incompatibilidade sanguínea (ABO ou RH), entre a mãe e o filho.
 - (C) o processo pelo qual retira-se o plasma sanguíneo, mantendo-se a massa eritrocitária fetal.
 - (D) a autotransfusão de hemoderivados para reposição de perdas volêmicas do recém-nato.
 - (E) a transfusão de sangue que é realizada antes de proceder o clampeamento do cordão umbilical.
- 44) Segundo KAPLAN, a pessoa que exhibe um padrão vitalício de retraimento social, introversão, afeto brando, constricto, e é vista pelo outro como excêntrica, isolada ou solitária, pode apresentar transtorno de personalidade do tipo
- (A) histriônica.
 - (B) esquizóide.
 - (C) borderline.
 - (D) anti-social.
 - (E) narcisista.
- 45) Segundo EDWAL, os indicadores biológicos são tiras de papel filtro, impregnadas com carga bacteriana, e representam o mais confiável nível de teste que pode ser utilizado no controle do processo de esterilização. De acordo com esta afirmação, assinale a opção que corresponde à carga bacteriana utilizada nos indicadores biológicos para autoclaves a vapor sob pressão
- (A) 10^3 de Bacillus subtilis.
 - (B) 10^4 de Bacillus subtilis.
 - (C) 10^4 de Bacillus stearothermophilus.
 - (D) 10^6 de Bacillus stearothermophilus.
 - (E) 10^6 de Bacillus subtilis.

Prova : Verde
Profissão : ENFERMAGEM

Concurso : PS-CSM

- 46) Qual a posição mais indicada para manter o paciente quando há suspeita de aspiração brônquica durante a administração de alimentação enteral?
- (A) Sentado.
 - (B) Fowler.
 - (C) Semi-fowler.
 - (D) Decúbito lateral direito e cabeceira baixa.
 - (E) Decúbito dorsal e pés elevados.
- 47) Assinale a opção correta em relação ao ácido peracético, em baixas concentrações, e seu uso no processamento de artigos odonto-médico-hospitalares.
- (A) Possui atividade rápida sobre os microorganismos.
 - (B) Não tem atividade esporicida.
 - (C) Não corroe metais e látex.
 - (D) Sua decomposição gera um produto tóxico.
 - (E) Sua eficácia depende de associação às altas temperaturas.
- 48) A Pressão Intracraniana (PIC) é uma Síndrome que afeta muitos pacientes com condições neurológicas agudas. Assinale a complicação da PIC aumentada.
- (A) Insônia progressiva.
 - (B) Hipoglicemia.
 - (C) Infarto do miocárdio.
 - (D) Diabetes insípido.
 - (E) Hiperperfusão cerebral.
- 49) Qual a finalidade do uso do sulfato de protamina depois que o paciente é desconectado da máquina de circulação extracorpórea?
- (A) Diminuir o débito cardíaco.
 - (B) Promover hemoconcentração.
 - (C) Evitar resposta inflamatória.
 - (D) Reverter os efeitos da heparina.
 - (E) Potencializar os efeitos da dopamina.
- 50) Na criança, a classificação da desidratação, quanto ao tipo, leva em consideração os seguintes parâmetros:
- (A) déficit líquido e dosagem de sódio.
 - (B) presença de diarreia e vômito.
 - (C) nível de elasticidade da pele e mucosa.
 - (D) nível de potássio extracelular e volume.
 - (E) déficit de sódio e número de evacuações.

Prova : Verde
Profissão : ENFERMAGEM

Concurso : PS-CSM