

MARINHA DO BRASIL
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA

***(PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO CORPO
DE SAÚDE DA MARINHA / PS-CSM/2009)***

**NÃO ESTÁ AUTORIZADA A UTILIZAÇÃO DE
MATERIAL EXTRA**

ENFERMAGEM

- 1) Na prescrição de enfermagem do paciente portador de leucemia aguda apresentando trombocitopenia e com a finalidade de evitar complicações relativas a sangramento, analise as afirmativas abaixo.

I - Não administrar injeções intramusculares.
II - Não inserir cateteres de demora.
III- Utilizar somente lâminas de barbear novas.

Assinale a opção correta.

- (A) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.
(B) Apenas a afirmativa III é verdadeira.
(C) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.
(D) As afirmativas I, II e III são verdadeiras.
(E) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.

- 2) Assinale a opção que apresenta fatores de risco para o desenvolvimento de osteoporose associados ao estilo de vida do indivíduo.

- (A) Fazer uso de álcool e ser tabagista.
(B) Possuir histórico familiar da doença e exceder-se na exposição à luz solar.
(C) Usar medicamentos anticonvulsivantes continuamente e ser mulher branca.
(D) Ser mulher e ser tabagista.
(E) Ser mulher branca e ter baixa estatura.

- 3) O dengue hemorrágico apresenta os mesmos sintomas do dengue clássico. A Organização Mundial de Saúde (OMS) classifica a gravidade dividida em graus. A plaquetopenia, a hemoconcentração e a insuficiência circulatória são características do grau

- (A) I
(B) II
(C) III
(D) IV
(E) V

- 4) Foi prescrita, para um paciente da Unidade Coronariana, uma solução de heparina, etapa única em vinte e quatro horas, volume de 400ml e 2.500 UI de heparina. A solução deverá ser infundida em bomba infusora e a unidade dispõe de frasco ampola de 5ml de heparina com 25.000 UI. Qual a velocidade aproximada da infusão e o volume de heparina a ser aspirado do frasco, respectivamente, para cumprir corretamente a prescrição?
- (A) 7 ml/h e 5 ml
 - (B) 14 ml/h e 5 ml
 - (C) 17 ml/h e 0,5 ml
 - (D) 21 ml/h e 0,5 ml
 - (E) 34 ml/h e 1 ml
- 5) Considerando que o armazenamento temporário consiste na guarda dos recipientes contendo resíduos já acondicionados, assinale a opção INCORRETA.
- (A) A sala para guarda de recipientes de transporte interno deve ter pisos e paredes lisas e laváveis.
 - (B) A sala para armazenamento temporário pode ser compartilhada com a sala de utilidades.
 - (C) Os resíduos de fácil putrefação, que venham a ser coletados por período superior a 24 horas de seu armazenamento, devem ser conservados sob refrigeração.
 - (D) No armazenamento temporário não é permitida a retirada dos sacos de resíduos de dentro dos recipientes ali estacionados.
 - (E) O armazenamento temporário deverá ser feito com a disposição dos sacos sobre o piso.
- 6) Um dos transtornos que poderá afetar seriamente o paciente na abstinência de álcool é
- (A) o coma alcoólico.
 - (B) a convulsão.
 - (C) a hipertermia.
 - (D) o sangramento retal.
 - (E) a neoplasia de laringe.

7) As provas de função renal são utilizadas para avaliar a gravidade da doença renal e acompanhar a evolução clínica do paciente. A densidade específica da urina determina a capacidade do rim em

- (A) depurar solutos do plasma.
- (B) concentrar a urina.
- (C) liberar eritropoetina.
- (D) regular a pressão arterial.
- (E) produzir prostaglandinas.

8) Assinale a opção que completa corretamente a lacuna abaixo.

Um hospital geral vem buscando a melhoria de resultados nas intervenções cirúrgicas, diminuindo o tempo de espera para as marcações de cirurgias, levando ao aumento da satisfação da clientela e da qualidade da assistência. Nessas condições, pode-se considerar que houve uma melhora na _____ das ações hospitalares.

- (A) eficácia
- (B) acreditação
- (C) efetividade
- (D) legitimidade
- (E) otimização

9) Após a realização do procedimento de Endoscopia Digestiva Alta(EDA), além dos cuidados de monitorização dos sinais vitais e o acompanhamento das queixas de dor ou sangramento, a enfermeira deve orientar o paciente, visando evitar a broncoaspiração, a não ingerir alimento ou bebida até que o reflexo do vômito reapareça, por um período entre

- (A) 1 a 5 minutos.
- (B) 10 a 15 minutos.
- (C) 1 a 2 horas.
- (D) 3 a 4 horas.
- (E) 6 a 12 horas.

- 10) Foi admitido um paciente, no setor de emergência de um grande hospital, com queimaduras em todo o tórax anterior e membro superior direito. Utilizando-se a Regra dos Noves, pode-se dizer que, inicialmente, a área afetada é de
- (A) 18%
 - (B) 19%
 - (C) 27%
 - (D) 36%
 - (E) 45%
- 11) Um paciente de 2 anos de idade, Tax 38,5°C, chegou ao Posto de Saúde com história de coriza, tosse, conjuntivite e manchas de Koplik na mucosa bucal. Esse quadro clínico sugere a seguinte doença:
- (A) Varicela.
 - (B) Rubéola.
 - (C) Exantema súbito.
 - (D) Escarlatina.
 - (E) Sarampo.
- 12) Dentre os cuidados pré-operatórios nos pacientes submetidos à cirurgia valvar, pode-se afirmar que é correto:
- (A) interromper drogas anti-hipertensivas e de insuficiência cardíaca dez dias antes da cirurgia.
 - (B) realizar tratamento dentário completo antes do procedimento cirúrgico.
 - (C) manter aspirina até o dia anterior à cirurgia.
 - (D) validar exames laboratoriais de até um ano, a partir da coleta.
 - (E) dispensar exames de Raio-X de tórax e eletrocardiograma.
- 13) No caso específico dos autoclaves a vapor com bomba de vácuo, o objetivo do teste de Bowie e Dick é verificar se
- (A) a instalação do equipamento está de acordo com o projeto de instalação.
 - (B) o funcionamento do equipamento, no que se refere à remoção do ar da câmara interna do mesmo, está adequado.
 - (C) houve recontaminação do material.
 - (D) o ciclo de esterilização foi completado.
 - (E) o tempo de penetração do calor nos pacotes foi o necessário.

- 14) Dentre as vacinas abaixo relacionadas, qual pode ser administrada por via intramuscular e subcutânea?
- (A) Hepatite B.
 - (B) Tríplice Bacteriana (DTP).
 - (C) Sarampo.
 - (D) Influenza.
 - (E) Bacilo de Calmette Guérin (BCG).
- 15) Dentre os procedimentos de admissão de pós operatório imediato para pacientes submetidos à cirurgia cardíaca, é ação correta de enfermagem:
- (A) manter a verificação do débito urinário duas vezes ao dia.
 - (B) avaliar a permeabilidade e a velocidade de fluxo de todos os cateteres intravasculares.
 - (C) solicitar o início imediato de fisioterapia respiratória e motora.
 - (D) programar o primeiro exame radiológico de tórax e eletrocardiograma para doze horas após admissão na unidade.
 - (E) clampar o dreno de tórax e/ou mediastino, abrindo após vinte e quatro horas.
- 16) São complicações decorrentes do Infarto Agudo do Miocárdio durante a hospitalização inicial:
- (A) arritmias e ruptura septal ventricular.
 - (B) aneurisma do ventrículo esquerdo e diabetes mellitus.
 - (C) insuficiência hepática e pericardite.
 - (D) pólipos intestinais e bradiarritmias.
 - (E) aneurisma da aorta abdominal e aneurisma ventricular.
- 17) Um paciente em tratamento na UTI tem o seguinte resultado de gasometria arterial: PaO₂ 40mmHg e PaCO₂ 80mmHg. Nessa situação, pode-se afirmar que o paciente apresenta
- (A) disfunção hepática.
 - (B) insuficiência respiratória.
 - (C) hiperoxigenação sanguínea arterial.
 - (D) alta eliminação de CO₂ via respiratória.
 - (E) hipossaturação de CO₂.

- 18) Gerenciar os conflitos na equipe de enfermagem de um hospital é um desafio para os enfermeiros. Pautando-se na abordagem psicossocial e psicodinâmica das organizações, tenta-se entender as necessidades e dificuldades do outro. O enfoque gerencial contemporâneo é um paradigma de uma situação de conflito que
- (A) parte do pressuposto de que o conflito pode ser suprimido.
 - (B) enfoca a importância de desenvolvimento de projetos voltados para ampliar a motivação no trabalho.
 - (C) busca mudar as posturas pessoais da equipe.
 - (D) objetiva o restabelecimento da harmonia.
 - (E) admite que o conflito é inerente às organizações e que, portanto, não é patológico.
- 19) Se o profissional de enfermagem registrar ou mandar que se registre, no prontuário, informação falsa ou diversa a que deveria constar, alterando a verdade sobre o fato relevante, estará cometendo
- (A) crime de periclitacão.
 - (B) crime de falsidade ideológica.
 - (C) efeito culposo.
 - (D) charlatanismo.
 - (E) crime de omissão.
- 20) São medidas de prevenção de infecção urinária hospitalar, EXCETO:
- (A) retirar o cateter vesical o mais precocemente possível.
 - (B) trocar o cateter vesical rotineiramente.
 - (C) manter o cateter vesical acoplado ao sistema fechado de coleção de urina.
 - (D) manter a bolsa coletora de urina sempre abaixo do nível da bexiga.
 - (E) não encostar a ponteira de esvaziamento da bolsa coletora no vaso medidor de urina.

- 21) Dentre as opções abaixo, assinale a que apresenta uma das causas da disfunção do Sistema Nervoso Central na criança, associada ao trabalho de parto.
- (A) Má-formação congênita.
 - (B) Uso de anestésico local.
 - (C) Diabetes materna.
 - (D) Infecção por toxoplasmose.
 - (E) Desproporção céfalo pélvica.
- 22) Na utilização da Nutrição Parenteral em ambiente hospitalar, a monitorização cuidadosa pelo enfermeiro é fundamental para o sucesso do método. Dentre as afirmações descritas a seguir, assinale a opção INCORRETA em relação à Nutrição Parenteral.
- (A) Utilizar bomba infusora.
 - (B) Usar máscara e técnica estéril durante troca do curativo no local de inserção do cateter.
 - (C) Monitorar sinais vitais.
 - (D) Interromper a solução durante encaminhamento a exames fora do setor, mantendo a permeabilidade da via com solução salina.
 - (E) Pesar o paciente diariamente.
- 23) A distensão abdominal da gravidez às vezes provoca a separação dos músculos retos. Essa separação é denominada
- (A) hérnia de hiato.
 - (B) diástase.
 - (C) diáfase.
 - (D) engurgitamento.
 - (E) hérnia inguinal.

- 24) Em relação aos resíduos de saúde, assinale a opção INCORRETA.
- (A) A identificação dos sacos de acondicionamento de resíduos e dos recipientes de transporte poderá ser feita por adesivos.
 - (B) O Grupo A é identificado pelo símbolo de substância infectante com rótulos de fundo branco, desenho e contornos pretos.
 - (C) O Grupo B é identificado pelo símbolo de risco associado e com discriminação de substância química e frases de risco.
 - (D) O Grupo C é representado pelo símbolo internacional de presença de radiação ionizante, com rótulos de fundo amarelo e contornos vermelhos, acrescido da expressão REJEITO RADIOATIVO.
 - (E) O Grupo E é identificado pelo símbolo da substância infectante, com rótulos de fundo branco desenho e contornos pretos, acrescido da inscrição de resíduo PERFURO CORTANTE.
- 25) O profissional de enfermagem que injetar substância estranha, como dietas ou sucos, por via venosa, estará incorrendo em
- (A) maus-tratos.
 - (B) curanderismo.
 - (C) exercício ilegal da profissão.
 - (D) ato lesivo à vida.
 - (E) ato lesivo à saúde pública.

- 26) Correlacione os distúrbios endócrinos com seus respectivos sinais e sintomas e a seguir assinale a opção correta.

DISTÚRBIOS

SINAIS E SINTOMAS

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| I - Síndrome de Cushing. | () Hipertensão, cefaleia, hiper- |
| II - Feocromocitoma. | ridrose, hipermetabolismo e |
| III- Crise Addisoniana. | hiperglicemia. |
| | () Face em lua cheia. |
| | () Cianose e choque circulató- |
| | rio. |

- (A) (III) (I) (II)
(B) (II) (I) (III)
(C) (I) (II) (III)
(D) (II) (III) (I)
(E) (III) (II) (I)

- 27) Quais os fatores sistêmicos, relacionados ao hospedeiro, podem prejudicar o processo cicatricial?

- (A) Tensão na linha de sutura e desnutrição.
(B) Hipervitaminose K e deficiência proteica.
(C) Má oxigenação e doenças metabólicas.
(D) Desnutrição e hipervitaminose C e A.
(E) Doença metabólica e corpo estranho.

- 28) As doenças de Notificação Compulsória obrigam a todos os profissionais de saúde, bem como os responsáveis por estabelecimentos de Saúde e Ensino, a comunicarem aos gestores do Sistema Único de Saúde(SUS) a ocorrência dos casos suspeitos ou confirmados dessas doenças.
Dentre as opções abaixo, assinale a que apresenta doenças de Notificação imediata(24 horas).

- (A) Poliomielite, cólera, influenza humana por novo subtipo.
(B) Cólera, difteria, malária.
(C) Leptospirose, influenza humana por novo subtipo, poliomielite.
(D) Sífilis, raiva, malária.
(E) Influenza humana por novo subtipo, varicela, difteria.

- 29) Segundo Brunner e Suddarth, os propósitos da monitorização da PIC (Pressão Intra Craniana) consistem em monitorar precocemente o aumento da pressão, quantificar e iniciar o tratamento apropriado, além de fornecer líquido para amostragem e drenagem. É correto afirmar que contribuem para a elevação da PIC:
- (A) cabeceira elevada 30° e diminuição dos estímulos ambientais.
 - (B) hiperoxigenação e rotação extrema do pescoço.
 - (C) vias aéreas livres e flexão extrema do quadril.
 - (D) corticosteróides e diuréticos osmóticos.
 - (E) febre e aspiração de via aérea.
- 30) Segundo o Código de Ética da categoria, são princípios fundamentais pertinentes à conduta dos profissionais de enfermagem, EXCETO:
- (A) atuar na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde.
 - (B) exercer suas atividades com competência para a promoção do ser humano na sua integralidade, de acordo com os princípios da ética e bioética.
 - (C) participar das ações que visem satisfazer as necessidades de saúde da população.
 - (D) respeitar a vida, a dignidade e os direitos humanos em todas as suas dimensões.
 - (E) sobrepor o interesse da ciência ao interesse da pessoa, família ou coletividade.
- 31) A glomerulonefrite difusa aguda é responsável pela maioria das admissões por doença renal na pediatria. Dentre os cuidados abaixo relacionados, quais são específicos para esse tipo de paciente?
- (A) Balanço hídrico, repouso, monitoração dos sinais vitais.
 - (B) Balanço hídrico, verificação de PA, deambulação.
 - (C) Dieta hiposódica, deambulação, estimular ingestão hídrica.
 - (D) Balanço hídrico, estimular ingestão hídrica, deambulação.
 - (E) Dieta hiposódica, repouso, controle regular da glicemia.

- 32) Assinale a opção que completa corretamente as lacunas abaixo.

O edema pulmonar consiste no acúmulo anormal de líquido nos pulmões. Posicionar o paciente ereto, com as pernas pendendo na lateral do leito, tem como objetivo apresentar o efeito imediato de _____ o retorno venoso, _____ o débito do ventrículo _____ e reduzindo a congestão pulmonar.

- (A) diminuir / aumentando / esquerdo
- (B) aumentar / diminuindo / esquerdo
- (C) aumentar / diminuindo / direito
- (D) diminuir / diminuindo / direito
- (E) diminuir / aumentando / direito

- 33) O intervalo mínimo entre a terceira dose da DTP (tríplice bacteriana) e o reforço é de

- (A) 2 meses.
- (B) 3 meses.
- (C) 6 meses.
- (D) 9 meses.
- (E) 1 ano.

- 34) Epidemias de Dengue têm sido registradas, anualmente, em vários estados brasileiros. Em relação ao Dengue, é correto afirmar que

- (A) a transmissão pode ser por contato direto de um doente com uma pessoa sadia.
- (B) o período de incubação é acima de quinze dias.
- (C) o agente etiológico é um arbovírus do gênero Flavivirus.
- (D) no tratamento sintomático dá-se preferência ao uso do ácido acetil salicílico, devido ao baixo custo.
- (E) a resposta imunológica à infecção é exclusivamente primária.

- 35) As articulações mantêm os ossos ligados e possibilitam que o corpo se movimente. Correlacione traumatismos músculo esqueléticos às suas definições e assinale a opção correta.

TRAUMAS

DEFINIÇÕES

- I - Luxação articular () Lesão dos ligamentos que circundam a articulação, sendo provocada por um movimento de torção ou tração.
- II - Entorse
- III- Contusão
- IV - Estiramento () Tração muscular provocada pelo uso, alongamento ou estresse excessivo.
- () Condição em que as superfícies articulares dos ossos formadores da articulação não estão mais em contato anatômico.
- () Lesão de tecidos moles produzida pela força obtusa, como impacto, chute ou queda.

- (A) (I) (III) (II) (IV)
(B) (II) (IV) (III) (I)
(C) (III) (II) (I) (IV)
(D) (II) (IV) (I) (III)
(E) (IV) (I) (II) (III)

- 36) Assinale a opção que completa corretamente as lacunas abaixo.

Segundo Woods, Suzan L. e co-autores, "o uso de cocaína tem sido associado com isquemia miocárdica, _____ e _____ (...)".

- (A) dislipidemia / endocardite
(B) cefaleia / diarreia
(C) arritmias / morte súbita
(D) leucopenia / cefaleia
(E) aneurisma abdominal / morte súbita

- 37) Qual a imunoglobulina que na última metade da gestação apresenta concentração fetal e materna aproximadamente iguais?
- (A) IGM
 - (B) IGD
 - (C) IGA
 - (D) IGG
 - (E) IGE
- 38) Qual das infecções abaixo relacionadas NÃO é transmitida por via transplacentar?
- (A) Toxoplasmose.
 - (B) Gonorreia.
 - (C) Sífilis.
 - (D) Rubéola.
 - (E) Caxumba.
- 39) Em um paciente com prótese ventilatória utilizando cânula de traqueostomia balonada por longo prazo, um dos cuidados diários da enfermagem é a checagem e o controle da pressão do balonete. Caso essa rotina seja negligenciada e o balonete permaneça hiperinflado, assinale, dentre as complicações descritas abaixo, qual NÃO será observada.
- (A) Amolecimento do tecido da traqueia.
 - (B) Edema de traqueia.
 - (C) Fístula traqueoesofágica.
 - (D) Necrose local da traqueia.
 - (E) Escape de volume corrente.
- 40) O distúrbio cerebral crônico, progressivo e degenerativo, acompanhado por efeitos profundos sobre a memória, cognição e a capacidade para o autocuidado, caracteriza a
- (A) doença de Alzheimer.
 - (B) paralisia de Bell.
 - (C) síndrome de Guillian-Barré.
 - (D) esclerose lateral amiotrófica.
 - (E) miastenia grave.

- 41) Em uma situação de emergência, em que há pneumotórax aberto traumático, qual deve ser a medida imediata executada pela enfermagem?
- (A) Providenciar material de intubação oro-traqueal.
 - (B) Verificar os sinais vitais.
 - (C) Realizar cateterismo vesical de demora.
 - (D) Instalar cateter nasal de oxigênio a 1 litro/min.
 - (E) Ocluir com gaze impregnada em vaselina a ferida torácica.
- 42) A regulação da temperatura no recém-nato de alto risco é indispensável na UTI Neonatal. As consequências adicionais imediatas que podem ser detectadas em um recém-nato mal aquecido são:
- (A) acidose metabólica, hipotermia, apneia.
 - (B) hemorragia intracraniana, apneia, hipercalemia.
 - (C) acidose metabólica, hipotermia, hipercalemia.
 - (D) alcalose respiratória, hipoxia, hipoglicemia.
 - (E) hipoglicemia, hipoxia, acidose metabólica.
- 43) Nos cuidados em caso de obstrução das vias aéreas por corpo estranho, a manobra de HEIMLICH é uma das ações desempenhadas pela enfermeira e consiste em
- (A) retirar o corpo estranho com o dedo.
 - (B) manobra de tração do maxilar.
 - (C) pressão abdominal subdiafragmática.
 - (D) balançar a vítima.
 - (E) colocar o paciente em posição de supinação.
- 44) Uma gestante com dezesseis semanas de idade gestacional informou, durante a consulta do pré-natal, a seguinte história: dois partos a termo, um parto gemelar prematuro e três abortamentos. Em relação à história da gestante, o caso citado pode ser classificado, respectivamente, como:
- (A) G VII; P VI; e A III.
 - (B) G VI; P III; e A III.
 - (C) G VI; P IV; e A III.
 - (D) G VII; P IV; e A III.
 - (E) G VI; P V; e A III.

- 45) No controle das doenças transmissíveis, certas precauções são fundamentais para evitar a disseminação. Dentre as doenças infecciosas que exigem precauções entéricas pode-se citar:
- (A) a leptospirose, o cólera, a tuberculose, a rubéola.
 - (B) o cólera, a rubéola, a febre tifoide, a leptospirose.
 - (C) as hepatites, a leptospirose, o cólera, a febre tifoide.
 - (D) o sarampo, a leptospirose, a leishmaniose, o cólera.
 - (E) a leptospirose, a tuberculose, a leishmaniose, as hepatites.
- 46) Em relação aos processos de limpeza, desinfecção e esterilização adequados de artigos médico hospitalares, assinale a opção INCORRETA.
- (A) Desinfecção de alto nível destrói todos os microrganismos, exceto uma parte dos esporos bacterianos.
 - (B) Desinfecção de médio nível inativa o bacilo da tuberculose e as bactérias na forma vegetativa, assim como a maioria dos vírus e fungos, exceto esporos bacterianos.
 - (C) Limpeza remove todo o material estranho e a matéria orgânica dos objetos e deve preceder ao processo de esterilização ou desinfecção.
 - (D) Antisséptico é um germicida químico que deve ser usado em objetos inanimados, pele ou tecidos orgânicos.
 - (E) Germicida é o agente que destrói microrganismos.
- 47) A hipercaliemia tem como um dos fatores etiológicos a
- (A) administração intravenosa excessiva de Sódio (solução hiperosmolar).
 - (B) excreção renal aumentada de Cálcio.
 - (C) excreção renal diminuída de Cálcio.
 - (D) excreção renal diminuída de Potássio.
 - (E) administração intravenosa rápida de soro glicosado 5%.

- 48) Segundo Brunner e Suddarth, correlacione as etapas do processo de Enfermagem aos seus respectivos procedimentos, e assinale a opção correta.

ETAPAS	PROCEDIMENTOS
I - Histórico	() Atualização do plano de cuidados através da prescrição de enfermagem.
II - Diagnóstico	() Determinação das respostas do paciente às prescrições de enfermagem.
III- Planejamento	() Identificação dos problemas.
IV - Implementação	() Coleta de dados.
V - Evolução	() Desenvolvimento de metas, resultados e do plano de cuidados.

(A) (IV) (II) (III) (I) (V)
(B) (II) (IV) (I) (III) (V)
(C) (III) (IV) (V) (I) (II)
(D) (V) (III) (I) (II) (IV)
(E) (IV) (V) (II) (I) (III)

- 49) Qual a infecção que se transmite de paciente a paciente geralmente pelas mãos da equipe de saúde?

- (A) Recorrente.
(B) Endógena.
(C) Exógena.
(D) Inter-hospitalar.
(E) Cruzada.

- 50) O método do trajeto em Z na injeção intramuscular profunda (Z-Track) é utilizado na administração de

- (A) ferro.
(B) vitamina K.
(C) corticoide.
(D) complexo B.
(E) antibiótico.