

MARINHA DO BRASIL
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA

(PROCESSO SELETIVO DE ADMISSÃO AOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA (PRM) DO HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS (HNMD) EM 2008)

PROVA: **AMARELA**

NÃO ESTÁ AUTORIZADA A UTILIZAÇÃO DE MATERIAL EXTRA

ESPECIALIDADE COM ACESSO DIRETO

Anestesiologia	Otorrinolaringologia
Cirurgia Geral	Pediatria
Clínica Médica	Psiquiatria
Neurologia	Radiologia e Diagnóstico por Imagem
Obstetrícia e Ginecologia	Neurocirurgia
Ortopedia e Traumatologia	

- 1) Durante a fase lútea do ciclo menstrual, o aspecto histológico do endométrio é caracterizado como
- (A) atrófico.
 - (B) secretor.
 - (C) proliferativo.
 - (D) hiperplásico.
 - (E) hipotrófico.
- 2) São causas comuns de obstrução do intestino delgado:
- (A) Hérnias de hiato.
 - (B) As aderências e as hérnias externas.
 - (C) Prolapsos de reto.
 - (D) Válvulas retais.
 - (E) Abscessos retais.
- 3) Qual dos grupos de antibióticos abaixo é considerado de primeira escolha para o tratamento da infecção pela Bordetella pertussis?
- (A) Penicilinas.
 - (B) Aminoglicosídeos.
 - (C) Macrolídeos.
 - (D) Carbapenêmicos.
 - (E) Cefalosporinas.
- 4) Qual das alterações endócrino-metabólicas abaixo, pode ser considerada como efeito adverso associado ao uso crônico dos corticosteróides?
- (A) Hipercalemia.
 - (B) Hipoglicemia.
 - (C) Hiperlipidemia.
 - (D) Perda de peso.
 - (E) Puberdade precoce.

- 5) À direção nacional Sistema Único de Saúde (SUS) compete:
- (A) participar das ações de controle e avaliação das condições e dos ambientes de trabalho.
 - (B) prestar apoio técnico e financeiro aos municípios e executar, supletivamente, ações e serviços de saúde.
 - (C) formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.
 - (D) identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas públicos de alta complexidade, de referência estadual e regional.
 - (E) planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde.
- 6) É uma contra-indicação de tomografia computadorizada de abdome quando há
- (A) trauma fechado.
 - (B) suspeita de lesão pancreática ou duodenal.
 - (C) choque refratário.
 - (D) exame físico não confiável.
 - (E) suspeita de lesão de víscera oca.
- 7) A respeito da arginina assinale a opção correta.
- (A) Diminui a produção de Interleucina 2.
 - (B) Diminui a proliferação de células T.
 - (C) Diminui o crescimento de tumores, facilitando a ação de agentes quimioterápicos.
 - (D) Não é precursor do Óxido Nítrico.
 - (E) Estimula crescimento tumoral, facilitando a ação de agentes quimioterápicos e da radioterápicos.
- 8) Ao realizar a primeira manobra de Leopold-Zweifel, foi observado um pólo fetal volumoso, de superfície irregular, resistente, mas redutível. A segunda manobra revelou as pequenas partes fetais orientadas para o lado direito materno. Na terceira manobra foi apreendido um pólo menor que o anterior, liso e consistente. Com estes achados, conclui-se que a situação, apresentação e posição fetais são respectivamente:
- (A) frontal, face e inferior.
 - (B) oblíqua, pélvica e direita.
 - (C) longitudinal, cefálica e esquerda.
 - (D) transversa, córmica e superior.
 - (E) sagital, vértice e posterior.

- 9) Em relação as alterações hematológicas no curso de uma gravidez normal assinale a opção correta.
- (A) O volume plasmático aumenta proporcionalmente mais do que o volume das hemácias.
 - (B) O volume das hemácias aumenta proporcionalmente mais do que o volume plasmático.
 - (C) O volume plasmático aumenta e o volume de hemácias permanece constante.
 - (D) O volume das hemácias diminui e o volume plasmático permanece constante.
 - (E) Não há alteração do volume plasmático e de hemácias.
- 10) Qual das opções abaixo corresponde às patologias relacionadas ao comprometimento do aparelho cardiovascular no Lupus Eritematoso Sistêmico e no Lupus Neonatal, respectivamente?
- (A) Endocardite e pericardite.
 - (B) Pericardite e bloqueio átrio-ventricular total.
 - (C) Miocardite e bloqueio átrio-ventricular total.
 - (D) Pericardite e taquicardia supraventricular.
 - (E) Endocardite e bradicardia sinusal.
- 11) Qual a complicação aguda mais encontrada na criança com glomerulonefrite aguda pós-estreptocócica?
- (A) Hipertensão arterial sistêmica.
 - (B) Hipercalemia.
 - (C) Uremia.
 - (D) Convulsões.
 - (E) Hiperfosfatemia.
- 12) Na presença de uma adenite inguinal crônica que evolui para úlceras, fístulas e estenose retal, a doença a ser pesquisada é a (o)
- (A) donovanose.
 - (B) sífilis.
 - (C) Síndrome da Imunodeficiência Adquirida.
 - (D) cancro mole.
 - (E) linfogranuloma venéreo.

- 13) Quanto à vacinação contra Influenza (gripe) é INCORRETO afirmar que
- (A) pode ser aplicada a partir dos seis meses de idade.
 - (B) pode ser aplicada simultaneamente com qualquer das outras vacinas do Programa Nacional de Imunização.
 - (C) existem três tipos de vacinas contra o vírus Influenza.
 - (D) sua composição é recomendada anualmente pela Organização Mundial de Saúde (OMS), com base nas informações recebidas de todo o mundo sobre a prevalência de cepas circulantes.
 - (E) sua via de administração é, exclusivamente, intramuscular.
- 14) São consideradas manifestações clínicas de hipoglicemia na criança, EXCETO
- (A) palpitação.
 - (B) diplopia.
 - (C) convulsões.
 - (D) poliúria.
 - (E) cefaléia.
- 15) O diagnóstico do tétano é feito por
- (A) anamnese e exame físico.
 - (B) hemocultura.
 - (C) cultura de material coletado na ferida.
 - (D) sorologia específica.
 - (E) necrópsia.
- 16) Na síndrome de Mallory-Weiss ocorre hemorragia causada por qual tipo de lesão esofagiana?
- (A) Divertículos.
 - (B) Úlceras.
 - (C) Varizes.
 - (D) Lacerações da mucosa.
 - (E) Ectasias vasculares.

- 17) Durante a primeira semana de vida os recém-nascidos apresentam uma perda ponderal em relação ao peso de nascimento. Tal fato se deve em parte a excreção do excesso de líquido extravascular e possivelmente por baixa ingestão nos primeiros dias de vida. Qual o percentual de perda de peso estimado nesse período?
- (A) 10 %
 - (B) 15 %
 - (C) 20 %
 - (D) 25 %
 - (E) 30 %
- 18) Em relação à direção do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a opção INCORRETA.
- (A) É única, de acordo com o inciso I do art. 198 da Constituição Federal.
 - (B) No âmbito da União é exercida pelo Ministério da Saúde.
 - (C) No âmbito dos Estados é exercida pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.
 - (D) No Distrito Federal é exercida diretamente pelo Ministério da Saúde.
 - (E) No âmbito dos municípios é exercida pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.
- 19) Assinale a opção que descreve a "Síndrome da embolia gordurosa".
- (A) Insuficiência cardíaca e respiratória, com antecedente de fratura de ossos longos.
 - (B) Disfunção neurológica, insuficiência respiratória e petéquias nas axilas, no tórax e parte proximal dos braços.
 - (C) Arritmia cardíaca e petéquias no tórax.
 - (D) Fraturas de ossos longos e insuficiência respiratória.
 - (E) Arritmia cardíaca, insuficiência respiratória e fraturas de ossos longos.
- 20) Qual o tumor primário mais comum do Sistema Nervoso Central?
- (A) Estrocioma.
 - (B) Meningioma.
 - (C) Glioma.
 - (D) Chantoma.
 - (E) Linfoma.

- 21) Nível baixo de alfa-feto-proteína no soro materno está associado à
- (A) aneuploidia.
 - (B) defeito de fechamento de tubo neural fetal.
 - (C) anencefalia.
 - (D) onfalocele.
 - (E) meningomielocelo.
- 22) Um distúrbio de ritmo, comum na intoxicação digitálica é a
- (A) onda P.
 - (B) ritmo sinusal.
 - (C) taquicardia atrial.
 - (D) fibrilação atrial.
 - (E) extrassístole ventricular.
- 23) Em relação a artrite reumatóide assinale a opção INCORRETA.
- (A) As mulheres são afetadas 3 vezes mais que os homens.
 - (B) Inicia-se mais freqüentemente na quinta e sexta década de vida.
 - (C) Os estudos indicam predisposição genética.
 - (D) Lesões microvalvulares e um aumento do número de células de revestimentos sinovial são as lesões encontradas na sinovite reumatóide.
 - (E) As articulações interfalangianas distais são as mais acometidas.
- 24) Segundo Framingham qual dos critérios abaixo é considerado menor para diagnóstico de insuficiência cardíaca?
- (A) Derrame pleural.
 - (B) Refluxo hepatojugular.
 - (C) Ritmo em B3.
 - (D) Cardiomegalia.
 - (E) Alteração de pressão arterial.
- 25) São características da insuficiência renal aguda pré-renal:
- (A) osmolaridade urinária variável, creatinina < 20mg/dl.
 - (B) osmolaridade urinária > 500 mOs/L, creatinina < 20mg/dl.
 - (C) creatinina > 40mg/dl e osmolaridade urinária = plasma.
 - (D) osmolaridade urinária > 500 mOs/L, creatinina > 40mg/dl.
 - (E) creatinina e osmolaridade urinária variáveis.

- 26) A capacidade de certos organismos de penetrar e se desenvolver no novo hospedeiro ocasionando infecção é a definição de
- (A) virulência.
 - (B) patogenicidade.
 - (C) dose infectante.
 - (D) poder invasivo.
 - (E) infectividade.
- 27) Qual das cardiopatias congênitas abaixo relacionadas cursam com hiperfluxo pulmonar e sintomatologia de insuficiência cardíaca congestiva como principal manifestação clínica da doença?
- (A) Atresia tricúspide.
 - (B) Comunicação interventricular.
 - (C) Atresia pulmonar.
 - (D) Transposição das grandes artérias.
 - (E) Tetralogia de Fallot.
- 28) A vacinação na gestante pode acarretar efeitos nocivos ao concepto. Além da vacina antitetânica, de uso indicado no pré-natal, as vacinas que podem ser utilizadas durante o período gravídico são:
- (A) hepatite B e sarampo.
 - (B) sarampo e caxumba.
 - (C) rubéola e caxumba.
 - (D) hepatite B e influenza.
 - (E) rubéola e influenza.
- 29) Em relação ao Calendário Básico de Vacinação de Rotina é correto afirmar que
- (A) ao nascer administra-se vacina para Hepatite B, BCG e DTP.
 - (B) aos dois meses administra-se DTP e Anti-Pólio.
 - (C) aos nove meses administra-se a vacina contra sarampo e febre amarela.
 - (D) a vacina contra Hepatite B deve ser aplicada nas primeiras 24 horas de vida, ou após a alta da maternidade.
 - (E) não existe intervalo mínimo entre as doses da vacina oral contra poliomielite.

- 30) Qual agente etiológico da parotidite pós-operatória?
- (A) Estreptococos.
 - (B) E. coli.
 - (C) Estafilococos.
 - (D) Klebsiella.
 - (E) Micoplasma.
- 31) A articulação das políticas e programas do Sistema Único da Saúde (SUS), a cargo das comissões intersetoriais abrange diversas atividades, EXCETO
- (A) alimentação e nutrição.
 - (B) saneamento e meio-ambiente.
 - (C) vigilância sanitária.
 - (D) ciência e tecnologia.
 - (E) educação.
- 32) Em relação às medidas preventivas aos acidentes ocupacionais com material pérfuro-cortante e fluidos orgânicos é correto afirmar que
- (A) o material pérfuro-cortante estéril pode ser desprezado em lixo comum.
 - (B) se pode desprezar as agulhas em recipientes de paredes rígidas sem desconectá-las das seringas.
 - (C) é preferível o uso de óculos protetor durante cirurgias com grande volume de sangue, em substituição ao protetor facial.
 - (D) não há risco ao recapear agulhas usadas com a utilização de pinças.
 - (E) a imobilização do paciente durante a realização de algum procedimento com material perfuro-cortante não é relevante.
- 33) O ciclo menstrual pode apresentar vários tipos de alteração. Quando ocorre um fluxo menstrual excessivo, com sangramento prolongado, período irregular e intervalos freqüentes, estamos diante de um quadro de
- (A) metrorragia.
 - (B) polimenorréia.
 - (C) hipomenorréia.
 - (D) oligomenorréia.
 - (E) menometrorragia.

- 34) Qual o agente etiológico responsável pela epiglote aguda na infância?
- (A) Streptococcus pneumoniae.
 - (B) Staphylococcus aureus.
 - (C) Streptococcus pyogenes.
 - (D) Mycoplasma pneumoniae.
 - (E) Haemophilus influenzae.
- 35) É uma contra-indicação absoluta para cirurgia da obesidade:
- (A) idade (adolescentes/idosos).
 - (B) síndrome de Prader-Willi.
 - (C) peso acima de 200 Kg.
 - (D) IMC > 40kg/m².
 - (E) pacientes com alto risco para TVP.
- 36) Qual das manifestações clínicas do lupus eritematoso sistêmico, abaixo citadas, é considerada a menos frequente?
- (A) trombocitopenia.
 - (B) pericardite.
 - (C) Anemia.
 - (D) Artralgia.
 - (E) Proteinúria.
- 37) Em relação as fístulas anorretais supra esfínterianas, assinale a opção correta.
- (A) São as mais comuns.
 - (B) O trajeto fistuloso é confinado ao plano interesfincteriano.
 - (C) A fístula conecta o plano interesfincteriano com a fossa isquirretal, perfurando o esfíncter externo.
 - (D) O trajeto fistuloso forma uma alça sobre o esfíncter externo e perfura o elevador do ânus.
 - (E) O trajeto passa do reto para a pele perianal.
- 38) Em relação a Esclerodermia, assinale a opção correta.
- (A) É encontrada em crianças e em adolescentes.
 - (B) É mais freqüente e grave em jovens negros.
 - (C) Possui maior incidência na segunda e terceira décadas.
 - (D) Afeta cinco vezes mais os homens.
 - (E) Não acomete os europeus.

- 39) A conduta no carcinoma *in situ* do colo uterino é
- (A) retirada da lesão sob visualização da colposcopia.
 - (B) histerectomia com anexectomia bilateral.
 - (C) histerectomia simples.
 - (D) conização.
 - (E) expectante.
- 40) A reposição de potássio deve ser evitada no pós-operatório imediato porque
- (A) a lesão tissular aumenta a concentração de potássio na circulação e há aumento da atividade da aldosterona.
 - (B) a reposição de potássio é realizada no per-operatório.
 - (C) a reposição de potássio deve ser realizada sempre, independentemente de se tratar de pós operatório.
 - (D) existe uma diminuição da atividade da aldosterona.
 - (E) a reposição de potássio deve ser realizada sempre, pois no pós operatório, existe tendência a hipocalemia.
- 41) A desaceleração tardia dos batimentos cardíacos nos dá o diagnóstico de
- (A) hipertonia uterina.
 - (B) hipotonia uterina.
 - (C) hipóxia fetal.
 - (D) descolamento prematuro da placenta.
 - (E) morte fetal.
- 42) O(s) fator(es) materno(s) que está(ão) frequentemente relacionado(s) ao descolamento prematuro da placenta normoinserida é(são)
- (A) hipertireoidismo.
 - (B) hipertensão arterial.
 - (C) idade entre 20 e 30 anos.
 - (D) curetagens uterinas múltiplas.
 - (E) neoplasia trofoblástica gestacional.
- 43) Um paciente apresenta fratura supracondilar do úmero. Neste caso a lesão associada que estará presente com maior frequência é a do (a)
- (A) nervo axilar.
 - (B) artéria radial.
 - (C) artéria subclávia.
 - (D) artéria axilar.
 - (E) nervo mediano.

- 44) A quimioprofilaxia, na exposição ocupacional, ao HIV é recomendada quando há
- (A) exposição percutânea com material de médio risco de soroconversão.
 - (B) contato de sangue com mucosa.
 - (C) exposição percutânea a fluidos contendo sangue visível.
 - (D) exposição de mucosa a fluidos orgânicos.
 - (E) exposição percutânea com volume pequeno de sangue e carga viral reduzida.
- 45) Qual marcador se encontra alterado na Cirrose Biliar primária?
- (A) HBsAg.
 - (B) Alfa-feto-proteína.
 - (C) Anticorpo Antimitocôndria.
 - (D) Anticorpo Antirribossoma.
 - (E) IGg.
- 46) Dentre os fármacos abaixo citados, qual o que pode causar neutropenia relacionada ao seu uso no paciente pediátrico?
- (A) Ceftriaxone.
 - (B) Ambroxol.
 - (C) Fenoterol.
 - (D) Paracetamol.
 - (E) Sulfametoxazol.
- 47) A porcentagem do número de óbitos de pessoas de 50 anos ou mais em relação ao número total de óbitos é conhecida como
- (A) prevalência proporcional.
 - (B) índice de Swaroop e Uemura.
 - (C) índice de letalidade.
 - (D) índice de morbidade.
 - (E) índice de esperança de vida.
- 48) Qual a causa mais comum de púrpura não trombocitopênica na infância?
- (A) Infecciosa.
 - (B) Por hipersensibilidade medicamentosa.
 - (C) Por desordens da função plaquetária.
 - (D) Púrpura de Henoch-Schönlein.
 - (E) Síndrome hemolítico-urêmica.

- 49) Em relação ao mieloma múltiplo é correto afirmar que
- (A) é responsável por 80% das neoplasias malignas hematológicas.
 - (B) cursa apenas com hipotermia.
 - (C) ocorre com frequência em mulatos, pardos e albinos.
 - (D) a dor óssea é a queixa mais frequente, em geral, induzida pelo movimento, não ocorrendo a noite, exceto com a mudança de posição.
 - (E) é a proliferação neoplásica de um clone de plasmócitos, envolvidos na produção de uma imunoglobulina ainda não identificada.
- 50) Assinale a condição que contra-indica a vacinação.
- (A) Vacina de vírus vivos atenuados em pessoas com imunodeficiência congênita.
 - (B) Doença neurológica estável.
 - (C) Desnutrição.
 - (D) Prematuridade ou baixo peso ao nascer.
 - (E) Paciente com escabiose.