

MARINHA DO BRASIL
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA

(PROCESSO SELETIVO DE ADMISSÃO AOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA (PRM) DO HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS (HNMD) EM 2008)

PROVA: **AMARELA**

NÃO ESTÁ AUTORIZADA A UTILIZAÇÃO DE MATERIAL EXTRA

**ESPECIALIDADE COM PRÉ-REQUISITO
EM CLÍNICA MÉDICA**

Cardiologia
Gastroenterologia
Pneumologia
Endocrinologia

- 1) Em relação a sarcoidose, assinale a opção correta.
- (A) A linfadenopatia é incomum.
 - (B) O órgão mais comumente atingido é o pulmão.
 - (C) A maioria dos pacientes estão na faixa dos 60 aos 80 anos de idade.
 - (D) A doença têm uma predileção quanto aos fumantes.
 - (E) A radiografia do tórax é utilizada como critério único para o diagnóstico da doença.
- 2) Em relação às manifestações clínicas dos distúrbios primários da hemostasia, assinale a opção correta.
- (A) O início do sangramento após um traumatismo é tardio.
 - (B) Os locais de sangramento mais comumente observados são as articulações, músculos e retroperitônio.
 - (C) No exame físico do paciente encontramos petéquias e equimoses.
 - (D) Possuem caráter autossômico ou recessivo ligado ao cromossomo X.
 - (E) Exigem terapia sistêmica e prolongada.
- 3) Um infarto agudo do miocárdio de parede anterior está mais comumente relacionado com a obstrução de qual artéria coronariana?
- (A) Coronária direita.
 - (B) Circunflexa.
 - (C) Coronária esquerda.
 - (D) Descendente anterior.
 - (E) Coronária esquerda, ramo póstero-lateral.
- 4) Dentre as drogas abaixo, assinale a mais indicada para o tratamento da estrogiloidíase.
- (A) Pamoato de pirantel.
 - (B) Ivermectina.
 - (C) Praziquantel.
 - (D) Mebendazol.
 - (E) Metronidazol.

- 5) A avaliação laboratorial da anemia hemolítica é sugerida pelos seguintes achados:
- (A) reticulocitose, haptoglobina baixa, LDH elevado.
 - (B) reticulócitos normais, haptoglobina baixa, bilirrubina indireta elevada.
 - (C) reticulocitose, haptoglobina elevada, bilirrubina indireta elevada.
 - (D) reticulocitose, LDH elevado, bilirrubina indireta baixa.
 - (E) reticulocitose, haptoglobina elevada, LDH baixo.
- 6) Um paciente dá entrada na emergência com quadro de mal estar e sudorese. No exame físico apresenta frequência cardíaca em torno de 20 batimentos por minuto. O eletrocardiograma evidencia bloqueio AV de terceiro grau intermitente. A conduta mais adequada é o uso de
- (A) atropina.
 - (B) noradrenalina.
 - (C) marca-passo temporário.
 - (D) cedilanide.
 - (E) beta bloqueador.
- 7) Uma paciente foi submetida a tireoidectomia total. No pós-operatório evoluiu com espasmos musculares, irritabilidade, depressão e psicose. A provável causa dessa complicação é a
- (A) hipermagnesemia.
 - (B) hipomagnesemia
 - (C) hipocalcemia
 - (D) hipercalcemia.
 - (E) hipercalemia.
- 8) Com relação à sífilis é INCORRETO afirmar que
- (A) a forma secundária é marcada por erupção cutânea.
 - (B) a forma primária costuma cursar com adenopatia inguinal, dolorosa e que tende a fistulizar.
 - (C) o cancro tende a regredir espontaneamente.
 - (D) na fase primária o diagnóstico pode ser realizado por pesquisa direta do treponema na secreção da lesão ulcerada.
 - (E) o cancro pode não ser visível, principalmente em mulheres.

- 9) A droga empregada em pacientes com varizes de esôfago com o objetivo de oferecer um benefício profilático aos que nunca sangraram é a(o)
- (A) propranolol.
 - (B) ranitidina.
 - (C) omeprazol.
 - (D) furosemida.
 - (E) espironolactona.
- 10) Quando avaliamos um paciente que preenche os critérios para resposta inflamatória sistêmica secundária a um foco infeccioso, pode-se firmar o diagnóstico de qual entidade nosológica?
- (A) Sepses.
 - (B) Sepses grave.
 - (C) Choque séptico.
 - (D) Disfunção orgânica múltipla.
 - (E) SIRS.
- 11) Em relação aos distúrbios dolorosos que respondem aos anti-depressivos tricíclicos, assinale a opção que contenha a patologia em que o efeito analgésico NÃO é observado.
- (A) Neuralgia pós-herpética.
 - (B) Neuropatia diabética.
 - (C) Cefaléia tensional.
 - (D) Enxaqueca.
 - (E) Lombalgia crônica.
- 12) Assinale o marcador sorológico mais comumente utilizado para predizer a gravidade da pancreatite aguda.
- (A) Amilase.
 - (B) Lipase.
 - (C) LDH.
 - (D) VHS.
 - (E) Proteína C reativa.

- 13) Assinale a opção que contém apenas uma causa de demência irreversível.
- (A) Hipotireoidismo.
 - (B) Deficiência de tiamina.
 - (C) Intoxicação por drogas.
 - (D) Doença de Alzheimer.
 - (E) Deficiência de Vitamina B12.
- 14) São exemplos de medicamentos contra indicados como terapia anti-hipertensiva na gestação:
- (A) hidralazina e metildopa.
 - (B) metildopa e bloqueadores do receptor da angiotensina.
 - (C) Bloqueadores do receptor da angiotensina e inibidores ECA.
 - (D) inibidores da ECA e hidralazina.
 - (E) hidralazina e betabloqueadores.
- 15) Assinale a neoplasia maligna mais comum do fígado.
- (A) Carcinoma de células escamosas.
 - (B) Carcinoma hepatocelular.
 - (C) Fibrossarcoma.
 - (D) Tumor maligno metastático.
 - (E) Lipossarcoma.
- 16) Qual o fator de risco mais consistente no câncer de pâncreas?
- (A) Álcool.
 - (B) Tabagismo.
 - (C) Colelitíase.
 - (D) Diabetes Melito.
 - (E) Obesidade.
- 17) Os tumores originários do esôfago de Barret, são
- (A) leiomiossarcomas.
 - (B) adenocarcinomas.
 - (C) carcinomas epidermóides.
 - (D) leiomiomas.
 - (E) linfomas.

- 18) Em relação à hipertensão pulmonar, assinale a opção correta.
- (A) A hipertensão pulmonar é a causa mais comum de cor pulmonale.
 - (B) O exercício físico não interfere nos valores da hipertensão pulmonar primária.
 - (C) Na hipertensão pulmonar a radiografia do tórax mostra um aumento dos ramos periféricos da artéria pulmonar.
 - (D) O tratamento da hipertensão pulmonar primária está baseado no uso de vasodilatadores.
 - (E) O sintoma mais comumente atribuível à hipertensão pulmonar é a dispnéia observada em repouso.
- 19) No que diz respeito à hepatite vírus B na fase aguda, assinale o marcador de replicação viral.
- (A) HBs Ag.
 - (B) HBe Ag.
 - (C) Anti-HBe.
 - (D) Anti-HBs.
 - (E) Anti-HBc.
- 20) O pneumotórax espontâneo primário tem como principal causa o/a (s)
- (A) trauma torácico.
 - (B) bolhas pleurais apicais.
 - (C) ventilação mecânica.
 - (D) doença pulmonar obstrutiva crônica.
 - (E) pneumonia bacteriana.
- 21) Em relação à doença inflamatória intestinal, é correto afirmar que
- (A) resposta aos antibióticos ocorre na colite ulcerativa.
 - (B) sangramento franco nas fezes está sempre presente na doença de Crohn.
 - (C) os sintomas sistêmicos são freqüentes na doença de Crohn.
 - (D) a colite ulcerativa freqüentemente preserva o reto.
 - (E) é comum ocorrer obstrução do intestino delgado na colite ulcerativa.

- 22) São aspectos típicos da síndrome de secreção inapropriada de hormônio antidiurético (SIADH), EXCETO
- (A) hiponatremia.
 - (B) natriurese.
 - (C) hiperuricemia.
 - (D) nível de potássio sérico normal.
 - (E) nível sérico normal ou reduzido de creatinina.
- 23) A tríade clássica da pelagra é constituída por:
- (A) anemia, demência, ceratite.
 - (B) anemia, diarreia, demência.
 - (C) dermatite, diarreia, demência.
 - (D) anemia, astenia, ceratite.
 - (E) exantema, glossite, diarreia.
- 24) Qual o grupo de anti-hipertensivos está relacionado com a diminuição inicial do débito cardíaco, redução da secreção de renina e diminuição das catecolaminas nas sinapses nervosas?
- (A) Antagonistas dos canais de cálcio.
 - (B) Beta bloqueadores.
 - (C) Diuréticos.
 - (D) Inibidores da enzima de conversão da angiotensina.
 - (E) Antagonista alfa adrenérgico.
- 25) Em relação a insuficiência renal aguda pré-renal, assinale a opção correta.
- (A) A concentração urinária do sódio é maior que 20 mmol/L.
 - (B) A osmolaridade urinária é maior que 500 mmosmol/Kg H₂O.
 - (C) A razão entre a uréia e a creatinina plasmática é menor que 20-30.
 - (D) No sedimento urinário, encontramos a presença de cilindros granulosos acastanhados.
 - (E) O índice de insuficiência renal é maior do que 1.

- 26) Em relação à amebíase pode-se afirmar que
- (A) o tipo mais comum de infecção amebiana é o abscesso hepático.
 - (B) a infecção clínica induz imunidade à nova colonização com *Entamoeba histolytica*.
 - (C) o metronidazol é o fármaco de escolha para tratamento do abscesso amebiano hepático.
 - (D) o teclozan é exemplo de amebicida tecidual.
 - (E) trata-se da principal causa de morte por parasitose.
- 27) A causa direta de insuficiência renal nos pacientes acometidos por mieloma múltiplo é
- (A) hiperuricemia.
 - (B) hipocalcemia.
 - (C) hipercalcemia.
 - (D) infiltração renal de células neoplásicas.
 - (E) injúria causada pela proteína de Bence Jones.
- 28) Um paciente apresentando quadro clínico de dor torácica associado a febre, há cerca de quatro semanas foi acometido por infarto agudo do miocárdio. A hipótese mais provável para o quadro clínico é
- (A) aneurisma do ventrículo esquerdo.
 - (B) pericardite bacteriana.
 - (C) reinfarto do miocárdio.
 - (D) síndrome de Dressler.
 - (E) pericardite fúngica.
- 29) Um paciente de 65 anos, admitido em emergência com quadro de vômitos e febre há 48 horas associado à confusão mental e cefaléia, apresentava rigidez de nuca +++/4+, líquido 1500 cel/mm³, 97% de polimorfonucleares, proteinorraquia de 230 mg/100ml e glicorraquia de 12 mg/100ml. A terapêutica mais recomendada deve ser:
- (A) cefalotina e gentamicina.
 - (B) vancomicina e ceftazidima.
 - (C) aguardar pela coloração de Gram e resultados de cultura para início da antibioticoterapia específica.
 - (D) ceftriaxone e ampicilina.
 - (E) gatifloxacina.

- 30) Um paciente alcoólatra dá entrada na emergência com quadro de vômitos incoercíveis acompanhado de sangue vivo. O diagnóstico mais provável é
- (A) esôfago de Barret.
 - (B) adenocarcinoma gástrico.
 - (C) hérnia de hiato.
 - (D) síndrome de Mallory-Weiss.
 - (E) síndrome de Zollinger-Ellison.
- 31) A droga de escolha para o tratamento da tricuriase é a(o)
- (A) secnidazol.
 - (B) metronidazol.
 - (C) pamoato de Pirantel.
 - (D) ivermectina.
 - (E) mebendazol.
- 32) Um profissional de saúde é vítima de exposição percutânea a material biológico e possui resposta vacinal conhecida (anti-HBS = 50 mUI/ml). O paciente-fonte é HBsAg positivo. A recomendação adequada de profilaxia para hepatite B para o profissional exposto deve ser
- (A) iniciar vacinação para hepatite B.
 - (B) administrar gamaglobulina hiperimune.
 - (C) iniciar uso de lamivudina.
 - (D) não adotar qualquer medida específica.
 - (E) administrar uma dose de vacina contra hepatite B e gamaglobulina hiperimune.
- 33) Em relação aos critérios de hospitalização de adultos com pneumonia adquirida na comunidade, assinale a opção correta.
- (A) Frequência respiratória acima de 28 irpm.
 - (B) Leucocitose.
 - (C) Tosse produtiva.
 - (D) Pneumonia multilobar.
 - (E) Febre alta.

- 34) Durante o tratamento do edema agudo de pulmão (EAP), administra-se um medicamento e o paciente evolui com hipotensão arterial e depressão ventilatória. Qual medicamento foi administrado?
- (A) Furosemida.
 - (B) Dobutamina.
 - (C) Dopamina.
 - (D) Morfina.
 - (E) Nitroglicerina.
- 35) Assinale a causa mais comum de insuficiência renal pós-renal, dentre as listadas abaixo.
- (A) Cálculos.
 - (B) Tumores vesicais.
 - (C) Hipertrofia prostática.
 - (D) Necrose tubular aguda.
 - (E) Glomerulonefrite membranosa.
- 36) A alteração eletrocardiográfica sugestiva de hiperpotassemia é a(o)
- (A) ondas T estreitas e pontiagudas.
 - (B) presença de onda U.
 - (C) onda T invertida e profunda.
 - (D) retificação do segmento ST.
 - (E) infradesnivel do segmento ST.
- 37) Em relação ao carcinoma de células renais, assinale a opção INCORRETA.
- (A) O diagnóstico é mais comum durante a sexta e sétima décadas de vida.
 - (B) Doença renal policística e tabagismo são exemplos de fatores de risco para a doença.
 - (C) A tríade clássica de hematúria, dor abdominal e massa no flanco ou abdome é observada em mais de 50% dos pacientes.
 - (D) O carcinoma de células claras é o subtipo histopatológico mais comum.
 - (E) Perda de peso e anemia ocorrem frequentemente e podem ser a única manifestação da doença.

- 38) Em relação às vasculites, assinale a alternativa correta.
- (A) A púrpura de Henoch-Schönlein é uma síndrome de vasculite sistêmica que acomete grandes vasos.
 - (B) A arterite de Takayasu é uma doença inflamatória que tem predileção pelo arco da aorta e seus ramos.
 - (C) Na arterite de células gigantes não encontramos uma predileção pelas artérias de médio e grande calibre.
 - (D) Na poliarterite nodosa há um comprometimento das artérias pulmonares e vasos brônquicos.
 - (E) Na Granulomatose de Wegner não observamos a vasculite do trato respiratório com glomerulonefrite associada.
- 39) Em pacientes portadores de diabetes a dosagem da hemoglobina glicada permite avaliar o/a (s)
- (A) grau de complicações do diabetes.
 - (B) controle glicêmico a longo prazo.
 - (C) tempo de evolução da doença.
 - (D) alterações agudas da glicemia.
 - (E) estado glicêmico durante as duas últimas semanas.
- 40) Dentre os medicamentos abaixo, qual o mais indicado para tratar a neurocisticercose?
- (A) Ganciclovir.
 - (B) Ceftriaxone.
 - (C) Tiabendazol.
 - (D) Praziquantel.
 - (E) Anfotericina B.

- 41) Em relação às doenças neoplásicas do intestino grosso, assinale a opção INCORRETA.
- (A) Os tumores do lado direito do cólon estão muitas vezes associados a hematoquezia, tenesmo e diminuição do calibre das fezes.
 - (B) Os tumores mais frequentes que acometem o intestino grosso consistem em pólipos benignos.
 - (C) É relatada uma correlação positiva entre o consumo de gordura saturada e a incidência de câncer de cólon.
 - (D) Menos de 5% dos adenomas colônicos transformam-se em carcinomas, podendo ser identificados diversos fatores significativos nessa transformação, particularmente o tamanho, tipo histológico e displasia epitelial.
 - (E) A colonoscopia é mais sensível que o clister opaco com duplo contraste para detectar pequenos adenomas e neoplasias.
- 42) Durante o atendimento a um paciente com diagnóstico clínico de acidente vascular encefálico, encontra-se a seguinte situação: abertura ocular - somente com a solicitação verbal; melhor resposta verbal - palavras impróprias; e melhor resposta motora - retirada. Neste caso, de acordo com a escala de Glasgow, qual o escore?
- (A) 09.
 - (B) 10.
 - (C) 11.
 - (D) 12.
 - (E) 15.
- 43) Ao avaliar um paciente com infarto agudo do miocárdio encontra-se alterações no seguimento ST nas derivações II, III e aVF. Qual a parede cardíaca que foi acometida pela injúria?
- (A) Inferior.
 - (B) Septal.
 - (C) Anterior.
 - (D) Lateral.
 - (E) Lateral alta.

- 44) O mesotelioma está relacionado à exposição crônica de
- (A) sílica.
 - (B) Berílio.
 - (C) alumínio.
 - (D) asbesto.
 - (E) pó de carvão.
- 45) A presença de pólipos colônicos associados a tumores dos tecidos moles e ossos, hipertrofia congênita do epitélio pigmentar retiniano, tumores desmóides no mesentério e cânceres ampulares caracteriza a síndrome de
- (A) Gardner.
 - (B) Turcot.
 - (C) Peutz-Jeghers.
 - (D) Cronkhite-Canada.
 - (E) Alport.
- 46) Em relação à síndrome nefrótica, é correto afirmar que
- (A) a doença por lesão mínima constitui o padrão mais frequente em adultos.
 - (B) é classicamente definida por albuminúria menor que 3g/dia, acompanhada de hipoalbuminemia, edema e hiperlipidemia.
 - (C) é baixa a probabilidade de se obter benefícios com a biópsia renal em pacientes adultos com proteinúria maciça e síndrome nefrótica.
 - (D) a glomeruloesclerose segmentar focal cursa frequentemente com redução do nível de complemento sérico.
 - (E) a nefropatia membranosa é o padrão mais comumente encontrado em pacientes com síndrome nefrótica associada à trombose da veia renal.
- 47) A que se deve, fundamentalmente, o uso de carbonato de cálcio na insuficiência renal crônica?
- (A) Antagonismo com o hormônio paratireóideo.
 - (B) Redução na absorção de potássio.
 - (C) Redução na absorção de fosfato.
 - (D) Efeito obstipante.
 - (E) Proteção da mucosa gástrica.

- 48) É exemplo de urticária mediada por imunocomplexos
- (A) dermatografismo.
 - (B) doença do soro.
 - (C) urticária solar.
 - (D) urticária ao frio.
 - (E) urticária colinérgica.
- 49) As manifestações clínicas mais comuns em pacientes portadores de feocromocitoma são:
- (A) abalos musculares, convulsões, astenia.
 - (B) irritabilidade, náuseas, distúrbios visuais.
 - (C) precordialgia, astenia, sudorese.
 - (D) cefaléia, sudorese, palpitações.
 - (E) dispnéia, parestesias, astenia.
- 50) Um paciente de 60 anos, portador de prótese de válvula mitral e sem alergia medicamentosa, será submetido a uma dilatação de uretra. O melhor esquema antibiótico para profilaxia de endocardite infecciosa é
- (A) ampicilina e gentamicina.
 - (B) amoxicilina e clindamicina.
 - (C) não prescrever qualquer antimicrobiano.
 - (D) vancomicina.
 - (E) amoxicilina.