

**MARINHA DO BRASIL**  
**DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA**

*(PROCESSO SELETIVO DE ADMISSÃO AOS  
PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA (PRM) DO  
HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS (HNMD) EM  
2009)*

PROVA: **AMARELA**

**NÃO ESTÁ AUTORIZADA A UTILIZAÇÃO DE  
MATERIAL EXTRA**

**ESPECIALIDADE COM PRÉ-REQUISITO  
EM CLÍNICA MÉDICA**

<b>Cardiologia</b>
<b>Gastroenterologia</b>
<b>Hemoterapia e Hematologia</b>
<b>Endocrinologia</b>

- 1) Assinale a opção que contém uma contraindicação absoluta para terapia trombolítica na Embolia Pulmonar.
  - (A) Diátese hemorrágica.
  - (B) Hipertensão grave não controlada.
  - (C) Cirurgia intracraniana.
  - (D) Cirurgia nos últimos dez dias.
  - (E) Gravidez.
  
- 2) As vítimas gravemente intoxicadas por monóxido de carbono têm indicação terapêutica de
  - (A) hemodiálise.
  - (B) antiarrítmicos.
  - (C) eletroconvulsoterapia.
  - (D) oxigênio hiperbárico.
  - (E) anticonvulsivantes.
  
- 3) Qual o critério de Jones na febre reumática é considerado menor?
  - (A) Cardite.
  - (B) Artralgia.
  - (C) Coréia de Sydenham.
  - (D) Nódulos subcutâneos.
  - (E) Eritema marginado.
  
- 4) Assinale a classe de medicamentos reconhecidos como agentes antiproteínúricos eficazes.
  - (A) Diuréticos de alça.
  - (B) Inibidores da enzima conversora da angiotensina.
  - (C) Estatinas.
  - (D) Antiagregantes plaquetários.
  - (E) Anticonvulsivantes.
  
- 5) Qual é a condição de doença renal crônica que pode estar associada a rins de tamanho normal?
  - (A) Estenose de artéria renal.
  - (B) Hipertensão arterial sistêmica.
  - (C) Gota.
  - (D) Amiloidose.
  - (E) Litíase renal.

- 6) As Doenças Intersticiais Pulmonares (DIP) representam um grupo grande e heterogêneo de transtornos do trato respiratório inferior que são considerados em conjunto devido às apresentações clínicas, radiográficas e fisiológicas compartilhadas. Em relação a classificação clínica da DIP, qual opção abaixo é exemplo de uma doença pulmonar primária?
- (A) Asbestose.
  - (B) Pneumonia eosinofílica crônica.
  - (C) Granulomatose de Wegener.
  - (D) Fibrose pulmonar idiopática.
  - (E) Lúpus eritematoso sistêmico.
- 7) Qual o tumor cardíaco primário mais frequente?
- (A) Mixoma.
  - (B) Lipoma.
  - (C) Rabdomioma.
  - (D) Linfoma.
  - (E) Fibroma.
- 8) Qual o fator de risco mais consistente no câncer de pâncreas?
- (A) Álcool.
  - (B) Tabagismo.
  - (C) Colelitíase.
  - (D) Diabetes Melito.
  - (E) Obesidade.
- 9) O agente etiológico da Doença de LYME é a(o)
- (A) Borrelia burdgorferi.
  - (B) Treponema pallidum.
  - (C) Haemophilus ducray.
  - (D) Candida albicans.
  - (E) Haemophilus influenzae.
- 10) O tipo histológico mais comum do hipernefroma é o
- (A) carcinoma de células papilíferas.
  - (B) carcinoma renal cromofóbico.
  - (C) carcinoma renal de células claras.
  - (D) oncocitoma renal.
  - (E) carcinoma do ducto coletor.

- 11) São causas de cirrose, EXCETO
- (A) brucelose.
  - (B) síndrome de Fanconi.
  - (C) doença de Wilson.
  - (D) pancreatite.
  - (E) amiodarona.
- 12) Um paciente de sete anos apresenta quadro agudo de púrpura palpável em nádegas e membros inferiores acompanhado de diarreia e poliartralgia. O diagnóstico mais provável é
- (A) púrpura trombocitopênica idiopática.
  - (B) febre reumática.
  - (C) giardíase.
  - (D) púrpura de HENOCCH SCHONLEIN.
  - (E) malária.
- 13) Qual o nível sérico é considerado fator prognóstico importante nos pacientes com diagnóstico de Linfoma Não-Hodgkin recente?
- (A) Ferritina.
  - (B) Amilase.
  - (C) Hemoglobina.
  - (D) Desidrogenase lática.
  - (E) Vitamina B12.
- 14) É(são) característica clínica do estágio II da encefalopatia hepática:
- (A) letargia, confusão moderada.
  - (B) confusão acentuada, fala incoerente.
  - (C) euforia.
  - (D) depressão.
  - (E) coma.
- 15) Em relação à doença de PAGET é INCORRETO afirmar que
- (A) mais de 95% dos pacientes são assintomáticos.
  - (B) os locais mais frequentes envolvidos na doença são a pelve, a coluna lombar e o fêmur.
  - (C) o débito cardíaco também pode estar aumentado e dar origem a uma insuficiência cardíaca por alto débito em pacientes com doença extensa.
  - (D) as síndromes espinhais ocorrem mais frequentemente quando a doença afeta a coluna torácica.
  - (E) a frequência da doença sintomática aumenta na puberdade.

Prova : Amarela Concurso : PRM/2009  
Profissão : ESPECIALIDADE COM PRÉ-REQUISITO EM CLÍNICA MÉDICA

- 16) Qual a causa mais comum de uma massa mediastinal em pacientes idosos?
- (A) Timoma.
  - (B) Linfoma.
  - (C) Lesões esofágicas.
  - (D) Tumor teratogênico.
  - (E) Carcinoma metastático.
- 17) Um paciente dá entrada na emergência com quadro de mal estar e sudorese. Ao exame físico apresenta frequência cardíaca em torno de 20 batimentos por minuto. Seu eletrocardiograma evidencia BAV de terceiro grau intermitente. Neste caso a conduta mais adequada é utilizar
- (A) atropina.
  - (B) noradrenalina.
  - (C) marca-passo temporário.
  - (D) cedilanide.
  - (E) beta bloqueador.
- 18) Em relação a um paciente que deu entrada na emergência com queixa de cefaléia e fraqueza muscular com início há alguns meses, seu exame físico revelou aumento da pressão arterial sistêmica, e seu exame laboratorial evidenciou hipocalemia, assinale a opção correta
- (A) Deve ser solicitado imediatamente uma pesquisa para exclusão de dengue.
  - (B) Deve ser feita insulino-terapia empírica (1U/Kg de peso) para evitar a evolução para um estado hiperosmolar.
  - (C) Caso haja relato de ingestão regular de álcool é importante evitar uso de solução salina, prevenindo a cardiopatia beribérica.
  - (D) O paciente deve receber corticoterapia em dose fisiológica pois os sintomas são típicos de insuficiência suprarrenal.
  - (E) É necessário excluir hipertensão arterial secundária a distúrbio endócrino.
- 19) Qual a neoplasia de tireóide de maior prevalência?
- (A) Folicular.
  - (B) Linfoma.
  - (C) Papilar.
  - (D) Anaplásico.
  - (E) Medular.

- 20) Um paciente que apresenta eritema nodoso, adenopatia hilar bilateral e visão turva sugere o diagnóstico de
- (A) sarcoidose.
  - (B) tuberculose.
  - (C) leishmaniose.
  - (D) histoplasmose.
  - (E) paracoccidioidomicose.
- 21) Qual das patologias abaixo pode cursar com derrame pleural transudativo?
- (A) Ruptura esofágica.
  - (B) Síndrome nefrótica.
  - (C) Pancreatite.
  - (D) Tuberculose.
  - (E) Pneumonia.
- 22) Dor abdominal epigástrica é causada mais frequentemente por
- (A) pancreatite.
  - (B) refluxo gastroesofágico.
  - (C) doença do trato biliar.
  - (D) dispepsia não-ulcerativa.
  - (E) neoplasia gástrica.
- 23) São considerados candidatos típicos para cirurgia bariátrica pacientes
- (A) com índice de massa corporal (IMC) acima de 40 Kg/m<sup>2</sup> e várias complicações médicas.
  - (B) com IMC entre 30-35Kg/m<sup>2</sup>.
  - (C) obesos, com qualquer IMC, podendo ser portadores de certos transtornos psiquiátricos, como personalidade borderline.
  - (D) com IMC de 30 Kg/m<sup>2</sup> e portador de hipertireoidismo.
  - (E) pacientes obesos com qualquer IMC.
- 24) Qual o sopro característico presente na ausculta cardíaca de um paciente com estenose aórtica?
- (A) Rufar diastólico.
  - (B) Ejeção sistólico.
  - (C) Apical holossistólico.
  - (D) Diástólico suave.
  - (E) Protodiastólico.

- 25) É achado clínico mais característico da Leishmaniose Visce-  
ral clássica:
- (A) cardiomegalia
  - (B) anasarca
  - (C) hepatoesplenomegalia
  - (D) linfonodomegalia
  - (E) derrame pleural
- 26) Assinale a opção que destaca uma característica da Doença de  
Crhon.
- (A) Acomete o reto podendo se estender até o ceco.
  - (B) O grau de inflamação do cólon é consistente e circunfe-  
rencialmente simétrico em qualquer nível.
  - (C) Presença de alterações inflamatórias transmurais.
  - (D) A inflamação fica confinada à mucosa e submucosa.
  - (E) Geralmente não envolve o intestino delgado.
- 27) São condições que caracterizam a síndrome da resposta infla-  
matória sistêmica (SRIS), EXCETO
- (A) leucocitose.
  - (B) frequência respiratória < 16 irpm.
  - (C) leucopenia.
  - (D) taquicardia.
  - (E) hipotermia.
- 28) Em relação à avaliação da função hepática pode-se afirmar  
que
- (A) a elevação não patológica da fosfatase alcalina sérica  
ocorre em crianças ou adolescentes em fase de cresci-  
mento ósseo acelerado.
  - (B) a AST (aspartato aminotransferase) é enzima encontrada  
somente no fígado e rins.
  - (C) a albumina sérica é sintetizada no baço.
  - (D) na doença de GILBERT é comum o aumento das aminotransfe-  
rases e da fosfatase alcalina.
  - (E) nos distúrbios hepatocelulares crônicos a albumina séri-  
ca encontra-se frequentemente em níveis normais.

- 29) O pneumotórax espontâneo secundário tem como principal causa
- (A) bolhas pleurais apicais.
  - (B) trauma torácico.
  - (C) ventilação mecânica.
  - (D) doença pulmonar obstrutiva crônica.
  - (E) pneumonia bacteriana.
- 30) São características do Tamponamento Cardíaco:
- (A) pulso paradoxal, baixa voltagem no ECG e cardiomegalia na radiografia de tórax.
  - (B) pulso paradoxal, ondas P anormais no ECG e calcificação pericárdica na radiografia de tórax.
  - (C) presença de B4 na ausculta cardíaca, alternância elétrica no ECG e derrame pericárdico no ecocardiograma.
  - (D) pulso paradoxal, presença de B3 na ausculta cardíaca e derrame pericárdico no ecocardiograma.
  - (E) ondas P anormais no ECG, cardiomegalia na radiografia de tórax e derrame pericárdico no ecocardiograma.
- 31) Qual é o principal efeito colateral dos estimulantes adrenérgicos?
- (A) Síncope.
  - (B) Hiporexia.
  - (C) Tremor.
  - (D) Rash cutâneo.
  - (E) Hipotensão arterial.
- 32) Em relação ao Lupus Eritematoso Sistêmico (LES) pode-se afirmar que
- (A) a manifestação pulmonar mais comum é o abscesso.
  - (B) a manifestação hematológica mais frequente é a trombocitose.
  - (C) quanto ao diagnóstico, o auto-anticorpo mais importante para a detecção é o teste FAN, já que este exame é positivo em mais de 95% dos pacientes, em geral no início dos sintomas.
  - (D) a base do tratamento para quaisquer manifestações inflamatórias do LES ameaçadoras à vida são os anti-inflamatórios não esteróides em doses elevadas.
  - (E) a artrite erosiva de uma articulação é um critério para o diagnóstico de LES.



- 33) Qual o patógeno que responde por cerca de 50% dos casos de Pneumonia Comunitária que necessitam de hospitalização?
- (A) Staphylococcus aureus.
  - (B) Haemophilus influenza.
  - (C) Legionella ssp.
  - (D) Moraxella catarrhalis.
  - (E) Streptococcus pneumoniae.
- 34) Em relação ao câncer de cólon e reto pode-se afirmar que os
- (A) estudos de população não encontraram correlações positivas entre o risco de câncer de cólon e reto e a ingestão de carne vermelha.
  - (B) tumores de cólon esquerdo (cólon distal) são geralmente massas polipóides e raramente levam à constrição da parede intestinal com obstrução.
  - (C) carcinomas epidermóides constituem 98% de todas as malignidades encontradas no intestino grosso.
  - (D) não há evidências de que a polipectomia endoscópica reduza a incidência e a mortalidade do câncer de colo e reto.
  - (E) pacientes portadores de pólipos adenomatosos geralmente permanecem assintomáticos mas podem se apresentar com um exame de sangue oculto nas fezes positivo ou com hematoquezia evidente.
- 35) Dentre os tumores de esôfago listados abaixo, qual é o mais comum?
- (A) Leiomioma.
  - (B) Lipoma.
  - (C) Linfoma.
  - (D) Leiomiossarcoma.
  - (E) Carcinoma epidermóide.
- 36) São medicamentos contraindicados como terapia anti-hipertensiva na gestação:
- (A) bloqueadores do receptor da angiotensina e inibidores da ECA.
  - (B) metildopa e bloqueadores do receptor da angiotensina.
  - (C) hidralazina e metildopa.
  - (D) inibidores da ECA e hidralazina.
  - (E) hidralazina e betabloqueadores.

- 37) Com relação à Fibrose Cística (FC) é correto afirmar que
- (A) é raro o acometimento do trato respiratório superior.
  - (B) o *Streptococcus pneumoniae* é geralmente o primeiro microorganismo isolado das amostras de secreções pulmonares dos pacientes com fibrose cística recém-diagnosticada.
  - (C) a primeira anormalidade na radiografia de tórax é a bronquiectasia.
  - (D) dentre as complicações intermitentes, o pneumotórax é a menos comum.
  - (E) tendo em vista o grande número de mutações no gene da FC, a análise do DNA não é usada como principal recurso diagnóstico.
- 38) O tratamento da infecção por *Helicobacter Pylori* pode ser desconsiderada quando o paciente apresenta
- (A) linfoma Malt.
  - (B) úlcera gástrica.
  - (C) gastrite crônica.
  - (D) úlcera duodenal.
  - (E) úlcera gástrica em remissão.
- 39) Assinale uma causa de Cardiomiopatia restritiva.
- (A) Miocardite infecciosa viral.
  - (B) Álcool.
  - (C) Distrofia de Duchene.
  - (D) Ciclofosfamida.
  - (E) Sarcoidose.
- 40) São manifestações iniciais da Insuficiência renal crônica:
- (A) hipertensão, anemia e serosite.
  - (B) hipertensão, proteinúria e hematúria macroscópica.
  - (C) síndrome nefrótica, insuficiência cardíaca e vômitos.
  - (D) hipertensão, neuropatia periférica e hiperpotassemia.
  - (E) anemia, hiperpotassemia e confusão mental.
- 41) É considerado contraindicação absoluta para o transplante hepático o paciente apresentar
- (A) idade > 70 anos.
  - (B) trombose de veia hepática.
  - (C) câncer extra-hepatobiliar.
  - (D) insuficiência renal.
  - (E) soropositividade ao HIV.

- 42) Qual é a causa mais frequente da Síndrome da Veia Cava Superior?
- (A) Linfoma.
  - (B) Histoplasmose.
  - (C) Aneurisma aórtico.
  - (D) Carcinoma broncogênico.
  - (E) Tireóide retroesternal.
- 43) Com relação ao Aneurisma de aorta é correto afirmar que o(s)
- (A) aneurismas de aorta abdominal são mais comuns em mulheres do que em homens.
  - (B) aneurismas de aorta abdominal são muito mais comuns do que os aneurismas torácicos.
  - (C) entre os aneurismas de aorta torácica, os aneurismas de aorta ascendente são os mais comuns.
  - (D) formato de um aneurisma é fusiforme quando há uma dilatação sacular da aorta.
  - (E) aneurismas de aorta torácica, geralmente, podem ser palpados.
- 44) A DOENÇA DE CUSHING é produzida por
- (A) tumor hipofisário secretor de ACTH.
  - (B) carcinoma de supra-renal.
  - (C) adenoma de supra-renal.
  - (D) neoplasia não-hipofisária de ACTH.
  - (E) doença supra-renal micronodular.
- 45) Um adulto jovem com estenose mitral leve realizará extração dentária múltipla com anestesia geral. É mandatário iniciar no pré-operatório o uso de
- (A) heparina de baixo peso molecular.
  - (B) IECA.
  - (C) diurético.
  - (D) antiinflamatório não-hormonal.
  - (E) antibiótico.
- 46) São indicações para o tratamento com interferon em pacientes portadores de hepatite B crônica, EXCETO
- (A) marcadores detectáveis de replicação do HBV.
  - (B) ALT < 2 vezes o limite superior do normal.
  - (C) ALT > 2 vezes o limite superior do normal.
  - (D) imunocompetente.
  - (E) hepatite crônica HbeAg-negativa.

- 47) A radiografia de tórax de um paciente asmático frequentemente apresenta
- (A) imagem normal.
  - (B) hiperinsuflação pulmonar.
  - (C) pneumotórax.
  - (D) velamento de seios costofrênicos.
  - (E) condensação pulmonar.
- 48) Em relação a um paciente que foi trazido por familiares à emergência com história de perda súbita da consciência ocorrida há cerca de três horas, que é hipertenso e diabético, mas faz tratamento irregular, assinale a opção correta.
- (A) Os sintomas sugerem descompensação por cetoacidose diabética. A primeira medida é iniciar reposição de bicarbonato de sódio.
  - (B) O paciente deve ser submetido a avaliação quanto à ocorrência de acidente vascular encefálico (AVE). Uma punção lombar pode ser realizada inicialmente.
  - (C) Caso o exame clínico revele membros hipotônicos fica excluído AVE, pois a hipertonia muscular é característica da fase aguda dessa entidade.
  - (D) O exame tomográfico do crânio serve como guia de pesquisa etiológica e abordagem terapêutica.
  - (E) A história é muito sugestiva de crise epiléptica provocada pelo descuido no tratamento.
- 49) As doenças glomerulares induzidas por antiinflamatórios não-esteróides têm como lesão morfológica
- (A) nefropatia membranosa.
  - (B) glomerulonefrite rapidamente progressiva.
  - (C) glomerulosclerose segmentar focal.
  - (D) glomerulonefrite necrosante.
  - (E) doenças por lesão mínima (habitualmente nefrite intersticial).
- 50) Qual é o procedimento de imagem diagnóstica de escolha para avaliação e análise qualitativa da suspeita de Derrame Pericárdico?
- (A) Ecocardiograma transtorácico.
  - (B) Cintilografia miocárdica.
  - (C) Radiografia de tórax.
  - (D) Ecocardiograma transesofágico.
  - (E) Tomografia de tórax.