

MARINHA DO BRASIL
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA

(PROCESSO SELETIVO DE ADMISSÃO AO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM NÍVEL DE ESPECIALIZAÇÃO, SOB A FORMA DE TREINAMENTO EM SERVIÇO PARA ENFERMEIROS, NOS MOLDES DE RESIDÊNCIA DE ENFERMAGEM (C-EENF) DO HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS (HNMD) EM 2011)

**NÃO ESTÁ AUTORIZADA A UTILIZAÇÃO DE
MATERIAL EXTRA**

**ENFERMAGEM CLÍNICA E
CIRÚRGICA**

- 1) Segundo Marangoni e Schechter, a hemocultura é o único teste que estabelece o diagnóstico de bacteremia. A correlação entre o volume de sangue colhido e a positividade do exame é de grande importância. Assinale a opção que corresponde ao volume de sangue mínimo, recomendado por coleta.
- (A) 2ml
 - (B) 4ml
 - (C) 6ml
 - (D) 8ml
 - (E) 10ml
- 2) As mulheres grávidas têm risco acrescido de síndrome tromboembólica, devido às alterações fisiológicas associadas com a gestação. Em relação à síndrome tromboembólica, segundo Rezende, assinale a opção **INCORRETA**.
- (A) A varicoflebite acomete o sistema profundo e determina embolia.
 - (B) A perna esquerda é a mais acometida em 90% dos casos.
 - (C) O tratamento farmacológico poderá ser feito com Warfarina.
 - (D) Cor pulmonale, dispnéia, escarro hemoptóico e taquicardia são os sinais torácicos da síndrome.
 - (E) Nas tromboflebitides de membros inferiores é assídua a dor na panturrilha provocada ao executar-se a dorsiflexão do pé.
- 3) O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem leva em consideração, prioritariamente, a necessidade e o direito de Assistência de Enfermagem à população e de sua organização. Em relação ao Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem assinale a afirmativa correta.
- (A) É dever do profissional associar-se, exercer cargos e participar de atividades de Entidades de Classe.
 - (B) A multa é uma penalidade que consiste na obrigatoriedade de pagamento de 01 a 10 vezes o valor da anuidade da categoria profissional à qual pertence o infrator.
 - (C) A suspensão é uma penalidade que consiste na perda do direito do Exercício da Enfermagem.
 - (D) A penalidade de cassação do registro profissional é de competência do conselho regional de Enfermagem.
 - (E) São consideradas infrações graves as que provoquem morte, deformidade permanente, perda ou inutilização de membro, sentido ou função, ou ainda, dano moral irreparável.

Prova : Amarela
Profissão : ENFERMAGEM CLÍNICA E CIRÚRGICA

Concurso : C-EENF/11

- 4) Um paciente do sexo masculino, de 62 anos, foi submetido à cirurgia de revascularização do miocárdio. Na Unidade Coronariana, a enfermeira fez o diagnóstico de débito cardíaco diminuído relacionado à perda sanguínea e função miocárdica comprometida. Segundo Brunner, quais das ações a seguir podem ser implementadas para restaurar o débito cardíaco de acordo com o diagnóstico de enfermagem estabelecido?
- (A) Auscultar o tórax para os sons respiratórios.
 - (B) Pesar diariamente quando o paciente está deambulando.
 - (C) Observar para as distorções da percepção, alucinações e desorientações.
 - (D) Aspirar as secreções traqueobrônquicas de acordo com a necessidade.
 - (E) Avaliar os pulsos periféricos (pedioso, tibial, radial, carotídeo).
- 5) Segundo Brunner e Suddarth, a insuficiência respiratória aguda (IRA) é definida como uma queda na pressão de oxigênio arterial (PaO₂) e uma elevação na pressão de dióxido de carbono (PaCo₂). Assinale a opção que indica hipoxemia e hipercapnia, respectivamente.
- (A) PaO₂ 60 mmHg e PaCo₂ 30 mmHg.
 - (B) PaO₂ 70mmHg e PaCo₂ 20mmHg.
 - (C) PaO₂ 30mmHg e PaCo₂ 60mmHg.
 - (D) PaO₂ 55mmHg e PaCo₂ 25mmHg.
 - (E) PaO₂ 80mmHg e PaCo₂ 30mmHg.
- 6) Segundo Kaplan e Sadock, a esquizofrenia é um transtorno de causas desconhecidas, caracterizada por sintomas psicóticos. São sinais e sintomas de esquizofrenia, **EXCETO**
- (A) delírios e estupor.
 - (B) alucinações e negativismo.
 - (C) discurso desorganizado e agitação.
 - (D) embotamento afetivo e ecolalia.
 - (E) dificuldade de concentração e insônia terminal.

- 7) As queimaduras são classificadas de acordo com a profundidade da destruição tecidual. A profundidade da queimadura determina se ocorrerá a reepitelização. Segundo Brunner, um indivíduo que apresenta uma lesão por queimadura de base avermelhada mosqueada, bolhosa, edema, dor e hiperestesia, apresenta uma queimadura de espessura
- (A) parcial superficial.
 - (B) plena profunda.
 - (C) total profunda.
 - (D) parcial profunda.
 - (E) plena.
- 8) O término da gravidez antes da viabilidade é definido como abortamento. Segundo Ziegel, o aborto que se caracteriza pela presença de sangramento, com dilatação cervical progressiva, e frequentemente, ruptura das membranas com perda de líquido amniótico é designado
- (A) incompleto.
 - (B) retido.
 - (C) habitual.
 - (D) inevitável.
 - (E) completo.
- 9) Segundo Kawamoto, o termo anidrose refere-se à
- (A) perda da força motora dos músculos.
 - (B) ausência ou diminuição do suor.
 - (C) debilidade muscular.
 - (D) sensação de fraqueza.
 - (E) diminuição da secreção salivar.
- 10) Segundo Brunner e Suddarth, a calota craniana contém o tecido cerebral, sangue e líquido cefalorraquidiano. O volume e a pressão desses três componentes estão, em geral, em um estado de equilíbrio e produzem a pressão intracraniana (PIC). A PIC normal é de (em mmHg)
- (A) 30 a 40
 - (B) 10 a 20
 - (C) 8 a 12
 - (D) 5 a 8
 - (E) 2 a 4

11) Analise as afirmativas abaixo, segundo Lolita Silva.

- I - Após a administração do Fentanil deve-se observar a pressão arterial e frequência respiratória, pois a droga pode ocasionar hipertensão e taquicardia.
- II - O gluconato de cálcio não deve ser utilizado em pacientes com intoxicação digitalica e hipercalemia.
- III- A hipoglicemia é uma das reações adversas ocasionadas pela furosemida.
- IV - A nitroglicerina é um agente hipotensor severo.
- V - Paralisia flácida, bloqueio neuromuscular e tremores são sintomas que podem aparecer após o uso do sulfato de magnésio.

Assinale a opção correta.

- (A) As afirmativas I, II, III, IV e V são corretas.
- (B) Apenas as afirmativas I, II e III são corretas.
- (C) Apenas as afirmativas I, III e IV são corretas.
- (D) Apenas as afirmativas II, IV e V são corretas.
- (E) Apenas as afirmativas III, IV e V são corretas.

12) Segundo Sylvia Hinrichsen, o cateterismo do trato urinário é uma prática comum em todas as unidades hospitalares. As infecções associadas à sondagem vesical são, portanto, freqüentes e preveníveis. Assinale a opção que contém um cuidado importante na prevenção de infecções do trato urinário.

- (A) Dar preferência à sondagem vesical de demora.
- (B) Trocar periodicamente a sonda vesical de demora.
- (C) Realizar a lavagem do sistema quando houver obstrução.
- (D) Manter a bolsa coletora abaixo do nível da bexiga.
- (E) Desconectar a sonda vesical de demora, do tubo coletor, em intervalos regulares.

- 13) A adrenalina é um neurotransmissor do sistema simpático e constitui-se numa das principais drogas manipuladas pela Enfermagem na terapia Intensiva. Segundo SILVA, pode-se citar como cuidado e justificativa de Enfermagem para o uso da referida droga:
- (A) registrar características da função intestinal, pois pode ocorrer diarreia devido à terapêutica.
 - (B) registrar glicemia capilar, pois a hiperglicemia é uma das complicações associadas.
 - (C) observar e registrar distúrbios visuais, pois a administração da droga acarreta visão turva.
 - (D) observar sinais de secura na boca e narinas, pois são características de sintomas adversos.
 - (E) observar córnea e conjuntiva ocular, pois poderá ocorrer ressecamento de córnea devido à deposição de cristais.
- 14) Segundo Ziegel, o bebê pequeno para idade gestacional (PIG) é geralmente definido como aquele cujo peso é inferior a 10% do que é esperado naquela idade gestacional. Em relação às características do recém-nascido PIG, assinale a opção correta.
- (A) No bebê PIG há grande risco de asfixia, porém o risco de aspiração é diminuído.
 - (B) Pode-se citar como causas do retardo do crescimento fetal a idade materna avançada e a nuliparidade.
 - (C) A hiperglicemia de rebote ocorre nos bebês PIG devido a má nutrição intra-uterina.
 - (D) Devido a grande reserva de glicogênio, o bebê PIG apresenta o risco aumentado de estresse ao frio.
 - (E) A policitemia se desenvolve nos bebês PIG como consequência da hipoxia intra-uterina crônica.
- 15) Segundo Sylvania Hinrichsen, na prevenção de processos infecciosos hospitalares, é fundamental que se observem as trocas de cateteres, curativos, sondas e outros materiais. Considerando-se esta afirmativa, assinale a opção correta.
- (A) O macronebulizador deve ser trocado uma vez por semana.
 - (B) A máscara de Venturi deve ser trocada a cada 72 horas.
 - (C) Trocar sonda vesical e bolsa coletora somente quando apresentar obstrução, vazamento ou desconexão do circuito fechado.
 - (D) Trocar o equipo de macro e microgotas a cada 06 h.
 - (E) O curativo de subclávia deve ser trocado com 48h, o tradicional e 7 a 10 dias, película transparente.

Prova : Amarela
Profissão : ENFERMAGEM CLÍNICA E CIRÚRGICA

Concurso : C-EENF/11

- 16) Segundo Brunner e Suddarth, o diabetes Mellitus é um grupo de doenças metabólicas caracterizadas por níveis elevados de glicose no sangue decorrentes dos defeitos na secreção e/ou ação da insulina. Assinale a opção que corresponde à ação da insulina.
- (A) Inibir o armazenamento de glicose no fígado e músculos.
 - (B) Reduzir o armazenamento de lipídios da dieta no tecido adiposo.
 - (C) Transportar e metabolizar a glicose para a produção de energia.
 - (D) Reduzir o transporte de aminoácidos para as células.
 - (E) Sinalizar ao fígado para manter a liberação de glicose.
- 17) Segundo Sylvia Hinrichsen, as doenças que requerem isolamento são as altamente contagiosas e/ou com grande ou pequena virulência que podem ser transmitidas pelo ar, por perdigotos ou pelo contato direto ou indireto. São doenças transmitidas pelo ar:
- (A) sarampo e tuberculose pulmonar.
 - (B) herpes-Zoster Varicela (HZV) e caxumba.
 - (C) sarampo e caxumba.
 - (D) rubéola e meningite por Neisseria Meningitides.
 - (E) pneumonia estreptocócica e tuberculose pulmonar.
- 18) O Programa Nacional de Imunizações tem como objetivo, em primeira instância, o controle de doenças imunopreveníveis através de amplas coberturas vacinais. De acordo com Manual de Normas de Vacinação, **NÃO** é contra-indicada a aplicação de vacinas de bactérias ou vírus vivos atenuados em pessoas
- (A) com imunodeficiência congênita ou adquirida.
 - (B) com neoplasia maligna.
 - (C) em tratamento com corticosteróides em esquemas imunodepressores.
 - (D) submetidas à radioterapia.
 - (E) desnutridas.

- 19) O processo imunológico pelo qual se desenvolve a proteção conferida pelas vacinas compreende o conjunto de mecanismos através dos quais o organismo humano reconhece uma substância como estranha. De acordo com Manual de Normas de Vacinação, em relação às vacinas, assinale a afirmativa correta.
- (A) A vacina contra hepatite B apresenta seus componentes antigênicos sob forma de vírus inativado.
 - (B) A vacina contra raiva apresenta seus componentes antigênicos sob forma de frações de vírus.
 - (C) A vacina BCG apresenta seus componentes antigênicos sob forma de bactérias mortas ou avirulentas.
 - (D) Nas áreas endêmicas (onde há casos humanos) a idade mínima de vacinação contra a febre amarela é de um ano.
 - (E) Nas áreas onde há apenas casos em macacos (áreas enzoóticas ou epizooticas) a idade mínima de vacinação contra a febre amarela é de nove meses.
- 20) Segundo Rezende, pode-se citar como sinais de probabilidade de gravidez:
- (A) amenorréia, náuseas e congestão mamária.
 - (B) aumento do volume uterino, náuseas e congestão mamária.
 - (C) amenorréia, aumento do volume uterino e alteração da forma uterina.
 - (D) aumento do volume uterino, náuseas e polaciúria.
 - (E) amenorréia, sinal de PUZOS e alteração da forma uterina.
- 21) Interromper o sangramento é essencial para o cuidado e sobrevida dos pacientes em uma situação de emergência. A Hemorragia que resulta na redução do volume de sangue circulante é uma causa primária de choque. Segundo Brunner são sinais e sintomas do choque hipovolêmico, **EXCETO**
- (A) pele fria e úmida.
 - (B) enchimento capilar acelerado.
 - (C) acidose metabólica.
 - (D) hiperpnéia.
 - (E) frequência de pulso crescente.

- 22) Segundo Brunner e Suddarth, a sobrevivência das vítimas de queimadura depende da reanimação adequada com líquidos. É alteração hidroeletrólítica observada na fase de emergência/reanimação:
- (A) aumento do débito urinário
 - (B) hemodiluição
 - (C) alcalose metabólica
 - (D) déficit de sódio
 - (E) aumento do volume sanguíneo.
- 23) A biópsia do rim é utilizada no diagnóstico e avaliação da extensão da doença renal. Segundo Brunner, um dos principais cuidados de enfermagem depois que um paciente submete-se a este procedimento é
- (A) monitorar os sinais vitais a cada 5 a 15 minutos, durante a primeira hora.
 - (B) avaliar os padrões de micção.
 - (C) avaliar o nível de dor.
 - (D) reforçar a informação fornecida para o paciente sobre o resultado do procedimento.
 - (E) atentar para sinais de dispnéia.
- 24) Segundo Brunner e Suddarth, o choque séptico é o tipo mais comum de choque circulatório, sendo causado pela infecção disseminada. Assinale a opção que contém um dos sinais e sintomas de choque séptico na primeira fase (fase hiperdinâmica e progressiva).
- (A) Frequência cardíaca diminuída.
 - (B) Hipotermia.
 - (C) Anúria.
 - (D) Frequência respiratória aumentada.
 - (E) Palidez.
- 25) Segundo o Manual de Normas de Vacinação, o aparecimento de cefaléia, mialgia, artralgia, diminuição do tônus muscular e parestesia plantar pode ocorrer após administração da vacina
- (A) BCG.
 - (B) contra Sarampo e Rubéola.
 - (C) contra o Tétano.
 - (D) contra a Raiva.
 - (E) contra a Hepatite B.

- 26) Uma das complicações da Nutrição Parenteral Total é a hiperglicemia. Segundo Brunner, uma das ações de enfermagem para esta complicação é
- (A) monitorar os sinais vitais.
 - (B) monitorar a velocidade de infusão horária.
 - (C) observar quanto a estupor, confusão, letargia.
 - (D) observar quanto a fraqueza, tremores, cefaléia.
 - (E) colocar o paciente em decúbito lateral.
- 27) Segundo Sylvia Hinrichsen, a lavagem das mãos deve ser um hábito entre os profissionais de saúde, pois é de extrema importância no controle das infecções hospitalares. Considerando-se esta afirmativa, assinale a opção correta.
- (A) A lavagem das mãos com sabão antisséptico acentua a redução na carga microbiana.
 - (B) Lavar as mãos com água quente diminui a incidência de dermatites.
 - (C) É desnecessário trocar as luvas em cirurgias com duração superior a duas horas e antes do implante de próteses.
 - (D) O uso de luvas substitui a lavagem das mãos.
 - (E) Não é necessário trocar as luvas ao mudar de um local infectado para outro, enquanto com o mesmo paciente.
- 28) Coloque F (falso) ou V (verdadeiro) nas afirmativas abaixo, em relação ao tratamento da diarreia aguda em crianças, assinalando a seguir a opção correta.
- () Um dos principais objetivos do tratamento da diarreia aguda inclui a avaliação do equilíbrio hidroeletrólítico.
 - () Na hipótese de desidratação grave devido a diarreia deve-se forçar a criança a ingerir líquidos.
 - () Os vômitos constituem uma contra-indicação a Terapia de Reidratação Oral.
 - () Os medicamentos antidiarreicos não estão recomendados no tratamento da diarreia infecciosa aguda.
- (A) (V) (F) (F) (V)
 - (B) (V) (V) (V) (F)
 - (C) (V) (F) (V) (V)
 - (D) (F) (V) (V) (V)
 - (E) (F) (F) (F) (V)

- 29) Segundo Brunner e Suddarth, o equilíbrio hidroeletrólítico é um processo dinâmico crucial para a vida. São sinais e sintomas de déficit de volume líquido (hipovolemia):
- (A) ganho agudo de peso e pulso rápido.
 - (B) turgor da pele diminuído e câibras.
 - (C) veias jugulares distendidas e diminuição da pressão arterial.
 - (D) pressão venosa central elevada e estertores.
 - (E) edema e oligúria.
- 30) A vacina contra a tuberculose é o BCG (bacilo de Calmette & Guérin) liofilizado, obtido por atenuação do *Mycobacterium bovis*. Segundo o Manual de Normas de Vacinação, em relação à aplicação da BCG, assinale a opção correta.
- (A) Deve ser aplicada em todos os indivíduos portadores do vírus da imunodeficiência humana.
 - (B) teste tuberculínico (PPD) é indispensável, antes ou depois da aplicação do BCG.
 - (C) Devem-se vacinar os comunicantes de casos de Hanseníase com duas doses de BCG.
 - (D) Se a primeira dose da vacina for aplicada com seis anos de idade ou mais, há necessidade de revacinação com 10 anos.
 - (E) Devem-se vacinar as gestantes comunicantes de casos de hanseníase a partir do 2º trimestre da gravidez.
- 31) O tumor de Wilms é o mais comum tumor maligno renal e intra-abdominal da infância. De acordo com Wong, assinale o cuidado de Enfermagem indicado no pré-operatório de criança portadora do tumor de Wilms.
- (A) Medida do perímetro torácico.
 - (B) Medida da circunferência abdominal.
 - (C) Evitar a palpação do tumor.
 - (D) Averiguar peso diariamente.
 - (E) Averiguar frequência cardíaca.

- 32) As drogas antineoplásicas podem ser vesicantes ou irritantes, provocando, dessa forma, reações severas, quando em contato com a pele. Segundo Kawamoto, um dos principais cuidados de enfermagem implementados quando do extravasamento desse tipo de droga é
- (A) após o término da infusão, aplicar compressas geladas.
 - (B) diminuir o gotejamento e esperar que termine a infusão para completar a dose prescrita.
 - (C) interromper de imediato a infusão da droga e aplicar compressas frias.
 - (D) após o término da infusão, aplicar compressas quentes.
 - (E) retirar o acesso venoso, e manter o membro junto ao corpo, ao nível da pelve.
- 33) As mulheres grávidas são suscetíveis a todos os agentes infecciosos que podem afetar a população em geral. Segundo Rezende, a recomendação para que as gestantes realizem rastreamento baseado na cultura vaginal tem como objetivo detectar o microorganismo
- (A) *Toxoplasma gondii*.
 - (B) *Streptococcus agalactiae*.
 - (C) *Candida albicans*.
 - (D) *Treponema pallidum*.
 - (E) Citomegaloviro.
- 34) No quadro de reação anafilática severa, a terapia apropriada deve ser instituída imediatamente. Segundo Brunner, na terapia com drogas, os anti-histamínicos e corticóides agem para a redução da(o)
- (A) broncoespasmo e do angioedema.
 - (B) arritmia cardíaca e do broncoespasmo.
 - (C) urticária e do broncoespasmo.
 - (D) arritmia cardíaca e do angioedema.
 - (E) urticária e do angioedema.
- 35) Segundo Kawamoto, a posição indicada para a realização de clister e lavagem intestinal é a posição
- (A) dorsal.
 - (B) de Fowler.
 - (C) de Trendelenburg.
 - (D) de Sim's.
 - (E) genupeitoral.

- 36) Segundo Brunner e Suddarth, a seguinte prescrição de enfermagem é indicada a pacientes que se submetem à cirurgia renal:
- (A) restringir ao máximo a deambulação.
 - (B) manter o sistema de drenagem aberto.
 - (C) desencorajar respirações profundas.
 - (D) pesar semanalmente o paciente.
 - (E) fazer medições exatas da ingesta e débito.
- 37) Devido ao planejamento ser um processo complexo e consciente, ele pode ser prejudicado por diversos fatores. Segundo Marquis e Huston, um dos fatores que prejudicam o bom planejamento é(são) o(s)
- (A) detalhes suficientes nas atividades de planejamento.
 - (B) uso adequado de planos e resistência à mudança por parte dos indivíduos.
 - (C) uso consistente de planejamento de ação e não de reação.
 - (D) planos utilizados para controlar e não para influenciar ou orientar.
 - (E) excesso de conhecimento e habilitação com relação a como planejar.
- 38) Semanas à meses são necessários para a consolidação da maioria das fraturas. As complicações das fraturas situam-se dentro de duas categorias - iniciais e tardias. Segundo Brunner, considerando-se as complicações iniciais das fraturas, assinale a opção que apresenta as complicações mais comuns.
- (A) Dor, arritmia cardíaca, síndrome compartimental, infecção.
 - (B) Hemorragia, embolia gordurosa, dor, arritmia cardíaca.
 - (C) Síndrome compartimental, tromboembolia, trombose venosa profunda, coagulopatia vascular disseminada, infecção.
 - (D) Desequilíbrio eletrolítico, dor, tromboembolia, hemorragia.
 - (E) Infecção, arritmia cardíaca, hemorragia, desequilíbrio eletrolítico.

- 39) Um paciente permanece na Unidade de Recuperação Pós-Anestésica (URPA) até que tenha se recuperado plenamente do agente anestésico. Segundo Brunner, dentre as medidas empregadas para determinar a aptidão do paciente para alta desta unidade está a(o)
- (A) dor mínima.
 - (B) náuseas e vômitos presentes.
 - (C) leve desorientação.
 - (D) hipotensão leve.
 - (E) débito urinário de, pelo menos, 20 ml/h.
- 40) Diversos tipos de deformidades cranianas são observados na primeira infância. Em relação às deformidades cranianas e suas características, assinale a opção correta.
- (A) Oxicefalia é o fechamento prematuro das suturas coronais, fazendo com que o crânio seja encurtado na direção ântero-posterior.
 - (B) Plagiocefalia é o fechamento unilateral de uma sutura coronal ou lambdoidal, fazendo com o crânio se torne assimétrico.
 - (C) Escafocefalia é o fechamento prematuro de uma ou mais suturas da calota craniana.
 - (D) Craniossinostose é o fechamento prematuro da sutura sagital, fazendo com que o crânio se torne alongado.
 - (E) Braquicefalia é o fechamento prematuro de qualquer sutura craniana, acarretando deformidade facial típica (olhos espaçados e maxila hipoplásica).
- 41) Segundo Marangoni e Schechter, o dengue é uma doença infecciosa febril aguda, benigna na maior parte dos casos. São manifestações clínicas do dengue "clássico":
- (A) febre alta e mialgia.
 - (B) hipertensão e oligúria.
 - (C) opressão torácica e prurido.
 - (D) poliúria e acidose metabólica.
 - (E) mucosite e supressão medular.

- 42) A teofilina é uma metilxantina usada no tratamento da asma em crianças. Segundo Wong, pode-se citar como sintomas da toxicidade da teofilina:
- (A) taquicardia, taquipneia, anorexia e vômitos.
 - (B) bradicardia, taquipneia, anorexia e vômitos.
 - (C) taquicardia, irritabilidade, náusea e convulsões.
 - (D) bradicardia, irritabilidade, náusea e convulsões.
 - (E) bradicardia, letargia, náusea e convulsões.
- 43) Segundo Marquis e Huston, há vários tipos de planejamento. Na maioria das organizações, estes planos formam uma hierarquia. A pirâmide da hierarquia do planejamento, da base para o topo, é formada por
- (A) normas, procedimentos, políticas, objetivos, metas, filosofia e missão.
 - (B) procedimentos, normas, objetivos, metas, políticas, filosofia e missão.
 - (C) missão, filosofia, metas, normas, procedimentos, políticas e objetivos.
 - (D) objetivos, metas, políticas, normas, procedimentos, filosofia e missão.
 - (E) filosofia, missão, normas, procedimentos, políticas, objetivos e metas.
- 44) Em uma unidade de internação foi prescrito 1,5g de Keflin, EV de 6/6 horas. A apresentação do frasco disponível na unidade é de 250 mg, em pó e a ampola com diluente de 5 ml. Quantos frascos do antibiótico serão usados nas 24 horas de internação deste paciente?
- (A) 06
 - (B) 12
 - (C) 18
 - (D) 24
 - (E) 30

- 45) Segundo Wong, a presença de íleo meconial, deficiência de vitaminas lipossolúveis, baqueteamento dos dedos das mãos e dos pés, tosse paroxística associada à evacuações soltas e liquefeitas são manifestações clínicas da
- (A) pneumonia.
 - (B) fibrose cística.
 - (C) bronquiolite.
 - (D) asma.
 - (E) coqueluche.
- 46) A consideração mais importante em qualquer traumatismo craniano é se o cérebro está lesado. Segundo Brunner, dentre as lesões cerebrais, a concussão pode ser definida como uma
- (A) lesão mais grave na qual o cérebro é contundido, com possível hemorragia superficial.
 - (B) lesão difusa que envolve o comprometimento disseminado dos axônios nos hemisférios cerebrais.
 - (C) lesão grave na qual o cérebro é contundido, com hemorragia profunda difusa.
 - (D) lesão difusa que envolve o corpo caloso e tronco cerebral.
 - (E) perda temporária da função neurológica sem comprometimento estrutural aparente.
- 47) Segundo Brunner e Suddarth, as metas da diálise peritoneal são remover as substâncias tóxicas e resíduos metabólicos e restabelecer o equilíbrio hidroeletrolítico normal. São complicações da diálise peritoneal:
- (A) náusea e vômito.
 - (B) peritonite e sangramento.
 - (C) cáibra muscular e embolia gasosa.
 - (D) dor torácica e hipertrigliceridemia.
 - (E) hipotensão e convulsões.
- 48) De acordo com Rezende no ciclo gestatório patológico, a presença de cetonúria, fraqueza muscular acentuada, oligúria e síndrome de KORSAKOFF caracterizam a (o)
- (A) hiperêmese gravídica.
 - (B) toxemia gravídica.
 - (C) prenhez ectópica.
 - (D) coriocarcinoma.
 - (E) mola hidatiforme.

- 49) Segundo Brunner e Suddarth, o choque cardiogênico acontece quando o coração não consegue bombear sangue suficiente para suprir a quantidade de oxigênio necessária para os tecidos. É sinal clássico de choque cardiogênico:
- (A) inquietação.
 - (B) pressão arterial alta.
 - (C) pulso forte.
 - (D) pele quente.
 - (E) estertores respiratórios diminuídos.
- 50) O processo de enfermagem é uma abordagem de resolução de problemas deliberada para atender às necessidades de cuidado de saúde e de enfermagem de uma pessoa. Segundo Brunner, o exame físico está incluído em qual etapa deste processo?
- (A) Planejamento.
 - (B) Diagnóstico.
 - (C) Implementação.
 - (D) Evolução.
 - (E) Histórico.