

MARINHA DO BRASIL
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA

(PROCESSO SELETIVO DE ADMISSÃO AO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM NÍVEL DE ESPECIALIZAÇÃO, SOB A FORMA DE TREINAMENTO EM SERVIÇO PARA ENFERMEIROS, NOS MOLDES DE RESIDÊNCIA DE ENFERMAGEM (C-EENF) DO HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS (HNMD) EM 2009)

**NÃO ESTÁ AUTORIZADA A UTILIZAÇÃO DE
MATERIAL EXTRA**

ENFERMAGEM MÉDICO CIRÚRGICA

- 1) A intoxicação por ingestão de materiais tóxicos é uma situação de emergência. Assinale o cuidado de enfermagem que NÃO deve ser realizado na ingestão de substâncias tóxicas.
- (A) Administrar xarope de ipeca em paciente alerta.
 - (B) Realizar lavagem gástrica em paciente obnubilado.
 - (C) Administrar carvão ativado.
 - (D) Induzir o vômito após ingestão de destilados de petróleo.
 - (E) Administrar antagonista específico.
- 2) A Síndrome de CUSHING resulta da atividade adrenocortical excessiva. Assinale o cuidado de enfermagem, com a justificativa para a adoção do mesmo, visando diminuir as complicações dessa síndrome.
- (A) Registrar a pressão arterial devido ao risco de hipotensão.
 - (B) Manter precaução protetora devido ao aumento da imunidade.
 - (C) Averiguar a glicemia capilar devido ao risco de hipoglicemia.
 - (D) Manter a integridade cutânea devido ao adelgaçamento da pele.
 - (E) Estimular a ingestão de alimentos ricos em calorias devido ao emagrecimento.
- 3) Taquicardia, disfunção gastrintestinal, hipertermia, pânico, ansiedade, agitação, mania e demência constituem manifestações de emergência psiquiátrica na
- (A) agorafobia.
 - (B) depressão.
 - (C) tirotoxicose.
 - (D) distonia aguda.
 - (E) síndrome de KORSKOFF.

4) Analise as afirmativas abaixo.

- I - O estado asmático em crianças é uma emergência médica que pode resultar em insuficiência respiratória e morte.
- II - Na asma a desidratação deve ser corrigida rapidamente, visando minimizar a obstrução das vias aéreas.
- III- Falta de ar, tosse metálica, estertores pulmonares e fase expiratória prolongada são manifestações clínicas da asma.
- IV - Náusea, cefaléia, irritabilidade e insônia são efeitos adversos da teofilina, medicação usada no tratamento da asma.

Assinale a opção correta.

- (A) Apenas as afirmativas I e IV são verdadeiras.
- (B) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.
- (C) Apenas a afirmativa II é verdadeira.
- (D) Apenas as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.
- (E) Apenas a afirmativa I é verdadeira.

5) A enfermeira deve considerar como cuidado de enfermagem para pacientes em uso de sonda enteral o controle da temperatura, o volume e a velocidade do fluxo de infusão da dieta. A alimentação contínua e em pequenas quantidades evita:

- (A) náuseas, vômitos, trombólise, dor gástrica.
- (B) distensão abdominal, hemólise, diarreia, náuseas.
- (C) diarreia, dispnéia, disfagia, trombólise.
- (D) distensão abdominal, diarreia, náuseas, vômitos.
- (E) aspiração, diarreia, sudorese, vômitos.

- 6) Os principais objetivos do sistema de tratamento coronariano são os de preservar vidas, evitar as complicações e devolver aos pacientes a sua máxima capacidade funcional (tanto física quanto emocional). Para se alcançarem tais objetivos as enfermeiras da equipe de uma Unidade Coronária devem assumir várias responsabilidades, entre essas a antecipação e prevenção das complicações com a realização dos seguintes procedimentos:
- (A) infusões venosas, oxigenoterapia, tratamento de arritmias "de alarme".
 - (B) infusões venosas, cuidados de enfermagem, eletrocardiograma.
 - (C) apoio emocional, comunicação, cuidados de enfermagem.
 - (D) anamnese, eletrocardiograma, terapêutica medicamentosa.
 - (E) cuidados de enfermagem, eletrocardiograma, oxigenoterapia.
- 7) Assinale a opção que completa corretamente as lacunas da sentença abaixo.
- "A hipoglicemia neonatal acontece em 20-70% dos infantes de mães com diabetes tipo 1 e tipo 2. O mecanismo da hipoglicemia está altamente relacionado aos níveis da _____ no parto. A _____ materna determina hiperplasia das ilhotas fetais e _____ responsável pela hipoglicemia neonatal".
- (A) glicemia, hiperinsulinemia, hiperglicemia
 - (B) glicemia, hiperglicemia, hiperinsulinemia
 - (C) hiperglicemia, glicemia, hiperinsulinemia
 - (D) hiperinsulinemia, glicemia, hiperglicemia
 - (E) hiperglicemia, hiperinsulinemia, glicemia
- 8) Um dos riscos do paciente queimado é a aspiração do vômito. Tal condição é desencadeada devido a (ao)
- (A) débito urinário diminuído.
 - (B) desidratção.
 - (C) íleo paralítico.
 - (D) hemoconcentração.
 - (E) redução do volume sanguíneo.

- 9) Qual o instrumento fundamental na administração da assistência de enfermagem que além de nortear a caracterização de recursos humanos e materiais, facilita a avaliação da assistência prestada, permitindo verificar o alcance de padrões mínimos de assistência, oferecendo subsídios aos indicadores de custos e rendimentos, indicando também áreas que requeiram aprimoramento?
- (A) Atividades e tarefas de enfermagem.
 - (B) Sistematização da assistência de enfermagem.
 - (C) Desenvolvimento de teorias de enfermagem.
 - (D) Implementação da assistência de enfermagem.
 - (E) Valores e objetivos que norteiam a assistência de enfermagem.
- 10) Segundo GOMES, são critérios para admissão na UTI, EXCETO pacientes
- (A) em estado crítico, que necessitam de cuidados específicos de enfermagem e observação constante.
 - (B) em estado grave, que apresentam comprometimento importante de suas funções vitais.
 - (C) cujo estado apresenta alto risco, podendo apresentar subitamente alterações graves das funções vitais.
 - (D) em fase final de algumas moléstias, que necessitam apenas de cuidados paliativos.
 - (E) de emergência séria, sofrendo de coma, choque, hemorragia ou perturbações respiratórias.
- 11) As emergências hipertensivas são elevações agudas da pressão arterial com risco de vida para o paciente. São condições associadas a emergência hipertensiva:
- (A) aneurisma, hemorragia e diabetes.
 - (B) depressão respiratória, diabetes e aneurisma.
 - (C) infarto agudo do miocárdio, trombose venosa profunda e embolia.
 - (D) infarto agudo do miocárdio, aneurisma dissecante de aorta e depressão respiratória.
 - (E) infarto agudo do miocárdio, aneurisma dissecante de aorta e hemorragia intracraniana.

Prova : Amarela
Profissão : ENFERMAGEM MÉDICO CIRÚRGICA

Concurso : C-EENF/09

- 12) A equipe de saúde tem papel fundamental na prevenção da infecção hospitalar, pois esta se instala quando há falhas de técnicas assépticas e nos casos de depressão significativa dos mecanismos de defesa do paciente provocada pela doença, pela agressão diagnóstica e terapêutica. A degermação é um tipo de assepsia que
- (A) destrói ou extermina os insetos, roedores ou outros transmissores de infecções ao homem.
 - (B) destrói ou inativa os agentes infecciosos situados fora do organismo, não necessariamente matando os esporos.
 - (C) remove ou reduz o número de bactérias na pele por meio de limpeza mecânica ou por aplicação de preparado químico.
 - (D) destrói ou elimina todos os microorganismos na forma vegetativa ou esporulada.
 - (E) reduz o número de germes a um nível isento de perigo. Sua aplicação é mais recomendada em refeitórios e lavanderia.
- 13) São características importantes de déficit do volume de líquidos, EXCETO
- (A) turgor cutâneo diminuído.
 - (B) hipertensão arterial.
 - (C) urina concentrada.
 - (D) veias cervicais colabadas.
 - (E) oligúria.
- 14) A prática de enfermagem na comunidade é centrada na promoção e manutenção da saúde de indivíduos e grupos, prevenção e minimização da progressão da doença e melhora da qualidade de vida. Analisando este contexto, pode-se afirmar que os conceitos fundamentais do cuidado de enfermagem na comunidade são:
- (A) autocuidado e reabilitação domiciliar.
 - (B) serviço de internação domiciliar e cuidado de enfermagem preventivo.
 - (C) comunicação e reabilitação domiciliar.
 - (D) autocuidado e cuidado preventivo no contexto da cultura da comunidade.
 - (E) comunicação e cuidado preventivo no contexto da cultura da comunidade.

Prova : Amarela
Profissão : ENFERMAGEM MÉDICO CIRÚRGICA

Concurso : C-EENF/09

- 15) Um dos fatores que afeta a cicatrização normal das feridas é a falha de técnica asséptica no curativo, portanto deve-se
- (A) reduzir a infecção das lesões contaminadas.
 - (B) promover hemostasia, através de curativo compressivo.
 - (C) iniciar os curativos pelas incisões limpas, depois as abertas não infectadas e por último, as colostomias e fístulas.
 - (D) remover as secreções.
 - (E) impedir contaminação do ferimento por fezes, vômito, urina.
- 16) As fases da ressuscitação cardiopulmonar são, respectivamente:
- (A) vias aéreas livres, restabelecimento da respiração, restabelecimento da circulação e terapêutica definitiva.
 - (B) intubação, restabelecimento da circulação, vias aéreas livres e restabelecimento da respiração.
 - (C) vias aéreas livres, acesso venoso pênneo, restabelecimento da respiração e restabelecimento da circulação.
 - (D) restabelecimento da respiração, hidratação, restabelecimento da circulação e cardioversão.
 - (E) vias aéreas livres, acesso venoso pênneo, intubação e cardioversão.
- 17) Durante a transfusão sanguínea, deve-se observar e controlar as reações à transfusão. Na ocorrência de embolia gasosa os sintomas apresentados são:
- (A) calafrios, hipertermia, tremores, convulsão, coma.
 - (B) dispnéia, tosse, taquicardia, tremores, hipotensão.
 - (C) prurido generalizado, tosse, hipertermia, cefaléia, anúria.
 - (D) cianose, oligúria, anúria, icterícia, convulsão.
 - (E) cianose, hipotensão, convulsão, inconsciência, coma.
- 18) Assinale a causa para a diminuição do débito cardíaco no pós-operatório de cirurgia cardíaca.
- (A) Hipervolemia.
 - (B) Hipertermia.
 - (C) Tamponamento cardíaco.
 - (D) Derrame pleural.
 - (E) Necrose tubular aguda.

Prova : Amarela
Profissão : ENFERMAGEM MÉDICO CIRÚRGICA

Concurso : C-EENF/09

- 19) Uma pessoa com diagnóstico de tuberculose pulmonar é considerada não infecciosa depois de
- (A) uma semana de terapia medicamentosa contínua.
 - (B) duas a três semanas de terapia medicamentosa contínua.
 - (C) quatro a cinco semanas de terapia medicamentosa a contínua.
 - (D) seis a sete semanas de terapia medicamentosa contínua.
 - (E) oito a nove semanas de terapia medicamentosa contínua.
- 20) Dentre as opções abaixo, assinale a que apresenta exemplos de manifestações clínicas do choque cardiogênico.
- (A) Hipotensão, alterações mentais, oligúria, acidose metabólica.
 - (B) Hipotensão, oligúria, hipertermia, pele úmida e fria.
 - (C) Hipertensão, alterações mentais, acidose metabólica.
 - (D) Hipertensão, hipertermia, oligúria, acidose metabólica.
 - (E) Hipotensão, hipertermia, bradicardia, oligúria.
- 21) Em relação ao distúrbio gastroesofágico, coloque V (verdadeiro) ou F (falso) nas afirmativas abaixo e assinale a opção correta.
- () O refluxo do conteúdo gástrico para o esôfago predispõe ao desenvolvimento de sintomas respiratórios.
 - () A tomografia computadorizada e a ressonância magnética consistem nos exames de avaliação diagnóstica da doença.
 - () Os lactentes com a patologia devem ser mantidos na posição supina, pois a mesma facilita o esvaziamento gástrico.
 - () Na maioria dos lactentes com a doença, o distúrbio é grave necessitando de cirurgia.
 - () A estenose de esôfago consiste em uma complicação significativa.
- (A) (V) (F) (F) (F) (V)
 - (B) (V) (V) (F) (V) (V)
 - (C) (F) (F) (F) (V) (V)
 - (D) (V) (V) (F) (F) (F)
 - (E) (V) (F) (V) (V) (V)

- 22) Qual é a complicação mais perigosa da insuficiência renal aguda?
- (A) Náuseas e vômitos.
 - (B) Acidose metabólica.
 - (C) Hiperpotassemia.
 - (D) Hipocalemia.
 - (E) Hipertensão arterial.
- 23) De acordo com o Código de Ética dos profissionais de enfermagem, é dever do profissional de enfermagem
- (A) cumprir e fazer cumprir os preceitos éticos e legais da profissão.
 - (B) ser informado sobre o diagnóstico provisório ou definitivo de todos os clientes que estejam sobre sua assistência.
 - (C) publicar trabalho com elementos que identifiquem o cliente sem sua autorização.
 - (D) promover e / ou facilitar o aperfeiçoamento técnico, científico e cultural do pessoal sob sua orientação e supervisão.
 - (E) assegurar ao cliente uma assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia.
- 24) A insulina é um dos medicamentos usados na terapêutica da diabetes mellitus. São complicações da terapia com insulina:
- (A) reações alérgicas, lipodistrofia, resistência à insulina.
 - (B) hipoglicemia, náuseas, hipercalcemia.
 - (C) reações alérgicas, resistência à insulina, hiperpotassemia.
 - (D) reações adversas, lipodistrofia, vômitos.
 - (E) hiperglicemia, lipodistrofia, náuseas.
- 25) A associação de tremores, rigidez e bradicinesia são manifestações clínicas do seguinte distúrbio neurológico:
- (A) doença de ALZHEIMER.
 - (B) doença de PARKINSON.
 - (C) doença de HUNTINGTON.
 - (D) esclerose lateral amiotrófica.
 - (E) distrofia muscular de DUCHENE.

Prova : Amarela
Profissão : ENFERMAGEM MÉDICO CIRÚRGICA

Concurso : C-EENF/09

- 26) A Resolução COFEN-240/2000, aprova o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e dá outras providências. Das Infrações e Penalidades, é considerada infração grave a que
- (A) ofenda a integridade física, mental ou moral de qualquer pessoa, sem causar debilidade.
 - (B) provoque morte, deformidade permanente, dano moral irremediável em qualquer pessoa.
 - (C) provoque morte, deformidade permanente, perda ou inutilização de membro, sentido, função ou ainda, dano moral irremediável em qualquer pessoa.
 - (D) provoque perigo de vida, deformidade permanente, perda ou inutilização de membro, sentido, função ou ainda, dano moral irremediável em qualquer pessoa.
 - (E) provoque perigo de vida, debilidade temporária de membro, sentido ou função em qualquer pessoa.
- 27) Quantos mililitros (ml) de glicose 50% (ampola contendo 20 ml) serão necessários para a administração de 20 g de glicose EV (endovenosa)?
- (A) 100
 - (B) 80
 - (C) 60
 - (D) 40
 - (E) 20
- 28) De acordo com o Ministério da Saúde, são doenças de notificação compulsória imediata (caso suspeito ou confirmado)
- (A) cólera, febre amarela, poliomielite, varíola.
 - (B) hanseníase, tuberculose, dengue, meningite.
 - (C) hanseníase, dengue, difteria, malária.
 - (D) cólera, dengue, leptospirose, malária.
 - (E) hepatite viral, tuberculose, febre amarela, dengue.
- 29) Alterações neuropatológicas e bioquímicas específicas são encontradas no paciente com doença de Alzheimer. Nos estágios iniciais da doença ocorrem
- (A) esquecimento e demência.
 - (B) esquecimento e perda de memória sutil.
 - (C) tristeza e dificuldade de formular conceitos.
 - (D) perda de memória sutil e tristeza.
 - (E) comportamento compulsivo e delírio.

Prova : Amarela
Profissão : ENFERMAGEM MÉDICO CIRÚRGICA

Concurso : C-EENF/09

- 30) Conforme o Calendário Básico de Vacinações de Rotina do Ministério da Saúde, as seguintes vacinas devem ser administradas, de preferência, logo após o nascimento:
- (A) BCG (contra tuberculose) e SRC (tríplice viral).
 - (B) BCG (contra tuberculose) e HB (contra Hepatite B).
 - (C) HB (contra Hepatite B) e DTP (tríplice bacteriana).
 - (D) SRC (tríplice viral) e DTP (tríplice bacteriana).
 - (E) SRC (tríplice viral) e VOP (Vacina oral contra a poliomielite).
- 31) Midríase, confusão, evidências de perda de peso, fraqueza muscular, náuseas e vômitos são manifestações clínicas da intoxicação por
- (A) opióides.
 - (B) álcool.
 - (C) cafeína.
 - (D) CANNABIS SATIVA.
 - (E) cocaína.
- 32) Para fazer o cálculo de pessoal para trabalhar em uma unidade, faz-se necessário a caracterização da clientela, fundamentada no cuidado progressivo ao paciente. Como é denominado o cuidado prestado a pacientes que necessitam de assistência permanente para manter suas necessidades básicas?
- (A) Intensivo.
 - (B) Intermediário.
 - (C) Prolongado.
 - (D) Mínimo.
 - (E) Ambulatorial.
- 33) Quais das opções abaixo constitui uma contra indicação à vacinação?
- (A) Desnutrição.
 - (B) Doença aguda.
 - (C) Tratamento em curso com medicamentos em doses não imunodepressoras.
 - (D) Pós transplante de medula óssea (depois de 2 anos).
 - (E) Alergias sistêmicas e graves, relacionadas a componentes de determinadas vacinas.

Prova : Amarela
Profissão : ENFERMAGEM MÉDICO CIRÚRGICA

Concurso : C-EENF/09

- 34) Um recém-nascido com icterícia grave corre o risco de desenvolver encefalopatia bilirrubínica, uma síndrome de lesão cerebral decorrente de depósitos de bilirrubina não-conjugada. Qual das opções abaixo NÃO é causa de hiperbilirrubinemia?
- (A) Prematuridade.
 - (B) Sepses.
 - (C) Recém nascido de mãe diabética.
 - (D) Equimoses.
 - (E) Recém nascido pós termo.
- 35) Assinale a função que possibilita ao enfermeiro exercer a administração da assistência de enfermagem de forma global, coerente e responsável.
- (A) Supervisão de enfermagem.
 - (B) Coordenação das atividades do pessoal de apoio no que se refere a recursos materiais.
 - (C) Coordenadora dos serviços de enfermagem.
 - (D) Agente de educação contínua.
 - (E) Planejamento da assistência de enfermagem.
- 36) Assinale a opção que completa corretamente as lacunas. O resultado hemodinâmico final do choque é a _____ do débito cardíaco em consequência do _____ retorno venoso ou da lesão do _____ cardíaco.
- (A) pressão / alto / vaso.
 - (B) resistência / baixo / tecido.
 - (C) redução / baixo / músculo.
 - (D) pressão / baixo / músculo.
 - (E) redução / alto / vaso.
- 37) O distúrbio comum do afeto ou humor do idoso e que apresenta fadiga, memória e concentração diminuídos, sentimentos de culpa e inutilidade, além de distúrbios do sono são característicos da (o)
- (A) delírio.
 - (B) estresse.
 - (C) demência.
 - (D) nostalgia.
 - (E) depressão.

Prova : Amarela
Profissão : ENFERMAGEM MÉDICO CIRÚRGICA

Concurso : C-EENF/09

- 38) Os medicamentos vasoativos são administrados em todas as formas de choque e nunca devem ser interrompidos de maneira abrupta, porque isso pode provocar
- (A) hemorragia.
 - (B) instabilidade hemodinâmica grave.
 - (C) parada cardio-respiratória.
 - (D) hipertensão.
 - (E) vômito.
- 39) São sinais de pré-eclampsia grave:
- (A) hipertensão, edema, proteinúria e hipertermia.
 - (B) hipotensão, hiperglicemia, edema e proteinúria.
 - (C) hipertensão, trombocitopenia, proteinúria e edema de pulmão.
 - (D) hipertensão, oligúria, hemorragia e taquicardia.
 - (E) hipotensão, edema, proteinúria e cianose.
- 40) A frequência das mamadas de um recém nascido em aleitamento materno deve ser realizada
- (A) sob livre demanda.
 - (B) de uma em uma hora.
 - (C) de duas em duas horas.
 - (D) de três em três horas.
 - (E) de quatro em quatro horas.
- 41) A medida que a pressão intracraniana se eleva, a condição do paciente se agrava, conforme manifestado pelos seguintes sinais e sintomas, respectivamente:
- (A) perda dos reflexos do tronco cerebral, hipotensão e hipotermia.
 - (B) vômito em jato, hipotensão e aumento da frequência respiratória.
 - (C) deterioração do nível de consciência, hipertensão e diminuição da frequência cardíaca.
 - (D) hemiplegia, hipertensão e hipotermia.
 - (E) postura decorticada, hipotensão e aumento da frequência cardíaca.

- 42) O Ministério da Saúde recomenda que as vacinas BCG (contra tuberculose), HB (contra hepatite B), DTP (tríplice bacteriana), VOP (vacina oral contra poliomielite), Hib (contra HAEMOPHILUS INFLUENZAE tipo b), DT (dupla infantil) e outras, devem ser conservadas em geladeira sob a temperatura de
- (A) 0°C a +4°C.
 - (B) -2°C a -8°C.
 - (C) -4°C a -10°C.
 - (D) +2°C a +8°C.
 - (E) +4°C a +10°C.
- 43) Uma pessoa com o diagnóstico de transtorno bipolar II apresenta
- (A) episódios de mania e tristeza.
 - (B) transtorno delirante e insônia.
 - (C) psicose induzida por alucinógenos e tristeza.
 - (D) história de um ou mais episódios depressivos maiores e de pelo menos um episódio hipomaníaco.
 - (E) tristeza e apatia.
- 44) A anemia falciforme pertence ao grupo de doenças denominadas hemoglobinopatias. A triagem neonatal permite a intervenção de enfermagem precoce diante das possíveis complicações. Assinale abaixo um dos fatores desencadeantes do fenômeno de falcização.
- (A) Dor vasclusiva.
 - (B) Dor torácica.
 - (C) Acidente vascular cerebral.
 - (D) Priapismo doloroso.
 - (E) Desidratação.

- 45) O Ministério da Saúde realizou em agosto de 2008 a Campanha Nacional de Vacinação para Eliminação da Rubéola, com a aplicação da vacina dupla viral (sarampo e rubéola) em homens e mulheres com idade entre 20 e 39 anos de todo o país. A Rubéola é considerada uma doença benigna, mas seu perigo está na infecção materna no 1º trimestre da gravidez, podendo causar no feto sérios defeitos congênitos, entre os quais pode-se citar:
- (A) hidrocefalia, retardamento mental, catarata, lábios e palato fundidos.
 - (B) hidrocefalia, retardamento mental, catarata, surdez.
 - (C) microcefalia, pé torto congênito, hepatoesplenomegalia, surdez.
 - (D) microcefalia, retardamento mental, catarata, lábios e palato fundidos.
 - (E) poliadenopatias, catarata, surdez, lábios e palato fundidos.
- 46) A desidratação é um distúrbio comum em lactentes e crianças. Os sinais clínicos da desidratação grave são:
- (A) pele acinzentada, oligúria e tempo de enchimento capilar menor que 2 segundos.
 - (B) pele mosqueada, oligúria e tempo de enchimento capilar maior que 3 segundos.
 - (C) pele mosqueada, poliúria e tempo de enchimento capilar menor que 2 segundos.
 - (D) pele pálida, oligúria e tempo de enchimento capilar menor que 2 segundos.
 - (E) pele pálida, poliúria e tempo de enchimento capilar maior que 3 segundos.
- 47) São complicações imediatas da intubação endotraqueal:
- (A) quebra de dentes e oclusão da cânula com secreção.
 - (B) broncoespasmo e aspiração de sangue e secreções durante a intubação.
 - (C) lacerações em lábios e infecção.
 - (D) traqueomalácia e broncoespasmo.
 - (E) aspiração de sangue e secreções durante a intubação e infecção.

- 48) Os diferentes isolamentos sofreram modificações em suas instalações e manutenções. Ainda hoje é necessária a realização de uma série de procedimentos que exigem precauções, a fim de evitar a disseminação das doenças no próprio hospital. Considerando essas modificações, pode-se afirmar que o isolamento protetor ou reverso é indicado para as seguintes doenças:
- (A) STEVENS JOHNSON, AIDS, doenças imunodepressoras.
 - (B) febre tifóide, leptospirose, cólera.
 - (C) gangrena gasosa, escabiose, doenças estafilocócicas.
 - (D) sarampo, rubéola, meningite meningocócica.
 - (E) tuberculose, coqueluche, parotidite.
- 49) Que opção abaixo NÃO é considerada complicação da nutrição parenteral?
- (A) Perda protéica.
 - (B) Hipoglicemia de rebote.
 - (C) Embolia gasosa.
 - (D) Pneumotórax.
 - (E) Sobrecarga hídrica.
- 50) O método mais comumente empregado para avaliar o ajuste imediato do recém nascido a vida extra-uterina é o sistema de ESCORE DE APGAR. Em quais itens o ESCORE DE APGAR é baseado?
- (A) Frequência cardíaca, esforço respiratório, tono muscular, irritabilidade reflexa e reflexo de BABINSKI.
 - (B) Frequência cardíaca, esforço respiratório, peso, estatura e coloração.
 - (C) Anomalias cardíacas, perímetro abdominal, tono muscular, irritabilidade reflexa e coloração.
 - (D) Reflexo de sucção, reflexo de MORO, reflexo de preensão, esforço respiratório e tono muscular.
 - (E) Frequência cardíaca, esforço respiratório, tono muscular, irritabilidade reflexa e coloração.