

MARINHA DO BRASIL
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA

(PROCESSO SELETIVO DE ADMISSÃO AO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM NÍVEL DE ESPECIALIZAÇÃO, SOB A FORMA DE TREINAMENTO EM SERVIÇO PARA ENFERMEIROS, NOS MOLDES DE RESIDÊNCIA DE ENFERMAGEM (C-EENF) DO HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS (HNMD) EM 2007)

NÃO ESTÁ AUTORIZADA A UTILIZAÇÃO DE MATERIAL EXTRA

ENFERMAGEM MÉDICO CIRÚRGICA

- 1) Das opções abaixo, assinale a que possui contra-indicação absoluta ao uso de contraceptivo oral.
- (A) Hipertensão.
 - (B) Doença falciforme.
 - (C) Distúrbio tromboembólico.
 - (D) Icterícia induzida por bile.
 - (E) Fase aguda de mononucleose.
- 2) Em relação à uma criança de 3 anos de idade que recebeu o BCG há mais de 6 meses e cuja cicatriz vacinal encontra-se ausente, assinale a opção que indica o que deve ser feito.
- (A) Realizar teste tuberculínico (PPD) e aguardar resultado para vacinação.
 - (B) Revacinação, com realização prévia do teste tuberculínico (PPD).
 - (C) Não revacinar.
 - (D) Agendar retorno da criança em 6 meses e fazer nova verificação da cicatriz.
 - (E) Revacinação, sem necessidade de realização do teste tuberculínico (PPD).
- 3) O teste de Schiller tem por objetivo
- (A) confirmar o câncer de colo uterino.
 - (B) descartar o câncer de colo uterino.
 - (C) identificar alterações celulares mediante a fixação do iodo nas áreas ricas em glicogênio.
 - (D) confirmar alterações de natureza hematológica.
 - (E) identificar alterações de natureza infecciosa mediante a fixação da solução de lugol nas áreas ricas em lipídios.
- 4) Assinale a opção que indica qual o prazo de validade do leite humano ordenhado, armazenado na geladeira e congelador/freezer, respectivamente:
- (A) 12 horas e 7 dias.
 - (B) 24 horas e de 15 a 21 dias.
 - (C) 24 horas e 6 meses.
 - (D) 48 horas e de 15 a 21 dias.
 - (E) 48 horas e 6 meses.

5) Coloque F (falso) ou V (verdadeiro) nas afirmativas abaixo em relação ao Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, assinalando a seguir, a opção correta.

- () É direito dos profissionais de enfermagem apoiar as iniciativas que visem o aprimoramento profissional, cultural e a defesa dos legítimos interesses de classe.
- () O profissional de enfermagem presta assistência de saúde visando a promoção do ser humano como um todo.
- () É permitido publicar trabalho com elementos que identifiquem o cliente sem sua autorização.
- () As penalidades de advertência verbal, multa, censura e suspensão do exercício profissional são de alçada do Conselho Federal de Enfermagem.
- () É dever do profissional de enfermagem respeitar o ser humano na situação de morte e pós-morte.

- (A) (V) (V) (F) (V) (V)
- (B) (V) (V) (F) (V) (F)
- (C) (V) (V) (F) (F) (V)
- (D) (F) (V) (V) (F) (V)
- (E) (V) (V) (V) (F) (V)

6) Assinale a opção que completa corretamente as lacunas da sentença abaixo, respectivamente.

Os bloqueios cardíacos de 2º grau resultam com freqüência de lesão isquêmica do sistema de condução. No bloqueio AV de 2º grau - tipo Wenckebach, a freqüência geralmente é _____, o ritmo _____ e o intervalo PR _____ progressivamente.

- (A) baixa / regular / aumenta
- (B) alta / irregular / diminui
- (C) baixa / irregular / diminui
- (D) baixa / irregular / aumenta
- (E) alta / regular / aumenta

7) O grande objetivo no tratamento do diabete gestacional é evitar a macrosomia fetal, cujas principais conseqüências são:

- (A) hipoglicemia neonatal, hidrocefalia e proteinúria.
- (B) hipoglicemia neonatal, tocotraumatismos e oligúria.
- (C) oligúria, hiperglicemia neonatal e distocia de ombros.
- (D) hipoglicemia neonatal, distocia de ombros e tocotraumatismos.
- (E) distocia de ombros, hipoglicemia neonatal e anemia.

- 8) No desenvolvimento da Teoria da Administração, as funções administrativas de planejamento, organização, comando, coordenação e controle, foram primeiramente identificadas pelo teórico
- (A) Max Weber.
 - (B) Taylor.
 - (C) Henri Fayol.
 - (D) Mc Gregor.
 - (E) Mayo.
- 9) Em qual das condições descritas abaixo, comumente encontramos alucinações e delírios?
- (A) Distúrbios.
 - (B) Hebefrênia.
 - (C) Ansiedade Grave.
 - (D) Esquizofrenia.
 - (E) Distúrbio de Conversão.
- 10) A contracepção de emergência, também chamada de intercepção ou pílula pós-coital, é uma alternativa de caráter excepcional, utilizada apenas em situações de emergência, tais como relação sexual não planejada e desprotegida, uso inadequado de métodos anticoncepcionais, falha contraceptiva presumida e violência sexual. Deve ser utilizada, após o coito desprotegido em até quantas horas?
- (A) 72
 - (B) 48
 - (C) 36
 - (D) 24
 - (E) 12
- 11) O quadro clínico da gonorréia ou blenorragia no sexo masculino, caracteriza-se por
- (A) disúria, edema escrotal e ulceração.
 - (B) prurido intra-uretral, disúria e fluxo uretral mucopurulento espesso abundante de cor amarelo-esverdeado.
 - (C) formigamento, sangramento uretral e secreção espessa esbranquiçada.
 - (D) sangramento uretral, prurido e febre.
 - (E) febre, fluxo uretral mucopurulento espesso abundante de cor leitosa e prurido intenso.

- 12) Dos cuidados de enfermagem na administração de albumina a 5%, NÃO é indicado
- (A) administrar em pacientes com doenças cardíacas.
 - (B) misturar com hidrolisados protéicos.
 - (C) administrar em equipos filtrados.
 - (D) administrar em caso de doença pulmonar.
 - (E) administrar rapidamente.
- 13) Segundo Brunner no capítulo de tratamentos de pacientes com queimaduras, a profundidade e a extensão da lesão são consideradas na transferência do paciente para o centro de queimados. De acordo com o critério de classificação da lesão, a queimadura considerada importante é de
- (A) 2º grau que excedam 25% da área da superfície corporal em adultos e 20% em crianças.
 - (B) 2º grau que excedam 30% da área de superfície corporal em adultos e 25% em crianças.
 - (C) 2º grau que excedam 35% da área de superfície corporal em adultos e 30% em crianças.
 - (D) 2º grau que excedam 40% da área de superfície corporal em adultos e 30% em crianças.
 - (E) 2º grau que excedam 50% da área de superfície corporal em adultos e 30% em crianças.
- 14) Na Unidade de Recuperação Pós Anestésica, quando a Enfermeira receber o paciente, o que ela deve avaliar de imediato?
- (A) Sítio cirúrgico.
 - (B) Tubos e drenagens.
 - (C) Frequência do pulso.
 - (D) Linhas de monitoração.
 - (E) Acesso venoso.

- 15) O procedimento habitualmente utilizado após 18-20 semanas de gestação cujas principais indicações são o diagnóstico pré-natal para o estudo do cariótipo fetal e o estudo hematológico do feto com infecções congênitas, entre outras, denomina-se
- (A) amniocentese.
 - (B) cordocentese.
 - (C) amnioscopia.
 - (D) histeroscopia.
 - (E) biópsia de vilo corial.
- 16) Se um paciente apresenta uma Pressão Sistólica de 150mmHg e uma Pressão diastólica de 70mmHg, qual é a sua Pressão Arterial Média em mmHG?
- (A) 67
 - (B) 75
 - (C) 87
 - (D) 97
 - (E) 115
- 17) O estudo sistemático de que deveriam ser a conduta e as ações de uma pessoa no que se refere a si mesma, a outros seres humanos e ao ambiente, define
- (A) dilemas éticos.
 - (B) princípios éticos.
 - (C) decisões éticas.
 - (D) marco teórico ético.
 - (E) ética.
- 18) Dentre os quimioterápicos abaixo, qual atua quando a célula tumoral sintetiza o DNA?
- (A) Citarabina.
 - (B) Bleomicina.
 - (C) Vincristina.
 - (D) Vimblastina.
 - (E) Vindesina.

- 19) Sobre os cuidados imediatos de enfermagem após biópsia renal, é correto afirmar que
- (A) o paciente deve ser mantido em decúbito dorsal imediatamente após o procedimento.
 - (B) o paciente deve ficar em repouso no leito por 4 horas.
 - (C) os sinais vitais devem ser verificados de 1 em 1 hora.
 - (D) se houver sinais de sangramento, o abdome não deve ser palpado.
 - (E) o débito urinário deve ser feito, pois a anúria é uma complicação comum.
- 20) Em qual condições abaixo, a Pressão Venosa Central encontra-se aumentada?
- (A) Choque hipovolêmico.
 - (B) Choque Cardiogênico
 - (C) Sepses.
 - (D) Edema Pulmonar cardiogênico.
 - (E) Choque Séptico.
- 21) A infecção aguda da vesícula biliar tem indicação cirúrgica
- (A) eletiva.
 - (B) emergencial.
 - (C) urgente.
 - (D) necessária.
 - (E) opcional.

22) O gerenciamento dos RSS (Resíduos de Serviços de Saúde) constitui um conjunto de procedimentos de gestão, planejados e implementados a partir de bases técnico-científicas, normativas e legais, com o objetivo de minimizar a produção e proporcionar aos resíduos gerados um encaminhamento seguro, visando a proteção dos trabalhadores, à preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente. Quanto aos objetivos da fase de "SEGREGAÇÃO", pode-se afirmar que visam

- (I) impedir que os resíduos infectantes e químicos contaminem os comuns e prevenir acidentes ocupacionais.
- (II) reduzir custos financeiros, racionalizar recursos e possibilitar a reciclagem.
- (III) quantificar cada tipo de resíduo gerado e converter o resíduo infectante em inerte.

Asinale a opção correta.

- (A) somente a I está correta.
- (B) I e II estão corretas.
- (C) I e III estão corretas.
- (D) II e III estão corretas.
- (E) I, II e III estão corretas.

23) São princípios do raciocínio ético, EXCETO:

- (A) o paternalismo.
- (B) a justiça.
- (C) o dizer a verdade.
- (D) a defesa.
- (E) a beneficiência.

24) No atendimento ao paciente neurológico, a presença de Glasgow menor que 8, tem indicação imediata de

- (A) monitorização de glicemia.
- (B) reanimação cardiorespiratória.
- (C) monitorização de Pressão intracraniana.
- (D) monitorização de Pressão arterial invasiva.
- (E) entubação.

- 25) Na assistência inicial de enfermagem em uma parada cardiorespiratória é indicado
- (A) iniciar desfibrilação com carga inicial de 100J, se confirmado fibrilação
 - (B) preparar atropina, se confirmada assistolia.
 - (C) preparar adrenalina, se confirmado assistolia.
 - (D) decúbito dorsal com cabeceira a 0° e proceder a flexão do pescoço para abrir vias aéreas.
 - (E) iniciar ventilação com ambú e massagem cardíaca externa numa seqüência de 01 ventilação e 6 massagens.
- 26) O meio pelo qual o bebê perde calor no período imediato na sala de parto ao ser colocado sobre lençóis ou compressas frias chama-se
- (A) convecção.
 - (B) radiação.
 - (C) evaporação.
 - (D) irradiação.
 - (E) condução.
- 27) A vacina tríplice viral apresenta-se sob a forma liofilizada, em frasco-ampola com uma ou múltiplas doses. Após a sua diluição, se mantida sob condições ideais de armazenagem, a mesma deve ser aplicada pelo prazo máximo de
- (A) até o final do prazo de validade.
 - (B) 3 meses.
 - (C) 8 horas.
 - (D) 6 horas.
 - (E) 4 horas.
- 28) Dentre as infecções congênitas fetais, qual é a que apresenta o seguinte quadro clínico: microcefalia, ventriculomegalia, hepatoesplenomegalia, calcificação cerebral, coriorretinite e deficiência auditiva?
- (A) Herpes simples genital.
 - (B) Toxoplasmose.
 - (C) Rubéola.
 - (D) Sífilis.
 - (E) Citomegaloviro.

- 29) Um líder que identifica valores comuns, é comprometido, olha para os efeitos e delega poderes possui característica da liderança
- (A) transacional.
 - (B) democrática.
 - (C) transformacional.
 - (D) autocrática.
 - (E) laissez-faire.
- 30) Assinale a opção que completa corretamente a lacuna da sentença abaixo:
- A _____ é uma doença óssea metabólica caracterizada por mineralização inadequada do osso.
- (A) artrite séptica
 - (B) doença de Paget
 - (C) osteomalacia
 - (D) osteomielite
 - (E) doença óssea metastática
- 31) P.S.V., de 25 anos está na sua 2ª gestação. A data da sua última menstruação foi 03/06/07. Calcule a data provável do parto.
- (A) 20/02/2008.
 - (B) 24/02/2008.
 - (C) 03/03/2008.
 - (D) 10/03/2008.
 - (E) 13/03/2008.
- 32) Em relação a fatores que afetam a cicatrização, pode-se afirmar que
- (A) o edema aumenta o suprimento sanguíneo ao exercer crescente pressão nos vasos.
 - (B) os corticoides melhoram a resposta inflamatória normal.
 - (C) a sepse estimula as funções celulares o que afeta a cura da ferida.
 - (D) a secreção de insulina se diminuída, retarda a cicatrização.
 - (E) a técnica do curativo não altera o transporte de oxigênio e nitrogênio.

- 33) São deveres do enfermeiro no exercício profissional, EXCETO:
- (A) assegurar ao cliente uma assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência.
 - (B) respeitar e reconhecer o direito do cliente de decidir sobre sua pessoa, seu tratamento e seu bem-estar.
 - (C) respeitar o natural pudor, privacidade e a intimidade do cliente.
 - (D) exercer a enfermagem com justiça, competência, responsabilidade e honestidade.
 - (E) garantir a continuidade da assistência de enfermagem.
- 34) A máscara N-95 apresenta eficácia de filtragem próxima de 99,5% e é importante equipamento de proteção individual no controle de doenças com risco de transmissão nosocomial. Por quanto tempo poderá ser utilizada por um mesmo profissional, se for mantida limpa, seca e íntegra?
- (A) tempo indeterminado.
 - (B) 3 meses.
 - (C) 1 mês.
 - (D) 15 dias.
 - (E) 7 dias.
- 35) Na meningococemia, além da precaução padrão são exigidas medidas de precaução na transmissão aérea por perdigotos. Assinale a opção que indica a duração de tais medidas e a antibioticoterapia correta empregada para os contatos indicados.
- (A) Durante toda a duração da doença e empregar profilaxia com rifampicina.
 - (B) Até 72 horas após o início da terapêutica adequada e empregar eritromicina para os contatos.
 - (C) Até 24 horas após o início da terapêutica adequada e empregar rifampicina para os contatos.
 - (D) Durante toda a duração da doença e empregar profilaxia com eritromicina.
 - (E) Até 24 horas após o início da terapêutica adequada e empregar eritromicina para os contatos.

- 36) No tratamento com lítio em distúrbios bipolares, qual das condições abaixo podem aumentar seu nível sérico?
- (A) Ingestão de sódio aumentada.
 - (B) Função renal aumentada.
 - (C) Perda hidroeletrolítica.
 - (D) Ingestão de cálcio diminuída.
 - (E) Constipação.
- 37) Ao aplicar uma penalidade, pode ser considerado como agravante pelo Código de Ética de Enfermagem a seguinte circunstância:
- (A) realizar atos sob coação e/ou intimidação.
 - (B) ter bons antecedentes profissionais.
 - (C) realizar atos sob emprego real de força física.
 - (D) ter confessado espontaneamente a autoria da infração.
 - (E) cometer infração dolosamente.
- 38) Em qual das arritmias abaixo, a frequência do traçado no ECG é irregular, há ausência de onda P e o complexo QRS é normal em forma e duração?
- (A) Flutter atrial.
 - (B) Extra-sístole atrial.
 - (C) Fibrilação ventricular.
 - (D) Extra-sístole ventricular.
 - (E) Fibrilação atrial.

39) O dengue é uma doença infecciosa febril aguda, benigna na maior parte dos casos, causada por qualquer um dos quatro sorotipos de um vírus do gênero flavivirus. Em relação às suas características, é correto afirmar que

- (I) o termo "hemorrágico" é impreciso, uma vez que o que caracteriza esta forma da doença não é a presença de manifestações hemorrágicas, mas a ocorrência de um súbito aumento da permeabilidade vascular.
- (II) manifestações hemorrágicas, tais como epistaxe e gengivorragia podem ocorrer em alguns casos, mesmo nas formas benignas da doença.
- (III) a notificação dos casos suspeitos ou confirmados é obrigatória e deve ser feita às secretarias municipais de saúde através de formulário próprio.
- (IV) a hidratação não é procedimento fundamental, devendo ser utilizada somente nos casos em que haja hemoconcentração.

Assinale a opção correta.

- (A) I, II e III estão corretas.
- (B) I, II e IV estão corretas.
- (C) I, III e IV estão corretas.
- (D) II, III e IV estão corretas.
- (E) I, II, III e IV estão corretas.

40) Com relação ao diagnóstico de enfermagem para o paciente cirúrgico, é correto afirmar que

- (A) o risco de constipação está relacionado aos agentes anestésicos.
- (B) o débito cardíaco diminuído está relacionado à hipervolemia.
- (C) o risco de retenção urinária está relacionado à imobilidade.
- (D) o risco de broncoaspiração está relacionado ao repouso no leito.
- (E) a intolerância à atividade está relacionada à fraqueza primária à cirurgia.

- 41) O questionário CAGE é utilizado para avaliar comportamento que indica o uso abusivo
- (A) do álcool.
 - (B) da cocaína.
 - (C) da heroína.
 - (D) da anfetamina.
 - (E) do barbitúrico.
- 42) A Nutrição Parenteral é utilizada para suprir as necessidades nutricionais quando o paciente não pode usar a via oral ou entérica. Para tanto, o paciente deverá apresentar os seguintes problemas, EXCETO:
- (A) perda de mais de 10% do peso habitual antes da doença.
 - (B) vômito ou diarreia aguda.
 - (C) nível sérico de albumina abaixo de 3,5g/dl.
 - (D) perda excessiva de nitrogênio por feridas.
 - (E) emagrecimento contínuo apesar da ingestão oral ou entérica adequada.
- 43) Em relação à mastite puerperal, qual é a droga de escolha para o tratamento e quais medidas coadjuvantes podem ser empregadas?
- (A) Cefalexina, via oral de 6/6 horas. Continuidade da amamentação em ambas as mamas, calor local e esvaziamento manual das mamas.
 - (B) Penicilina cristalina, via endovenosa de 6/6 horas. Calor local, uso de bombas de sucção e drenagem cirúrgica.
 - (C) Cefalexina, via oral de 6/6 horas. Drenagem cirúrgica, continuidade da amamentação em ambas as mamas e uso de bombas de sucção.
 - (D) Penicilina cristalina, via endovenosa de 12/12 horas. Esvaziamento manual das mamas, aplicação de compressas frias após a ordenha e interrupção da amamentação.
 - (E) Cefalexina, via oral de 12/12 horas. Interrupção da amamentação, calor local e esvaziamento manual das mamas.

- 44) Paciente 72 anos, diabético, hipertenso, com quadro de pneumonia, vem apresentando hiperglicemia em todos os horários aferidos. É prescrito solução venosa de insulina para infusão contínua. O Enfermeiro deve atentar para iniciar
- (A) dieta enteral contínua, monitorar glicemia a cada 2 horas e trocar a solução a cada 12 horas.
 - (B) glicose hipertônica, monitorar glicemia a cada hora e trocar solução a cada 24 horas.
 - (C) dieta enteral contínua, monitorar glicemia horária e trocar solução a cada 12 horas.
 - (D) glicose hipertônica, glicemia a cada hora e trocar solução a cada 8 horas.
 - (E) dieta enteral contínua, glicemia a cada 2 horas e trocar solução a cada 24 horas.
- 45) Qual a complicação é possível encontrar em pacientes que estejam em uso de alimentação por via enteral?
- (A) Hiper-hidratação.
 - (B) Hiponatremia.
 - (C) Hiperalbuminemia.
 - (D) Hipocalcemia.
 - (E) Hiperpotassemia.
- 46) Numa situação de emergência em que o paciente necessita de transfusão sanguínea e não é possível esperar pelos testes de compatibilidade, qual dos produtos abaixo NÃO pode ser utilizado?
- (A) Dextran.
 - (B) Sangue tipo O, Rh negativo.
 - (C) Substituto artificial do plasma.
 - (D) Sangue tipo O, Rh positivo.
 - (E) Solução com proteínas plasmáticas.

- 47) Associe o agente esterelizante/desinfetante ao seu período de exposição:

ESTERELIZANTE		PERÍODO
(I) ácido peracético 0,2%	()	20 a 30 minutos
(II) glutaraldeído 2%	()	4 horas
(III) óxido de etileno	()	5 horas
(IV) peróxido de hidrogênio	()	10 minutos
na forma gás-plasma	()	1 hora

Assinale a opção correta.

- (A) (I) (IV) (II) (III) (-)
(B) (II) (III) (-) (I) (IV)
(C) (II) (IV) (I) (-) (III)
(D) (I) (-) (III) (IV) (II)
(E) (II) (-) (III) (IV) (I)
- 48) Paciente de 60 anos, em pós-operatório de Hemicolectomia, encontra-se eupneico, com saturação de 85% por oximetria de pulso e ausculta pulmonar com presença de secreções estáticas. Pode-se dizer que este paciente apresenta hipoxemia
- (A) subaguda e estertores.
(B) episódica e estertores.
(C) subaguda e sibilos.
(D) episódica e crepitações.
(E) subaguda e crepitações.
- 49) Dentre as afirmações abaixo, assinale a que corresponde ao cuidado adequado após a realização de uma paracentese.
- (A) Manter o paciente em decúbito dorsal com a cabeceira a zero graus.
(B) Monitorar sinais vitais a cada 2 horas.
(C) Avaliar sinais de hipervolemia.
(D) Avaliar alterações do estado mental.
(E) Passar sonda nasogástrica para sinfonagem.

- 50) Na assistência de enfermagem ao recém-nascido, durante a pesquisa dos reflexos, o reflexo dos pontos cardeais consiste em
- (A) estimular os cantos da boca para que a boca e a face ou somente a face se desloquem em direção ao agente estimulador.
 - (B) fazer um estímulo sonoro batendo ao lado do recém-nascido na mesa de exame, o que irá produzir uma resposta que simula um abraçamento realizado com os quatro membros.
 - (C) estender constantemente o dedo grande com abertura em leque dos demais dedos.
 - (D) colocar o recém-nascido suspenso pelo examinador, deixando que os pés do bebê toquem a superfície da mesa de exame.
 - (E) colocar um lápis ou o dedo do examinador na base da superfície palmar ou plantar do recém-nascido fazendo com que apareça o movimento de flexão.