

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Com relação ao transtorno depressivo, julgue os itens a seguir.

- 51 Os estudos de neuroimagem possibilitaram conhecer o papel do lobo frontal no desencadeamento de déficits cognitivos associados.
- 52 Nos casos graves de transtorno depressivo, a taxa de remissão obtida por tratamento com eletroconvulsoterapia — que varia entre 50% e 80% — é inferior à atingida no tratamento com psicofármacos.

Ainda com relação ao transtorno depressivo, cada um dos próximos itens apresenta uma situação clínica, seguida de uma assertiva a ser julgada.

- 53 Em perícia médica, um paciente apresentou atestado médico comprovando ser portador de transtorno depressivo maior, em uso de antidepressivos e antipsicóticos atípicos. Nessa situação, apenas a apresentação do atestado médico não é suficiente para que o paciente seja considerado portador de incapacidade laborativa.
- 54 Uma paciente portadora de depressão psicótica pós-parto cometeu infanticídio. Nessa situação, do ponto de vista legal, a paciente será considerada alienada mental, visto que a depressão consiste no motivo que a levou à prática desse crime.
- 55 Uma paciente com depressão grave foi atendida em ambulatório sem acompanhamento familiar, e o médico que a atendeu prescreveu-lhe tricíclicos para uso contínuo por três meses, ao longo dos quais a paciente suicidou-se. Nessa situação, o médico não poderá ser indiciado por prescrição negligente, já que a família não acompanhou a paciente à consulta médica.

Julgue os itens de 56 a 61, relativos às psicoterapias.

- 56 No tratamento do transtorno de pânico, a psicoterapia cognitivo-comportamental tem eficácia comparável à da farmacoterapia.
- 57 No âmbito da psicoterapia psicanalítica, a regressão é considerada um mecanismo de defesa imatura.

58 O conceito de comportamento operante desenvolvido por Skinner — um dos pensadores da terapia comportamental — refere-se à ideia de que o comportamento age ou interage no indivíduo com o fim último de modificá-lo.

59 A principal indicação terapêutica para pacientes com transtornos de ansiedade consiste na terapia interpessoal.

60 Caso haja risco de um paciente cometer suicídio ou homicídio, a obrigatoriedade da confidencialidade não se aplicará ao médico, podendo a comunicação do risco de suicídio ou homicídio ser realizada aos familiares sem o consentimento explícito do paciente.

61 A técnica denominada *biofeedback* fundamenta-se na teoria da aprendizagem.

A respeito do exame do estado mental (EEM), julgue os seguintes itens.

62 O humor, objeto de avaliação em uma das etapas do EEM, pode ser descrito como normal, constrito, embotado ou plano.

63 A fuga de ideias é secundária à aceleração do pensamento.

64 Quando convocado para avaliar a capacidade testamentária de um paciente por meio de EEM, o perito deve provar que o paciente tem conhecimento da natureza e da extensão de suas posses e é capaz de compreender o significado do seu ato jurídico.

65 Alucinações e delírios são alterações observadas no processo do pensamento.

Julgue os itens que se seguem, referentes aos transtornos mentais.

66 O diagnóstico obtido por meio de eletroencefalograma pode não diferenciar paciente em *delirium* de paciente com demência degenerativa primária.

67 Na classificação DSM-IV-TR, as definições dos transtornos mentais consistem em descrições clínicas com abordagem não teórica em relação às causas.

68 A impulsividade e a autodestrutividade são características presentes em paciente com o transtorno de personalidade denominado *borderline*.

69 O DSM-IV-TR, ao contrário do CID-10, inclui categorias diagnósticas classificadas como neuroses.

70 No DSM-IV-TR, constam as controvérsias conceituais a respeito das categorias diagnósticas.

Com referência ao atendimento em emergências psiquiátricas, julgue os itens subsecutivos.

- 71** Caso haja suspeita de um paciente ter sofrido morte violenta, ainda que o médico que o atendeu tenha prestado assistência regular, é vedado a esse médico fornecer atestado de óbito.
- 72** A contenção de paciente agitado involuntariamente é permitida unicamente para prevenir dano iminente a terceiros.
- 73** As síndromes serotoninérgica e neuroléptica maligna, apesar de terem semelhanças clínicas, apresentam diferenças em relação à taxa de mortalidade, que, no caso da síndrome neuroléptica, reside entre 15% e 20% dos pacientes.

---

Considerando o campo da psiquiatria, julgue os itens de **74** a **79**.

- 74** No atendimento multiprofissional em saúde mental, as intervenções devem ser dirigidas especialmente às incapacidades, mais do que aos sintomas.
- 75** Para se monitorar a toxicidade do lítio, devem ser observados os sintomas clínicos do paciente, que incluem polidipsia, poliúria, tremores e ataxia.
- 76** Os efeitos colaterais comumente causados pelo uso de antipsicótico atípico olanzapina incluem sedação e indução de síndrome metabólica, e a indicação desse medicamento deve limitar-se a pacientes hipertensos, diabéticos e obesos.
- 77** Em pacientes portadores de síndrome da imunodeficiência adquirida com quadro febril de início abrupto, o uso de antipsicótico deve-se restringir à possível ocorrência de delírios e alucinações, uma vez que o tratamento dispensado à doença infecciosa trará melhoras, também, para o quadro psiquiátrico.

- 78** Na perícia médica para regresso ao trabalho de paciente com transtorno bipolar e eventos agravados por trabalho em turnos, o critério de liberação para reintegração ao trabalho não se restringe ao estado atual de remissão da sintomatologia clínica.
- 79** A recusa de paciente em informar à companheira sua condição de portador do vírus da AIDS pode justificar a quebra do direito à confidencialidade.

---

Julgue os itens seguintes, relativos à interdição.

- 80** Na avaliação para interdição civil, é suficiente que o perito valha-se do sistema nosológico internacional da Organização Mundial de Saúde, denominado CID-10.
- 81** Nas ações de interdição, o papel do perito é julgar a capacidade do indivíduo de tomar decisões em determinado período e, mais especificamente, se são válidas as transações comerciais por ele efetuadas nesse período.
- 82** Nas ações de interdição, é permitido ao médico participar como perito da avaliação de ex-paciente, desde que o vínculo entre eles tenha cessado há pelo menos cinco anos.

---

Com base no Código de Ética Médica, julgue os seguintes itens.

- 83** Em perícias para a concessão de licença médica, é correta a recusa de declaração médica de comparecimento à consulta, mesmo que esta contemple diagnóstico médico, prescrição, descrição detalhada de sintomas e CID.
- 84** Considere que uma médica mantenha relação amorosa e sexual — iniciada após um ano do término da relação médica-paciente — com um ex-paciente. Nessa situação, como não resta mais responsabilidade profissional nessa relação, não se considera antiética a conduta da médica.
- 85** A administração de medicamento sob pesquisa por médico assistente é permitida nos casos em que os métodos existentes não apresentem resultado satisfatório.

Suspeitas em relação a outras pessoas, ciúmes, incapacidade de perdoar e extração de significados ocultos em situações neutras são critérios diagnósticos da CID-10 e do DSM-IV-TR para o transtorno de personalidade paranoide (TPP). Acerca desse assunto, julgue os itens a seguir.

- 86** O TPP pode manifestar-se como antecedente pré-mórbido de outros transtornos do eixo I, como a esquizofrenia ou o transtorno delirante.
- 87** Diferentemente do TPP, o transtorno delirante de tipo persecutório, o estado de humor com sintomas psicóticos e a esquizofrenia de tipo paranoide caracterizam-se por período de sintomas psicóticos persistentes, entre os quais se incluem alucinações e delírios.
- 88** Os transtornos narcisista e *borderline* são os transtornos de personalidade menos frequentes em comorbidade com o TPP.

---

Julgue os próximos itens, referentes à psicose pós-parto, psicopatia cujos sintomas mais frequentes são depressão, delírios e pensamentos autoagressivos ou contra o bebê.

- 89** A incidência de transtornos do humor em parentes de indivíduos com psicose pós-parto é similar à observada em parentes de indivíduos com transtornos do humor.
- 90** Em regra, o desenvolvimento da psicose pós-parto está relacionado a eventos perinatais como infecções, intoxicações e perda sanguínea.
- 91** No DSM-IV-TR, não constam critérios diagnósticos específicos da psicose pós-parto.
- 92** A administração de estrógeno e progesterona às pacientes tem-se mostrado eficaz no tratamento da psicose pós-parto, uma vez que já se provou que a diminuição súbita nas concentrações desses hormônios, logo após o parto, contribui para a prevenção do transtorno.

Com relação a transtornos factícios, julgue os itens a seguir.

- 93** Os sintomas psicológicos factícios assemelham-se aos fenômenos da pseudossimulação.
- 94** Pacientes inicialmente internados como psicóticos e, posteriormente, diagnosticados como portadores de doença factícia tendem a apresentar transtorno de personalidade *borderline*.
- 95** De modo geral, os pacientes com transtornos factícios abandonam o tratamento quando o método que utilizam para conquistar atenção é identificado pelo profissional que os assiste.
- 96** Denomina-se síndrome de Munchausen o transtorno factício com sintomas psicológicos.

---

Julgue os próximos itens, relativos a transtornos dissociativos.

- 97** Nos casos de transtorno dissociativo da identidade, assim como nos de fuga dissociativa, as identidades antiga e nova não se alteram.
- 98** O transtorno da despersonalização está associado ao consumo de drogas como álcool, clioquinol, escopolamina e maconha.
- 99** Incluem-se, entre os sintomas-chave da amnésia dissociativa, leve déficit cognitivo que dificulta a apreensão de novas informações e incapacidade para recordar informações já armazenadas.
- 100** Diferentemente do que ocorre na vigência de amnésia dissociativa, na vigência de amnésia pós-concussão, a perturbação da memória dos pacientes é frequentemente anterógrada.
- 101** O transtorno dissociativo de identidade pode desenvolver-se até mesmo em crianças de três anos de idade, sendo as do sexo masculino as que apresentam maior propensão a desenvolvê-lo.

---

A respeito dos transtornos psiquiátricos associados ao envelhecimento, julgue os itens seguintes.

- 102** Apresentando o paciente idoso sinais evidentes de comprometimento psiquiátrico, a entrevista a ser realizada com ele deverá ocorrer na presença de seus parentes.
- 103** A depressão de início tardio caracteriza-se por altas taxas de recorrência.
- 104** A idade constitui fator de risco para o desenvolvimento da depressão em pacientes idosos.
- 105** O transtorno delirante mais comum a se manifestar na fase geriátrica é o de natureza somática.

Julgue os itens que se seguem, referentes a transtornos alimentares.

- 106** Portadores de anorexia nervosa frequentemente apresentam comportamento obsessivo-compulsivo, depressão e ansiedade.
- 107** Casos de depressão e de dependência de álcool são comuns entre familiares de pacientes com anorexia nervosa.
- 108** A taxa de suicídio de pacientes portadores de anorexia do tipo compulsão periódica/purgativo é inferior à de pacientes que apresentam anorexia do tipo restritivo.
- 109** A anorexia nervosa manifesta-se em indivíduos na faixa etária de dez a trinta anos de idade, sendo a frequência máxima de ocorrência desse transtorno entre os treze e os vinte e cinco anos de idade.
- 110** Os portadores de anorexia nervosa tendem a apresentar episódios de voracidade, uma vez que pensam constantemente em comida.

---

Com relação a transtornos de humor, julgue os itens de **111** a **115**.

- 111** Os problemas neurológicos mais comuns que se manifestam com sintomas como depressão incluem a doença de Parkinson, a epilepsia e as doenças causadoras de demência, com exceção da demência do tipo Alzheimer.
- 112** Diferentemente dos pacientes que apresentam demência, os com depressão e dificuldades cognitivas se esforçam para responder ao que lhes é perguntado.

- 113** Os sintomas cognitivos do transtorno depressivo maior iniciam-se subitamente.
- 114** O diagnóstico diferencial de um paciente com transtorno bipolar I (episódio depressivo) é idêntico ao de um paciente com transtorno depressivo maior.
- 115** Em pacientes que apresentam mania não se observam alucinações bizarras nem delírios não congruentes com o humor.

---

Acerca de dependência química no ambiente de trabalho, julgue o item abaixo.

- 116** Nervosismo, irritabilidade, falta de concentração e excessivos pedidos de dispensa do trabalho se incluem entre as atitudes e comportamentos do empregado que podem estar relacionados à dependência química.

---

Com relação aos transtornos do sono, julgue os itens subsequentes.

- 117** A parassonia é um fenômeno comum que aparece subitamente durante o sono, nos estágios 1 e 2.
- 118** Alterações do sono típicas da depressão maior estão associadas a perturbações na atividade colinérgica central.
- 119** As causas das dificuldades para permanecer dormindo incluem interações de substâncias e lesões do tronco cerebral.
- 120** A narcolepsia é uma perturbação psicogênica.

## PROVA DISCURSIVA

- Nesta prova, faça o que se pede, usando o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, transcreva o texto para a **FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA**, no local apropriado, pois **não serão avaliados fragmentos de texto escritos em locais indevidos**.
- Qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de **trinta** linhas será desconsiderado.
- Na **folha de texto definitivo**, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois **não será avaliado** texto que tenha qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.

Nenhum exame psiquiátrico é tão pouco compreendido pelos profissionais da área quanto o exame do estado mental (EEM). Duas concepções errôneas a respeito desse exame são frequentes. A primeira consiste na ideia de que o EEM restringe-se ao momento em que o profissional testa a orientação e a memória do paciente. Na realidade, ele abrange toda a entrevista, quando são avaliados, de forma contínua, o afeto, a concentração, a memória e o *insight* do paciente. A segunda refere-se ao entendimento de que o EEM é idêntico ao minixame do estado mental de Folstein (Minimental), rastreamento específico para a avaliação de demência cujo uso na entrevista psiquiátrica de rotina está sendo cada vez mais questionado.

O EEM é definido como a avaliação do estado de funcionamento cognitivo e emocional atual do paciente. Assim, embora em boa parte da entrevista inicial se focalize especificamente o passado do paciente, para se realizar com excelência esse exame, é necessário que o profissional dispense atenção, também, para o tempo presente, momento em que o profissional poderá observar a forma como o paciente se apresenta, seu processo de pensamento se organiza e suas emoções se manifestam.

Vicente Caballo. **Manual de transtornos de personalidade. Descrição, avaliação e tratamento**. São Paulo: Santos Livraria e Editora, 2008 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial, redija um texto dissertativo acerca do EEM, apresentando os elementos que o compõem. Em seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos a serem considerados no exame:

- ▶ qualidades da linguagem;
- ▶ qualidades do afeto;
- ▶ memória.

**RASCUNHO**

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	



**cespeUnB**

Centro de Seleção e de Promoção de Eventos