

**PROVA DE CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS****ENFERMAGEM****QUESTÃO ÚNICA**

41. Um estudo realizado em um hospital universitário observou que 11,0% dos pacientes submetidos à cateterização vesical de demora apresentaram infecção, enquanto a incidência de infecção estimada para todos os pacientes internados foi de 5,7 a 16,3%. Com isso pode-se afirmar:

- (A) a prevalência da infecção urinária em pacientes com sonda de demora é baixa.
- (B) a taxa de infecção urinária é elevada em pacientes que se submeteram ao cateterismo.
- (C) a taxa de infecção urinária em pacientes que se submeteram ao cateterismo está dentro do esperado.
- (D) a prevalência da infecção urinária em pacientes com sonda de demora é aceitável comparado aos casos esperados.
- (E) a incidência de infecção estimada está acima da realidade.

42. Sobre segurança do paciente é correto afirmar que:

- (A) todo erro em saúde ocasiona um ou mais eventos adversos.
- (B) a iatrogenia é o principal erro que ameaça atualmente a segurança do paciente.
- (C) a notificação de acidentes é amplamente utilizada para estudos epidemiológicos sobre eventos adversos.
- (D) o prontuário eletrônico é o instrumento principal para evitar erros.
- (E) os aspectos mais relevantes que comprometem a segurança dos pacientes são: erros de prescrição/administração de medicamentos, falha na comunicação e infecções.

43. Sobre o funcionamento da sala de vacinação é correto afirmar:

- (A) o termômetro de aferição da temperatura máxima e mínima deve permanecer sempre na posição horizontal.
- (B) o termômetro linear deve ser colocado dentro do refrigerador e deve ser verificada a temperatura pelo menos 2 vezes ao dia, registrando o valor encontrado em uma folha de controle.
- (C) como protocolo, em caso de falta de energia elétrica, os imunobiológicos devem ser imediatamente retirados do refrigerador e colocados em uma caixa térmica até o retorno da energia elétrica.
- (D) os frascos das sobras diárias de imunobiológicos ou daqueles que sofreram alteração de temperatura, ou prazo de validade vencido devem ser desprezados em sacos de lixo azul ou verde, e os resíduos comuns em sacos brancos.
- (E) em locais onde não há coleta sistemática do lixo hospitalar, as sobras dos produtos compostos por microorganismos vivos atenuados, recebem tratamento antes de serem desprezadas. Para isso os frascos devem ser colocados no autoclave durante 15 minutos, a uma temperatura entre 121°C e 127°C.

44. Para mobilizar secreções de vias aéreas inferiores e facilitar a eliminação da secreção pela tosse ou aspiração, o(a) enfermeiro(a) poderá realizar a drenagem postural. Quando queremos facilitar a drenagem do lobo médio do pulmão direito, como devemos posicionar o cliente?

- (A) Sentado com as mãos apoiadas nas pernas.
- (B) Sentado com a cabeça apoiada nas pernas, colocando um travesseiro entre as pernas e o tronco.
- (C) Decúbito lateral esquerdo, com um travesseiro para apoiar a cabeça e as costas e manter o braço direito estendido e apoiado na cabeça.
- (D) Decúbito lateral direito, com um travesseiro para apoiar a cabeça e as costas e manter o braço esquerdo estendido e apoiado na cabeça.
- (E) Decúbito dorsal e com pernas fletidas e apoiadas em um travesseiro.

45. Em uma prescrição pede-se a administração de 140 ml de uma solução em um tempo de 45min. Calcule o número de microgotas necessárias para administrar essa solução no tempo prescrito e assinale a alternativa correta.
- (A) 187 microgotas/min
(B) 62 microgotas/min
(C) 46 microgotas/min
(D) 6 microgotas/min
(E) 3 microgotas/min
46. As definições e as teorias de enfermagem ajudam na compreensão da prática da profissão. Dessa forma, considerando as teorias e seus principais objetivos, associe a segunda coluna de acordo com a primeira e, a seguir, assinale a alternativa com a sequência correta.
- | | |
|-----------------|---|
| (1) Orem | () identificar tipos de demandas centradas no paciente, avaliar a adaptação às demandas e ajudar o paciente a se adaptar |
| (2) Nightingale | () promover a saúde, restaurar o cliente a condição de saúde e prevenir a doença |
| (3) Roy | () cuidar e ajudar o cliente a alcançar o autocuidado total |
| (4) Watson | () facilitar os processos reparativos do corpo por manipulação do ambiente ao paciente. |
- (A) 3 – 4 – 1 – 2
(B) 1 – 2 – 3 – 4
(C) 3 – 2 – 1 – 4
(D) 1 – 4 – 3 – 2
(E) 3 – 4 – 2 – 1
47. A finalidade do uso de afirmações diagnósticas de enfermagem é:
- (A) avaliar o cuidado de enfermagem.
(B) colher informações sobre dados dos pacientes.
(C) identificação de sinais clínicos comprometidos.
(D) ajudar a enfermagem a focalizar o seu papel no cuidado ao paciente.
(E) facilitar a compreensão dos profissionais de saúde a respeito do problema de saúde do paciente.
48. Você tem uma prescrição médica de 0,25mg de digoxina IV. A ampola que a farmácia enviou diz 0,125mg (= 1cc). Quantos frascos você vai aspirar?
- (A) 1,0
(B) 1,5
(C) 2,0
(D) 3,0
(E) 3,5
49. A manutenção de níveis normais de glicose no período pós-operatório previne:
- (A) trombo
(B) êmbolo
(C) sangramento
(D) íleo paralítico
(E) infecção da ferida cirúrgica
50. À inflamação das vias respiratórias que provoca episódios de tosse, sibilo e dispnéia, que exige avaliação adequada de enfermagem com medidas de intervenção para alívio imediato de sintomas respiratórios e de ansiedade, como também intervenções para educação e manutenção da saúde, dá-se o nome de:
- (A) Sinusite
(B) Anafilaxia
(C) Rinite alérgica
(D) Asma brônquica
(E) Alergias alimentares

51. Na anamnese de um paciente que sofreu queimadura, a enfermeira percebe que a pele está superficialmente destruída, com ferida úmida e dolorosa, com áreas avermelhadas edematosas que clareiam mediante compressão. Considerando a profundidade da queimadura a enfermeira deve tratar esse evento como:
- (A) queimadura de primeiro grau
(B) queimadura de segundo grau
(C) queimadura de terceiro grau
(D) eritema
(E) escoriação
52. No exame de Hemograma o valor normal da taxa de Hemoglobina em um homem adulto é:
- (A) 7,8 g/dl
(B) 11,2 g/dl
(C) 14,5 g/dl
(D) 43 g/dl
(E) 150 g/dl
53. São manifestações clínicas da febre reumática aguda em crianças de 6 a 15 anos:
- I. poliartrite
II. cardite
III. coréia
IV. eritema
V. hipertermia
- (A) somente I e II estão corretas
(B) somente II e III estão corretas
(C) somente II, III, V estão corretas
(D) somente III, IV e V estão corretas
(E) todas as alternativas estão corretas
54. São fármacos utilizados para o tratamento de distúrbios convulsivos:
- (A) Lorazepam e Furosemida
(B) Diazepam e Metronidazol
(C) Metronidazol e Fenobarbital
(D) Carbamazepina e Primidona
(E) Furosemida e Carbamazepina
55. Identificando os tipos de precauções para as seguintes doenças, associe a segunda coluna de acordo com a primeira e, a seguir, assinale a alternativa com a sequência correta:
- | | |
|---|--------------|
| (1) Precauções de contato | () Rubéola |
| (2) Precauções contra gotículas | () Varicela |
| (3) Precauções para transmissão pelo ar | () Impetigo |
| | () Difteria |
| | () Sarampo |
- (A) 3 – 1 – 1 – 2 – 2
(B) 3 – 2 – 1 – 3 – 2
(C) 1 – 2 – 3 – 1 – 2
(D) 1 – 3 – 2 – 3 – 1
(E) 2 – 3 – 1 – 2 – 3
56. A Herpes Simples apresenta-se na pele como uma lesão cutânea do tipo:
- (A) vesícula
(B) pápula
(C) mácula
(D) pústula
(E) placa
57. O Óxido Nitroso (N₂O) é freqüentemente utilizado no processo anestésico por:
- (A) promover bom relaxamento.
(B) impedir a depressão do miocárdio.
(C) não se associar a outros agentes voláteis.
(D) não causar hipóxia mesmo sendo administrado em altas dosagens.
(E) ter indução e recuperação rápidas, além de ter efeitos aditivos para outros anestésicos.

58. Associe a segunda coluna de acordo com a primeira e, a seguir, assinale a alternativa com a sequência correta:
- | | |
|-------------------|--|
| (1) Aderência | () Formação de tecido conjuntivo ou cicatricial excessivo |
| (2) Quelóide | () Extrusão de órgãos internos através da ferida |
| (3) Gangrena | () Junção de membranas serosas causando formação de tecido fibroso |
| (4) Evisceração | () Separação de camadas da ferida cirúrgica |
| (5) Deiscência | () Processo de infecção anaeróbia que ocorre em lugar da cicatrização |
- (A) 1 – 2 – 3 – 4 – 5
(B) 1 – 3 – 5 – 2 – 4
(C) 2 – 4 – 1 – 5 – 3
(D) 2 – 5 – 4 – 1 – 3
(E) 3 – 4 – 1 – 5 – 2
59. O diagnóstico de enfermagem de débito cardíaco diminuído, para pacientes em pós-operatório imediato, pode está relacionado a:
- (A) dor e ansiedade
(B) retenção periférica de sangue
(C) tipo de procedimento cirúrgico
(D) tempo do procedimento cirúrgico
(E) comprometimento das eliminações
60. A termorregulação ineficaz relacionada a processos cirúrgicos é um diagnóstico real de enfermagem para:
- (A) pacientes renais
(B) pacientes idosos
(C) pacientes adultos
(D) pacientes submetidos a anestesia geral
(E) todos os pacientes submetidos a cirurgia
61. Pela RDC nº 153, as bolsas de concentrado de hemácias, após serem descongeladas, devem ser transfundidas em no máximo quantas horas?
- (A) uma
(B) duas
(C) quatro
(D) seis
(E) dez
62. Cirurgias seguras salvam vidas. Esse é um desafio da Aliança Mundial para a Segurança do Paciente. No que diz respeito à realização de “pausa cirúrgica”, que é uma etapa prevista no Protocolo Universal, é correto afirmar:
- (A) tem como uma das suas funções a troca das luvas cirúrgicas em cirurgias prolongadas.
(B) momento utilizado quando é necessário realizar algum exame diagnóstico intraoperatório.
(C) pausa realizada nas cirurgias prolongadas para que seja realizada troca de equipe de cirurgiões.
(D) é uma breve pausa antes da incisão para confirmar o paciente, o procedimento e o local da operação.
(E) é o momento em que é confirmado o início da ação da anestesia para que se inicie o procedimento cirúrgico sem desconforto para o paciente.
63. Para pacientes diabéticos, a atividade física está contra-indicada no seguinte caso:
- (A) for hipertenso.
(B) glicemia superior a 300mg/dl.
(C) fazer exercícios pós-alimentação.
(D) se o paciente tiver diabetes tipo I.
(E) tiver diagnóstico de obesidade mórbida.
64. Dentre as alternativas abaixo, assinale o fármaco que aumenta o risco de hipoglicemia.
- (A) Nitratos
(B) Ranitidina
(C) Dimeticona
(D) Amoxicilina
(E) Ácido Acetil-Salicílico

65. Em situações de desastres, a triagem das vítimas é de suma importância para salvar o máximo de vidas. A classificação por código de cores, utilizada pela Defesa Civil, indica a prioridade de atendimento. Assinale a alternativa correta em relação à utilização deste instrumento.
- (A) A faixa verde corresponde aos pacientes sem lesões aparentes, porém por estarem no local do desastre são examinados e liberados.
 - (B) A faixa vermelha corresponde aos feridos com lesão moderada, mas que podem evoluir para uma situação de risco iminente (pacientes de médio risco).
 - (C) A faixa amarela corresponde aos feridos com lesões graves, mas por não estarem em situação de risco iminente, têm menor prioridade que os pacientes de alto risco.
 - (D) A faixa preta corresponde aos feridos graves, com lesões severas, em situação de risco iminente e cujas probabilidades de sobrevivência dependem de cuidados imediatos. (pacientes de alto risco).
 - (E) A faixa branca corresponde aos pacientes com lesões leves e baixo nível de risco, os quais, atendidos rapidamente, no setor específico (feridos leves), podem ser liberados e referenciados para controle ambulatorial.
66. No atendimento à pessoas com ingestão acidental de substância cáustica devem ser observados os seguintes cuidados:
- (A) não realizar a lavagem gástrica.
 - (B) como cuidado de emergência deverá ser passada sonda nasogástrica para aspiração do conteúdo gástrico.
 - (C) o paciente deverá ser encaminhado imediatamente ao serviço de endoscopia digestiva para avaliar o dano à mucosa do trato digestivo alto.
 - (D) quando a substância cáustica é apresentada em grânulos o prognóstico em relação à presença de lesões é melhor do que se a substância for líquida.
 - (E) se no exame da cavidade oral não for identificada lesão após a ingestão da substância cáustica, é indicativo de que a mucosa não foi lesionada por essa substância.
67. Trata-se de um dos cuidados de enfermagem prioritário para paciente com o diagnóstico de enfermagem de débito cardíaco diminuído:
- (A) controle de diurese.
 - (B) realizar pulsoterapia.
 - (C) realizar curva térmica.
 - (D) orientar aumento da ingesta hídrica.
 - (E) orientar sobre os cuidados com o uso de marcapasso.
68. O acidente ofídico causado pelas serpentes peçonhentas do gênero Lachesis (Surucucu), caracterizado pelo edema local, dor, calor, eritema, necrose, lesão vascular com sangramento e até insuficiência renal aguda é conhecido como:
- (A) Peçonho
 - (B) Iaquésico
 - (C) Crotálico
 - (D) Botrópico
 - (E) Micrúrico
69. São características próprias da demência no idoso:
- (A) início súbito, de progressão abrupta e memória geralmente prejudicada.
 - (B) atenção prejudicada, memória geralmente normal e desorientação seletiva.
 - (C) progressão lenta, de início insidioso, pensamentos diminuídos com dificuldade para encontrar as palavras.
 - (D) início insidioso, pensamento desorganizado e distorcido e episódios de delírios.
 - (E) pensamento desorganizado, discurso incoerente e comportamento variável com retardo ou agitação psicomotora.
70. Sobre as alterações relacionadas ao metabolismo hidroeletrólítico na gravidez é correto afirmar:
- (A) a excreção de sódio aumenta com a ação da aldosterona.
 - (B) a excreção de sódio na gravidez é diminuída pela ação da progesterona.
 - (C) fisiologicamente o sódio tem sua excreção aumentada para diminuir o edema gestacional.
 - (D) estimular a gestante a permanecer em posição supina e de pé contribui para o aumento da excreção de sódio.
 - (E) no terceiro trimestre há uma elevação do volume plasmático para capacitar a gestante para as perdas sanguíneas do parto.

71. São complicações próprias do último trimestre de gravidez:

- I. Doença Hipertensiva Específica da Gravidez
- II. Hiperêmese Gravídica
- III. Incompetência Instimocervical
- IV. Doença trofoblástica Gestacional
- V. Descolamento Prematuro da Placenta

- (A) somente I e V estão corretas
- (B) somente II e IV estão corretas
- (C) somente I, II e III estão corretas
- (D) somente I, III e V estão corretas
- (E) somente II, III e IV estão corretas

72. São complicações diretas da ruptura prematura da bolsa amniótica:

- (A) Distocia
- (B) hidrânio
- (C) corioamnionite
- (D) desidratação fetal
- (E) hemorragia uterina

73. Assinale abaixo a afirmativa que fornece as informações corretas para administrar o imunobiológico em questão, observando volume e quantidade de doses, via de administração e data de início da vacinação:

- (A) a tríplice viral deve ser feita ao nascer, sendo administrada em uma dose de 0,5 ml por via subcutânea.
- (B) a vacina contra a febre amarela deve ser feita a partir dos seis meses, sendo administrada em uma dose de 0,5 ml por via subcutânea.
- (C) a vacina DTP deve ser feita a partir dos seis meses de idade, sendo administrada em três doses com 0,5 ml por via intramuscular.
- (D) a vacina contra o sarampo deve ser feita a partir dos três meses de idade, sendo administrada em uma dose de 0,1 ml por via subcutânea.
- (E) a vacina contra a hepatite B deve ser feita a partir dos três meses de idade, sendo administrada em três doses de 0,5 ml por via intramuscular.

74. A exposição ocupacional a produtos químicos está relacionada com a ocorrência de várias doenças. Relacione a primeira coluna de acordo com a segunda coluna e assinale a opção correta no que diz respeito aos fatores de risco das doenças ocupacionais:

DOENÇA OCUPACIONAL	PRINCIPAL FATOR DE RISCO OCUPACIONAL
(1) Metahemoglobinemia	(a) Exposição ocupacional ao benzeno
(2) Angiossarcoma hepático	(b) Exposição ocupacional ao asbesto
(3) Câncer de estômago	(c) Exposição ocupacional a tiouracil
(4) Leucemia mieloblástica	(d) Exposição ocupacional a aminas aromáticas
	(e) Exposição ocupacional ao cloreto de vinila
(A) 1 – d; 2 – e; 3 – b, 4 – a	
(B) 1 – b; 2 – d; 3 – c; 4 – e	
(C) 1 – c; 2 – a; 3 – d; 4 – b	
(D) 1 – d; 2 – a; 3 – b; 4 – c	
(E) 1 – e; 2 – b; 3 – a; 4 – c	

75. Sobre a utilização de hemocomponentes e hemoderivados como recurso terapêutico, é correto afirmar:

- (A) o concentrado de hemácias deve ser mantido entre 2°C e 6°C e sua validade varia entre 45 e 60 dias.
- (B) as hemácias não podem ser transfundidas em acesso venoso compartilhado com nenhum tipo de solução.
- (C) o plasma fresco deve ser armazenado a uma temperatura de 1°C a 6°C e após descongelado só poderá ser utilizado até 8 horas.
- (D) o concentrado de plaquetas pode ser obtido a partir do sangue total ou por aférese, sendo coletadas de vários doadores para se chegar ao volume desejado.
- (E) a lavagem das hemácias e plaquetas com solução salina, realizada no banco de sangue, tem como principal objetivo a eliminação da maior quantidade possível de plasma.

76. A poluição atmosférica nas grandes cidades é considerada como um problema de saúde pública. Assinale abaixo um dos principais agentes responsáveis pela poluição atmosférica fotoquímica:

- (A) Particulados
- (B) Ácido sulfúrico
- (C) Dióxido de enxofre
- (D) Óxidos de nitrogênio
- (E) Monóxido de carbono

77. A febre de katayama está associada a que patologia abaixo especificada?

- (A) Botulismo.
- (B) Coqueluche.
- (C) Febre Amarela.
- (D) Doença de Chagas.
- (E) Esquistossomose aguda.

78. Sobre a osteomielite em crianças é correto afirmar que:

- (A) é uma infecção grave do espaço articular que ocorre comumente na adolescência e seus sintomas são eritema, calor, tumefação e dor.
- (B) sua incidência é alta entre 2 meses e 2 anos de idade, e o processo infeccioso é facilmente tratado pelo uso de agentes antimicrobianos.
- (C) é um processo inflamatório grave, que acomete crianças na faixa etária entre 2 a 5 anos, e o tratamento baseia-se na manutenção da pressão arterial, perfusão e oxigenação.
- (D) é um processo infeccioso dos ossos e articulações que acometem mais frequentemente crianças entre 3 a 12 anos de idade, de início abrupto com presença de febre, dor, calor, eritema e tumefação.
- (E) é de início súbito ou insidioso, acomete normalmente crianças pequenas de 1 a 2 anos. A criança posiciona o membro envolvido em flexão para minimizar a dor pela compressão da cápsula articular do quadril.

79. É diagnóstico de enfermagem para pacientes com distúrbios bipolares:

- (A) distúrbio dos processos do pensamento relacionado com ansiedade grave
- (B) ansiedade relacionada com ataques de pânico inesperados ou com experiência de eventos traumáticos.
- (C) risco de violência autodirigida ou dirigida a outras pessoas relacionado com o pensamento delirante e experiências alucinatórias.
- (D) perturbação dos processos de pensamento relacionada com alterações biológicas como: agitação, hiperatividade e incapacidade de se concentrar.
- (E) distúrbio dos processos de pensamento com distorções de percepção e cognitivas como demonstrado por comportamento suspeito e defensivo, e rupturas no pensamento.

80. Obedecendo ao calendário básico de vacinações do Ministério da Saúde, associe a segunda coluna de acordo com a primeira e, a seguir, assinale a alternativa com a sequência correta:

- | IDADE | VACINAS |
|--------------------|-------------------------------|
| (1) um mês de vida | () HB – contra hepatite B |
| (2) quatro meses | () VOP – contra poliomielite |
| (3) nove meses | () FA – contra febre amarela |
| | () Hib – contra meningite |
-
- (A) 1 – 3 – 2 – 1
 - (B) 2 – 1 – 3 – 3
 - (C) 1 – 2 – 3 – 2
 - (D) 1 – 2 – 1 – 3
 - (E) 3 – 1 – 2 – 1



FINAL DA PROVA