



VERSÃO

**B**

## COMANDO DA AERONÁUTICA

### EXAME DE ADMISSÃO AO CURSO DE ADAPTAÇÃO DE MÉDICOS DA AERONÁUTICA (CAMAR 2013)

#### ESPECIALIDADE: OTORRINOLARINGOLOGIA



#### LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

1. Este caderno contém 01 (uma) prova de GRAMÁTICA e INTERPRETAÇÃO DE TEXTO, composta de 30 (trinta) questões objetivas numeradas de 01 (um) a 30 (trinta); e 01 (uma) prova de ESPECIALIDADE, composta de 30 (trinta) questões objetivas numeradas de 31 (trinta e um) a 60 (sessenta).
2. Ao receber a ordem do Chefe/Fiscal de Setor, **confira**:
  - ✓ se a numeração das questões e a paginação estão corretas;
  - ✓ se todas as questões estão perfeitamente legíveis. Sendo detectada alguma anormalidade de impressão, solicite imediatamente ao fiscal de prova a substituição deste caderno; e
  - ✓ se a “VERSÃO” da prova e a “ESPECIALIDADE” constantes deste caderno de questões conferem com os campos “VERSÃO” e “ESPECIALIDADE” contidos em seu CARTÃO DE RESPOSTAS.
3. O caderno de questões pode ser utilizado livremente para fazer rascunhos (cálculos, desenhos, etc.).
4. Iniciada a prova, é vedado formular perguntas.
5. Não é permitido ao candidato comunicar-se com outro candidato, bem como utilizar livros, anotações, agendas eletrônicas, gravadores, máquina calculadora, telefone celular e/ou similares, ou qualquer instrumento receptor/transmissor/armazenador de mensagens.
6. No **CARTÃO DE LEITURA ÓTICA PERSONALIZADO (CARTÃO DE RESPOSTAS)**, preencha apenas **uma alternativa (a, b, c ou d) de cada questão, com caneta esferográfica azul ou preta**, conforme instrução contida no próprio Cartão de Respostas.
7. A questão não assinalada ou assinalada com mais de uma alternativa, emendada, rasurada, borrada, ou que vier com outra assinalação, será **considerada incorreta**.
8. Tenha muito cuidado com o seu Cartão de Respostas para não o amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou, de qualquer modo, danificá-lo. O Cartão de Respostas **NÃO** será substituído.
9. **A prova terá a duração de 4 (quatro) horas e 20 (vinte) minutos.**
10. Recomenda-se ao candidato iniciar a marcação do Cartão de Respostas nos últimos 20 minutos do tempo total de prova.
11. Por razões de segurança e sigilo, o candidato deverá permanecer obrigatoriamente no local de realização das provas por, no mínimo, **2 (duas) horas** depois de iniciada a prova. O caderno de questões só poderá ser levado pelo candidato que permanecer no recinto por, no mínimo, 4 (quatro) horas depois de iniciada a prova.
12. Em nenhuma hipótese, o candidato poderá se ausentar do local de prova levando consigo seu Cartão de Respostas.
13. É obrigatório que o candidato assine a Lista de Chamada e o Cartão de Respostas.
14. A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno de questões e no Cartão de Respostas poderá implicar na não correção de sua prova e exclusão do processo seletivo.



- 31)** Relacione a coluna da direita com a da esquerda e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência **correta**.
- |               |   |
|---------------|---|
| (1) Laringe   | ( ) é a abertura da laringe.  |
| (2) Epiglote  | ( ) porção cartilaginosa da via aérea, em posição cervical alta.  |
| (3) Cricoidea | ( ) circunda a via aérea bem abaixo das cordas vocais.  |
| (4) Glote     | ( ) cartilagem revestida por epitélio estratificado, com a função de fechar a abertura da laringe durante deglutição. |
- a) 4 – 3 – 1 – 2  
 b) 2 – 1 – 4 – 3  
 c) 4 – 1 – 3 – 2  
 d) 3 – 2 – 1 – 4
- 32)** São fatores de risco para sinusite bacteriana aguda, **exceto**:
- a) Rinite alérgica.  
 b) Desvio de septo.  
 c) Otite média aguda.  
 d) Refluxo gastroesofágico.
- 33)** Os principais vírus que acometem preferencialmente a faringe e as amígdalas são, **exceto**:
- a) HSV-1.  
 b) Adenovírus.  
 c) *Cocksakie A*.  
 d) Vírus *Epstein-Barr*.
- 34)** A doença de Ménière é uma alteração da orelha interna que se caracteriza por crises paroxísticas de vertigem típica, hipoacusia neurosensorial flutuante, zumbidos e sensação de pressão na orelha afetada. São fatores relacionados ao desenvolvimento da doença de Ménière, **exceto**:
- a) Sífilis.  
 b) Trauma.  
 c) Otosclerose.  
 d) Perda auditiva.
- 35)** Embora os neurinomas do acústico se originem quase que exclusivamente do nervo vestibular, em geral, o paciente portador deste tipo de tumor se apresenta, de uma forma bastante característica, com uma história de perda auditiva
- a) assimétrica.  
 b) bilateral simétrica.  
 c) bilateral progressiva.  
 d) unilateral progressiva.
- 36)** Sobre a paralisia idiopática ou paralisia de Bell, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo e, em seguida, assinale a alternativa **correta**.
- ( ) Caracteriza-se por proporcionar quadro de paralisia do nervo facial de caráter periférico, de instalação súbita e causa determinada.  
 ( ) Não é o quadro mais frequente de paralisia, considerando-se tanto adultos quanto crianças, constituindo-se, portanto, de uma entidade rara.  
 ( ) Na maioria dos casos de paralisia de Bell (70 a 85%), ocorre uma recuperação espontânea da função do nervo, mesmo não havendo tratamento algum.  
 ( ) O tratamento cirúrgico não está entre os recursos terapêuticos utilizados no tratamento desse tipo de paralisia.
- a) V – V – F – V  
 b) V – F – V – F  
 c) F – F – F – V  
 d) F – V – V – F

37) A timpanoplastia é um procedimento relativamente seguro em mãos experientes e deve ser indicado para eliminar uma infecção da orelha média e/ou restaurar o mecanismo de condução sonora em qualquer paciente saudável. Relacione as colunas com os nomes e definições dos vários tipos de timpanoplastia e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência **correta**.

- (1) Miringoplastia
- (2) Timpanoplastia Tipo I
- (3) Timpanoplastia Tipo II
- (4) Timpanoplastia Tipo III
- (5) Timpanoplastia Tipo IV
- (6) Timpanoplastia Tipo V

- ( ) Pode ser realizada em situações especiais nas quais outros tipos de timpanoplastias tenham tido sucesso na eliminação do processo patológico, porém sem um resultado funcional satisfatório devido a uma fixação primária, ou, mais comumente, secundária da base do estribo.
- ( ) Procedimento no qual utiliza-se tecido sob a forma de um enxerto para selar uma perfuração da membrana timpânica.
- ( ) É geralmente utilizada realizando-se uma abordagem pelo canal auditivo externo (CAE) e consiste na exploração da orelha média, inspeção da cadeia ossicular e possível remoção de patologias menores.
- ( ) É realizada quando a doença encontrada impede o estabelecimento de um sistema condutor normal.
- ( ) É realizada quando há doença ossicular extensa, inclusive com ausência da supraestrutura estapediana.
- ( ) É a cirurgia destinada a remover tecido doente, seguida de processo reconstrutivo do mecanismo de alavanca do sistema ossicular.

- a) 3 – 5 – 2 – 6 – 4 – 1
- b) 4 – 5 – 2 – 6 – 3 – 1
- c) 1 – 4 – 3 – 5 – 6 – 2
- d) 6 – 1 – 2 – 4 – 5 – 3

38) Analise as afirmativas abaixo.

- I. Sob o ponto de vista eminentemente clínico, a otite média crônica é caracterizada como uma condição inflamatória associada a perfurações amplas e persistentes da membrana timpânica e otorreia.
- II. A otite média aguda é definida como um processo inflamatório de curta duração, de intervalo não superior a duas semanas entre o seu início e o seu término.
- III. A otite média aguda é um processo inflamatório, infeccioso ou não, ocupando focal ou generalizadamente a fenda auditiva.
- IV. A otite média aguda raramente está associada a quadros inflamatórios mais insidiosos, persistentes ou destrutivos.

Está(ão) **incorreta(s)** somente a(s) afirmativa(s)

- a) III.
- b) I e III.
- c) I e IV.
- d) II e IV.

39) O osso temporal é frequentemente envolvido nos traumatismos cranioencefálicos. Assinale abaixo a alternativa **incorreta** em relação às fraturas que podem atingir esse osso.

- a) Fraturas extralabirínticas não comprometem o labirinto ósseo, mas a cápsula ótica.
- b) Fraturas labirínticas, por comprometerem o labirinto ósseo, levam à perda neurosensorial.
- c) Fraturas longitudinais são aquelas que se estabelecem acompanhando o maior eixo da porção petrosa.
- d) Fraturas transversas são aquelas que ocorrem segundo orientação transversa ao maior eixo do rochedo.

40) Relacione as síndromes descritas abaixo ligadas a disacusias neurosensoriais à sua descrição e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência **correta**.

(1) Síndrome de *Pendred*

(2) Síndrome de *Perrault*

(3) Síndrome de *Johanson-Bliz-Zard*

(4) Síndrome de *Down*

( ) a perda auditiva pode ser encontrada em 65% dos casos, predominando a disacusia condutiva decorrente de infecções de repetição ou otite secretora.

( ) associa Bócio à disacusia neurosensorial congênita severa.

( ) ocorre digenesia gonadal associada a disacusia neurosensorial congênita.

( ) a disacusia neurosensorial severa congênita está associada à hipoplasia da cartilagem alar do nariz, insuficiência pancreática com síndrome de mal absorção, retardo mental e malformação geniturinária.

a) 1 – 3 – 2 – 4

b) 4 – 1 – 2 – 3

c) 3 – 1 – 4 – 2

d) 2 – 4 – 3 – 1

41) Preencha as lacunas e, em seguida, assinale a alternativa **correta**.

Na \_\_\_\_\_, o osso denso da cápsula ótica é substituído por focos de osso esponjoso vascular neoformados. Essa doença compromete mais o sexo \_\_\_\_\_ e existe fator hereditário envolvido na doença.

a) otite / masculino

b) otosclerose / feminino

c) doença de Meniere / feminino

d) doença de Meniere / masculino

42) Acerca dos neurinomas do acústico, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e, em seguida, assinale a alternativa **correta**.

( ) São tumores mais frequentes da região do canal auditivo externo e ângulo protocerebelar.

( ) A suspeita desse tumor ocorre sempre que se depara com perdas auditivas assimétricas ou unilaterais, acompanhada por zumbidos.

( ) Do ponto de vista diagnóstico por imagem, o exame de escolha para a sua identificação é a ressonância magnética.

a) F – V – F

b) V – F – V

c) F – V – V

d) V – F – F

43) A mãe de uma criança de 6 meses procurou o Posto de Saúde para vacinar seu filho. A criança apresentava tosse produtiva, coriza hialina e febre baixa há dois dias. Ao exame físico, notou-se hiperemia de orofaringe, opacificação da membrana timpânica direita e roncos pulmonares difusos. Além do tratamento sintomático, a conduta deve ser

I. adiar a vacinação.

II. realizar a vacinação.

III. administrar Amoxicilina.

IV. administrar Cefalosporina.

Está(ão) **correta(s)** somente a(s) afirmativa(s)

a) II.

b) IV.

c) I e III.

d) II e III.

44) Preencha a lacuna e, em seguida, assinale a alternativa **correta**.

A triagem auditiva, feita através do método de emissões otoacústicas (EOA), deve ser realizada em \_\_\_\_\_, segundo recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria.

a) asfíxicos

b) prematuros

c) todas as crianças

d) portadores de infecções congênitas

45) No tratamentos das otites médias agudas (OMA), o antibiótico empírico de primeira escolha é

- a) amoxicilina.
- b) eritromicina.
- c) claritromicina.
- d) cefalosporina.

46) No que se refere ao Código de Ética Médica, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência **correta**.

- ( ) Em último caso, o médico plantonista poderá atestar óbito, quando não o tenha verificado pessoalmente ou quando não tenha prestado assistência ao paciente.
- ( ) É lícito ao médico, valendo-se de sua profissão, a participação de anúncios de empresas comerciais.
- ( ) O médico que cometer falta grave prevista no Código de Ética deverá ter exercício profissional suspenso mediante procedimento administrativo específico.
- ( ) O médico portador de doença incapacitante para o exercício profissional, apurada pelo Conselho Regional de Medicina em procedimento administrativo com perícia médica, terá seu registro suspenso enquanto perdurar sua incapacidade.

- a) F – V – V – F
- b) V – V – F – F
- c) V – F – F – V
- d) F – F – V – V

47) De acordo com o Código de Ética Médica, analise as afirmativas abaixo.

- I. É vedado ao médico revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, salvo hipótese em que tenha sido arrolado como testemunha em processo judicial.
- II. É lícita a realização de atendimento médico à distância, nos moldes da regulamentação do Conselho Federal de Medicina.
- III. É defeso ao médico retirar órgão de doador vivo quando este for juridicamente incapaz, salvo se houver autorização por escrito de seu representante legal.

Está(ão) **correta(s)** a(s) afirmativa(s)

- a) I, somente.
- b) II, somente.
- c) III, somente.
- d) II e III, somente.

48) O Código de Ética Médica, no capítulo destinado à responsabilidade profissional, elenca algumas atividades proibidas no exercício da medicina. Acerca dessas atividades, assinale a afirmativa **incorreta**.

- a) Deixar de assegurar os direitos do médico, sempre que investido em cargo de direção.
- b) Deixar de assumir responsabilidade sobre procedimento médico do qual participou, exceto quando vários médicos tenham assistido ao paciente.
- c) Intervir sobre o genoma humano com vista à sua modificação, exceto na terapia gênica, excluindo-se qualquer ação em células germinativas que resulte na modificação genética da descendência.
- d) Deixar de cumprir, salvo por motivo justo, as normas emanadas dos Conselhos Federal e Regional de Medicina e de atender às suas requisições administrativas, intimações ou notificações no prazo determinado.

49) A polissonografia é um teste multiparamétrico utilizado para determinar a presença de

- a) vias aéreas obstruídas.
- b) hiperplasia adenotonilar.
- c) fratura do osso temporal.
- d) síndrome da apneia / hipoapneia obstrutiva do sono.

50) São considerados achados mais comuns na fratura de osso temporal, **exceto**:

- a) Tontura.
- b) Zumbido.
- c) Hiperacusia.
- d) Paralisia facial periférica.

51) Associe as manifestações clínicas apresentadas por pacientes com faringites virais agudas com os agentes causadores e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência **correta**.

- |                     |  |
|---------------------|--|
| (1) Resfriado comum | ( ) adenopatia cervical, eventualmente generalizada, esplenomegalia e exantema após uso de ampicilina – mononucleose infecciosa. |
| (2) Adenovírus      | ( ) pequenas úlceras e vesículas no palato mole e pilares da amígdala, dor abdominal – herpangina.                               |
| (3) Coxsackie       | ( ) múltiplas úlceras no palato, adenopatia cervical dolorosa com ou sem gengivostomatite.                                       |
| (4) Herpes Simples  | ( ) mialgia, cefaleia e conjuntivite – febre faringoconjuntival.   |
| (5) Epstein-Barr    | ( ) corrimento nasal, tosse, anorexia e adenopatia cervical.   |

- a) 5 – 3 – 4 – 2 – 1  
b) 3 – 4 – 2 – 1 – 5  
c) 1 – 2 – 3 – 4 – 5  
d) 2 – 5 – 4 – 3 – 1

52) “É responsável por mais de 50% dos casos de resfriado comum. Existem descritos mais de 100 sorotipos; é um agente típico das vias aéreas superiores”.

Trata-se de

- a) rinovírus.  
b) influenza.  
c) enterovírus.  
d) coronavírus.

53) A farmacoterapia continua sendo a principal arma no manejo da rinite alérgica, após falha no controle ambiental adequado. Assinale abaixo a alternativa **correta**, em relação à prescrição de anti-histamínicos e sua posologia nos casos de rinossinusite.

- a) Hidroxizina, dosagem máxima de 100 mg/dia para adultos.  
b) Cleomastina, 1 mg a cada 12 horas, para maiores de 12 anos.  
c) Cipro-heptadina, 4 mg a cada 6 horas, para crianças de 2 a 6 anos.  
d) Dexclorfeniramina, 1,25 ml de xarope a cada 12 horas, para pacientes entre 6 e 12 anos.

54) Medidas de controle ambiental, com relação aos aeroalérgenos e irritantes inespecíficos na rinossinusite devem ser aplicadas, mesmo quando sua eficácia não for completa. Assinale abaixo a alternativa **incorreta** em relação às providências que devem ser tomadas para o melhor controle ambiental e consequente melhora do estado do paciente.

- a) Proibir o tabagismo apenas no dormitório do paciente.  
b) Retirar do quarto do paciente os travesseiros de pena ou paina, cobertores de lã e edredons de plumas.  
c) Dar preferência aos pisos laváveis e cortinas tipo persianas, ou material que possa ser limpo com pano úmido.  
d) Os animais de pelo, se existentes, devem ser banhados uma vez por semana e, principalmente, não devem permanecer no dormitório.

55) Relacione a coluna da esquerda com a da direita, indicando as bactérias que podem causar as doenças enumeradas e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência **correta**.

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| (1) Epiglotite        | ( ) <i>Streptococcus pyogenes</i> (Betaemolítico do grupo A).  |
| (2) Faringite         | ( ) <i>Streptococcus pneumoniae</i> , <i>Haemophilus influenzae</i> não tipável, <i>Moraxella catarrhalis</i> , <i>S. pyogenes</i> .       |
| (3) Otite Média Aguda | ( ) <i>S. pneumoniae</i> , <i>H. Influenzae</i> , <i>M. catarrhalis</i> e <i>S. Aureus</i> , anaeróbios.                                   |
| (4) Sinusite          | ( ) <i>Haemophilus influenzae</i> tipo B, <i>Streptococcus pyogenes</i> , <i>Streptococcus pneumoniae</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> . |

- a) 2 – 3 – 4 – 1  
b) 3 – 4 – 1 – 2  
c) 1 – 2 – 3 – 4  
d) 4 – 1 – 2 – 3

56) São fatores de risco para o desenvolvimento de rinite alérgica, **exceto**:

- a) histórico familiar de alergia.
- b) presença de teste cutâneo de alergia positivo.
- c) IgE sérica < 100 UI/ml antes dos 6 anos de idade.
- d) exposição a alérgenos de ambientes internos, como animais domésticos e ácaros.

57) Na presença de quais fatores está contraindicado o uso de esteroides sistêmicos no tratamento da sinusite crônica?

- I. *Diabetes Mellitus*.
- II. Tuberculose ativa.
- III. Gravidez.
- IV. Osteoporose.
- V. Insuficiência cardíaca congestiva.

Está(ão) **correto(s)** o(s) fator(es)

- a) II, somente.
- b) III, somente.
- c) I, II, III, IV e V.
- d) I, II e III, somente.

58) Preencha a lacuna e, em seguida, assinale a alternativa **correta**.

Em determinadas doenças agudas, como sarampo, mononucleose, resfriados comuns, coqueluches, há uma diminuição da resistência vascular e aumento da fragilidade capilar, provocando \_\_\_\_\_ com frequência.

- a) epistaxe
- b) rinorreia
- c) afecção
- d) alergia nasal

59) Considerando etiologia, epidemiologia e patogênese da rinite alérgica, analise as afirmativas abaixo.

- I. É uma doença inflamatória da mucosa nasal, caracterizada por rinorreia clara, congestão, prurido, espirros e irritação conjuntival.
- II. Os principais alérgenos são: poeira, ácaros, fungos, epitélio, urina e saliva de animais (cães e gatos), baratas e menos comumente o pólen.
- III. Na rinite alérgica intermitente, os sintomas estão presentes em mais de quatro dias por semana e em mais que quatro semanas.
- IV. É considerada de intensidade moderada a grave quando estão presentes distúrbio do sono, prejuízo das atividades diárias, lazer ou esportes, prejuízos das atividades na escola e no trabalho; sintomas insuportáveis.

Está(ão) **incorreta(s)** somente a(s) afirmativa(s)

- a) III.
- b) IV.
- c) I e II.
- d) II e III.

60) Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência **correta**.

- ( ) A causa mais comum da rinosinusite é a infecção viral das vias aéreas superiores com edema e inflamação da mucosa, que leva a obstrução dos seios paranasais, acúmulo de secreções e proliferação bacteriana secundária.
- ( ) Os micro-organismos mais comumente envolvidos com a rinosinusite bacteriana aguda são *Staphylococcus coagulase* negativo, *staphylococcus aureus*, *streptococcus alfa*hemolítico e anaeróbios.
- ( ) Os micro-organismos mais comumente envolvidos com a rinosinusite bacteriana crônica são *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae* e *Moraxella Catarrhalis*.
- ( ) Na rinosinusite bacteriana em crianças, a tosse é o sintoma mais importante. O estudo radiológico tem função controversa e, em geral, não é utilizado.

- a) V – F – F – V
- b) F – V – V – V
- c) F – F – V – F
- d) V – V – F – F