



VERSÃO

**B****COMANDO DA AERONÁUTICA****EXAME DE ADMISSÃO AO CURSO DE ADAPTAÇÃO DE MÉDICOS DA AERONÁUTICA****(CAMAR 2013)****ESPECIALIDADE: PEDIATRIA****LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.**

1. Este caderno contém 01 (uma) prova de GRAMÁTICA e INTERPRETAÇÃO DE TEXTO, composta de 30 (trinta) questões objetivas numeradas de 01 (um) a 30 (trinta); e 01 (uma) prova de ESPECIALIDADE, composta de 30 (trinta) questões objetivas numeradas de 31 (trinta e um) a 60 (sessenta).
2. Ao receber a ordem do Chefe/Fiscal de Setor, **confira**:
  - ✓ se a numeração das questões e a paginação estão corretas;
  - ✓ se todas as questões estão perfeitamente legíveis. Sendo detectada alguma anormalidade de impressão, solicite imediatamente ao fiscal de prova a substituição deste caderno; e
  - ✓ se a “VERSÃO” da prova e a “ESPECIALIDADE” constantes deste caderno de questões conferem com os campos “VERSÃO” e “ESPECIALIDADE” contidos em seu CARTÃO DE RESPOSTAS.
3. O caderno de questões pode ser utilizado livremente para fazer rascunhos (cálculos, desenhos, etc.).
4. Iniciada a prova, é vedado formular perguntas.
5. Não é permitido ao candidato comunicar-se com outro candidato, bem como utilizar livros, anotações, agendas eletrônicas, gravadores, máquina calculadora, telefone celular e/ou similares, ou qualquer instrumento receptor/transmissor/armazenador de mensagens.
6. No **CARTÃO DE LEITURA ÓTICA PERSONALIZADO (CARTÃO DE RESPOSTAS)**, preencha apenas **uma alternativa (a, b, c ou d) de cada questão, com caneta esferográfica azul ou preta**, conforme instrução contida no próprio Cartão de Respostas.
7. A questão não assinalada ou assinalada com mais de uma alternativa, emendada, rasurada, borrada, ou que vier com outra assinalação, será **considerada incorreta**.
8. Tenha muito cuidado com o seu Cartão de Respostas para não o amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou, de qualquer modo, danificá-lo. O Cartão de Respostas **NÃO** será substituído.
9. **A prova terá a duração de 4 (quatro) horas e 20 (vinte) minutos.**
10. Recomenda-se ao candidato iniciar a marcação do Cartão de Respostas nos últimos 20 minutos do tempo total de prova.
11. Por razões de segurança e sigilo, o candidato deverá permanecer obrigatoriamente no local de realização das provas por, no mínimo, **2 (duas) horas** depois de iniciada a prova. O caderno de questões só poderá ser levado pelo candidato que permanecer no recinto por, no mínimo, 4 (quatro) horas depois de iniciada a prova.
12. Em nenhuma hipótese, o candidato poderá se ausentar do local de prova levando consigo seu Cartão de Respostas.
13. É obrigatório que o candidato assine a Lista de Chamada e o Cartão de Respostas.
14. A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno de questões e no Cartão de Respostas poderá implicar na não correção de sua prova e exclusão do processo seletivo.



**31)** Considerando o Calendário de Vacinação das crianças, relacione as afirmativas abaixo conforme as vacinas citadas, e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta sequência **correta**.

- (1) BCG
- (2) Hepatite B
- (3) Oral rotavírus humano G1P1 [8] (atenuada)
- (4) Tríplice viral
- (5) Pneumocócica 10 (conjugada)

- ( ) administrar preferencialmente nas primeiras 12 horas de nascimento ou na primeira visita ao serviço de saúde.
- ( ) administrar o mais precoce possível, preferencialmente após o nascimento. Nos prematuros com menos de 36 semanas administrar a vacina após completar 1 mês de vida e atingir 2 Kg.
- ( ) administrar duas doses seguindo rigorosamente os limites de faixa etária: primeira dose: 1 mês e 15 dias a 3 meses e 7 dias. Segunda dose: 3 meses e 7 dias a 5 meses e 15 dias. O intervalo mínimo preconizado entre a primeira e a segunda dose é de 30 dias.
- ( ) no primeiro semestre de vida, administrar 3 doses, aos 2, 4 e 6 meses de idade. O intervalo entre as doses é de 60 dias e, no mínimo, de 30 dias. Fazer um reforço, preferencialmente, entre 12 e 15 meses de idade, considerando o intervalo mínimo de seis meses após a 3ª dose.
- ( ) administrar 2 doses. A primeira dose aos 12 meses de idade e a segunda dose deve ser administrada aos 4 anos de idade.

- a) 2 – 1 – 3 – 5 – 4
- b) 4 – 3 – 2 – 5 – 1
- c) 3 – 2 – 4 – 1 – 5
- d) 4 – 5 – 2 – 3 – 1

**32)** Um adolescente, ao jogar futebol, teve uma lesão do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho. Sobre este quadro clínico, assinale a afirmativa **incorreta**.

- a) Ligamento colateral medial é o ligamento mais comumente lesado do joelho.
- b) LCA é o principal estabilizador do joelho contra a translação anterior da tíbia sob o fêmur e contra a rotação externa do fêmur.
- c) Para verificar a lesão de LCA, devem ser realizados os seguintes testes clínicos: teste da gaveta anterior, teste de *Lachman* e *Pivot shift test*.
- d) Os adolescentes e jovens predispostos à lesão e rotura do LCA são participantes de esporte de impacto com o pé no solo, que exigem rotações e súbitas mudanças de direção no movimento.

**33)** Em relação ao atraso do crescimento, analise as afirmativas abaixo.

- I. No hipotireoidismo ocorre redução do crescimento da estatura com preservação do crescimento do peso.
- II. As doenças cardiovasculares são consideradas no início da lactância, a causa predominante de atraso do crescimento.
- III. A baixa ingesta calórica exibe queda do perímetro cefálico antes da queda do percentil de peso.
- IV. Nas doenças sistêmicas graves, o ganho ponderal insuficiente é ainda mais importante do que o déficit de crescimento linear.

Estão **corretas** somente as afirmativas

- a) I e III.
- b) II e III.
- c) I e IV.
- d) II e IV.

**34)** As crianças com cardiopatia congênita sofrem, frequentemente, complicações na infância, devido a

- a) *septo primum*.
- b) broncopneumonia.
- c) *síndrome de Down*.
- d) alterações morfológicas.

35) As principais formas de apresentação clínica das cardiopatias podem ser, **exceto**:

- a) cianose.
- b) arritmia cardíaca.
- c) sopro cardíaco isolado.
- d) síndrome da insuficiência cardíaca.

36) Considerando uma criança com poucos meses de idade, nascida a termo, com baixo peso e em aleitamento materno, é **correto** afirmar que

- a) a proteção anti-infecciosa se refere apenas à doença diarreica bacteriana ou viral.
- b) o aleitamento materno não pode ser exclusivo até os 6 meses, é preciso suplementos.
- c) toda criança com baixo peso deve receber outro tipo de leite até chegar ao peso ideal.
- d) a proteção anti-infecciosa é devido a IgA secretora e fatores inespecíficos, como maturação do epitélio intestinal e outros.

37) De acordo com o Programa de Atenção às Doenças Prevalentes na infância do Ministério da Saúde do Brasil, analise as afirmativas abaixo.

- I. O diagnóstico de uma criança com 1 ano de idade que apresenta diarreia com sangue nas fezes há cerca de 14 dias é desidratação grave.
- II. Uma criança na idade pré-escolar queixa-se de dor e apresenta secreção purulenta visível na orelha direita há mais ou menos 5 dias, logo, é um caso de infecção aguda do ouvido.
- III. Um menino de 4 anos com febre e tosse há 3 dias, frequência respiratória de 50 IRM, sem estridor ou sibilância, não deve ter diagnóstico de pneumonia.
- IV. Uma criança considerada agudamente doente, mas que consegue mamar no peito da mãe e beber líquido, não está vomitando e não tem convulsões, não apresenta sinais gerais de perigo.

Estão **corretas** as afirmativas

- a) I, II, III e IV.
- b) I e III, somente.
- c) II e IV, somente.
- d) I, II e III, somente.

38) Estima-se que, no Brasil, a taxa de tuberculose na infância esteja ao redor de 15%, sendo que 75% dos casos são de forma pulmonares e 25% de forma extra-pulmonares. O agente etiológico conhecido como bacilo de *Koch* é um complexo constituído de várias espécies, tais como, **exceto**:

- a) *M. bovis*.
- b) *M. microti*
- c) *M. asiático*.
- d) *M. tuberculosis*.

39) As infecções das vias aéreas superiores, como regra geral, apresentam condições ameaçadoras da vida. As doenças que provocam infecções respiratórias superiores mais comuns em crianças são a rinite e a obstrução nasal. Analisando a representação de algumas etiologias, relacione a coluna da direita com a da esquerda e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência **correta**.

**Vírus:**

- (1) Picornavírus (rinovírus e enterovírus)
- (2) Adenovírus
- (3) Paramixovírus
- (4) Ortomixovírus (influenza)

**Bactérias:**

- ( ) otite média aguda: *Streptococcus pneumoniae*, *Moraxella catarrhalis* e *S. pyogenes*.
- ( ) sinusite: *S. pneumoniae*, *H. influenzae* e *S. aureus* e anaeróbios.
- ( ) faringite: *Streptococcus pyogenes*.
- ( ) epiglote: *Haemophilus influenzae* tipo b, *Streptococcus pyogenes*, *Staphylococcus aureus*.

- a) 1 – 2 – 3 – 4
- b) 2 – 3 – 1 – 4
- c) 2 – 1 – 4 – 3
- d) 3 – 4 – 1 – 2

40) A bronquite corresponde à presença de inflamação da parede brônquica associada a diversas causas, **exceto**:

- a) **Inflamatórias**: asma.
- b) **Infeções**: vírus, *Chlamydia*, *Ureaplasma* e *Bordetella pertussis*.
- c) **Doenças crônicas**: distúrbios de deglutição, refluxo gastroesofágico e imunodeficiência.
- d) **Bronquite**: via aérea desobstruída não apresentando edemas nas paredes dos brônquios.

41) O diagnóstico de uma menina, 10 anos, é pneumonia comunitária aguda. Foi tratada com penicilina cristalina via endovenosa por 48 horas sem apresentar melhorias no quadro clínico. Considerando a hipótese de pneumonia por *Mycoplasma pneumoniae*, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência **correta**.

- ( ) A principal indicação do antimicrobiano é a erradicação do *Mycoplasma pneumoniae* do trato respiratório.
- ( ) O aspecto radiográfico é específico da doença e o diagnóstico poderá ter sido facilmente estabelecido.
- ( ) As contagens identificadas na leucometria global e específica são, na maioria dos casos, normais, mas a velocidade de hemossedimentação está frequentemente elevada.

- a) F – F – V
- b) V – F – F
- c) F – V – V
- d) V – V – F

42) Uma criança, 8 meses de idade, apresentou quadro de coriza e tosse seca, que piorava de forma progressiva. Transferida para UTI pediátrica, recebeu ventilação assistida por 5 dias, tendo alta depois de aproximadamente 20 dias, mas o quadro clínico não melhorou por completo. Apresentou sibilância grave, dificuldade de alimentação e, às vezes, vômitos após a mamada, pelo prazo de 2 meses. A radiografia do tórax demonstrou ausência de condensações com pequenas áreas de hiperinsuflação localizada. A equipe médica foi informada que os 2 irmãos da criança apresentavam estado gripal. História patológica pregressa e familiar: dermatite atópica e histórico familiar de atopia.

Após análise de tais informações, o provável diagnóstico é

- a) pneumonia grave.
- b) bronquiolite obliterante.
- c) alergia a proteína do leite de vaca.
- d) asma grave aliada a bronquite viral.

43) Considerando os princípios da dietoterapia, o aumento médio de peso no 1º ano de vida segue em proporção à tabela apresentada abaixo. Assinale a alternativa que apresenta um **erro**.

	primeiro ano	gramas/mês	gramas/dia
a)	1º trimestre	700 g	25-30 g
b)	2º trimestre	600 g	20 g
c)	3º trimestre	500 g	15 g
d)	4º trimestre	400 g	12 g

44) Sobre as recomendações do Ministério da Saúde/OPAS e da Sociedade Brasileira de Pediatria, no que se refere à alimentação da criança nos 2 primeiros anos de vida, analise as afirmativas abaixo.

- I. Para garantir o volume a ser ingerido, a alimentação complementar deve ser iniciada em mamadeira.
- II. A alimentação complementar e o leite materno devem ter horários rígidos.
- III. O leite materno só deve ser dado até 6 meses. Após este período, introduzir a fórmula de leite de vaca, duas refeições de sal e uma refeição de frutas.
- IV. O leite materno só deve ser dado até 6 meses e após este período, oferecer outros alimentos de forma gradual. Pode-se manter o leite materno até 2 anos.

Está(ão) **correta(s)** somente a(s) afirmativa(s)

- a) III.
- b) IV.
- c) I e III.
- d) II e III.

45) Identifique a alternativa que apresenta uma contraindicação absoluta ao aleitamento materno.

- a) Galactosemia.
- b) Fibrose cística.
- c) Fenda palatina.
- d) Prematuridade.

46) No que se refere ao Código de Ética Médica, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência **correta**.

- ( ) Em último caso, o médico plantonista poderá atestar óbito, quando não o tenha verificado pessoalmente ou quando não tenha prestado assistência ao paciente.
- ( ) É lícito ao médico, valendo-se de sua profissão, a participação de anúncios de empresas comerciais.
- ( ) O médico que cometer falta grave prevista no Código de Ética deverá ter exercício profissional suspenso mediante procedimento administrativo específico.
- ( ) O médico portador de doença incapacitante para o exercício profissional, apurada pelo Conselho Regional de Medicina em procedimento administrativo com perícia médica, terá seu registro suspenso enquanto perdurar sua incapacidade.

- a) F – V – V – F
- b) V – V – F – F
- c) V – F – F – V
- d) F – F – V – V

47) De acordo com o Código de Ética Médica, analise as afirmativas abaixo.

- I. É vedado ao médico revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, salvo hipótese em que tenha sido arrolado como testemunha em processo judicial.
- II. É lícita a realização de atendimento médico à distância, nos moldes da regulamentação do Conselho Federal de Medicina.
- III. É defeso ao médico retirar órgão de doador vivo quando este for juridicamente incapaz, salvo se houver autorização por escrito de seu representante legal.

Está(ão) **correta(s)** a(s) afirmativa(s)

- a) I, somente.
- b) II, somente.
- c) III, somente.
- d) II e III, somente.

48) O Código de Ética Médica, no capítulo destinado à responsabilidade profissional, elenca algumas atividades proibidas no exercício da medicina. Acerca dessas atividades, assinale a afirmativa **incorreta**.

- a) Deixar de assegurar os direitos do médico, sempre que investido em cargo de direção.
- b) Deixar de assumir responsabilidade sobre procedimento médico do qual participou, exceto quando vários médicos tenham assistido ao paciente.
- c) Intervir sobre o genoma humano com vista à sua modificação, exceto na terapia gênica, excluindo-se qualquer ação em células germinativas que resulte na modificação genética da descendência.
- d) Deixar de cumprir, salvo por motivo justo, as normas emanadas dos Conselhos Federal e Regional de Medicina e de atender às suas requisições administrativas, intimações ou notificações no prazo determinado.

49) A investigação ultrassonográfica de infecção no trato urinário infantil é indicada para crianças

- a) com mais de 2 anos de idade.
- b) com menos de 1 ano de idade.
- c) com menos de 2 anos de idade.
- d) a partir do primeiro caso de infecção no trato urinário.

50) O pé torto congênito consiste numa deformidade complexa que compromete as estruturas ósseas e partes moles do pé. Os principais movimentos executados pelo pé são: dorsoflexão, flexão plantar, inversão e eversão do pé. Sobre as deformidades do pé, analise as afirmativas abaixo.

- I. Pé plano: redução/perda do arco (concauidade) do pé.
- II. Pé cavo: aumento do arco (concauidade) do pé.
- III. Pé equino: pé mantido em flexão plantar excessiva.
- IV. Pé calcâneo: pé mantido em dorsoflexão excessiva.

Estão **corretas** as afirmativas

- a) I, II, III e IV.
- b) I, II e III, somente.
- c) I, III e IV, somente.
- d) II, III e IV, somente.

51) Preencha a lacuna e, em seguida, assinale a alternativa **correta**.

Segundo o artigo 13 do(a) \_\_\_\_\_ (Lei nº 8.069/1990), a simples suspeita ou a confirmação de maus tratos à criança ou adolescente deverá ser comunicada ao Conselho Tutelar.

- a) Código Penal Brasileiro
- b) Constituição Federal de 1988
- c) Estatuto da Criança e do Adolescente
- d) Lei de Diretrizes e Bases da Educação

52) Na violência contra crianças, o abuso físico deve ser avaliado quanto à possibilidade de doenças orgânicas. Assinale a alternativa que **não** apresenta uma lesão de doença orgânica.

- a) Fratura óssea.
- b) Tortura psicológica.
- c) Hematoma, equimose e coagulopatia.
- d) Depressão do nível de consciência e convulsão.

53) A prevenção dos acidentes domésticos inclui medidas de proteção passiva. Pode-se citar como barreiras fixas no ambiente, **exceto**:

- a) Grades nas janelas.
- b) Lacs em vasos sanitários.
- c) Redes nas sacadas e janelas.
- d) Corrimões bilaterais nas escadas.

54) O crescimento, geralmente, espelha a saúde de uma criança e sua alteração é um sinal de alerta para a presença de algum distúrbio. Sobre as definições da estatura infantil, marque a afirmativa **incorreta**.

- a) Estatura 1: desvio-padrão do alvo-genético familiar.
- b) Estatura 2: desvio-padrão abaixo da média populacional.
- c) Velocidade de crescimento abaixo do percentil 25 para determinada idade e sexo.
- d) O crescimento intrauterino influencia o crescimento de percentil, gerando o nanismo grave.

55) No crescimento e desenvolvimento da criança, existem alguns marcos do desenvolvimento. Considerando o 1º ano de vida, assinale a afirmativa **incorreta**.

- a) Linguagem: fala outras palavras além de "mama, dada".
- b) Motor: levanta-se sozinho, anda com uma das mãos apoiadas.
- c) Adaptativo: faz o movimento de pinça entre polegar e indicador precisamente.
- d) Pessoal-social: não se importa com o modo de vestir e não ajusta a postura quando é vestido.

56) Sobre a criança, cuja mãe tem HIV+, é **correto** afirmar que o(a)

- a) aleitamento materno é contraindicado, devendo ser garantido o uso de fórmulas artificiais até os 2 anos de vida.
- b) criança, neste caso, do 6º ao 12º mês, deve tomar o SMZ-TMP, 3 dias por semana.
- c) transmissão do HIV pode ocorrer em qualquer período da lactação, não tendo relação com o CD4 e a carga viral plasmática.
- d) criança deve usar AZT, 2 mg/kg de 6 em 6 horas nas primeiras horas de vida, mesmo que a mãe não tenha recebido AZT.

57) Em relação ao aleitamento materno e transmissão vertical do HIV, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência **correta**.

- ( ) Mulheres cronicamente infectadas possuem risco maior de transmissão pelo leite materno.
- ( ) A probabilidade de infecção pelo HIV por litro de leite materno ingerido é similar em magnitude à probabilidade da transmissão heterossexual através de ato sexual desprotegido, entre adultos.
- ( ) Mulheres infectadas sintomáticas excretam o HIV no leite materno.

- a) V – F – V
- b) F – F – F
- c) F – V – V
- d) V – V – F

58) Sobre a crise convulsiva febril em crianças, analise as afirmativas abaixo.

- I. É mais frequente nas primeiras horas da infecção.
- II. Crises mioclônicas e espamos infantis nunca são observados.
- III. Em geral, ocorre no 1º dia de febre.

Estão **corretas** as afirmativas

- a) I, II, III
- b) I, II, somente.
- c) I, III, somente.
- d) II, III, somente.

59) Sobre as vantagens do aleitamento materno, relacione a coluna da direita com a da esquerda e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência **correta**.

Pacientes:

Vantagens:

- (1) Bebê
- (2) Mãe

- ( ) desenvolvimento da cavidade oral.
- ( ) remineralização óssea.
- ( ) promove perda ponderal.
- ( ) prevenção de doenças.
- ( ) redução do risco de câncer.
- ( ) composição química ideal.
- ( ) proteção contra o diabetes tipo 2.

- a) 1-2-2-1-2-1-2
- b) 2-1-1-2-2-2-1
- c) 1-2-2-2-1-1-1
- d) 2-1-1-1-1-2-2

60) Preencha a lacuna e, em seguida, assinale a alternativa **correta**.

O termo alergia significa um estado de hiperresponsividade de um ou mais órgãos, ao contato com \_\_\_\_\_ do meio ambiente.

- a) alérgenos
- b) antígenos
- c) reatores crônicos
- d) riscos hospitalares