

**Concurso Público para provimento de cargos de
Médico - Nível III (Grau A) - Residência Médica
Pediatria**

Nome do Candidato

Caderno de Prova '30', Tipo 001

Nº de Inscrição

MODELO

Nº do Caderno

MODELO1

Nº do Documento

0000000000000000

ASSINATURA DO CANDIDATO

00001-0001-0001

P R O V A**Conhecimentos Gerais
Conhecimentos Específicos
Dissertativa****INSTRUÇÕES**

- Verifique se este caderno:
 - corresponde a sua opção de cargo.
 - contém 40 questões, numeradas de 1 a 40.
 - contém a proposta e espaços para rascunho e transcrição definitiva das três questões dissertativas.Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.
Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

VOCÊ DEVE

- Procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- Verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.
- Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: (A) ● (C) (D) (E)
- Ler o que se pede na Prova Dissertativa e utilizar, se necessário, o espaço para rascunho.

ATENÇÃO

- Marque as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de material transparente de tinta preta.
- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.
- Responda a todas as questões.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
- Em hipótese alguma os rascunhos das questões da Prova Dissertativa serão corrigidos.
- A duração da prova é de 5 horas para responder a todas as questões objetivas, preencher a Folha de Respostas e responder a Prova Dissertativa (rascunho e transcrição).
- Ao término da prova, chame o fiscal da sala e devolva todo o material recebido.
- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.

**CONHECIMENTOS GERAIS**

1. Em relação às instituições públicas, é correto afirmar:
 - (A) Uma organização é considerada moderna se é capaz de usar o conhecimento para desenvolver e oferecer novos produtos e serviços, dentro de espírito inovador e criativo.
 - (B) Um ambiente de trabalho moderno é bastante rígido, proporciona disciplina, impermeabiliza procedimentos já existentes dentro da organização e evita inovações que desestabilizem a rotina.
 - (C) O fornecimento de informações aos cidadãos é essencialmente seletivo, para que eles não influenciem significativamente as decisões políticoadministrativas.
 - (D) A política de capacitação de servidores públicos prescinde de ferramentas de informática e uso das tecnologias da informação.
 - (E) O compartilhamento de conhecimento e informação na gestão pública será incluído como prioridade apenas em políticas de gestão do conhecimento futuras.

2. No momento em que o Governo avalia o desempenho de suas organizações e de seus servidores por metas ou objetivos alcançados, ele está avaliando a gestão pública por meio
 - (A) da eficiência.
 - (B) da eficácia.
 - (C) da efetividade.
 - (D) da qualidade.
 - (E) do custo.

3. De uma maneira geral, as competências gerenciais são classificadas em três categorias: conhecimentos, habilidades e atitudes. Essas categorias são necessárias para ocupar um cargo de gerente e dependem do nível hierárquico do cargo, das tarefas a serem desenvolvidas pelo gerente e do tipo de organização, entre outros fatores. A relação correta entre habilidades e nível hierárquico é:
 - (A) Quanto mais alto o nível hierárquico do cargo a ser ocupado, mais habilidades técnicas serão requeridas.
 - (B) Em cargos de gerências táticas e intermediárias são requeridas com maior intensidade as chamadas habilidades e atitudes.
 - (C) Em cargos com características operacionais são requeridas maiores habilidades técnicas como principal condição desse gerenciamento.
 - (D) Quanto mais operacional o cargo a ser ocupado, mais habilidades atitudinais serão requeridas.
 - (E) Quanto mais operacional o cargo a ser ocupado, mais habilidades conceituais serão requeridas.

4. O Brasil é um Estado organizado de forma Federativa. Isto significa que as atribuições inerentes aos poderes executivo, legislativo e judiciário são divididas em duas esferas de atuação: a Federal (União) e a Estadual. Em relação a essas esferas, é INCORRETO afirmar que
 - (A) a cúpula dos três poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário formam o núcleo estratégico do Estado.
 - (B) aos Estados e Municípios são atribuídas as ações de caráter local.
 - (C) a Constituição da União e as leis federais determinam o escopo e o alcance das constituições dos Estados Federados.
 - (D) o critério de divisão de poderes entre União e Estados membros é, ao mesmo tempo, funcional e territorial.
 - (E) os Estados têm total autonomia para formulação e aplicação de suas políticas, independentemente do poder central.

5. No Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI) consta que: “são significativos os fatores externos decorrentes do desenvolvimento do capital humano sob a perspectiva do Ciclo de Vida. Ao mesmo tempo em que uma população saudável e bem nutrida influencia positivamente os indicadores educacionais, o investimento em educação tem reflexos positivos sobre os indicadores de saúde”.
Dentre outras, são ações propostas no PMDI:
 - (A) adoção de perspectiva integrada de desenvolvimento do capital humano; salto de qualidade no ensino e ampliação da escolaridade da população jovem mineira, orientada por padrões internacionais (OCDE); superação da pobreza crônica das novas gerações; protagonismo juvenil e capacitação para o trabalho.
 - (B) aumento do número de escolas e hospitais de atendimento público; aumento de ambulatórios setoriais ou regionais; aumento do número de vagas para médicos no atendimento público.
 - (C) adoção de qualidade no ensino e no atendimento público em todos os órgãos destinados à população; superação da pobreza crônica e capacitação para o trabalho.
 - (D) superação da pobreza crônica; elaboração de programas materno-infantil e de adolescentes para diminuir a mortalidade infantil; construções de escola de nível médio e de ensino superior.
 - (E) construções de redes de hospitais de atendimento público; implantação em todo o estado mineiro do Programa de Saúde do Trabalhador; Construção de Escolas Públicas para aumentar o número de vagas disponíveis e capacitação para o trabalho.



6. É VETADO ao Funcionário Público
- (A) facilitar as atividades de fiscalização pelos órgãos de controle.
 - (B) observar os princípios e valores da Ética Pública.
 - (C) divulgar e informar a todos os integrantes de sua classe sobre a existência de Código de Conduta Ética.
 - (D) utilizar-se do cargo, emprego ou função para obter qualquer favorecimento para si ou outrem.
 - (E) apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função.
-
7. Dentre as características das organizações públicas modernas, nas quais o conhecimento é valorizado, encontra-se
- (A) coordenação centralizada de tarefas.
 - (B) predomínio do trabalho individual.
 - (C) transmissão do conhecimento coletivo, de preferência, em forma de documentos impressos.
 - (D) o servidor-polivalente e inovador.
 - (E) diminuição do poder dos usuários dos serviços dessas empresas.
-
8. Segundo seu delineamento, em um estudo de
- (A) *coorte*, a exposição é medida antes do desenvolvimento da doença.
 - (B) caso-controle, a exposição é medida antes do desenvolvimento da doença.
 - (C) prevalência, a exposição é medida antes do desenvolvimento da doença.
 - (D) caso-controle, o risco da doença não é medido diretamente.
 - (E) caso-controle e de prevalência, o risco da doença é medido diretamente.
-
9. O sistema de planejamento do Sistema Único de Saúde (SUS) pressupõe
- (A) que as peculiaridades, necessidades e realidades de saúde do país sejam homogeneizadas e contempladas dentro de um documento igual para todos os estados.
 - (B) que a esfera federal de gestão realize todo o planejamento e a regionalização das ações fique a cargo dos estados e municípios.
 - (C) que cada esfera de gestão (municipal, estadual e federal) realize o seu planejamento.
 - (D) instrumentos de planejamento de centralização: Plano Diretor, Plano Diretor de Investimento (PDI) e Programação Pactuada e Integrada da Atenção em Saúde (PPI).
 - (E) Plano Federal Bienal de Saúde, instrumento básico que norteia a Programação Bienal das ações e serviços de saúde prestados.
-
10. Sobre os modelos de atenção à saúde no Sistema Único de Saúde (SUS), é correto afirmar que
- (A) se fundamentam em regionalização, integralização e terceirização dos serviços.
 - (B) cada doença tem um nível de atenção à saúde (primária, média complexidade e alta complexidade) predeterminado.
 - (C) se fundamentam em regionalização e integração dos serviços interfederativos.
 - (D) foram implantados com vistas ao atendimento das Doenças de Notificação Compulsória (DNC).
 - (E) os serviços de atenção primária são as únicas portas de entrada no sistema SUS.



-
11. O projeto de vigilância em saúde (Vigisus) é
- (A) voltado à redução de mortalidade por doenças transmissíveis e não abrange a exposição a fatores de risco associados com a saúde.
 - (B) composto de duas fases: Vigisus I (1999 a 2004) para Estruturação do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde e Vigisus II (2005-2013) para Modernização do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde.
 - (C) destinado à redução da mortalidade e da morbidade de doenças transmissíveis, mas não abrange as doenças não transmissíveis.
 - (D) executado pela Secretaria de Vigilância em Saúde e Fundação Nacional de Saúde, sendo financiado pelo Banco Interamericano para Reconstrução e Desenvolvimento.
 - (E) direcionado para serviços de saneamento em grandes aglomerados urbanos e, por isso, não inclui a saúde de povos indígenas e quilombolas.
-
12. Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições,
- (A) o controle e a fiscalização do serviço de internação e atendimento ambulatorial, não abrangendo a execução da política de sangue e seus derivados.
 - (B) a fiscalização e inspeção de alimentos quanto à qualidade sanitária, sem abranger a vigilância nutricional e a orientação alimentar.
 - (C) a participação na formulação da política de saúde pública, não incluindo a execução de ações de saneamento básico.
 - (D) a participação no controle e formulação da política de medicamentos, excetuando a participação na produção de insumos de interesse para a saúde.
 - (E) a participação no controle e na fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substância e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.
-
13. O controle social no Sistema Único de Saúde
- (A) diminuiu após a Norma Operacional Básica (NOB 1/96), desde que esta redefiniu vínculos de serviços com seus usuários.
 - (B) está contemplado em um dos blocos de financiamento para a gestão do Sistema Único de Saúde.
 - (C) está previsto somente para serviços públicos de assistência à saúde.
 - (D) pressupõe ações dos usuários sobre serviços, exclusivamente, da iniciativa privada.
 - (E) requer financiamento do próprio usuário.
-
14. A educação em saúde, segundo o Sistema Único de Saúde (SUS),
- (A) é o objetivo de um Programa destinado a capacitar trabalhadores da saúde para a utilização adequada de equipamentos usados em serviços de saúde.
 - (B) está prevista em legislação, mas ainda não existe uma secretaria de gestão relacionada a essa área.
 - (C) restringe-se a um compromisso de buscar alternativas para os problemas relacionados a não valorização dos trabalhadores da saúde.
 - (D) refere-se à qualificação de trabalhadores da saúde e, ainda, à promoção de hábitos saudáveis aos usuários do SUS.
 - (E) prevê atividades exclusivas dos trabalhadores da saúde para atendimento da população.
-
15. Quanto ao financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS),
- (A) os recursos de custeio da esfera federal destinados à assistência podem corresponder ao Piso Assistencial Básico (PAB) destinado ao custeio de procedimentos e ações de assistência básica, de responsabilidade tipicamente municipal.
 - (B) na esfera estadual, conta com recursos transferidos pela União e essas transferências regulares não estão condicionadas à contrapartida deste nível de governo.
 - (C) na esfera municipal, além dos recursos oriundos do respectivo Tesouro, existem transferências eventuais da União para municípios, as quais não estão condicionadas à contrapartida deste nível de governo.
 - (D) os fundos de saúde dos municípios não podem receber verba oriunda de reembolso de despesas realizadas em função de atendimentos prestados por unidades públicas a beneficiários de planos privados de saúde.
 - (E) os recursos de custeio da esfera federal, destinados às ações e serviços de saúde, configuram o Teto Financeiro Global (TFG) e o teto financeiro do estado; não deve conter os tetos de municípios.
-



16. Na legislação do Sistema Único de Saúde,
- (A) “Programação Pactuada e Integrada (PPI)” restringe-se às atividades de assistência ambulatorial e hospitalar, constituindo um instrumento essencial de reorganização do modelo de atenção e da gestão do SUS, de alocação dos recursos e de explicitação do pacto estabelecido entre as três esferas de governo.
 - (B) “Teto Financeiro da Assistência do Município (TFAM)” é um montante que corresponde ao financiamento do conjunto de ações assistenciais em situações de emergência, assumidas pela Secretaria Municipal de Saúde, transferido eventualmente do Fundo Nacional ao Fundo Municipal de Saúde.
 - (C) “Índice de Valorização de Resultados (IVR)” consiste na atribuição de valores adicionais ao teto financeiro da assistência do estado, transferidos eventualmente do Fundo Nacional ao Fundo Estadual de Saúde, quando houver obtenção de resultados de impacto positivo sobre as condições de saúde da população.
 - (D) “Remuneração por Serviços Produzidos” restringe-se ao pagamento direto aos prestadores privados contratados e conveniados, contra apresentação de faturas, referentes a serviços realizados conforme programação e mediante prévia autorização do gestor.
 - (E) “Fração Assistencial Especializada (FAE)” é um montante que corresponde a procedimentos ambulatoriais de média complexidade, medicamentos e insumos excepcionais, órteses e próteses ambulatoriais e Tratamento Fora do Domicílio (TFD), sob gestão do Estado.
-
17. O Plano Diretor de Regionalização (PDR) do Sistema Único de Saúde (SUS) prevê:
- (A) Municípios em Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada (GPAB-A), com capacidade de ofertar com suficiência a totalidade de serviços de média complexidade, incluindo atividades ambulatoriais de apoio diagnóstico e terapêutico e de internação hospitalar para sua própria população.
 - (B) Nos municípios habilitados em Gestão Plena da Atenção Básica-Ampliada (GPAB-A) que tenham serviços de alta complexidade em seu território, nos quais as funções de gestão e relacionamento com prestadores de alta complexidade são de responsabilidade do gestor municipal, podendo este delegar aos gestores de hospitais as funções de controle e avaliação dos prestadores.
 - (C) Ao governo federal cabe prever a parcela dos recursos a serem gastos em cada município, para cada área de alta complexidade, destacando a parcela a ser utilizada com a população do próprio município e a parcela a ser gasta com a população de referência, sempre de acordo com a Programação Pactuada e Integrada.
 - (D) A assistência de alta complexidade deve ser programada no âmbito federal, e em alguns casos macrorregionais, tendo em vista as características especiais desse grupo: alta densidade tecnológica e alto custo, economia de escala, escassez de profissionais especializados e concentração de oferta em poucos municípios.
 - (E) A programação da assistência de alta complexidade, consolidada pela Secretaria de Assistência à Saúde do Ministério da Saúde, não deve conter a referência de pacientes para outros Estados, ou mesmo, reconhecer o fluxo programado de pacientes de outros Estados.
-
18. As ações de auditoria dentro do Sistema Único de Saúde (SUS) são
- (A) atividades que necessitam de um órgão que consolide as informações necessárias, analise os resultados obtidos em decorrência de suas ações, mas não proponha medidas corretivas.
 - (B) de responsabilidade das três esferas gestoras do SUS, o que exige a estruturação do respectivo órgão de controle, avaliação e auditoria, incluindo a definição dos recursos e da metodologia adequada de trabalho.
 - (C) ações de controle que podem, ou não, auditar procedimentos prévios à realização de serviços e à ordenação dos respectivos pagamentos.
 - (D) ações de controle que excluem autorização de internações e procedimentos ambulatoriais, desde que sejam critérios médicos.
 - (E) monitoramentos da qualidade dos serviços prestados, sem priorizar a regularidade e fidedignidade de registros de produção e faturamento de serviços.
-
19. Segundo Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde (SUS-NOAS 01), houve fortalecimento do controle, regulação e avaliação da assistência aos usuários devido
- (A) à criação de procedimentos técnico-administrativos prévios à prestação de serviços hospitalares, os quais não podem ser fiscalizados pelos usuários.
 - (B) à previsão de compra de serviços da rede privada, pautada apenas na sua indisponibilidade na rede pública.
 - (C) à possibilidade de compra de serviços da rede privada com base no interesse público e necessidades assistenciais.
 - (D) à implementação de indicadores objetivos baseados em critérios técnicos que não podem ser avaliados pelos usuários.
 - (E) ao fato do gestor federal elaborar todos os planos de controle, regulação e avaliação para fortalecimento da capacidade de gestão.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

<p>20. Em relação à coqueluche, é correto afirmar que</p> <p>(A) o padrão ouro para o diagnóstico é cultura da secreção traqueal.</p> <p>(B) a vacina tríplice bacteriana (DPT) de células inteiras pode ser utilizada até a adolescência.</p> <p>(C) o doente deve ficar afastado de suas atividades escolares por pelo menos 5 dias após início do tratamento com antimicrobiano.</p> <p>(D) a vacina contra coqueluche não é necessária para quem já teve a doença.</p> <p>(E) o hemograma revela frequentemente linfocitose com atipia evidente.</p>	<p>24. Adolescente de 12 anos de idade, do sexo masculino, com IMC de 30, se queixa de dor em quadril a esquerda que piora à deambulação. A dor vem piorando gradativamente. Nega febre ou trauma anterior. É praticante de vôlei. Ao exame físico apresenta dor à palpação do quadril E, sem sinais flogísticos. Ao movimentar a coxa E refere acentuação da dor à rotação interna e à abdução. A principal hipótese diagnóstica é</p> <p>(A) artrite séptica.</p> <p>(B) sinovite transitória e o tratamento consiste em repouso e anti-inflamatório.</p> <p>(C) epifisiólise da cabeça do fêmur E e o tratamento é cirúrgico.</p> <p>(D) distensão muscular do quadríceps.</p> <p>(E) artrite reacional.</p>
<p>21. Em relação à transmissão do vírus sincicial respiratório (VSR), é correto afirmar que</p> <p>(A) a aquisição intra-hospitalar do VSR acompanha a sazonalidade da doença na comunidade.</p> <p>(B) a transmissão por aerossóis é a principal forma de aquisição do VSR.</p> <p>(C) a excreção do VRS se mantém por três a quatro semanas na maioria das crianças.</p> <p>(D) o VSR não coloniza estetoscópios.</p> <p>(E) como medida para evitar a transmissão intra-hospitalar do VRS, quando não for possível quarto privativo, deve-se alocar crianças com VRS no mesmo quarto com distância mínima de 2 metros entre os leitos.</p>	<p>25. Adolescente de 14 anos se queixa de dor intensa e súbita em região escrotal a esquerda associada a náuseas e vômitos. Ao exame físico, o escroto se encontra edemaciado e hiperemiado a esquerda. O testículo esquerdo está aumentado de volume, doloroso e não há melhora da dor à elevação. Os seguintes diagnósticos estão corretos, EXCETO:</p> <p>(A) a torção do apêndice testicular é pouco provável porque o testículo esquerdo se encontra globalmente edemaciado e doloroso.</p> <p>(B) a principal hipótese diagnóstica é torção do testículo E.</p> <p>(C) um diagnóstico diferencial é epididimite.</p> <p>(D) está indicado ultrassom com Doppler.</p> <p>(E) deve-se aguardar 24 horas de evolução para distinção entre orquite e torção de testículo.</p>
<p>22. A Sociedade Brasileira de Pediatria define Síndrome Metabólica em adolescentes entre 10 e 16 anos como aumento da circunferência abdominal (> p90, segundo sexo e idade) associado a pelo menos duas anormalidades de quatro. NÃO faz parte desse grupo de anormalidades:</p> <p>(A) Colesterol total > 200 mg/dL.</p> <p>(B) Hipertensão arterial: pressão sistólica > 130 mmHg e diastólica > 85mmHg.</p> <p>(C) Intolerância à glicose.</p> <p>(D) Hipertrigliceridemia (> 150 mg/dL).</p> <p>(E) Baixo HDL – colesterol (< 40 mg/dL).</p>	<p>26. Lactente de 8 meses apresenta quadro de febre e coriza há 24 horas com evolução para tosse ladrante, choro rouco e respiração ruidosa. Ao exame físico, a criança apresenta estridor laringeo audível sem estetoscópio e retração subcostal, sem cianose em ar ambiente. Neste caso, a melhor conduta seria:</p> <p>(A) visualização do cavum para descartar epiglote.</p> <p>(B) a dexametasona por via oral poderia ser tentada juntamente com inalação com adrenalina.</p> <p>(C) administração de oxigênio através de cateter nasal.</p> <p>(D) venóclise com administração endovenosa de antibiótico beta lactâmico e oxigenioterapia.</p> <p>(E) inalação com beta agonista para descartar obstrução respiratória baixa.</p>
<p>23. Orientação atualizada sobre a nutrição da criança garante crescimento e desenvolvimento adequados. Em relação a esse assunto, estão corretas as afirmativas, EXCETO:</p> <p>(A) deve-se estimular o consumo de leite (600 mL/dia) no segundo ano de vida, assim como de seus derivados, visando oferta adequada de cálcio.</p> <p>(B) o leite de vaca integral é um dos grandes responsáveis pela alta incidência de anemia ferropriva em menores de 2 anos no Brasil.</p> <p>(C) o termo aleitamento materno predominante é utilizado quando o lactente recebe, além do leite materno, água ou bebidas a base de água, mas não recebe outro leite.</p> <p>(D) a concentração de vitamina A no leite materno varia de acordo com a dieta da mãe.</p> <p>(E) recém-nascidos a termo, de peso adequado para a idade gestacional, em uso de 500 mL de fórmula infantil, necessitam de suplementação de ferro.</p>	<p>27. Lactente de 6 meses é trazido para consulta por queixa de sustos frequentes. A mãe refere que a criança sustentou a cabeça com 4 meses de idade. Os sustos são caracterizados pela mãe como episódios de flexão da cabeça, do tronco e dos membros superiores, geralmente com duração de segundos, que vem em salvas de 3 a 5. Em relação a esse caso, estão corretas as afirmações abaixo, EXCETO:</p> <p>(A) a ressonância magnética faz parte da investigação diagnóstica.</p> <p>(B) o prognóstico da evolução da doença, mesmo com tratamento, não é bom.</p> <p>(C) o eletroencefalograma pode confirmar o diagnóstico.</p> <p>(D) a primeira opção terapêutica é fenobarbital.</p> <p>(E) o tratamento pode ser feito com ACTH.</p>



28. Lactente de 4 meses iniciou diarreia aquosa profusa, com vômitos e febre elevada há 2 dias. Ao exame físico se apresenta desidratado com choro irritadiço, hipertônico, respiração rápida e profunda, enchimento capilar de 4 segundos, pulso rápido e fino, temperatura de 39 °C. A alteração laboratorial menos provável no caso seria:
- (A) acidose metabólica.
 - (B) anion gap diminuído.
 - (C) hipernatremia.
 - (D) ureia elevada.
 - (E) hemograma com leucocitose.
29. Mãe relata que seu filho de 3 anos, previamente hígido, apresentou inchaço de face que progressivamente nos dias seguintes progrediu para os membros inferiores. Referiu que a diurese se manteve mas notou que a urina se apresentava espumosa. Ao exame físico, a criança apresenta edema generalizado com discreta ascite, pressão arterial normal. Em relação a esse caso, estão corretas as afirmações abaixo, EXCETO:
- (A) uma complicação da doença é fenômeno tromboembólico.
 - (B) a principal hipótese diagnóstica é síndrome nefrótica idiopática.
 - (C) um dos exames que confirmam o diagnóstico é proteinúria > 50 mg/kg nas 24 horas.
 - (D) a investigação inicial inclui biópsia renal.
 - (E) uma das complicações do tratamento prolongado da doença é a catarata.
30. O calendário de vacinação da criança foi atualizado pelo Ministério da Saúde em 2012. Em relação a esse assunto, é INCORRETO afirmar:
- (A) a Organização Pan-Americana da Saúde recomenda que os países da região das Américas devam continuar campanhas com a vacina oral contra poliomielite até a completa certificação mundial de erradicação da poliomielite.
 - (B) a vacina antipneumológica adotada inclui a proteção contra 10 sorotipos do pneumococo e cobertura parcial para *hemophilus influenzae* não tipável.
 - (C) o esquema sequencial da vacinação contra poliomielite é realizado com duas doses iniciais de vacina inativada seguidas de doses orais de vírus atenuados.
 - (D) a dose da vacina contra hepatite B ao nascimento não é mais necessária com a introdução da vacina pentavalente aos 2, 4 e 6 meses.
 - (E) a manutenção das doses da vacina oral contra poliomielite visa manter a imunidade populacional (de rebanho) contra o risco potencial de introdução de poliovírus selvagem através de viajantes oriundos de localidades que ainda apresentam casos de poliomielite.
31. Adolescente de 16 anos se queixa do aparecimento de lesão eritematosa oval, isolada, em tronco, com diâmetro máximo de 3 cm, que evoluiu com clareamento central e descamação fina nas bordas. Após alguns dias relata surgimento de novas lesões em tronco, agora menores, com diâmetro maior orientado em relação à linha de clivagem da pele. Refere também descamação dessas lesões com prurido leve. A hipótese diagnóstica mais provável é:
- (A) Eczema numular.
 - (B) Dermatofitose.
 - (C) Sífilis secundária.
 - (D) Pitíriase versicolor.
 - (E) Pitíriase rósea.
32. NÃO faz parte dos sinais e sintomas da intoxicação por organofosforados ou carbamatos:
- (A) salivação.
 - (B) miose.
 - (C) broncospasmo.
 - (D) diarreia.
 - (E) pele seca.
33. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) veio garantir a todas as crianças e adolescentes o tratamento com atenção, proteção e cuidados especiais para se desenvolverem e se tornarem adultos conscientes e participativos do processo inclusivo. Em relação a esse assunto, as afirmativas abaixo estão corretas, EXCETO:
- (A) os hospitais privados e públicos são obrigados a manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe.
 - (B) a adoção depende do consentimento dos pais ou do representante legal do adotando.
 - (C) aplica-se a todas as pessoas até 21 anos.
 - (D) incumbe ao poder público propiciar apoio alimentar à gestante e à nutriz que dele necessitem.
 - (E) podem adotar os maiores de vinte e um anos, independentemente de estado civil.
34. A asplenia funcional é um fenômeno que ocorre progressivamente na criança com anemia falciforme. São medidas corretas para diminuir a probabilidade de infecções graves, propostas pelo Ministério da Saúde, EXCETO:
- (A) Profilaxia com penicilina benzatina ou V oral até os 10 anos de idade
 - (B) Vacina polissacáride contra pneumococo: 1 dose após 2 anos de idade, reforço após 5 anos.
 - (C) Vacina antivaricela: dose única após 1 ano de idade.
 - (D) Vacina anti-hepatite A: uma dose após 1 anos de idade, reforço após 6 meses.
 - (E) Profilaxia com eritromicina em caso de alergia à penicilina.



35. A tabela abaixo apresenta as potências relativas dos efeitos glico e mineralocorticoide, em relação à hidrocortisona, de alguns corticoesteroides utilizados na prática clínica.

potência relativa (em relação a hidrocortisona)

	glicocorticoide	mineralocorticoide
Corticoide A	1,0	1,0
Corticoide B	3,5 – 4,0	0,8
Corticoide C	4,0	0,8
Corticoide D	5,0	0 – 0,5
Corticoide E	30	0

O corticoesteroide representado pela denominação “corticoide E” corresponde à

- (A) dexametasona.
- (B) metilprednisolona.
- (C) prednisona.
- (D) prednisolona.
- (E) deflazacort.

36. Os pais de um lactente portador de hipospádia procuram orientação médica sobre a possibilidade de circuncisão no seu filho. O médico deverá destacar corretamente que

- (A) existe um risco consistentemente maior de câncer de pênis em crianças não circuncisadas.
- (B) o risco de infecção urinária em crianças não circuncisadas é 10 a 15 vezes maior que nas circuncisadas.
- (C) a circuncisão reduz o risco de transmissão de doenças sexualmente transmissíveis.
- (D) são muito raras as complicações da circuncisão.
- (E) a circuncisão é procedimento seguro e de baixo risco em crianças com hipospádia.

37. Uma menina de 4 anos apresenta história de há 2 semanas ter tido quadro de diarreia com muco e sangue que durou 5 dias. Há 1 semana vem apresentando fadiga e edema periorbitário bilateral. Qual das alternativas abaixo apresenta os resultados de exames que mais provavelmente estarão associados ao quadro dessa paciente?

- (A) Elevados tempos de protrombina e tromboplastina parcial ativada.
- (B) Hipoalbuminemia.
- (C) Complemento baixo.
- (D) Anticorpo antinúcleo positivo.
- (E) Anemia e plaquetopenia.

38. Uma recém-nascida (RN) do sexo feminino apresenta quadro clínico de icterícia zona II leve, com bilirrubina indireta de 7,4 mg% e bilirrubina direta de 0,6 mg%, com 14 horas de vida. A tipagem sanguínea da mãe e a da RN é ORh positivo com Coombs direto e indireto (TAD e PAI) negativos. A dosagem da glicose-6-fosfato desidrogenase (G-6-PD) foi 50% do valor mínimo de referência. Neste caso, pode-se afirmar que a deficiência de G-6-PD

- (A) deve ser diagnosticada pela análise da morfologia da hemácia, que se revela macrocítica e nucleada, no sangue periférico.
- (B) não se manifesta clinicamente durante o período neonatal, devido à presença dominante da hemoglobina fetal no recém-nascido (RN), não explicando a icterícia.
- (C) não ocorre nas pessoas do sexo feminino, além de a bilirrubina estar em valores esperados para a hora de vida.
- (D) leva à hemólise e anemia, mas não é capaz de causar elevações da bilirrubina no período neonatal.
- (E) leva a uma incapacidade de inativação de compostos oxidantes, que se acumulam no eritrócito e desencadeiam a hemólise e daí a icterícia.

39. A Portaria GM/MS nº 822, assinada em 6 de junho de 2001, criou o Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN). Todos os Estados brasileiros contam com pelo menos um Serviço de Referência em Triagem Neonatal. O PNTN prevê o diagnóstico de quatro doenças que são, além do hipotireoidismo e da fenilcetonúria:

- (A) anemia falciforme e deficiência de G6PD.
- (B) hemoglobinopatias e fibrose cística.
- (C) anemia falciforme e aminoacidopatias.
- (D) hemoglobinopatias e aminoacidopatias.
- (E) hemoglobinopatias e 17 OH-progesterona.

40. Um recém-nascido prematuro com peso de nascimento de 1.110 g apresentou sinais radiológicos, no terceiro mês de vida, caracterizados como doença metabólica óssea (ou osteopenia da prematuridade). Esta doença é consequência

- (A) do hipoparatiroidismo absoluto que leva à reabsorção óssea.
- (B) da baixa mineralização óssea devida à baixa produção de $1,25 \text{ OH}_2 \text{ D}_3$ pelo prematuro.
- (C) do hipoparatiroidismo relativo que leva à baixa absorção de cálcio.
- (D) da baixa mineralização óssea devida à baixa oferta de cálcio e fósforo após o nascimento.
- (E) do hipoparatiroidismo absoluto que leva à calciúria e à fosfatúria.



NÃO ESCREVA NESTA PÁGINA



NÃO ESCREVA NESTA PÁGINA



b. Quais foram os métodos de coleta de evidências para estabelecer a opção terapêutica?

Redação Definitiva

c. Se você fosse planejar um estudo para obter um alto grau de recomendação e força de evidência para os medicamentos propostos, como organizaria?

Redação Definitiva



NÃO ESCREVA NESTA PÁGINA