



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
DECEx – DETMIL  
ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS  
ESCOLA SARGENTO MAX WOLF FILHO

**EXAME INTELECTUAL AOS CURSOS DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS 2012-13**  
**SOLUÇÃO DAS QUESTÕES DE SAÚDE**

A questão abaixo se encontrava na prova da área:

<b>Combatente/Logística-Técnica e Aviação</b>	<b>Música</b>	<b>X</b>	<b>Saúde</b>
---	---------------	----------	--------------

44) Quando um técnico de enfermagem examina o tórax, expõe o osso externo e hemitórax esquerdo, localiza o quinto espaço intercostal na linha medioclavicular e coloca o diafragma do estetoscópio sobre o ápice cardíaco e ausculta, até ouvir as bulhas cardíacas normais B1 e B2 de um paciente, ele está verificando que tipo de pulso?

- A) Femoral
- B) Pedioso
- C) Radial
- D) Carotídeo
- » E) Apical

45) O exame prioritário para o diagnóstico da tuberculose pulmonar é o(a):

- A) prova tuberculínica
- » B) baciloscopia direta de escarro
- C) exame radiológico simples.
- D) baciloscopia de lavado brônquico
- E) cultura de escarro ou outras secreções

46) Quanto à administração de medicamentos, é correto afirmar que a

- » A) dose de manutenção é a dose necessária para manter os níveis desejáveis de medicamento na corrente sanguínea e nos tecidos.
- B) dose tóxica é a maior quantidade de droga capaz de produzir efeito terapêutico sem apresentar efeitos indesejáveis.
- C) dose letal é a quantidade de medicamento capaz de causar sequelas ao paciente.
- D) dose máxima é a quantidade de uma droga que ultrapassa a dosagem terapêutica e que causa perturbações, até mesmo de muita gravidade.
- E) dose pediátrica é sempre a metade da dose feita em adulto.

- 47) Com relação ao Calendário Básico de Vacinação da Criança, é correto afirmar que
- A) a imunização da hepatite B pode ser realizada ao nascer (1ª dose), ao 1º mês de vida (2ª dose), ao 6º mês de vida (3ª dose) e uma dose de reforço a cada 10 anos.
  - » **B) a vacina BCG deve ser administrada o mais brevemente possível, preferencialmente ao nascer, em dose única.**
  - C) a vacina tríplice viral imuniza contra sarampo, difteria e rubéola.
  - D) a dose inicial da vacina contra a febre amarela, quando administrada antes dos dois primeiros meses de vida, não necessita de reforço a cada dez anos.
  - E) a vacina oral de rotavírus humano (VORH) não faz parte do Calendário Básico de Vacinação da Criança do Ministério da Saúde.
- 

- 48) Existem diversos profissionais da área da saúde no Atendimento Pré-Hospitalar Móvel, dentre eles o técnico de enfermagem. Não seria atribuição do referido profissional de saúde
- A) assistir ao enfermeiro no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de enfermagem.
  - B) prestar cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave, sob supervisão direta ou à distância do profissional enfermeiro.
  - C) participar de programas de treinamento e aprimoramento profissional especialmente em urgências/emergências.
  - D) realizar manobras de extração manual de vítimas.
  - » **E) supervisionar e avaliar as ações de enfermagem da equipe no Atendimento Pré-Hospitalar Móvel.**
- 

- 49) Dentre os cuidados preconizados para a remoção de uma sonda nasogástrica de um determinado paciente, é incorreto afirmar que
- A) a sonda poderá ser clampeada e desclampeada intermitentemente durante um período experiência de 24 horas.
  - B) antes de ser removida, a sonda deve ser “lavada” com 10ml de solução fisiológica.
  - C) a sonda deve ser puxada delicada e lentamente, interrompendo-se sua retirada ao sinal de tracionamento.
  - » **D) antes da retirada da sonda nasogástrica, é conveniente introduzi-la mais cerca de 15cm para evitar que se prenda à parede gástrica.**
  - E) é indispensável o uso de EPI pelo profissional que realiza o procedimento da retirada de sonda nasogástrica.

50) Em um determinado município com uma população de 1.200.000 de habitantes, foram notificados 600 casos de meningite, dos quais 120 mortes foram confirmadas, causadas pela doença. Qual foi o percentual de letalidade da doença neste caso?

- » A) **20%**
  - B) 0,5%
  - C) 2%
  - D) 0,02%
  - E) 5%
- 

51) Um homem foi atendido no setor de emergência com quadro de apendicite aguda e foi necessária a realização de apendicectomia. Assinale qual cuidado de enfermagem é contra-indicado no referido paciente.

- » A) **Administração de enema no período pré-operatório.**
  - B) Infusão intravenosa, para repor a perda hídrica e promover a função renal adequada.
  - C) Realização de antibioticoterapia prescrita para evitar a infecção.
  - D) Passagem de sonda nasogástrica no pré-operatório, quando existe evidência ou probabilidade de íleo paralítico.
  - E) Colocação do paciente na posição de *semi-fowler* após a cirurgia.
- 

52) A(o) \_\_\_\_\_ não são sinais e/ou sintomas de alarme de dengue hemorrágica.

- A) dor abdominal intensa e contínua e vômitos persistentes.
  - B) hipotensão postural e/ou lipotímia e hepatomegalia dolorosa.
  - C) hemorragias importantes (hematêmese e/ou melena) e sonolência e/ou irritabilidade.
  - » D) **aumento da diurese e o aumento repentino da temperatura corpórea ou hipertermia.**
  - E) aumento repentino do hematócrito e queda abrupta de plaquetas.
- 

53) Um técnico de enfermagem precisa administrar 10ml de solução de glicose a 20%, conforme a prescrição médica. Entretanto, o Hospital só dispõe de ampolas de 20ml de glicose hipertônica a 50% e de ampolas de 10ml de água destilada. Diante do exposto, assinale a alternativa que indica o volume correto a ser associado dessas duas substâncias para obedecer as especificações da prescrição.

- A) 1ml de glicose a 50% + 9ml de água destilada.
- » B) **4ml de glicose a 50% + 6ml de água destilada.**
- C) 3ml de glicose a 50% + 7ml de água destilada.
- D) 2ml de glicose a 50% + 8ml de água destilada.
- E) 5ml de glicose a 50% + 5ml de água destilada.


54) O *diabete melitus* tipo 2 tem como sintomas clássicos a

- » A) **poliúria, polidipsia, polifagia e perda involuntária de peso.**
  - B) polidipsia, fadiga, balanopostite e mialgia.
  - C) retinopatia, neuropatia, letargia e mialgia.
  - D) poliúria, polifagia, mialgia e letargia.
  - E) letargia, polifagia, infecções de repetição e neuropatia.
- 

55) Quanto às drogas utilizadas em reanimação cardiopulmonar (RCP) e seus efeitos, é incorreto afirmar que

- A) a epinefrina (adrenalina) tem efeito vasoconstritor e cronotrópico positivo.
- B) a vasopressina influi na contração cardíaca.
- C) o bicarbonato de sódio altera o pH sanguíneo, corrigindo a acidose respiratória.
- D) a atropina promove o bloqueio da ação parassimpática: aumenta a automaticidade do nódulo sinoatrial e a condução atrioventricular.
- » E) **a lidocaína não é uma droga anti-arrítmica.**



  
**Gen Bda FERNANDO VASCONCELLOS PEREIRA**  
Comandante da Escola de Sargentos das Armas

**“ACADEMIA MILITAR: DOIS SÉCULOS FORMANDO OFICIAIS PARA O EXÉRCITO”**