



CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRADA EM SAÚDE MENTAL PHILIPPE PINEL

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 023/13

201 – TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Nome do Candidato

Número de Inscrição

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- O candidato receberá do fiscal: Um Caderno de Questões contendo **50 (cinquenta) questões** objetivas de múltipla escolha. Uma Folha de Respostas personalizada para a Prova Objetiva.
- Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no Caderno de Questões, se a numeração das questões e a paginação estão corretas e se não há falhas, manchas ou borrões. Se algum desses problemas for detectado, solicite ao fiscal outro caderno completo. Não serão aceitas reclamações posteriores.
- A totalidade da Prova terá a duração de **3 (três) horas**, incluindo o tempo para preenchimento da Folha de Respostas da Prova Objetiva.
- Iniciadas as Provas, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorridas **2 (duas) horas** de prova, devendo, ao sair, entregar ao fiscal de sala, obrigatoriamente, o Caderno de Questões e a Folha de Respostas da Prova Objetiva, que será o único documento válido para correção.
- Não serão permitidas consultas a quaisquer materiais, uso de telefone celular ou outros aparelhos eletrônicos.
- Caso seja necessária a utilização do sanitário, o candidato deverá solicitar permissão ao fiscal de sala, que designará um fiscal volante para acompanhá-lo no deslocamento, devendo manter-se em silêncio durante o percurso, podendo, antes da entrada no sanitário e depois da utilização deste, ser submetido a revista com detector de metais. Na situação descrita, se for detectado que o candidato está portando qualquer tipo de equipamento eletrônico, será eliminado automaticamente do concurso.
- O candidato, ao terminar a(s) prova(s), deverá retirar-se imediatamente do estabelecimento de ensino, não podendo permanecer nas dependências deste, bem como não poderá utilizar os sanitários.

INSTRUÇÕES – PROVA OBJETIVA

- A Folha de Respostas **NÃO** pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
- Use caneta transparente de tinta azul ou preta.
- Assinale a alternativa que julgar correta para cada questão na Folha de Respostas.
- Para cada questão, existe apenas **1 (uma)** resposta certa – não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emendas ou rasuras.
- O modo correto de assinalar a alternativa é cobrindo, completamente, o espaço a ela correspondente, conforme modelo abaixo:


- Todas as questões deverão ser respondidas.

OS TEXTOS E AS QUESTÕES FORAM REDIGIDOS CONFORME O NOVO ACORDO ORTOGRÁFICO DA LÍNGUA PORTUGUESA, MAS ESTE NÃO SERÁ COBRADO NO CONTEÚDO.

09/2013



CONCURSOS PÚBLICOS

Espaço reservado para anotação das respostas

CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRADA EM SAÚDE MENTAL PHILIPPE PINEL – EDITAL 023/13

201 – TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Nome: _____ Inscrição: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	

O gabarito da Prova Objetiva estará disponível no site da **Cetro Concursos** (www.cetroconcursos.org.br) a partir do dia **24 de setembro de 2013**.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

1. Assinale a alternativa que apresenta somente substâncias psicoativas classificadas como estimulantes.
- (A) Anfetamina, cocaína e crack.
(B) Álcool, heroína e morfina.
(C) Ansiolítico, antipsicótico e benzodiazepínicos.
(D) Maconha, LSD e ecstasy.
2. Com relação às características da bulimia, assinale a alternativa correta.
- (A) É uma psicopatologia caracterizada pelo ato de privar-se por completo de qualquer tipo de alimento com o intuito de emagrecer.
(B) É uma psicopatologia caracterizada por uma rígida e insuficiente dieta alimentar, ingerindo o mínimo de alimentos possível com o intuito de emagrecer.
(C) É uma psicopatologia caracterizada por compulsão em ingerir alimentos, seguida do ato de forçar o vômito após as refeições com o intuito de emagrecer.
(D) É uma psicopatologia caracterizada pela obsessão por dieta equilibrada e reeducação alimentar com o intuito de emagrecer.
3. Assinale a alternativa que apresenta o nome do conjunto de reações e sintomas psicomotores específicos, como rigidez muscular e tremor, relacionados diretamente ao uso de psicotrópicos.
- (A) Entorpecimento.
(B) Intoxicação.
(C) Overdose.
(D) Síndrome Neuroléptica Maligna.
4. Um paciente tem como prescrição receber a dose de 200mg de determinado medicamento, por via endovenosa. Sabendo-se que o medicamento vem em ampolas de 2ml, e que cada 1ml contém 50mg do medicamento, assinale a alternativa que apresenta a quantidade de ampolas a ser administrada.
- (A) 2 ampolas.
(B) 2,5 ampolas.
(C) 3 ampolas.
(D) 4 ampolas.
5. É correto afirmar que, entre as principais características apresentadas por pacientes com quadro clínico de depressão, estão:
- (A) atos frequentes de sadismo e crueldade, incapacidade de sentir culpa e de aprender com os próprios erros.
(B) crises de ansiedade com sinais de pavor diante de situações não perigosas.
(C) perda de interesse por atividades cotidianas, energia diminuída e fadiga ao menor esforço.
(D) distorções do pensamento e afeto inadequado.
6. A insulino terapia é realizada pelo profissional de saúde ou pelo próprio paciente, através da via de administração subcutânea. Sabendo-se que há diferentes tipos de insulina, assinale a alternativa que apresenta o **único** tipo que pode também ser administrado por via endovenosa.
- (A) Insulina regular.
(B) Insulina NPH.
(C) Insulina lenta.
(D) Insulina ultralenta.
7. Observe os sintomas abaixo.
- I. Tosse seca e contínua com duração de mais de 4 semanas que, posteriormente, passa a apresentar secreção.
II. Sudorese noturna, cansaço excessivo, palidez, falta de apetite e rouquidão.
III. Em casos mais graves, há dificuldade para respirar e eliminação de sangue ao tossir.
- É correto afirmar que esses sintomas são característicos de
- (A) difteria.
(B) meningite.
(C) pneumonia.
(D) tuberculose.
8. A administração de ácido acetilsalicílico (AAS) é **contraindicada** em pacientes que fazem uso de
- (A) antibióticos.
(B) anticoagulantes.
(C) anti-inflamatórios.
(D) anti-histamínicos.
9. Em relação à pressão arterial e à frequência respiratória, deve-se considerar como parâmetros de normalidade os seguintes valores, respectivamente:
- (A) 110/70mmHg e de 18 a 22mrpm.
(B) 120/80mmHg e de 16 a 20mrpm.
(C) 120/80mmHg e de 18 a 22mrpm.
(D) 110/70mmHg e de 16 a 20mrpm.

<p>10. Quanto à atuação durante o atendimento de pacientes epiléticos em crise convulsiva, assinale a alternativa incorreta.</p> <p>(A) Procurar proteger a cabeça do paciente com travesseiro ou almofada.</p> <p>(B) Não tentar imobilizar os membros do paciente, permitindo que ele se debata.</p> <p>(C) Caso o paciente esteja se sufocando com a própria língua, tentar puxá-la para fora da boca.</p> <p>(D) Lateralizar a cabeça do paciente, a fim de desobstruir as vias aéreas e evitar que se sufoque.</p>	<p>14. Quanto aos cuidados de enfermagem durante a eletroconvulsoterapia, assinale a alternativa incorreta.</p> <p>(A) Caso o paciente faça uso de próteses dentárias, será necessário removê-las.</p> <p>(B) O profissional deve certificar-se de que o paciente está em jejum absoluto há, no mínimo, 8 horas.</p> <p>(C) Atualmente, não é mais necessário preocupar-se em proteger a boca e os dentes do paciente, pois ele estará anestesiado.</p> <p>(D) Caso o paciente faça uso de medicações anti-hipertensivas, deve-se certificar de que foram tomadas.</p>
<p>11. Com relação às medidas e proporções utilizadas pela Equipe de Enfermagem na administração de medicamentos, analise as assertivas abaixo.</p> <p>I. 1ml equivale a 20 gotas.</p> <p>II. 1 gota equivale a 3 microgotas.</p> <p>III. 1ml/hora equivale a 1 microgota/minuto.</p> <p>É correto o que se afirma em</p> <p>(A) I, II e III.</p> <p>(B) I e II, apenas.</p> <p>(C) II e III, apenas.</p> <p>(D) I e III, apenas.</p>	<p>15. Sobre as medidas de precaução que devem ser tomadas no contato com pacientes que apresentam quadro clínico de tuberculose, assinale a alternativa incorreta.</p> <p>(A) A equipe de saúde deve fazer uso de máscara N95 ao entrar no quarto de isolamento.</p> <p>(B) O paciente não precisa fazer uso de máscara cirúrgica ao sair do quarto, pois a equipe de saúde e os acompanhantes estarão protegidos.</p> <p>(C) Os visitantes e acompanhantes devem usar máscara cirúrgica quando entrarem em contato com o paciente.</p> <p>(D) O paciente deve ser mantido em quarto de isolamento com aviso de precaução contra aerossóis.</p>
<p>12. No atendimento emergencial a pacientes com queimaduras de 2º ou 3º graus, deve-se priorizar o(a)</p> <p>I. administração de medicamentos cicatrizantes de uso tópico, mantendo a queimadura sem curativo.</p> <p>II. administração de medicamentos cicatrizantes de uso tópico, seguida de realização de curativo.</p> <p>III. resfriamento da queimadura com água fria ou soro fisiológico e reposição volêmica do paciente.</p> <p>É correto o que está contido em</p> <p>(A) I, II e III.</p> <p>(B) I, apenas.</p> <p>(C) II, apenas.</p> <p>(D) III, apenas.</p>	<p>16. As vacinas Hepatite B e BCG-ID devem ser administradas pela primeira vez em uma criança na seguinte faixa etária:</p> <p>(A) 4 meses após o nascimento.</p> <p>(B) 1 mês após o nascimento.</p> <p>(C) 2 meses após o nascimento.</p> <p>(D) ao nascimento.</p>
<p>13. Sobre as formas de prevenção de ocorrência de úlcera por pressão em pacientes acamados, assinale a alternativa incorreta.</p> <p>(A) Deve-se elevar a cabeceira acima de 30°.</p> <p>(B) Deve-se realizar mudança de decúbito em intervalos de 2 em 2 horas.</p> <p>(C) Deve-se fazer uso de coxins em regiões de proeminências ósseas.</p> <p>(D) Deve-se fazer uso de colchão caixa de ovo.</p>	<p>17. Para determinar o nível de consciência do paciente, é utilizada a Escala de Coma de Glasgow. A utilização dessa escala baseia-se na avaliação da(s) resposta(s)</p> <p>I. ocular.</p> <p>II. motora.</p> <p>III. verbal.</p> <p>É correto o que está contido em</p> <p>(A) I e II, apenas.</p> <p>(B) II e III, apenas.</p> <p>(C) I, II e III.</p> <p>(D) III, apenas.</p>

18. Correlacione os tipos de choque e suas definições e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

Tipos de Choque	Definições
1. Cardiogênico.	() Diminuição do volume intravascular devido a distúrbio hidroeletrolítico ou hemorragias graves.
2. Séptico.	() Presença de agente patógeno capaz de produzir uma grave resposta infecciosa sistêmica.
3. Hipovolêmico.	() Alteração cardiovascular na qual o principal evento é a falência total ou parcial das funções cardíacas.

- (A) 3/ 2/ 1
 (B) 1/ 2/ 3
 (C) 2/ 3/ 1
 (D) 1/ 3/ 2

19. Com relação às funções da Equipe de Enfermagem na atenção à Saúde Mental, marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () Realizar comunicação terapêutica a fim de contribuir para a evolução clínica do paciente.
 () Orientar pacientes, familiares e visitantes sobre as normas e rotinas do serviço de saúde.
 () Ter conhecimento dos efeitos e das interações medicamentosas dos fármacos administrados.

- (A) F/ F/ V
 (B) V/ V/ V
 (C) V/ V/ F
 (D) V/ F/ V

20. Segundo as características das medidas de processamento de artigos usadas em Central de Materiais e Esterilização (CME), correlacione as colunas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

1. Limpeza.	() Processo de destruição de microrganismos, com exceção de esporos bacterianos.
2. Desinfecção.	() Processo de remoção de resíduos e materiais orgânicos que se encontrem nos artigos.
3. Esterilização.	() Processo capaz de destruir todo e qualquer organismo patogênico: fungos, bactérias, esporos e vírus.

- (A) 3/ 1/ 2
 (B) 1/ 2/ 3
 (C) 3/ 2/ 1
 (D) 2/ 1/ 3

21. Ao prestar assistência de enfermagem a mulheres no puerpério, deve-se observar

- I. sinais vitais e presença de contrações uterinas.
 II. presença de dor ao urinar e aspecto do sangramento vaginal.
 III. aspecto das mamas e mamilos e a produção de leite.

É correto o que está contido em

- (A) I, II e III.
 (B) I e II, apenas.
 (C) II e III, apenas.
 (D) I e III, apenas.

22. Correlacione as patologias e suas características e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

Patologias	Características
1. Claustrofobia.	() Medo de ficar em ambiente fechado.
2. Agorafobia.	() Medo de se expor em público.
3. Fobia Social.	() Hipersensibilidade à luz.
4. Fotofobia.	() Medo de ficar no meio de multidões.

- (A) 4/ 2/ 1/ 3
 (B) 3/ 1/ 4/ 2
 (C) 1/ 3/ 4/ 2
 (D) 1/ 2/ 4/ 3

23. Para infundir uma solução de 250ml de soro fisiológico a 0,9%, com o fluxo programado para 45ml/h, serão necessárias, aproximadamente,

- (A) 2,5 horas.
 (B) 3 horas.
 (C) 3,5 horas.
 (D) 5,5 horas.

24. É correto afirmar que a Transmissão Vertical do vírus HIV é a transmissão

- (A) pelo uso de materiais cirúrgicos não esterilizados em ambiente hospitalar.
 (B) pelo uso compartilhado de seringas e agulhas infectadas.
 (C) através do contato sexual.
 (D) durante a gestação, o parto ou a amamentação, quando a mãe é portadora do vírus.

25. Sabendo-se que 1ml equivale a aproximadamente 20 gotas, para infundir uma solução de 500ml de soro fisiológico com o fluxo programado para 90 microgotas/minuto, serão necessárias, aproximadamente,

- (A) 3,5 horas.
- (B) 5 horas.
- (C) 5,5 horas.
- (D) 6,5 horas.

26. A aferição de sinais vitais do paciente tem como principal objetivo

- (A) seguir as prescrições médicas.
- (B) seguir as prescrições de enfermagem.
- (C) atender às normas e rotinas estabelecidas nos protocolos hospitalares.
- (D) avaliar as condições de estado geral e identificar possíveis problemas de saúde do paciente.

27. São tipos de oxigenoterapia:

- I. sistema de alto fluxo.
- II. sistema de baixo fluxo.
- III. sistema de nebulização.

É correto o que está contido em

- (A) I e II, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) II e III, apenas.

28. Antes de realizar o procedimento de soroterapia como via de administração de medicamento, o profissional de enfermagem deve

- I. observar o estado geral do paciente.
- II. aplicar os 5 certos.
- III. conhecer os efeitos do medicamento no corpo humano.

É correto o que está contido em

- (A) I, II e III.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.

29. A utilização da “Técnica em Z” ou “Trilha em Z” para a administração de medicamento intramuscular tem como objetivo

- I. evitar refluxo/extravasamento de medicamento para a camada subcutânea.
- II. prevenir a formação de nódulos por reação inflamatória.
- III. prevenir a formação de hematomas.

É correto o que está contido em

- (A) I, II e III.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.

30. O sangramento eliminado por via nasal, proveniente do rompimento de pequenos capilares da membrana mucosa desta região, é chamado de

- (A) hemólise.
- (B) hemoptise.
- (C) hematêmese.
- (D) epistaxe.

31. Febre alta, fortes dores de cabeça, vômitos, rigidez no pescoço, moleza, irritação, fraqueza e manchas vermelhas na pele são sintomas característicos de um quadro clínico de

- (A) tétano.
- (B) meningite.
- (C) difteria.
- (D) raiva.

32. A abordagem terapêutica de pacientes com Transtorno de Pensamento deve

- (A) enfatizar a internação psiquiátrica de longa permanência, pois as alucinações e delírios não permitem que o paciente tenha uma vida social adequada.
- (B) estimular a adesão do paciente ao tratamento, incentivando-o a ter autonomia e responsabilidade e mostrando a necessidade de fortalecer sua rede de apoio familiar e social, visando a um bom prognóstico.
- (C) enfatizar a contenção física do paciente durante a internação, já que as alucinações e delírios o tornam agressivo.
- (D) estimular o paciente a ter uma vida totalmente independente, pois, caso não disponha de uma rede de apoio familiar e social após a internação, terá plenas condições de se cuidar sozinho.

<p>33. Ao realizar a administração de medicamento por via intramuscular, o mais indicado é que a antisepsia da região seja realizada com</p> <p>(A) água e sabão. (B) clorexidina alcoólica. (C) álcool a 70%. (D) clorexidina degermante.</p>	<p>37. Segundo os princípios da Reforma Psiquiátrica, a atenção em saúde mental deve priorizar</p> <p>I. a humanização do atendimento prestado ao portador de sofrimento psíquico. II. a desinstitucionalização de pacientes psiquiátricos, buscando reinseri-los na sociedade. III. o atendimento de pacientes psiquiátricos em Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Hospitais-Dia, Centros de Convivência e Residências Terapêuticas, em substituição aos leitos psiquiátricos.</p> <p>É correto o que está contido em</p> <p>(A) I e III, apenas. (B) I e II, apenas. (C) I, II e III. (D) II e III, apenas.</p>
<p>34. A adolescência é uma fase do desenvolvimento humano caracterizada por mudanças físicas e psicológicas que marcam a transição entre a infância e a idade adulta. Sobre as mudanças ocorridas na adolescência, marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.</p> <p>() Na adolescência, todas as características da personalidade do indivíduo já estão formadas. () As mudanças físicas da adolescência, como o amadurecimento sexual, são mais importantes que o amadurecimento psicológico. () A adolescência é vivida de forma exatamente igual em todas as culturas, pois trata-se de um processo fisiológico.</p> <p>(A) F/ F/ F (B) V/ V/ V (C) F/ V/ F (D) V/ F/ V</p>	<p>38. Assinale a alternativa correta sobre as características da anorexia.</p> <p>(A) É uma psicopatologia caracterizada por uma rígida e insuficiente dieta alimentar, na qual ingere-se o mínimo de alimentos possível com o intuito de emagrecer. (B) É uma psicopatologia caracterizada pelo ato de privar-se por completo de qualquer tipo de alimento com o intuito de emagrecer. (C) É uma psicopatologia caracterizada pela compulsão em ingerir alimentos, seguida do ato de forçar o vômito após as refeições com o intuito de emagrecer. (D) É uma psicopatologia caracterizada pela obsessão por dieta equilibrada e reeducação alimentar com o intuito de emagrecer.</p>
<p>35. Efeitos adversos como apatia, redução da iniciativa, diminuição de respostas emocionais e sedação são característicos do uso de</p> <p>I. ansiolíticos. II. antidepressivos. III. antipsicóticos.</p> <p>É correto o que está contido em</p> <p>(A) I, II e III. (B) I, apenas. (C) II, apenas. (D) III, apenas.</p>	<p>39. Assinale a alternativa correta sobre as principais características de um quadro clínico de esquizofrenia.</p> <p>(A) Indiferença aos sentimentos alheios e desrespeito a normas, regras e obrigações sociais. (B) Alternância entre períodos de depressão e períodos de mania. (C) Pensamentos obsessivos (ideias recorrentes) e atos compulsivos (ações repetitivas). (D) Presença de alterações do pensamento (delírios) e alterações da sensoripercepção (alucinações).</p>
<p>36. “Doença neurológica crônica, caracterizada por crises convulsivas recorrentes, mas que costuma ter um bom prognóstico ao ser tratada com uso contínuo de anticonvulsivantes.” Essa afirmativa refere-se à seguinte patologia:</p> <p>(A) doença de Parkinson. (B) epilepsia. (C) convulsão febril. (D) doença de Alzheimer.</p>	<p>40. Um paciente chega ao Pronto Atendimento com os seguintes sintomas: tremores, náuseas, irritabilidade, ansiedade, hiperatividade, convulsões, confusão mental com possibilidade de alucinações, inversão do ciclo sono-vigília, desnutrição. Sabendo-se que se trata de um paciente alcoolista, que há 24 horas não ingere bebidas alcoólicas, é correto afirmar que se trata de um quadro de</p> <p>(A) síndrome de abstinência demorada/tardia. (B) desintoxicação. (C) síndrome de abstinência aguda. (D) <i>delirium tremens</i>.</p>

<p>41. Quanto à ação da Equipe de Enfermagem na prevenção a doenças transmissíveis, marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.</p> <p>() Administração dos medicamentos prescritos para o tratamento das doenças.</p> <p>() Comunicar a ocorrência de doenças nos casos de notificação compulsória.</p> <p>() Educação contínua da comunidade em que atuam, visando desenvolver medidas de promoção da saúde e prevenção de doenças.</p> <p>(A) F/ F/ F (B) V/ V/ F (C) V/ V/ V (D) F/ F/ V</p>	<p>45. O uso da comunicação terapêutica pela Equipe de Enfermagem na atenção à saúde mental deve priorizar</p> <p>I. o estabelecimento de comunicação clara, a relação de confiança e estar aberto para escuta e compreensão da realidade vivida pelo paciente.</p> <p>II. o aconselhamento do paciente com base nas próprias experiências de vida do profissional.</p> <p>III. a interferência nas relações familiares em defesa do paciente.</p> <p>É correto o que está contido em</p> <p>(A) I, apenas. (B) II, apenas. (C) III, apenas (D) I, II e III.</p>
<p>42. A constante sensação de que algo ruim poderá acontecer, gerando sentimentos de apreensão e nervosismo, é característico de transtornos</p> <p>(A) de pensamento. (B) do humor. (C) de ansiedade. (D) de personalidade.</p>	<p>46. Com relação ao atendimento à gestante que não possui carteira de vacinação ou qualquer registro de imunização contra o tétano, assinale a alternativa que apresenta a conduta correta a ser adotada.</p> <p>(A) Administrar na gestante somente a primeira dose do esquema vacinal da antitetânica, a fim de minimizar os riscos que a imunização pode oferecer ao bebê.</p> <p>(B) Imunizá-la contra o tétano somente após o parto, pois a vacina oferece riscos de má formação para o bebê.</p> <p>(C) Iniciar imediatamente o esquema vacinal, independentemente da idade gestacional, tentando garantir que as 3 doses da vacina antitetânica sejam administradas antes do parto.</p> <p>(D) A realização do esquema vacinal da antitetânica na gestante é indiferente, pois o parto não oferece riscos de se contrair o tétano.</p>
<p>43. Na abordagem terapêutica de pacientes com pensamentos suicidas, deve-se</p> <p>I. ignorar o paciente para que ele deixe de falar sobre isso, pois quem quer se matar não avisa.</p> <p>II. comunicar a toda a equipe a ocorrência destes pensamentos, para que estejam cientes da necessidade de ficarem atentos a este risco.</p> <p>III. conter o paciente fisicamente, a fim de evitar a tentativa de suicídio.</p> <p>É correto o que está contido em</p> <p>(A) I, apenas. (B) II, apenas. (C) III, apenas. (D) II e III, apenas.</p>	<p>47. O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) tem como objetivo</p> <p>I. oferecer atendimento ambulatorial em saúde mental.</p> <p>II. oferecer acompanhamento clínico e de reinserção social dos usuários por meio do exercício de direitos civis, acesso ao trabalho e lazer e fortalecimento de vínculos familiares e sociais.</p> <p>III. garantir o acesso ao acompanhamento clínico-psiquiátrico, evitando, assim, que o paciente fique sem medicação.</p> <p>É correto o que está contido em</p> <p>(A) I, apenas. (B) II, apenas. (C) III, apenas. (D) II e III, apenas.</p>
<p>44. Assinale a alternativa que apresenta o transtorno mental caracterizado pela alternância entre mania e depressão.</p> <p>(A) Transtorno afetivo bipolar. (B) Transtorno obsessivo compulsivo. (C) Transtorno do pânico. (D) Transtorno de conduta.</p>	

48. Assinale a alternativa que apresenta a quantidade máxima de líquido que pode ser introduzida no músculo deltoide durante a administração de medicamento por via intramuscular.

- (A) 5ml.
- (B) 4ml.
- (C) 3ml.
- (D) 2ml.

49. Quanto à realização correta do procedimento da técnica de lavagem de mãos em ambiente hospitalar, é correto afirmar que é

- (A) o método mais utilizado para o controle de infecção, apesar de não ser o mais eficaz.
- (B) pouco relevante se o ambiente hospitalar for constantemente desinfetado.
- (C) relevante em ambientes hospitalares com alto risco de infecção, mas pouco necessário em atendimento ambulatorial.
- (D) o método mais simples e mais indicado para o controle de infecções.

50. Na assistência humanizada ao parto natural, deve-se estimular a parturiente a

- (A) dar preferência à posição vertical, deambulando durante o trabalho de parto.
- (B) permanecer em repouso absoluto.
- (C) evitar alimentar-se durante o trabalho de parto.
- (D) evitar banhos de imersão.