

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE

# CONCURSO PÚBLICO

PROVA PARA CARGO DE:

## MÉDICO – Estratégia da Família

\* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE

\* Neste Caderno de Questões, você encontra:

- 28 questões ESPECÍFICAS
- 12 questões de Português

\* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala.

\* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início.

\* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas.

\* Caso o candidato opte em sair antes de 02:00 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual for a forma.

\* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do candidato.

\* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos.

\* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas.

\* Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas.

\* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para seu preenchimento e assinale no local indicado.

\* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória.

\* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 23/09/2013, no site [www.conpass.com.br](http://www.conpass.com.br).

\* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula X do Edital do Concurso Público nº 001/2013 da PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE, Republicado por Incorreção em 16/07/2013.

\* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a mesma.

**BOA PROVA!!**

**DATA: 22 DE SETEMBRO DE 2013**

**CONPASS®**

Concursos Públicos  
e Assessorias

## **PARTE I – MÉDICO – Estratégia da Família**

01 - Os medicamentos aceitáveis para o tratamento da gonorréia devem ter eficácia próxima de 100%. As mulheres grávidas com gonorréia não complicada, devem ser tratadas com:

- A) Norfloxacino- 800 mg-VO.
- B) Ceftriaxona- 250 mg-IM.
- C) Ciprofloxacino- 500 mg-VO.
- D) Espectinomicina- 1g- IM –dose única.
- E) Doxiciclina-200 mg-dose única.

02 - A Doença de Chagas é uma das maiores endemias do Brasil, estimando-se em que se tenha mais de 2 milhões de pessoas infectadas e 20 milhões vivendo em área de transmissão natural no país. Quanto a esta doença, está correto afirmar que:

- A) Atualmente, com a melhoria das moradias ,os casos de transmissão oral são mais frequentes que a transmissão vetorial ativa. A localização das úlceras de penetração na mucosa do trato digestivo causa sangramento digestivo alto. O edema de face constitui um sinal de porta de entrada.
- B) Não há relatos de transmissão vertical.
- C) A sintomatologia do megacolon, caracteriza-se por constipação de evolução rápida complicada por volvo, ruptura do colo e sinais de megacolon tóxico.
- D) Na insuficiência cardíaca congestiva o coração mostra-se aumentado de volume de forma assimétrica com predomínio de sinais clínicos de descompensação do lado esquerdo.
- E) As arritmias aparecem sob diferentes padrões, especialmente extrasístoles ventriculares e supraventriculares, monomórficas ou polimórficas, isoladas ou em salvas.

03 - Quanto às diarreias , esta afirmativa está correta:

- A) O uso indiscriminado de antibióticos – principalmente clindamicina , cefalosporinas e as ampicilinas – pode levar a um quadro diarréico de curso bifásico, iniciando com diarréia aquosa e se tornando muco-pio – sanguinolenta.
- B) A presença de um quadro diarréico, com dores abdominais de forte intensidade – constitui um fator excludente de abdômem agudo por apendicite.
- C) A presença de um quadro diarréico com dores abdominais de forte intensidade afasta o diagnóstico de diverticulite.
- D) A presença de um quadro de dor abdominal concomitante com diarréia profusa afasta o diagnóstico de pancreatite de qualquer etiologia.
- E) O quadro clínico da diarréia viral por rotavírus, quando apresenta presença de muco e sangue nas fezes, costuma apresentar também febre alta e ter uma duração acima de 15 dias.

04 - Tonturas que duram de alguns minutos até uma a duas hora, bem como tonturas que perduram por até 24 horas, podem ter como causa:

- A) Hipoperfusão cerebral transitória- pré-síncope.
- B) Distúrbios fóbicos.
- C) Ansiedade.
- D) Síndrome de Menière.
- E) Vertigem postural paroxística benigna.

05 - Este(s) fármaco(s), utilizado(s) no tratamento de vertigens, pode(m) apresentar parkinsonismo e depressão como paraefeitos.

- A) Meclizina.
- B) Dimenidrato.
- C) Cinarizina e flunarizina.
- D) Prometazina.
- E) Diazepam e lorazepam.

06 - A artrite reumatóide (AR) é uma doença inflamatória sistêmica, auto-imune e crônica. Queixas constitucionais são mais comuns nos idosos, como fadiga, astenia e perda de peso. Estes critérios classificatórios do diagnóstico de AR, devem estar presentes por pelo menos seis semanas, exceto:

- A) Rigidez matinal articular de pelo menos 1 hora.
- B) Artrite das articulações das mãos.
- C) Artrite de 3 ou mais áreas articulares (mãos, punhos, cotovelos).
- D) Artrite de 3 ou mais áreas articulares (joelhos, tornozelos e pés).
- E) Osteopenia periarticular e/ou erosões acometendo de forma assimétrica duas ou três articulações.

07 - Quanto às doenças infecciosas parasitárias esta afirmativa está correta:

- A) Na giardíase a presença de tenesmo, sangue e muco nas fezes é frequente. Estes quadros justificam a dificuldade de diagnóstico diferencial clínico com a amebíase.
- B) Na giardíase, cerca de 30 a 50% dos indivíduos podem desenvolver diarréia crônica e esteatorréia.
- C) A cloração da água é um método seguro para a destruição de cistos da giárdia. Estes são as formas infectantes. Têm baixa resistência ao meio externo.
- D) Não há risco de transmissão por meio da atividade sexual entre adultos homossexuais sem distinção de gênero.
- E) Entre as complicações da amebíase intestinal, as perfurações intestinais são as mais frequentes seguidas por estenose e ameboma.

08 - Estes amebicidas atuam tanto na luz intestinal como nos tecidos, exceto

- A) Metronidazol.
- B) Etofamida; teclozan.
- C) Ornidazol.
- D) Secnidazol.
- E) Tinidazol.

09 - No tocante à estrogiloidíase esta afirmativa está correta:

- A) A forma mais comum de transmissão é a penetração das larvas filarióides através da pele (principalmente dos pés) e das mucosas (principalmente boca e esôfago). No idoso, adquire importância a auto-infecção externa ou exógena pela penetração de larvas filarióides oriundas de larvas rabditóides, na região perianal.
- B) A presença de dor abdominal, diarreia, urticária e eosinofilia importante, a diferenciam de outras parasitoses.
- C) Casos assintomáticos prescindem de tratamento nos indivíduos jovens que necessitem de tratamento com imunossuppressores.
- D) O diagnóstico diferencial com a giardíase se baseia na presença de esteatorreia e síndrome de má absorção.
- E) O diagnóstico diferencial do quadro pulmonar, com broncopneumonia bacteriana ou viral (ausente na estrogiloidíase) tem base na presença, ou não, de expectoração. A tosse na estrogiloidíase é seca, podendo ocorrer crises asmatiformes com dispnéia. Sem febre.

10 - Constitui (em) característica(s) marcante(s) da ancilostomose :

- A) Dor epigástrica, náuseas e vômitos.
- B) Flatulência, digestão difícil e diarreia sem presença de sangue.
- C) Anemia (hipocrômica e microcítica), devido ao hematófagismo importante do parasita.
- D) Diarreia com presença de sangue.
- E) Perversão do apetite (síndrome de pica).

11 - O hipotireoidismo subclínico é definido como aumento do TSH sérico com T4 livre normal, caracteriza-se por :

- A) Depressão.
- B) Fadiga e ganho de peso.
- C) Disfunção cognitiva.
- D) Ser assintomático ou com manifestações clínicas mínimas.
- E) Irregularidade menstrual.

12 - Representa(m) a primeira escolha no tratamento de obesos com diabetes tipo 2, no qual a resistência à insulina é o fator preponderante. Apresenta(m) maior benefício sobre controle de glicemia, peso corporal e níveis lipídicos que os demais relacionados:

- A) Metformina.
- B) Sulfoniluréias.
- C) Tiazolidinodionas.
- D) Meglinidas.
- E) Inibidores da alfa-glicosidase.

13 - No diagnóstico diferencial de uma doença febril, exantemática, num adolescente, é verdadeiro afirmar que, embora esse achado não tenha valor patognomônico, a linfocitose com atipias é fundamental para que se possa firmar o diagnóstico da(o):

- A) Hepatite a vírus.
- B) Rubéola.
- C) Sífilis secundária.
- D) Mononucleose infecciosa .
- E) Toxoplasmose.

14 - Na suspeita de tuberculose (Tb), uma reação tuberculínica negativa não afasta o diagnóstico da doença. Está incorreto considerar como causa(s) de falso-negativo:

- A) Desnutrição grave.
- B) Aids; sarampo; gripe.
- C) Doença de Hodgkin; leucemia linfática crônica.
- D) Período pré-menstrual; doenças febris.
- E) Reação praticada no período de incubação da Tb, que tem duração de uma semana até seis meses após o contágio.

15 - Quanto ao uso destas drogas na gravidez está incorreto afirmar que:

- A) A prova tuberculínica com o derivado protéico purificado –PPD-RT23 não sofre interferência na gravidez.
- B) Não há relatos de teratogenia, com o uso de antidepressivos, mas deve-se reduzir a dose do cloridrato de amitriptilina no terceiro trimestre para evitar a ocorrência de efeitos atropínicos no recém-nascido.
- C) Betabloqueadores durante a gravidez podem prejudicar o crescimento do feto, causar hipoglicemia e bradicardia neonatal.
- D) O acetato de hidrocortisona deve ter seu uso evitado em grande quantidade ou por tempo prolongado devido ao risco de anomalias fetais.
- E) Os IECAS – captopril, enalapril e etc – devem ter seu uso contra-indicado pois, além de potenciais malformações no primeiro trimestre, podem causar danos ao feto ou morte fetal em qualquer trimestre da gravidez.

16 - Na maioria dos pacientes com tuberculose, a demora para procurar assistência pode chegar a até mais de três meses. O acesso à assistência pode tornar ainda mais demorado o diagnóstico. Quanto maior a duração da doença mais evidentes serão:

- A) Os sinais de consupção- emagrecimento e palidez.
- B) Os sintomas respiratórios – Escarros hemoptóicos patognomônicos e dispnéia.
- C) Os sintomas gerais – febre alta e anárquica e sudorese vespertina.
- D) Os acometimentos sistêmicos – hépato e esplenomegalia.
- E) Outros sintomas, tais como, artralgias assimétricas e mialgia.

17 - A leishmaniose visceral, (LV) (calazar), se caracteriza por um amplo espectro clínico. A infecção assintomática ocorre na maioria dos indivíduos residentes em áreas endêmicas. Na forma subclínica, também frequente nestas áreas, a sintomatologia é inespecífica. Entre os achados clínicos e as possibilidades evolutivas, não se observa:

- A) Febre baixa persistente e sudorese.
- B) Retardo do crescimento e adinamia.
- C) A maioria dos casos (85%), de ambas as formas, tem forte possibilidade de evolução para a forma clássica, ao final de alguns meses, principalmente, se o tratamento não for precocemente instituído.
- D) Hepatomegalia, com fígado pouco aumentado e baço, em geral, impalpável.
- E) Diarreia e tosse seca.

18 - Na tuberculose primária, em 2/3 dos casos, a lesão parenquimatosa resolve-se sem sequelas radiológicas. No terço restante, uma cicatriz calcificada conhecida como foco de Ghon, pode ser encontrada. Quanto às demais manifestações radiológicas desta fase primária da tuberculose, está incorreto afirmar que:

- A) Derrame pleural tem sido descrito em até 63% das formas primárias, sendo mais comum o seu aparecimento no adolescente e no adulto jovem, estando relativamente ausente nas crianças.
- B) Linfonomegalia mediastinal pode ser encontrada em até 96% das vezes, ocorrendo menos comumente em adultos.
- C) Em adultos com tuberculose primária, a cavidade é relatada em até 29% das vezes.
- D) Caracteriza-se por consolidação mais frequente nos lobos inferiores ou até mesmo atelectasia segmentar ou lobar.
- E) A forma miliar é a mais frequente em todas as faixas etárias. Geralmente, as crianças abaixo de cinco anos são mais atingidas mesmo vacinadas com a vacina BCG.

19 - Quanto ao tratamento e à quimioprofilaxia da tuberculose, no Brasil, para adultos, adolescentes e crianças abaixo de dez anos está incorreto afirmar que:

- A) A isoniazida (INH) provoca neurite periférica relacionada a alterações no metabolismo da vitamina B6, consideradas irreversíveis por alguns autores.
- B) O uso profilático de vitamina B6 não deve ser feito para todos os pacientes, pois esta compete com a INH em sua ação sobre o bacilo.
- C) A quimioprofilaxia com INH é recomendada por um período de seis meses, em infectados pelo bacilo. (Quimioprofilaxia secundária).
- D) Na fase intensiva do tratamento de crianças a dose de etambutol deverá ser a metade da dose dos adultos. O mesmo princípio é observado para com os idosos acima de 65 anos.
- E) A quimioprofilaxia com INH é recomendada por seis meses para não infectados. Quimioprofilaxia primária.

20 - Em áreas endêmicas, estes sintomas/sinais são altamente sugestivos de calazar. Sendo que é considerado caso suspeito, todo indivíduo – criança ou adulto – proveniente de área endêmica ou áreas, onde esteja ocorrendo surto, que apresente:

- A) Febre, sem linfonomegalia, há mais de duas semanas, com ou sem outras manifestações da doença.
- B) Perda progressiva de peso; fraqueza.
- C) Esplenomegalia; hepatomegalia.
- D) Anemia.
- E) Leucopenia e hipergamaglobulinemia.

21 - Qualquer classe de medicamentos anti-hipertensivos pode ser utilizada, como monoterapia inicial, para pacientes jovens ou idosos, portadores de hipertensão leve a moderada, que não responderam às medidas não medicamentosas. Exceto:

- A) Antagonistas dos canais de cálcio.
- B) Inibidores da enzima de conversão da angiotensina.
- C) Antagonistas do receptor da angiotensina II.
- D) Vasodilatadores de ação direta.
- E) Diuréticos.

22 - Quanto aos diuréticos está incorreto afirmar que:

- A) Como anti-hipertensivos, dá-se preferência aos diuréticos tiazídicos e similares. Diuréticos de alça são reservados para situações de hipertensão arterial associada às insuficiências renal e cardíaca.
- B) O uso de diuréticos poupadores de potássio em pacientes com redução da função renal pode provocar hiperpotassemia.
- C) Os diuréticos poupadores de potássio apresentam pequena potência diurética, mas, quando associados a tiazídicos e diuréticos de alça, são úteis na prevenção e tratamento da hipopotassemia.
- D) Nos idosos, devido às suas características hidroeletrolíticas, o uso de diuréticos oferece maior risco de desidratação e colapso circulatório.
- E) O aparecimento dos efeitos indesejáveis dos diuréticos, bem como de eventual ineficácia, estão em geral relacionados à dose utilizada. Dessa forma, recomenda-se que a dose utilizada do diurético tiazídico não ultrapasse 50mg/dia. Doses de 12,5 mg/dia são consideradas sub-doses.

23 - Esta afirmativa está incorreta quanto à hanseníase virchowiana (MHVV).

- A) Infiltração difusa e gradual pode preceder em anos o aparecimento de lesões nodulotuberosas – hansenomas.
- B) Há comprometimento lento e gradual de filetes nervosos periféricos, levando à perda de sensibilidade inicialmente em mãos e pés e posteriormente em membros e tronco.
- C) A MHVV é usualmente doença localizada. Porém tem, eventualmente, sido descrita doença generalizada, com muitas lesões dispostas de forma assimétrica, sob a forma de múltiplas máculas com discreta hipocromia.
- D) No princípio, manifesta-se por obstrução nasal com secreção serosanguinolenta e edema de tornozelos e pés, que podem preceder em meses ou anos, lesões mais características.
- E) A pele da face, muito espessada, forma grandes dobras, com supercílios e cílios rarefeitos (madarose) e adquire o aspecto de face leonina.

24 - A hanseníase neural pura tem como característica:

- A) Comprometimento nervoso assimétrico, com dor e edema em um ou mais nervos.
- B) O exame histopatológico das áreas acometidas pode mostrar diversos tipos de hanseníase, predominando os dimorfos tuberculóides.
- C) Comumente a função sensorial é a primeira e mais severamente afetada, porém, ocasionalmente, pode ocorrer alteração apenas motora.
- D) Na dependência da resistência do indivíduo o comprometimento dos troncos nervosos pode ser simétrico, de forma crônica ou assimétrico, de forma aguda.
- E) Todas as respostas estão corretas.

25 - A *Helicobacter pylori* (HP) é uma bactéria muito difundida, infectando aproximadamente a metade da população mundial. A maioria das pessoas infectadas nunca desenvolverá afecções clinicamente significativas. Quanto a este patógeno está incorreto afirmar que:

- A) É considerado o padrão-ouro para o diagnóstico, o histológico associado à pesquisa positiva de urease na biópsia gástrica.
- B) Um esquema terapêutico com monoterapia antiinfecante – tendo como droga de primeira escolha o metronidazol, associada a um inibidor de bomba protônica – omeprazol, está indicado para idosos infectados, portadores de doença do refluxo gastrointestinal, por 14 dias.
- C) A presença de HP é capaz de agravar os danos provocados à mucosa gástrica pelo uso concomitante de antiinflamatório não-hormonal. (AINH)
- D) Método diagnóstico invasivo implica na realização de endoscopia digestiva alta (EDA) com biópsia da mucosa gástrica. Deve ser obrigatória diante de sinais de alarme tais como sangramento, perda de peso e anorexia.
- E) Dispepsia iniciada após os 45 anos de idade e disfagia, constituem indicadores de EDA com biópsia da mucosa gástrica.

26 - Entre as complicações da artrite reumatóide, se deve(m) ao uso crônico de corticosteróides:

- A) Destruição articular.
- B) Síndrome de Cushing.
- C) Osteoporose.
- D) Artrite séptica.
- E) Úlceras cutâneas; neuropatia vasculítica; pericardite.

27 - No tratamento da insuficiência cardíaca (IC), com betabloqueadores, estes efeitos adversos são identificados como os mais comuns, especialmente no início do tratamento ou com aumento das doses, exceto:

- A) Broncoespasmo.
- B) Hipotensão; bradicardia.
- C) Bloqueio átrio-ventricular.
- D) Retenção de líquidos.
- E) Agravamento da IC.

28 - No tocante à cetoacidose diabética está incorreto afirmar que:

- A) Pode ser manifestação inicial do diabetes tipo1.
- B) Desenvolve-se em diabéticos tipo1 com necessidades aumentadas de insulina, durante infecção, trauma, infarto do miocárdio ou cirurgia.
- C) Pode se desenvolver em diabéticos tipo 2 sob estresse intenso, como sepse ou trauma.
- D) O achado de leucocitose de até 25.000/mm<sup>3</sup>, com desvio à esquerda, é indicador de infecção, independente de temperatura elevada ou normal ou hipotermia.
- E) Cetoacidose alcoólica e hipoglicemia constituem diagnósticos diferenciais bem como acidose láctica em diabéticos tipo 1, incluindo o uso de metformina.

## PARTE II - PORTUGUÊS

As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte:

Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método: a primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem a campa foi outro berço; a segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo: diferença radical entre este livro e o Pentateuco.

(Machado de Assis, in Memórias Póstumas de Brás Cubas)

29 - Das afirmações seguintes:

I. Considerando as ideias do autor-personagem é possível concluir que se trata de um texto autobiográfico.

II. De acordo com o autor-personagem é menos comum não começar o livro por sua morte.

III. É possível afirmar que a analogia existente entre o autor e Moisés é que ambos falam sobre suas mortes.

- A) Estão corretas apenas I e III.
- B) Estão corretas apenas II e III.
- C) Estão corretas apenas I e II.
- D) Todas estão corretas.
- E) Apenas o item I está correto.

30 - Das afirmações seguintes:

I. A distinção fundamental entre o autor e Moisés encontra-se no fato do autor começar pelo nascimento e Moisés, pela morte.

II. Através do texto é possível deduzir que o Pentateuco serviu de modelo ao autor do texto.

III. Ao considerar-se um defunto autor, o autor destaca seu conformismo diante da morte.

- A) Apenas I está correta.
- B) Apenas II está correta.
- C) Todas estão incorretas.
- D) Apenas III está correta.
- E) Estão corretas I e II.

As questões 31 e 32 referem-se ao poema seguinte:

### Saudades

Tenho saudades de muitas coisas  
do meu tempo de menininha:  
sentar no colo do meu pai,  
ninar boneca sem receios,  
chorar de medo da morte da mãe,  
sonhar com festa e bolo de aniversário,  
cantar com os anjos na igreja,  
ouvir as mágicas histórias de vovó,  
brincar de pique, de corda e peteca,  
acreditar em cegonhas, fadas e bruxas  
e sobretudo no Papai Noel.

Será que quando for velhinha,  
e já estiver caducando,  
vou viver tudo de novo?

(Cantigas de adolecer. São Paulo, 1992. p. 9.)

31 - Considerando o poema “Saudades”, todas as afirmações seguintes são verdadeiras, exceto:

- A) O poema apresenta duas estrofes sendo que a 1ª estrofe é organizada em torno da oração constituída pelos dois primeiros versos.
- B) Os versos de 03 a 11 especificam as “coisas” de que o eu lírico tem saudades.
- C) A palavra “infância” pode resumir tudo aquilo de que o eu lírico tem saudades.
- D) Os versos 05, 06 e 07 classificam-se como orações subordinadas substantivas apositivas reduzidas de infinitivo.
- E) A função sintática desempenhada pelo termo “de muitas coisas do meu tempo de menininha” (1º e 2º versos) é objeto direto.

32 - Das afirmações seguintes:

I. As ações “Sentar no colo do meu pai” e “ninar boneca sem receios” são o alvo das saudades do eu lírico e desempenham o papel de orações subordinadas substantivas completivas nominais.

II. No poema lido, as orações subordinadas substantivas apositivas são dispensáveis para a compreensão das pequenas “coisas” que compõem a infância.

III. As coisas de que são feitas nossa infância são alegres e tristes; parecem coisas pequenas, sem importância e, no entanto, delas sentimos saudades quando nos afastamos desse tempo.

- A) Apenas os itens I e III estão corretos.
- B) Apenas os itens II e III estão corretos.
- C) Apenas os itens I e II estão corretos.
- D) Todos estão corretos.
- E) Apenas o item II está correto.

A questão 33 refere-se a tira seguinte:



(Fernando Gonsales, Folha de S. Paulo, 20/02/2004.)

33 - Das afirmações seguintes:

I. A tira emprega dois pronomes relativos, sendo um no 1º quadrinho e o outro no 2º quadrinho.

II. A função sintática do vocábulo “QUE” no segundo quadrinho é de sujeito.

III. O humor da tira está na comparação banal que o sábio estabelece entre a Terra e um frango e entre a padaria e o sistema solar e no fato de o ratinho considerar essa comparação como prova de sabedoria.

- A) Todas estão incorretas.
- B) Apenas I e II estão corretas.
- C) Apenas I e III estão corretas.
- D) Todas estão corretas.
- E) Apenas II e III estão corretas.

34 - Na frase “Cada animal tem direito \_\_\_\_ consideração, \_\_\_\_ cura e \_\_\_\_ proteção do homem” a alternativa que preenche corretamente as lacunas é:

- A) à – à – à
- B) à – à – a
- C) à – a – à
- D) a – à – à
- E) a – a – a

35 - A regência nominal está correta em todos os itens, exceto em:

- A) Meu amigo é entendido em informática.
- B) O presidente mostrou-se desfavorável com nosso projeto.
- C) Nossa classe é responsável pela horta comunitária.
- D) Estávamos pasmados de ouvi-lo falar assim.
- E) O professor era indulgente com nossos erros.

36 - Assinale a alternativa que apresenta erro de concordância verbal:

- A) Precisam-se de vendedores com experiência comprovada.
- B) Faz cinco minutos que ela saiu.
- C) O futuro são esperanças.
- D) Desta vez será a minha equipe que guardará a rede de vôlei.
- E) Vossa senhoria aceita um café?

37 - Todas as alternativas seguintes apresentam apenas vocábulos grafados de acordo com a norma-padrão, exceto:

- A) malcriado / auferir / autuar / mal-caráter
- B) caudaloso / autêntico / almoço / moleque
- C) aurífero / alcalino / austero / álcool
- D) maltrapilho / sauna / mau-olhado / malvadeza
- E) bueiro / sotaque / embolia / curtume

38 - Na frase “Tinha um mundo de planos na cabeça” identificamos a presença da seguinte figura de linguagem:

- A) perífrase
- B) pleonasm
- C) onomatopeia
- D) hipérbole
- E) eufemismo

39 - Assinale o item em que todos os vocábulos fazem parte de uma mesma regra de acentuação:

- A) juízo – herói – destrói
- B) Tietê – xará – júri
- C) Jôquei – bênção – véu
- D) bíceps – bônus – chapéus
- E) balaústre – caféina – baú

40 - Os vocábulos BOQUIABERTO, COR-DE-ROSA e EMPALIDECER classificam-se, respectivamente, quanto ao processo de formação das palavras em:

- A) composição por justaposição, composição por aglutinação, derivação parassintética.
- B) composição por aglutinação, composição por justaposição, derivação prefixal e sufixal.
- C) composição por aglutinação, composição por justaposição, derivação parassintética.
- D) derivação sufixal, composição por justaposição e derivação prefixal e sufixal.
- E) nenhuma das respostas anteriores