

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará 05 (cinco) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (15 questões) e Conhecimentos Específicos (35 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- V. Você dispõe de 3 (três) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 2 (duas) horas após seu início.
- VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!.....
DESTAQUE AQUI**GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO**

Nome:

Assinatura do Candidato:

Inscrição:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RASCUNHO

Leia abaixo a parte final de um conto do famoso escritor argentino Julio Cortázar.

Continuidade dos parques

Já sem olhar, ligados firmemente à tarefa que os esperava, separaram-se na porta da cabana. Ela devia seguir pelo caminho que ia para o norte. Do caminho oposto ele se voltou um instante para vê-la correr com o cabelo solto. Correu por sua vez, esquivando-se das árvores e das cercas, até distinguir na rósea bruma do crepúsculo a alameda que levava à casa. Os cães não deviam latir, e não latiram. O capataz não estaria a essa hora, e não estava. Subiu os três degraus do pórtico e entrou. Pelo sangue galopando em seus ouvidos chegavam-lhe as palavras da mulher: primeiro uma sala azul, depois uma galeria, uma escadaria atapetada. No alto, duas portas. Ninguém no primeiro cômodo, ninguém no segundo. A porta do salão, e então o punhal na mão, a luz dos janelões, o alto respaldo de uma poltrona de veludo verde, a cabeça do homem na poltrona lendo um romance.

1) Como dito, o excerto que você acabou de ler pertence a um conto, isto é, um tipo de texto literário cuja linguagem é trabalhada pelo autor para que sejam alcançados determinados efeitos estéticos. As figuras de linguagem são poderosos recursos estilísticos que contribuem para a criação desses efeitos. No que se refere às figuras de linguagem, é correto dizer que o trecho “Pelo sangue galopando em seus ouvidos chegavam-lhe as palavras da mulher” não apresenta:

- a) prosopopeia
- b) personificação
- c) metáfora
- d) sinestesia
- e) sinédoque

2) Ainda com base no texto, assinale abaixo a alternativa que apresenta erro no que se refere ao acento indicativo da crase.

- a) “ligados firmemente à tarefa que os esperava”
- b) “até distinguir na rósea bruma do crepúsculo a alameda”
- c) “a luz dos janelões”
- d) “O capataz não estaria a essa hora”
- e) “a alameda que levava à casa”

3) Considere o período e as afirmações abaixo.

Ora, ao longo do filme, ri repetidamente, e não foi “de nervoso”.

- I. O termo entre aspas atua como advérbio de causa.
- II. A conjunção “e” poderia ser substituída, sem alteração de sentido por “pois”.
- III. O período é simples.

Está correto o que se afirma somente em:

- a) Apenas I
- b) Apenas II
- c) Apenas III
- d) Apenas I e III
- e) Apenas II e III

4) Assinale a alternativa que classifica, correta e respectivamente, os termos destacados no trecho abaixo.

Enfim, a preferência é para entrevistas rigorosamente estruturadas, com perguntas preestabelecidas e, portanto, menos sugestivas.

- a) Preposição -advérbio – adjetivo
- b) Preposição – adjetivo –advérbio
- c) Pronome – advérbio – adjetivo
- d) Preposição – advérbio – advérbio
- e) Conjunção – adjetivo – adjetivo

5) Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.

As crianças contam histórias _____ não é possível acreditar.

- a) que
- b) as quais
- c) em que
- d) onde
- e) das quais

6) Considere as orações abaixo.

- I. Prefiro cinema do que teatro.
- II. Não assisti aquela peça.
- III. Seu comportamento implicou outra advertência.

De acordo com a norma culta:

- a) somente III está correta.
- b) somente II está correta.
- c) somente I está correta.
- d) somente II e III estão corretas.
- e) todas estão corretas.

7) Considere os períodos abaixo.

- I. Podem haver congestionamentos nas estradas.
- II. Verificou-se, na investigação, todas as possibilidades.
- III. Trata-se de situações complexas.

A concordância está correta somente em

- a) Apenas I
- b) Apenas II
- c) Apenas III
- d) Apenas I e III
- e) Apenas II e III

8) Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas.

Não entendi _____ ele reagiu tão _____ quando _____ contaram a notícia.

- a) porque – mau – o
- b) porque – mal – lhe
- c) por que – mal – o
- d) por que – mau – lhe
- e) por que – mal – lhe

9) Considere os períodos abaixo.

- I. Vi o filme que o autor fez referência.
- II. Não sei aonde fica aquela cidade.
- III. Ele tem algo de que não gosto.

A regência está correta somente em:

- a) Apenas I
- b) Apenas II
- c) Apenas III
- d) Apenas I e III
- e) Apenas II e III

10) Considere as orações abaixo.

- I. Informei-lhe da alteração da data.
- II. Informei-o a alteração da data.
- III. Informei-lhe a alteração da data.
- IV. Informei-o da alteração da data.

A regência está correta em:

- a) I, II, III e IV.
- b) I, II e III, apenas.
- c) II, III e IV, apenas.
- d) I e II, apenas.
- e) III e IV, apenas.

11) Considere os períodos abaixo.

- I. Ela tem lindos olhos verde-claros.
- II. Os milhares de pessoas presentes adoraram o show.
- III. Dado as circunstâncias, o melhor é agir rapidamente.

A concordância está correta somente em:

- a) Apenas I
- b) Apenas II
- c) Apenas III
- d) Apenas I e II
- e) Apenas II e III

12) Considere os períodos abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. Os candidatos, que têm nível superior, consideraram a prova difícil.
 - II. Os candidatos que têm nível superior consideraram a prova difícil.
- a) A pontuação é apenas uma questão estilística e está correta em I e II.
 - b) Em I, entende-se que todos os candidatos têm nível superior.
 - c) A pontuação está correta nos dois períodos e não há qualquer diferença de sentido entre eles.
 - d) A pontuação está correta somente em II, pois não é possível separar sujeito e predicado.
 - e) A pontuação está correta apenas em I.

13) Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas.

- I. Não _____ em tomar as atitudes.
- II. Ele teve _____ na sua tentativa.

- a) exite – êxito
- b) exite – hêxito
- c) hesite – êxito
- d) hesite – hêxito
- e) hesite – êzito

14) Considere as orações abaixo.

- I. É necessário paciência.
- II. É necessária a participação de todos.
- III. É proibido a entrada de pessoas estranhas.

A concordância está correta somente em:

- a) Apenas I
- b) Apenas II
- c) Apenas III
- d) Apenas I e II
- e) Apenas II e III

15) Considere o período e as afirmações abaixo.

Fui eu quem solicitou na semana passada, um atestado de matrícula a direção da escola.

- I. Há um problema de concordância verbal, pois o correto seria "solicitei".
- II. Falta o acento indicativo de crase em "à direção".
- III. A pontuação está correta.

Está correto o que se afirma somente em:

- a) Apenas I
- b) Apenas II
- c) Apenas III
- d) Apenas I e II
- e) Apenas II e III

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) Os betabloqueadores estão contra indicados, na seguinte situação:

- a) Disfunção sexual por outros hipotensores.
- b) Taquicardia, sem insuficiência cardíaca.
- c) Fenômeno de Raynaud.
- d) Hipertireoidismo.
- e) Insuficiência coronariana.

17) Paciente, 60 anos de idade, deu entrada no hospital, em parada cardiorrespiratória, apresenta o seguinte traçado no eletrocardiograma da figura 1:




Figura 1

Após análise criteriosa a conduta será:

- a) Iniciar adrenalina com 0,1 a 0,5 mg (da solução 1:1000), subcutânea ou intramuscular, repetindo a aplicação a cada 20 minutos.
- b) 30 compressões torácicas e 02 Ventilações.
- c) Estímulo vagal.
- d) Desfibrilação.
- e) Sedação e intubação oro traqueal.

18) Mulher, com 57 anos de idade, obesa e tabagista, apresentando na anamnese e no exame clínico, taquicardia, dispnéia, hipotensão arterial, dor torácica súbita e hemoptise. Nesse quadro, sugere o diagnóstico de:

- a) Infarto agudo do miocárdio.
- b) Tromboembolismo pulmonar.
- c) Bronquiectasias.
- d) Adenoma brônquico.
- e) Pneumonia bacteriana.

19) Indique a arritmia cardíaca, responsável pela maioria das mortes súbitas, nas primeiras vinte e quatro horas de um acidente coronariano agudo:

- a) Fibrilação atrial.
- b) Bloqueio de ramo direito.
- c) Fibrilação ventricular.
- d) Bloqueio de ramo esquerdo.
- e) Taquicardia paroxística supraventricular.

20) A incidência radiográfica de tórax pósterio anterior, em relação ao diagnóstico de aneurisma dissecante de aorta, pode contribuir com os seguintes achados:

- a) Aumento de átrio esquerdo e ventrículo direito.
- b) Aumento da área cardíaca e condensação pulmonar.
- c) Alargamento da borda superior do átrio direito.
- d) Derrame pericárdico e diminuição da área cardíaca.
- e) Alargamento do mediastino e derrame pleural.

21) Profissional da saúde, do sexo feminino, 25 anos de idade, com seu esquema vacinal incompleto para hepatite B, procura atendimento médico referindo exposição ocupacional com material biológico, durante uma sutura de um paciente sabidamente usuário de droga injetável, com sorologia desconhecida para hepatite B. A profilaxia recomendada para essa profissional será:

- a) Completar esquema vacinal e realizar anti-HBs quantitativo 30 dias após exposição.
- b) Iniciar esquema vacinal, realizar anti-HBs quantitativo.
- c) Completar esquema vacinal, realizar anti-HBs quantitativo e administrar uma dose de imunoglobulina humana contra Hepatite B (HBIG), o mais precoce possível até sete dias após o acidente.
- d) Completar esquema vacinal com três doses, pois o risco de contaminação é de 0,3%.
- e) Nenhuma medida específica deve ser tomada.

- 22) Para indivíduos com 60 anos de idade, ou mais, o calendário de vacinação no Estado de São Paulo recomenda:
- Vacina pneumocócica 23-valente com reforço há cada 5 anos e contra Influenza anualmente.
 - Dupla Adulto (dT – difteria e tétano) dose de reforço a cada 10 anos para indivíduos previamente imunizados com esquema completo dessa vacina e contra Influenza anualmente nos períodos de campanha.
 - Contra Influenza, vacina pneumocócica 23-valente e dT (difteria e tétano) com reforço há cada 5 anos.
 - Contra Influenza H1N1, contra a febre amarela e Hepatite B.
 - Contra Influenza e Vacina pneumocócica 23-valente com reforço anualmente.
- 23) Adulto jovem apresenta em seu exame radiológico a formação de pneumatocele, que é mais observada em pneumonias do tipo:
- Estafilocócica.
 - Estreptocócica.
 - Pneumocócica.
 - Fúngica.
 - Viral.
- 24) O aciclovir assim como o penciclovir são drogas especialmente empregadas para o caso de :
- pneumonia pneumocócica.
 - leishmaniose visceral.
 - micose ungueal.
 - herpes labial.
 - candidíase oral.
- 25) Em uma mulher com 68 anos de idade, com quadro clínico diagnosticado como artrite reumatóide, podemos encontrar em suas mãos os seguintes sinais radiográficos relacionados a essa patologia:
- Áreas osteolíticas e reação periosteal.
 - Destruição óssea e desvio cubital dos quirodáctilos.
 - Espessamento da cortical óssea e grande aumento das partes moles.
 - Afilamento das extremidades e aumento das partes moles amontantes.
 - Desmineralização óssea e desvio cubital dos quirodáctilos.
- 26) Paciente do sexo masculino, 18 anos de idade, apresenta ferimento leve em antebraço direito por mordedura de cão domiciliado e sadio. A carteira de vacinação do paciente encontra-se em atraso, pois sua última dose de vacina foi aos 5 anos de idade. Segundo a profilaxia da raiva humana e o calendário vacinal para adolescentes no Estado de São Paulo, qual conduta deve ser tomada:
- Observar o animal por 10 dias, reforço da dupla adulto dT (dT – difteria e tétano) e iniciar esquema de vacina contra Hepatite B.
 - Observar o animal e iniciar esquema vacinal de 03 doses de antirrábica com intervalos de 0, 3 e 7 dias.
 - Iniciar esquema vacinal de 05 doses de antirrábica com intervalos de 0, 3, 7, 14 e 28 dias por via intramuscular.
 - Administrar Soro anti-rábico (SAR) 40 UI/Kg de peso e iniciar esquema de vacinação antirrábica 05 doses.
 - Enviar amostra do sistema nervoso central para o diagnóstico laboratorial de raiva.
- 27) Conforme Portaria do Ministério da Saúde nº 104, de 25 de janeiro de 2011, que define a relação de doenças, agravos e eventos em saúde pública de notificação compulsória em todo o território nacional, assinale a afirmação CORRETA:
- São de notificação compulsória: Acidente de Trabalho com mutilação, Pneumonia bacteriana e câncer relacionado ao trabalho.
 - São de notificação compulsória: Dengue, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida – AIDS e violência doméstica, sexual e outras violências.
 - A notificação compulsória é obrigatória somente para profissionais da saúde médicos e enfermeiros.
 - São de notificação compulsória imediata a Tuberculose e Hanseníase.
 - Todas as doenças e agravos deverão ser comunicados ao serviço de Vigilância epidemiológica do município.
- 28) Paciente deu entrada no pronto socorro apresentando crises convulsivas por abstinência ao álcool, em relação às crises. Nessa situação, pode-se afirmar que:
- Possui manifestações focais.
 - Apresenta resposta positiva à fenitoina sódica.
 - Raramente são múltiplas.
 - Ocorrem geralmente de 12 a 24 horas após a interrupção da ingestão do álcool.
 - Recidivam habitualmente, na sobrevivência do *delirium tremens*.
- 29) Uma paciente com quadro de intoxicação por ingestão excessiva de antidepressivo tricíclico em tentativa de suicídio, deu entrada no pronto socorro apresentando prolongamento QRS com distúrbio de condução átrio ventricular no eletrocardiograma. O tratamento de escolha é:
- Massagem do seio carotídeo.
 - Administração de digitálico endovenoso.
 - Colocação de marcapasso.
 - Instituição de propranolol via oral.
 - Administração de verapamil endovenoso.
- 30) Paciente diagnosticado com morte cerebral, apresenta a seguinte pontuação na escala de Glasgow:
- Quinze.
 - Zero.
 - Dez.
 - Cinco.
 - Três.
- 31) No choque cardiogênico, encontramos alterações hemodinâmicas com maior frequência para esta patologia como:
- Pressão venosa central alta e frequência cardíaca elevada.
 - Pressão arterial sistêmica normal e resistência pulmonar diminuída.
 - Pressão capilar pulmonar baixa e volume sistólico aumentado.
 - Resistência sistêmica normal e débito cardíaco reduzido.
 - Pressão venosa central baixa e resistência pulmonar alta.
- 32) Homem, vítima de acidente automobilístico, com trauma de crânio, apresentou durante a evolução na observação clínica um “intervalo lúcido”, o que frequentemente indica:
- Hematoma extradural.
 - Higroma hipertensivo.
 - Hematoma subdural.
 - Hematoma intraparenquimatoso.
 - Ação adrenérgica reacional.

- 33) **NÃO** é característico da pericardite com tamponamento cardíaco:
- Tosse e disfagia.
 - Sinal de Rotch.
 - Pulso paradoxal.
 - Depressão do segmento ST no eletrocardiograma.
 - Taquicardia.
- 34) Mulher adulta, em consulta de rotina com a ginecologista, apresentou ao exame físico bócio e sinais e sintomas de hipotireoidismo. parou o uso de pílula anticoncepcional há 3 meses, com a intenção de engravidar. Provavelmente, é portadora de tireoidite:
- Crônica de Riedel.
 - Crônica de Hashimoto.
 - Subaguda de Quervain
 - Aguda bacteriana.
 - Medicamentosa.
- 35) Homem adulto, com obesidade mórbida, apresentando sonolência e cianose de extremidades, foi diagnosticado pelo pneumologista como sendo portador da síndrome de Pickwick. Os sinais e sintomas relacionados a esta síndrome, estão relacionados à ocorrência de:
- Paralisia frênica.
 - Espasmo brônquico.
 - Compressão traqueal.
 - Edema intersticial.
 - Hipoventilação pulmonar.
- 36) O médico residente do pronto socorro, atendendo um paciente politraumatizado, comatoso com fratura de base de crânio, apresentando rinorréia persistente. Para confirmar que a secreção correspondia a líquido cefalorraquidiano, colheu amostra e solicitou a pesquisa de:
- Células epiteliais.
 - Glicose.
 - Neutrófilos.
 - Gamaglobulina.
 - Histiócitos.
- 37) Paciente deu entrada na emergência, com orifício de entrada penetrante do abdômen por FAF (ferimento por arma de fogo), apresentando retroperitonismo ao "Raio-X" simples de abdômen; no toque retal apresentou crepitação. O quadro sugere lesão de:
- Duodeno.
 - Cólon transverso.
 - Rim esquerdo.
 - Ureter esquerdo.
 - Pâncreas.
- 38) Mulher, com 19 anos de idade, deu entrada em uma UPA (unidade de pronto atendimento), com vômito, dor abdominal aguda e petéquias disseminadas. Não há trombocitopenia e a paciente refere história de alergia. A hipótese diagnóstica inicial é:
- Salmonelose.
 - Pancreatite aguda.
 - Púrpura de Henoch-Schönlein.
 - Enterovirose.
 - Dermatite atópica.
- 39) São considerados condições e fatores de risco para complicações da Influenza:
- Grávidas a partir de 25 semanas de gestação.
 - Puérperas após duas semanas após o parto.
 - Crianças abaixo de dois anos.
 - Adultos acima de 50 anos.
 - Indivíduos menores de 19 anos de idade em uso prolongado de paracetamol.
- 40) Homem, com 45 anos de idade, com quadro clínico de início súbito cursando com, febre, manifestações articulares e nódulos cutâneos eritematosos, diarreia mucossanguinolenta com 7 evacuações diárias acompanhadas de cólica. A principal hipótese diagnóstica é:
- Colite amebiana.
 - Doença de Crohn
 - Diverticulite aguda.
 - Tuberculose intestinal.
 - Retocolite ulcerativa.
- 41) Após eletrocardiograma e monitoramento, o paciente é diagnosticado com um quadro de flutter atrial. O tratamento imediato mais efetivo é o(a):
- Cardioversão.
 - Quinidina.
 - Marcapasso.
 - Cedilanide.
 - Lidocaína endovenosa.
- 42) Em um paciente adulto com quadro clínico e diagnóstico de síndrome nefrótica, qual a anormalidade urinária mais característica:
- Hematuria.
 - Cilindrúria.
 - Lipidúria.
 - Proteinúria.
 - Hipostenúria.
- 43) Paciente deu entrada no hospital com quadro compatível de estado de mal epiléptico. A droga de primeira escolha para o caso é:
- Valproato.
 - Fenitoína.
 - Carbamazepina.
 - Primidona.
 - Lítio.
- 44) A dislipidemia pode ser classificada laboratorialmente quando há, exceto:
- Hipercolesterolemia isolada.
 - Hipertrigliceridemia isolada.
 - Aumento isolado de VLDL.
 - Diminuição isolada do HDL-colesterol.
 - Hiperlipidemia mista.
- 45) A cocaína é um alcaloide, estimulante do Sistema Nervoso Central. Ela atinge rapidamente o cérebro, produz resposta intensa, o que a torna muito procurada como droga de abuso. Em relação à intoxicação aguda por cocaína, assinale a alternativa CORRETA:
- Fenobarbital é contra indicado na intoxicação crônica.
 - Betabloqueadores são contra indicados.
 - Diazepam endovenoso controla as convulsões.
 - A morfina e bloqueadores de cálcio devem sempre ser administrados.
 - Na intoxicação crônica é contra indicado o uso de antidepressivos tricíclicos.
- 46) Paciente apresentando diarreia aguda, acompanhada de sangue nas fezes e que após a reidratação endovenosa, ainda mantém o estado geral comprometido. Para esse quadro, está indicado o uso de:
- Adstringentes.
 - Hemotransfusão.
 - Anti-helmínticos.
 - Antimicrobianos.
 - Antifúngicos.

47) Paciente com diagnóstico de dengue, é indicativo de mau prognóstico os pacientes que apresentam:

- a) Plaquetopenia abaixo de 100.000/mm³.
- b) Hematócrito abaixo de 39%.
- c) Leucopenia.
- d) Eosinofilia.
- e) Leucocitose.

48) Na insuficiência renal crônica, entre as manifestações mais precoces na evolução da doença, destaca-se:

- a) Desnutrição protéica.
- b) Anemia.
- c) Osteodistrofia.
- d) Insuficiência cardíaca.
- e) Intolerância glicídica.

49) A síndrome de Mallory-Weiss refere-se ao sangramento decorrente de lacerações da mucosa da junção do esôfago e estômago, tipicamente resultante de um esforço ao tossir ou vomitar. A síndrome de Mallory-Weiss geralmente está associada a:

- a) Úlcera péptica.
- b) Carcinoma.
- c) Alcoolismo.
- d) Hérnia hiatal
- e) Monilíase

50) São condições que predisõem a formação dos cálculos biliares:

- a) Hemólise crônica, dieta hipolipídica e hiperuricemia.
- b) Tabagismo, dieta hiperglicídica e hiperuricemia.
- c) Alimentação parenteral, dieta hipercalórica e uso de diurético.
- d) Alimentação parenteral, obesidade e dieta hipopurínica.
- e) Hemólise crônica, tabagismo e obesidade.