

**Concurso Público**

REF. EDITAL Nº 2/2013

**NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ****Cargo****MÉDICO -  
CIRURGIA PEDIÁTRICA****ATENÇÃO**

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

**INSTRUÇÕES**

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



-----(destaque aqui)-----

**FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO**

<b>Questão</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	<b>04</b>	<b>05</b>	<b>06</b>	<b>07</b>	<b>08</b>	<b>09</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	
<b>Resp.</b>																										

<b>Questão</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>40</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>45</b>	<b>46</b>	<b>47</b>	<b>48</b>	<b>49</b>	<b>50</b>	
<b>Resp.</b>																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) no dia seguinte à aplicação da prova.

## LÍNGUA PORTUGUESA

### Pensando livremente sobre o livre arbítrio

Marcelo Gleiser

Todo mundo quer ser livre; ou, ao menos, ter alguma liberdade de escolha na vida. Não há dúvida de que todos temos nossos compromissos, nossos vínculos familiares, sociais e profissionais. Por outro lado, a maioria das pessoas imagina ter também a liberdade de escolher o que fazer, do mais simples ao mais complexo: tomo café com açúcar ou adoçante? Ponho dinheiro na poupança ou gasto tudo? Em quem vou votar na próxima eleição? Caso com a Maria ou não?

A questão do livre arbítrio, ligada na sua essência ao controle que temos sobre nossas vidas, é tradicionalmente debatida por filósofos e teólogos. Mas avanços nas neurociências estão mudando isso de forma radical, questionando a própria existência de nossa liberdade de escolha. Muitos neurocientistas consideram o livre arbítrio uma ilusão. Nos últimos anos, uma série de experimentos detectou algo surpreendente: nossos cérebros tomam decisões antes de termos consciência delas. Aparentemente, a atividade neuronal relacionada com alguma escolha (em geral, apertar um botão) ocorre antes de estarmos cientes dela. Em outras palavras, o cérebro escolhe antes de a mente se dar conta disso.

Se este for mesmo o caso, as escolhas que achamos fazer, expressões da nossa liberdade, são feitas inconscientemente, sem nosso controle explícito.

A situação é complicada por várias razões. Uma delas é que não existe uma definição universalmente aceita de livre arbítrio. Alguns filósofos definem livre arbítrio como sendo a habilidade de tomar decisões racionais na ausência de coerção. Outros consideram que o livre arbítrio não é exatamente livre, sendo condicionado por uma série de fatores, desde a genética do indivíduo até sua história pessoal, situação pessoal, afinidade política etc.

Existe uma óbvia barreira disciplinar, já que filósofos e neurocientistas tendem a pensar de forma bem diferente sobre a questão. O cerne do problema parece estar ligado com o que significa estar ciente ou ter consciência de um estado mental. Filósofos que criticam as conclusões que os neurocientistas estão tirando de seus resultados afirmam que a atividade neuronal medida por eletroencefalogramas, ressonância magnética funcional ou mesmo com o implante de eletrodos em neurônios não mede a complexidade do que é uma escolha, apenas o início do processo mental que leva a ela.

Por outro lado, é possível que algumas de nossas decisões sejam tomadas a um nível profundo de consciência que antecede o estado mental que associamos com estarmos cientes do que escolhemos. Por exemplo, se, num futuro distante, cientistas puderem mapear a atividade cerebral com tal precisão a ponto de prever o que uma pessoa decidirá antes de ela ter consciência da sua decisão, a questão do livre arbítrio terá que ser repensada pelos filósofos.

Mesmo assim, me parece que existem níveis diferentes de complexidade relacionados com decisões diferentes, e que, ao aumentar a complexidade da escolha, fica muito difícil atribuí-la a um processo totalmente inconsciente.

Casar com alguém, cometer um crime e escolher uma profissão são ponderações longas, que envolvem muitas escolhas parciais no caminho que requerem um diálogo com nós mesmos. Talvez a confusão sobre o livre arbítrio seja, no fundo, uma confusão sobre o que é a consciência humana.

<http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2014/01/1396284-pensando-livremente-sobre-o-livre-arbitrio.shtml>

#### QUESTÃO 01

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se afirma a seguir.

- (A) Em "...são ponderações longas...", funciona como predicativo.
- (B) Em "...tomo café com açúcar..." funciona como complemento nominal.
- (C) Em "Mesmo assim, me parece que existem...", pode ficar após o verbo.
- (D) Em "...imagina ter também a liberdade...", indica acréscimo.
- (E) Em "...são feitas inconscientemente, sem nosso controle...", expressa modo.

#### QUESTÃO 02

A palavra que NÃO está separada corretamente é

- (A) bar – rei – ra.
- (B) pes – so – as.
- (C) ci – en – tes.
- (D) ne – u – ro – nal.
- (E) fi – ló – so – fos.

#### QUESTÃO 03

Em "Muitos neurocientistas consideram o livre arbítrio uma ilusão.", a expressão destacada funciona como

- (A) complemento nominal.
- (B) predicativo do sujeito.
- (C) predicativo do objeto.
- (D) adjunto adnominal.
- (E) objeto indireto.

#### QUESTÃO 04

Apresenta a mesma regra de acentuação da palavra filósofos a expressão

- (A) alguém.
- (B) magnética.
- (C) decisões.
- (D) açúcar.
- (E) ilusão.

#### QUESTÃO 05

"Existe uma óbvia barreira disciplinar, já que filósofos e neurocientistas tendem a pensar de forma bem diferente sobre a questão."

A expressão destacada pode ser substituída, sem prejuízo sintático-semântico, por

- (A) apesar de.
- (B) como.
- (C) porquanto.
- (D) embora.
- (E) à medida que.

**QUESTÃO 06**

Em "...fica muito difícil atribuí-la..." o pronome destacado retoma

- (A) decisões diferentes.
- (B) ponderações longas.
- (C) níveis diferentes.
- (D) escolha.
- (E) confusão.

**QUESTÃO 07**

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se afirma a seguir.

- (A) Em "...antes de a mente se dar conta disso.", funciona como adjunto adnominal.
- (B) Em "Alguns filósofos definem livre arbítrio...", é pronome indefinido.
- (C) Em "...ocorre antes de estarmos cientes dela.", expressa tempo.
- (D) Em "...definem livre arbítrio como sendo...", pode ser retirada a expressão sendo.
- (E) Em "...a questão do livre arbítrio terá que ser...", pode ser substituída por terá de.

**QUESTÃO 08**

Em "Se este for mesmo o caso...", a conjunção expressa

- (A) tempo.
- (B) consecução.
- (C) conclusão.
- (D) modo.
- (E) condição.

**QUESTÃO 09**

Assinale a alternativa cujo pronome NÃO foi classificado corretamente.

- (A) "...estão mudando isso de forma radical..." (demonstrativo)
- (B) "...estão tirando de seus resultados..." (possessivo)
- (C) "Se este for mesmo o caso..." (demonstrativo)
- (D) "...todos temos nostros compromissos..." (possessivo)
- (E) "...ocorre antes de estarmos cientes dela." (possessivo)

**QUESTÃO 10**

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se afirma a seguir.

- (A) Em "Em quem vou votar na próxima eleição?", funciona como objeto indireto.
- (B) Em "...ligada na sua essência ao controle..." funciona como objeto indireto.
- (C) Em "Mesmo assim, me parece que existem...", expressa contraste.
- (D) Em "Talvez a confusão sobre o livre arbítrio...", expressa dúvida.
- (E) Em "...estão mudando isso de forma radical...", expressa modo.

**RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO****QUESTÃO 11**

Observando o calendário de 2014, observamos que o feriado de 21 de abril (Tiradentes) cai em uma segunda-feira. Sendo assim, em que dia da semana cairá o dia 9 de abril deste mesmo ano?

- (A) Terça-feira.
- (B) Quarta-feira.
- (C) Quinta-feira.
- (D) Sábado.
- (E) Domingo.

**QUESTÃO 12**

Rafael recebeu um boleto para ser pago no próximo dia útil. Fazendo as contas, ele percebeu que possui apenas cinco oitavos de três sétimos do valor total do boleto, ou seja, ele possui apenas R\$ 75,00. Qual é o valor total do boleto que Rafael deverá pagar?

- (A) R\$ 280,00.
- (B) R\$ 250,00.
- (C) R\$ 200,00.
- (D) R\$ 180,00.
- (E) R\$ 150,00.

**QUESTÃO 13**

Um professor de matemática passou dois trabalhos diferentes para seus alunos. Os alunos deveriam optar por fazer um dos dois trabalhos, mas os alunos que quisessem poderiam fazer os dois por uma questão de curiosidade que ele corrigiria. Sabendo que todos os alunos entregaram pelo menos um dos trabalhos, e que 80% fez o trabalho 1, e 60% fez o trabalho 2, quantos alunos fizeram os dois trabalhos?

- (A) 10%.
- (B) 20%.
- (C) 30%.
- (D) 40%.
- (E) 50%.

**QUESTÃO 14**

Observe a sequência a seguir:

35; 42; 49; 56;...

Qual é o sétimo termo desta sequência?

- (A) 63.
- (B) 65.
- (C) 70.
- (D) 75.
- (E) 77.

**QUESTÃO 15**

Qual é a negação de "Todos os alunos gostam de matemática"?

- (A) Nenhum aluno gosta de matemática.
- (B) Existem alunos que gostam de matemática.
- (C) Existem alunos que não gostam de matemática.
- (D) Pelo menos um aluno gosta de matemática.
- (E) Apenas um aluno não gosta de matemática.

## LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

### QUESTÃO 16

Com relação à contratação de pessoal pela EBSEERH, assinale a alternativa correta.

- (A) Não há necessidade de realização de concurso público.
- (B) A EBSEERH somente fará contratação mediante concurso público.
- (C) A EBSEERH fica autorizada a contratar, para fins de sua implantação, mediante processo seletivo simplificado, pessoal técnico e administrativo por tempo determinado.
- (D) A EBSEERH fica autorizada a contratar, para fins de sua implantação, mediante processo seletivo simplificado, pessoal técnico e administrativo sem determinação de tempo.
- (E) A EBSEERH não poderá, em qualquer hipótese, contratar mediante processo seletivo simplificado.

### QUESTÃO 17

A EBSEERH poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres. Para efeitos da Lei 12.550/2011, consideram-se instituições congêneres

- (A) as instituições públicas e privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.
- (B) as instituições públicas e privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito dos planos privados de assistência à saúde.
- (C) as instituições privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito dos planos privados de assistência à saúde.
- (D) as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.
- (E) as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito dos planos privados de assistência à saúde.

### QUESTÃO 18

Assinale a alternativa INCORRETA. O Conselho Consultivo da EBSEERH tem as finalidades de

- (A) apoio ao Conselho de Administração.
- (B) apoio ao Conselho Fiscal.
- (C) apoio à Diretoria Executiva.
- (D) controle social.
- (E) consulta.

### QUESTÃO 19

A EBSEERH é empresa pública unipessoal, vinculada ao

- (A) Ministério da Defesa.
- (B) Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
- (C) Ministério da Educação.

- (D) Ministério da Previdência Social.
- (E) Ministério da Saúde.

### QUESTÃO 20

Assinale a alternativa INCORRETA. Compete ao Conselho de Administração

- (A) admitir, promover, punir, dispensar e praticar os demais atos compreendidos na administração de pessoal, de acordo com as normas e critérios previstos em lei e aprovados pela Diretoria, podendo delegar esta atribuição no todo ou em parte.
- (B) fixar as orientações gerais das atividades da EBSEERH.
- (C) aprovar o regimento interno da EBSEERH e suas alterações supervenientes, que deverá conter, dentre outros aspectos, a estrutura básica da empresa e os níveis de alçada decisória da Diretoria e do Presidente, para fins de aprovação de operações.
- (D) deliberar sobre alteração do capital e do estatuto social da EBSEERH.
- (E) autorizar a aquisição, alienação e a oneração de bens imóveis e valores mobiliários.

## LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

### QUESTÃO 21

Conforme a Resolução 453/2012, os Conselhos de Saúde são

- (A) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e privadas e na administração da saúde.
- (B) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde.
- (C) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde e da assistência social.
- (D) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde e da previdência social.
- (E) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e privadas e na administração da saúde e da assistência social.

### QUESTÃO 22

De acordo com a Constituição Federal, constituem objetivos da seguridade social, EXCETO

- (A) universalidade da cobertura e do atendimento.
- (B) seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços.
- (C) equidade na forma de participação no custeio.
- (D) diferenciação dos benefícios e serviços em relação às populações urbanas e às populações rurais.
- (E) diversidade da base de financiamento.

**QUESTÃO 23**

De acordo com o Decreto 7.508/2011, os serviços de saúde específicos para o atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral, necessita de atendimento especial, denominam-se

- (A) Portas de Entrada.
- (B) Serviços Especiais de Acesso Primário.
- (C) Serviços Especiais de Acesso Aberto.
- (D) Atenção Primária.
- (E) Atenção Psicossocial.

**QUESTÃO 24**

Parte dos recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal. Conforme a Lei 8.142/1990, referidos recursos serão destinados

- (A) pelo menos setenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- (B) pelo menos cinquenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- (C) pelo menos sessenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- (D) pelo menos setenta por cento, aos Estados, afetando-se o restante aos Municípios.
- (E) pelo menos cinquenta por cento, aos Estados, afetando-se o restante aos Municípios.

**QUESTÃO 25**

De acordo com a Lei 8.080/1990, sobre a participação complementar, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada.
- (B) A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, as normas de direito público.
- (C) As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para participar do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (D) Os serviços contratados submeter-se-ão às normas técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato.
- (E) Os proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados deverão necessariamente exercer cargo de chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde (SUS).

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS****QUESTÃO 26**

Sobre a “associação de VACTERL”, assinale alternativa correta.

- (A) A denominação “associação” (como a associação de VACTERL) relaciona-se à presença de múltiplas anomalias independentes, embora tenham causa única básica.
- (B) A associação de VACTERL é mais comum nos pacientes com atresia de esôfago com fístula esôfago-traqueal distal.
- (C) Existe a denominação de VACTERL-H quando está associada à hidrocele.
- (D) Para que o paciente apresente associação de VACTERL completa é necessário apresentar atresia de esôfago e outras duas anomalias associadas.
- (E) O “L” da associação de VACTERL refere-se a “lienial = esplênico”.

**QUESTÃO 27**

Existem várias classificações relacionadas à atresia de esôfago quanto aos grupos de risco cirúrgico e prognóstico. A classificação que leva em consideração somente o peso e a presença de doença cardíaca congênita é a classificação de

- (A) Waterston.
- (B) Goss.
- (C) Spitz.
- (D) Montreal.
- (E) Foker.

**QUESTÃO 28**

A anastomose esofágica na correção da atresia de esôfago muitas vezes é um desafio para o cirurgião pediátrico. Assinale a alternativa INCORRETA quanto à técnica cirúrgica, sua indicação e sua descrição.

- (A) A técnica de Livaditis consiste em realizar uma miotomia circular extramucosa no esôfago proximal.
- (B) A técnica de Foker consiste em dissecação extensa do coto esofágico superior, dissecação do coto esofágico inferior e tração dos cotos com o uso de catéter de Fogarty.
- (C) Nas anastomoses com tensão pode ser feita a azigoplastia para melhores resultados.
- (D) A técnica de miotomia de Kimura é feita em forma de espiral e pode inclusive ser suturada obliquamente diminuindo o aparecimento de pseudodivertículo.
- (E) A técnica de Gough consiste em realizar um retalho da parede anterior do coto proximal para alongamento esofágico.

**QUESTÃO 29**

Assinale a seguir a complicação pós-operatória mais frequente relacionada ao tratamento cirúrgico da Atresia de Esôfago.

- (A) Estenose da anastomose.

- (B) Traqueomalácia.
- (C) Fístula traqueoesofágica recorrente.
- (D) Descência de anastomose.
- (E) Refluxo gastroesofágico.

**QUESTÃO 30**

Lucas, com 2 horas de vida, está em unidade neonatal e apresenta Sequência de Pierre-Robin com crises de cianose. Foi submetido à nasofibroscopia e classificado como obstrução do Tipo 1 (a língua entra em contato com a parede posterior da faringe, abaixo do palato mole). Assinale a alternativa correta sobre o caso.

- (A) O paciente deve ser mantido em decúbito dorsal e com suporte de O2.
- (B) Deve ser tentada entubação nasofaríngea prolongada (30 a 60 dias).
- (C) Deve ser feita entubação orotraqueal prolongada (30 dias).
- (D) Deve ser feita glossopexia por 60 dias.
- (E) Deve ser feita traqueostomia de emergência.

**QUESTÃO 31**

Adwilians, com vinte dias de vida, com dificuldade de ganho de peso, em investigação por vômitos não biliosos, foi submetido à REED. No RX do estômago, foi identificado septo radiluciente tênue, com 2 mm de espessura e em sentido perpendicular em relação ao eixo longitudinal do estômago. Assinale a alternativa com o diagnóstico mais provável.

- (A) Atresia pilórica com cordão fibroso.
- (B) Membrana antral completa.
- (C) Membrana antral tipo "biruta".
- (D) Membrana antral perfurada.
- (E) Atresia pilórica com cotos separados.

**QUESTÃO 32**

Assinale a alternativa correspondente à apresentação mais frequente de atresia intestinal.

- (A) Tipo I – diafragma mucoso obstrutivo com parede intestinal intacta.
- (B) Tipo II – fundos cegos do intestino conectados por cordão fibroso.
- (C) Tipo III A – fundos cegos do intestino separados por defeito mesentérico em forma de V.
- (D) Tipo III B – apple peel.
- (E) Tipo IV – múltiplas atresias.

**QUESTÃO 33**

Sabendo que a cirurgia de Sistrunk, descrita em 1920, é o melhor tratamento para o cisto do ducto tireoglossal, assinale a alternativa que descreve os passos principais deste procedimento.

- (A) Ressecção do cisto, corpo da cartilagem tireoide e ducto.
- (B) Ressecção do cisto, istmo da tireoide e trajeto fistuloso.
- (C) Ressecção do cisto, osso hioide e do trajeto fistuloso.
- (D) Ressecção do cisto, osso hioide e ligadura da fístula.
- (E) Ressecção do cisto, corpo do osso hioide e do ducto até a base da língua.

**QUESTÃO 34**

Sabendo que os Remanescentes Branquiais são originários de falhas do desenvolvimento embrionário do aparelho branquial, assinale a alternativa correta.

- (A) As anomalias da primeira fenda branquial são as mais comuns.
- (B) As lesões da segunda fenda branquial localizam-se da fossa tonsilar até a borda anterior do músculo esternocleidomastoideo.
- (C) Para confirmação de cisto branquial, a ultrassonografia deve sempre ser realizada não sendo necessária a tomografia computadorizada.
- (D) Os seios pré-auriculares têm comunicação com o conduto auditivo externo o qual deve ser ressecado.
- (E) As anomalias de terceira fenda branquial são facilmente identificáveis devido a sua localização.

**QUESTÃO 35**

Sabendo que "a atresia de vias biliares (AVB) é uma doença coleostática neonatal causada pela obstrução completa ou ausência dos ductos biliares intra e extra-hepáticos", assinale a alternativa correta.

- (A) A AVB pode ser dividida em três formas: embrionária, perinatal e evolutiva.
- (B) A transformação de células gigantes define a diferença histológica entre AVB e hepatite neonatal.
- (C) A AVB é a indicação mais comum de transplante hepático em crianças.
- (D) A icterícia obstrutiva e a hipoatividade dos recém-nascidos são sintomas iniciais da AVB.
- (E) A cintilografia com DISIDA deve ser feita em todas as crianças com colestase neonatal, por sua alta sensibilidade e especificidade.

**QUESTÃO 36**

Assinale a alternativa que corresponde a alteração mais sugestiva de atresia de vias biliares durante o exame ultrassonográfico.

- (A) Sinal do cordão triangular.
- (B) Ausência de vesícula biliar após jejum de seis horas.
- (C) Vesícula pequena, menor do que 1,5 cm, e vazia.
- (D) Presença de cisto no hilo hepático.
- (E) Hipoplasia do ducto biliar comum.

**QUESTÃO 37**

**Sobre o tratamento e prognóstico da Atresia de Vias Biliares, assinale a alternativa correta.**

- (A) A porção distal do conduto intestinal deve ser exteriorizada temporariamente.
- (B) A cirurgia de Kasai deve ser realizada em crianças de até um ano, com cirrose e ascite, pois melhora o resultado do transplante hepático.
- (C) É consenso o uso de antibiótico profilático por três meses, após a cirurgia de Kasai e então introduzir ácido ursodesoxicólico.
- (D) A cirurgia de Kasai via incisão transversa bilateral é a melhor opção.
- (E) A portoenterostomia via laparoscopia pode ser realizada.

**QUESTÃO 38**

**A Doença de Caroli é um tipo de dilatação biliar congênita com múltiplos cistos intra-hepáticos com ou sem fibrose hepática congênita. Segundo a classificação de Alonso-Lej modificada para dilatação biliar congênita. A descrição apresentada corresponde à Doença de Caroli**

- (A) Tipo I.
- (B) Tipo II.
- (C) Tipo III.
- (D) Tipo IV.
- (E) Tipo V.

**QUESTÃO 39**

**Renan, com cinco anos de idade, apresenta dor abdominal em hipocôndrio direito, vômitos, hipocolia fecal, icterícia intermitente e massa abdominal palpável ao exame físico. Foi submetido à ultrassonografia de abdome que foi sugestiva de cisto de colédoco com doze centímetros de diâmetro. Em relação ao caso, assinale a alternativa que corresponde a melhor conduta.**

- (A) Laparotomia com ressecção completa do cisto e hepaticojejunostomia em Y de Roux.
- (B) Cintilografia hepatobiliar com DISIDA para identificação do cisto.
- (C) Tomografia computadorizada para verificar anatomia e local de provável anastomose do cisto com víscera oca.
- (D) Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica para desobstrução do canal comum.
- (E) Colangiopancreatografia ressonância magnética, pois é o melhor exame e indica o momento ideal para a cirurgia.

**QUESTÃO 40**

**Maria, dois anos e seis meses de vida, apresentando urgência miccional, incontinência e obstipação que iniciaram faz cinco meses. Durante a investigação foi diagnosticado refluxo vesicoureteral bilateral grau III e está em uso de Cefalexina 20 mg/kg, VO a noite faz quatro meses. Mesmo em uso correto da medicação profilática, nestes quatro meses apresentou três episódios**

**de infecção urinária. Assinale a alternativa que corresponde a melhor conduta.**

- (A) Trata-se de infecção urinária recidivante que não responde à antibioticoprofilaxia devendo a paciente ser submetida à cirurgia de reimplante ureteral.
- (B) Deve-se mudar o antibiótico profilático para nitrofurantoína na dose de 2 mg/kg VO à noite.
- (C) Como o refluxo vesicoureteral grau III é bilateral, tem indicação de reimplante ureteral à Cohen.
- (D) Deve-se manter a profilaxia antibiótica, tratar a obstipação e a disfunção vesical.
- (E) Como o refluxo vesicoureteral grau III é bilateral a melhor técnica é a injeção de Deflux pois apresenta menor morbidade.

**QUESTÃO 41**

**A localização mais comum do apêndice vermiforme identificada durante a apendicectomia é**

- (A) subcecal.
- (B) retrocecal.
- (C) pélvica.
- (D) anterior.
- (E) látero-cecal.

**QUESTÃO 42**

**Sobre o tratamento conservador (clínico) e apendicectomia intervalada para a apendicite aguda, assinale a alternativa que é contraindicação para a manutenção do tratamento clínico.**

- (A) Tempo de evolução de sete dias.
- (B) Abscesso palpável em fossa ilíaca direita.
- (C) Suspeita de apêndice perfurado.
- (D) Dúvida diagnóstica.
- (E) Leucocitose importante (maior do que 20.000 leucócitos/mm<sup>3</sup>).

**QUESTÃO 43**

**Sobre os conceitos de tratamento da dor em crianças, assinale a alternativa correta.**

- (A) A percepção da dor no feto ocorre por volta da 32ª semana, sendo antes disso dispensável o tratamento da dor em cirurgias fetais.
- (B) No recém-nascido o metabolismo das drogas analgésicas é igual ao dos adultos.
- (C) O tratamento antinociceptivo, antes da cirurgia, é uma estratégia correta de tratamento da dor.
- (D) Os bloqueios anestésicos são dispensáveis quando se usa anestesia geral, não trazendo benefícios quando utilizados.
- (E) O uso de opioides nos recém-nascidos não tem indicação, pois apresentam o dobro da meia vida quando comparado aos adultos.

**QUESTÃO 44**

**Jenifer, dois meses de idade, está no primeiro dia pós-operatório de abaixamento de cólon por megacólon congênito via laparoscópica e transanal. Após dez minutos da administração de morfina prescrita conforme a rotina do serviço apresentou cianose e bradipneia. Foi feita a hipótese de erro de diluição da medicação.**



**Assinale a alternativa que apresenta a medicação que deve ser utilizada para reverter os efeitos colaterais da morfina.**

- (A) Metadona.
- (B) Naloxona.
- (C) Flumazenil.
- (D) Naproxeno.
- (E) Meperidina.

**QUESTÃO 45**

**Sabendo que a Doença de Hirschsprung é uma obstrução intestinal funcional congênita, assinale a alternativa correta.**

- (A) A aganglionose clássica ocorre em cerca de 75% dos casos.
- (B) A aganglionose colônica total ocorre em 20% dos casos.
- (C) Em 5% dos casos o diagnóstico é feito no período neonatal.
- (D) A enterocolite é mais frequente em crianças maiores.
- (E) A Doença de Hirschsprung é mais comum em prematuros.

**QUESTÃO 46**

**A acidúria paradoxal é uma alteração metabólica tardia que pode ocorrer na Estenose Hipertrófica de Píloro. Sobre a acidúria paradoxal, assinale a alternativa correta.**

- (A) Ocorre a reabsorção de potássio em troca de íons hidrogênio.
- (B) Ocorre a reabsorção do cálcio em troca de íons hidrogênio.
- (C) Ocorre a reabsorção do bicarbonato em troca de íons hidrogênio.
- (D) Ocorre a reabsorção de cloro em troca de íons hidrogênio.
- (E) Ocorre a reabsorção de sódio em troca de íons hidrogênio.

**QUESTÃO 47**

**Em relação aos exames de imagem na Estenose Hipertrófica de Píloro (EHP), assinale a alternativa correta.**

- (A) A ultrassonografia deve ser sempre realizada, pois não apresenta riscos para o paciente.
- (B) O achado ultrassonográfico de comprimento do píloro maior ou igual a 10 mm é característico de EHP.
- (C) A ressonância magnética tem sua indicação crescente na EHP, pois tem maior sensibilidade do que a ultrassonografia e não precisa de contraste.
- (D) A sensibilidade e especificidade do Raio-x contrastado de estômago é cerca de 100%.
- (E) O sinal do alvo, do barbante e do pseudo-rim são sugestivos de EHP.

**QUESTÃO 48**

**Sobre a Estenose Hipertrófica de Píloro (EHP), assinale a seguir a alternativa correta.**

- (A) Após quatro semanas de pós-operatório, o píloro retorna ao seu tamanho normal.
- (B) Ao se palpar a “oliva pilórica” o diagnóstico é de

certeza e o paciente deve ser levado de imediato ao centro cirúrgico.

- (C) Para ser operado, o exame de imagem é fundamental para a definição da via de acesso (circumbilical ou clássica).
- (D) A laparoscopia pode ser realizada após os trinta dias de vida, mas não no recém-nascido.
- (E) A complicação pós-operatória mais frequente independente da via de acesso é a infecção de ferida operatória.

**QUESTÃO 49**

**Marcos, três anos de idade, chegou ao pronto socorro trazido pelo SAMU com colar e prancha, com história de que o tanque de lavar roupas caiu sobre ele. Está com sinais vitais estáveis e foi feito a reposição volêmica inicial com ringer lactato. Apresenta escoriações em abdome superior e ao toque retal enfisema em parede posterior do reto. Não foram identificadas outras lesões associadas. Assinale a alternativa da lesão e da conduta que melhor se correlacionam com o caso.**

- (A) Lesão de cólon e deve ser feita laparotomia.
- (B) Lesão de estômago e deve ser feita laparoscopia.
- (C) Lesão de duodeno e deve ser feita laparotomia.
- (D) Lesão de baço e deve ser feita ultrassonografia.
- (E) Lesão de íleo e deve ser feita laparoscopia.

**QUESTÃO 50**

**Macon, dez anos de idade, vítima de acidente automobilístico foi submetido à laparotomia exploradora por trauma abdominal fechado com instabilidade hemodinâmica. Durante a cirurgia, foi suspeitado de lesão de cava retro-hepática e realizado de imediato isolamento vascular total do fígado. Assinale a alternativa correta.**

- (A) O clampeamento da aorta abdominal deve ser realizado antes do clampeamento dos vasos hepáticos.
- (B) O isolamento vascular total do fígado pode ser mantido por até 3 horas.
- (C) O shunt atriocava pode ser feito com introdução de catéter pela veia cava em substituição ao clampeamento da veia porta.
- (D) O shunt temporário tipo “rex shunt” pode ser feito como manobra auxiliar durante a cirurgia.
- (E) O shunt atriocava é menos efetivo do que o clampeamento dos vasos hepáticos.