

**Concurso Público**

REF. EDITAL Nº 2/2013

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ**Cargo****MÉDICO -
PNEUMOLOGIA****ATENÇÃO**

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



------(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

LÍNGUA PORTUGUESA

Pensando livremente sobre o livre arbítrio

Marcelo Gleiser

Todo mundo quer ser livre; ou, ao menos, ter alguma liberdade de escolha na vida. Não há dúvida de que todos temos nossos compromissos, nossos vínculos familiares, sociais e profissionais. Por outro lado, a maioria das pessoas imagina ter também a liberdade de escolher o que fazer, do mais simples ao mais complexo: tomo café com açúcar ou adoçante? Ponho dinheiro na poupança ou gasto tudo? Em quem vou votar na próxima eleição? Caso com a Maria ou não?

A questão do livre arbítrio, ligada na sua essência ao controle que temos sobre nossas vidas, é tradicionalmente debatida por filósofos e teólogos. Mas avanços nas neurociências estão mudando isso de forma radical, questionando a própria existência de nossa liberdade de escolha. Muitos neurocientistas consideram o livre arbítrio uma ilusão. Nos últimos anos, uma série de experimentos detectou algo surpreendente: nossos cérebros tomam decisões antes de termos consciência delas. Aparentemente, a atividade neuronal relacionada com alguma escolha (em geral, apertar um botão) ocorre antes de estarmos cientes dela. Em outras palavras, o cérebro escolhe antes de a mente se dar conta disso.

Se este for mesmo o caso, as escolhas que achamos fazer, expressões da nossa liberdade, são feitas inconscientemente, sem nosso controle explícito.

A situação é complicada por várias razões. Uma delas é que não existe uma definição universalmente aceita de livre arbítrio. Alguns filósofos definem livre arbítrio como sendo a habilidade de tomar decisões racionais na ausência de coerção. Outros consideram que o livre arbítrio não é exatamente livre, sendo condicionado por uma série de fatores, desde a genética do indivíduo até sua história pessoal, situação pessoal, afinidade política etc.

Existe uma óbvia barreira disciplinar, já que filósofos e neurocientistas tendem a pensar de forma bem diferente sobre a questão. O cerne do problema parece estar ligado com o que significa estar ciente ou ter consciência de um estado mental. Filósofos que criticam as conclusões que os neurocientistas estão tirando de seus resultados afirmam que a atividade neuronal medida por eletroencefalogramas, ressonância magnética funcional ou mesmo com o implante de eletrodos em neurônios não mede a complexidade do que é uma escolha, apenas o início do processo mental que leva a ela.

Por outro lado, é possível que algumas de nossas decisões sejam tomadas a um nível profundo de consciência que antecede o estado mental que associamos com estarmos cientes do que escolhemos. Por exemplo, se, num futuro distante, cientistas puderem mapear a atividade cerebral com tal precisão a ponto de prever o que uma pessoa decidirá antes de ela ter consciência da sua decisão, a questão do livre arbítrio terá que ser repensada pelos filósofos.

Mesmo assim, me parece que existem níveis diferentes de complexidade relacionados com decisões diferentes, e que, ao aumentar a complexidade da escolha, fica muito difícil atribuí-la a um processo totalmente inconsciente.

Casar com alguém, cometer um crime e escolher uma profissão são ponderações longas, que envolvem muitas escolhas parciais no caminho que requerem um diálogo com nós mesmos. Talvez a confusão sobre o livre arbítrio seja, no fundo, uma confusão sobre o que é a consciência humana.

<http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2014/01/1396284-pensando-livremente-sobre-o-livre-arbitrio.shtml>

QUESTÃO 01

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se afirma a seguir.

- (A) Em "...são ponderações longas...", funciona como predicativo.
- (B) Em "...tomo café com açúcar..." funciona como complemento nominal.
- (C) Em "Mesmo assim, me parece que existem...", pode ficar após o verbo.
- (D) Em "...imagina ter também a liberdade...", indica acréscimo.
- (E) Em "...são feitas inconscientemente, sem nosso controle...", expressa modo.

QUESTÃO 02

A palavra que NÃO está separada corretamente é

- (A) bar – rei – ra.
- (B) pes – so – as.
- (C) ci – en – tes.
- (D) ne – u – ro – nal.
- (E) fi – ló – so – fos.

QUESTÃO 03

Em "Muitos neurocientistas consideram o livre arbítrio uma ilusão.", a expressão destacada funciona como

- (A) complemento nominal.
- (B) predicativo do sujeito.
- (C) predicativo do objeto.
- (D) adjunto adnominal.
- (E) objeto indireto.

QUESTÃO 04

Apresenta a mesma regra de acentuação da palavra filósofos a expressão

- (A) alguém.
- (B) magnética.
- (C) decisões.
- (D) açúcar.
- (E) ilusão.

QUESTÃO 05

"Existe uma óbvia barreira disciplinar, já que filósofos e neurocientistas tendem a pensar de forma bem diferente sobre a questão."

A expressão destacada pode ser substituída, sem prejuízo sintático-semântico, por

- (A) apesar de.
- (B) como.
- (C) porquanto.
- (D) embora.
- (E) à medida que.

QUESTÃO 06

Em "...fica muito difícil atribuí-la..." o pronome destacado retoma

- (A) decisões diferentes.
- (B) ponderações longas.
- (C) níveis diferentes.
- (D) escolha.
- (E) confusão.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se afirma a seguir.

- (A) Em "...antes de a mente se dar conta disso.", funciona como adjunto adnominal.
- (B) Em "Alguns filósofos definem livre arbítrio...", é pronome indefinido.
- (C) Em "...ocorre antes de estarmos cientes dela.", expressa tempo.
- (D) Em "...definem livre arbítrio como sendo...", pode ser retirada a expressão sendo.
- (E) Em "...a questão do livre arbítrio terá que ser...", pode ser substituída por terá de.

QUESTÃO 08

Em "Se este for mesmo o caso...", a conjunção expressa

- (A) tempo.
- (B) consecução.
- (C) conclusão.
- (D) modo.
- (E) condição.

QUESTÃO 09

Assinale a alternativa cujo pronome NÃO foi classificado corretamente.

- (A) "...estão mudando isso de forma radical..." (demonstrativo)
- (B) "...estão tirando de seus resultados..." (possessivo)
- (C) "Se este for mesmo o caso..." (demonstrativo)
- (D) "...todos temos nostros compromissos..." (possessivo)
- (E) "...ocorre antes de estarmos cientes dela." (possessivo)

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se afirma a seguir.

- (A) Em "Em quem vou votar na próxima eleição?", funciona como objeto indireto.
- (B) Em "...ligada na sua essência ao controle..." funciona como objeto indireto.
- (C) Em "Mesmo assim, me parece que existem...", expressa contraste.
- (D) Em "Talvez a confusão sobre o livre arbítrio...", expressa dúvida.
- (E) Em "...estão mudando isso de forma radical...", expressa modo.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Observando o calendário de 2014, observamos que o feriado de 21 de abril (Tiradentes) cai em uma segunda-feira. Sendo assim, em que dia da semana cairá o dia 9 de abril deste mesmo ano?

- (A) Terça-feira.
- (B) Quarta-feira.
- (C) Quinta-feira.
- (D) Sábado.
- (E) Domingo.

QUESTÃO 12

Rafael recebeu um boleto para ser pago no próximo dia útil. Fazendo as contas, ele percebeu que possui apenas cinco oitavos de três sétimos do valor total do boleto, ou seja, ele possui apenas R\$ 75,00. Qual é o valor total do boleto que Rafael deverá pagar?

- (A) R\$ 280,00.
- (B) R\$ 250,00.
- (C) R\$ 200,00.
- (D) R\$ 180,00.
- (E) R\$ 150,00.

QUESTÃO 13

Um professor de matemática passou dois trabalhos diferentes para seus alunos. Os alunos deveriam optar por fazer um dos dois trabalhos, mas os alunos que quisessem poderiam fazer os dois por uma questão de curiosidade que ele corrigiria. Sabendo que todos os alunos entregaram pelo menos um dos trabalhos, e que 80% fez o trabalho 1, e 60% fez o trabalho 2, quantos alunos fizeram os dois trabalhos?

- (A) 10%.
- (B) 20%.
- (C) 30%.
- (D) 40%.
- (E) 50%.

QUESTÃO 14

Observe a sequência a seguir:

35; 42; 49; 56;...

Qual é o sétimo termo desta sequência?

- (A) 63.
- (B) 65.
- (C) 70.
- (D) 75.
- (E) 77.

QUESTÃO 15

Qual é a negação de "Todos os alunos gostam de matemática"?

- (A) Nenhum aluno gosta de matemática.
- (B) Existem alunos que gostam de matemática.
- (C) Existem alunos que não gostam de matemática.
- (D) Pelo menos um aluno gosta de matemática.
- (E) Apenas um aluno não gosta de matemática.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

QUESTÃO 16

Com relação à contratação de pessoal pela EBSEERH, assinale a alternativa correta.

- (A) Não há necessidade de realização de concurso público.
- (B) A EBSEERH somente fará contratação mediante concurso público.
- (C) A EBSEERH fica autorizada a contratar, para fins de sua implantação, mediante processo seletivo simplificado, pessoal técnico e administrativo por tempo determinado.
- (D) A EBSEERH fica autorizada a contratar, para fins de sua implantação, mediante processo seletivo simplificado, pessoal técnico e administrativo sem determinação de tempo.
- (E) A EBSEERH não poderá, em qualquer hipótese, contratar mediante processo seletivo simplificado.

QUESTÃO 17

A EBSEERH poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres. Para efeitos da Lei 12.550/2011, consideram-se instituições congêneres

- (A) as instituições públicas e privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.
- (B) as instituições públicas e privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito dos planos privados de assistência à saúde.
- (C) as instituições privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito dos planos privados de assistência à saúde.
- (D) as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.
- (E) as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito dos planos privados de assistência à saúde.

QUESTÃO 18

Assinale a alternativa INCORRETA. O Conselho Consultivo da EBSEERH tem as finalidades de

- (A) apoio ao Conselho de Administração.
- (B) apoio ao Conselho Fiscal.
- (C) apoio à Diretoria Executiva.
- (D) controle social.
- (E) consulta.

QUESTÃO 19

A EBSEERH é empresa pública unipessoal, vinculada ao

- (A) Ministério da Defesa.
- (B) Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
- (C) Ministério da Educação.

- (D) Ministério da Previdência Social.
- (E) Ministério da Saúde.

QUESTÃO 20

Assinale a alternativa INCORRETA. Compete ao Conselho de Administração

- (A) admitir, promover, punir, dispensar e praticar os demais atos compreendidos na administração de pessoal, de acordo com as normas e critérios previstos em lei e aprovados pela Diretoria, podendo delegar esta atribuição no todo ou em parte.
- (B) fixar as orientações gerais das atividades da EBSEERH.
- (C) aprovar o regimento interno da EBSEERH e suas alterações supervenientes, que deverá conter, dentre outros aspectos, a estrutura básica da empresa e os níveis de alçada decisória da Diretoria e do Presidente, para fins de aprovação de operações.
- (D) deliberar sobre alteração do capital e do estatuto social da EBSEERH.
- (E) autorizar a aquisição, alienação e a oneração de bens imóveis e valores mobiliários.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

Conforme a Resolução 453/2012, os Conselhos de Saúde são

- (A) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e privadas e na administração da saúde.
- (B) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde.
- (C) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde e da assistência social.
- (D) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde e da previdência social.
- (E) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e privadas e na administração da saúde e da assistência social.

QUESTÃO 22

De acordo com a Constituição Federal, constituem objetivos da seguridade social, EXCETO

- (A) universalidade da cobertura e do atendimento.
- (B) seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços.
- (C) equidade na forma de participação no custeio.
- (D) diferenciação dos benefícios e serviços em relação às populações urbanas e às populações rurais.
- (E) diversidade da base de financiamento.

QUESTÃO 23

De acordo com o Decreto 7.508/2011, os serviços de saúde específicos para o atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral, necessita de atendimento especial, denominam-se

- (A) Portas de Entrada.
- (B) Serviços Especiais de Acesso Primário.
- (C) Serviços Especiais de Acesso Aberto.
- (D) Atenção Primária.
- (E) Atenção Psicossocial.

QUESTÃO 24

Parte dos recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal. Conforme a Lei 8.142/1990, referidos recursos serão destinados

- (A) pelo menos setenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- (B) pelo menos cinquenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- (C) pelo menos sessenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- (D) pelo menos setenta por cento, aos Estados, afetando-se o restante aos Municípios.
- (E) pelo menos cinquenta por cento, aos Estados, afetando-se o restante aos Municípios.

QUESTÃO 25

De acordo com a Lei 8.080/1990, sobre a participação complementar, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada.
- (B) A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, as normas de direito público.
- (C) As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para participar do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (D) Os serviços contratados submeter-se-ão às normas técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato.
- (E) Os proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados deverão necessariamente exercer cargo de chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde (SUS).

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 26**

Sobre a tuberculose pulmonar, assinale a alternativa correta.

- (A) A tuberculose pulmonar primária acomete predominantemente adultos.
- (B) A mudança de coloração da urina para alaranjada ou avermelhada, durante o tratamento com esquema básico, requer suspensão imediata de todas as medicações em uso.
- (C) O tratamento atual para todos os casos novos de tuberculose é composto de 2 meses de rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol + 4 meses de rifampicina e isoniazida.
- (D) Em gestantes, está contraindicado o uso de rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etionamida.
- (E) O tabagismo não está associado a maior taxa de recidiva de tuberculose pulmonar.

QUESTÃO 27

Sobre micoses pulmonares, assinale a alternativa correta.

- (A) Itraconazol e sulfametoxazol+trimetoprim podem ser usados no tratamento da Paracoccidioidomicose.
- (B) A Paracoccidioidomicose predomina em mulheres, sendo a forma aguda a mais frequente.
- (C) O achado de Candida albicans em secreção traqueal é sempre considerado infecção e o tratamento deve ser realizado com itraconazol.
- (D) A criptococose pulmonar em pacientes com HIV/ SIDA deve ser tratada sempre com Anfotericina B.
- (E) O tratamento de aspergilose broncopulmonar alérgica deve ser feito sempre com itraconazol.

QUESTÃO 28

Sobre Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) assinale a alternativa correta.

- (A) A radiografia de tórax é sempre alterada em todos os estádios da doença.
- (B) É uma doença caracterizada pela obstrução reversível das vias aéreas e o principal tratamento farmacológico consiste no uso associado de broncodilatadores inalatórios de curta duração e corticosteroides.
- (C) Corticosteroides estão indicados em todos os estádios da doença.
- (D) A cessação do tabagismo é medida fundamental e deve sempre ser estimulada.
- (E) A espirometria indica DPOC grave, quando a relação VEF1/CVF for menor que 70% ou VEF1 menor que 60%.

QUESTÃO 29

Assinale a alternativa correta sobre Pneumonia Adquirida na Comunidade (PAC).

- (A) Tosse produtiva e febre são sintomas sempre presentes nos pacientes com PAC.
- (B) Antibióticos macrolídeos são medicamentos que não podem ser utilizados isoladamente no tratamento da

- PAC leve.
- (C) A vacina antipneumocócica polivalente R23 está indicada somente para adultos com fatores de risco e sua resposta imunológica ocorre uniformemente em todos os indivíduos vacinados.
 - (D) A confirmação da cura da PAC deve ser realizada pelo radiograma de tórax e hemograma.
 - (E) Preconiza-se o tratamento empírico baseado no conhecimento dos agentes mais prevalentes para PAC leve. A identificação do agente etiológico é possível em menos de 50% dos casos e por isso não deve ser realizada rotineiramente.

QUESTÃO 30

Assinale alternativa correta sobre derrames pleurais.

- (A) Todo derrame pleural deve ser tratado através de toracocentese ou drenagem pleural, independente de seu tamanho ou causa.
- (B) Derrame pleural recidivante secundário à neoplasia pulmonar, após realização de várias toracocenteses, deve ser tratado sempre através de pleurodese por cirurgia vídeoassistida.
- (C) Derrame pleural de pequeno volume, secundário a trauma torácico, sempre deve ser tratado com drenagem pleural em selo d'água.
- (D) A dosagem de Adenosina deaminase com valor de corte >40U/L deve incluir como diagnóstico diferencial tuberculose pleural, artrite reumatoide, empiema e linfomas.
- (E) Pneumonia, tuberculose e doenças do colágeno são causas frequentes de transudatos.

QUESTÃO 31

Sobre o tabagismo, assinale alternativa correta.

- (A) Vareneclina, bupropiona e nortriptilina são todos fármacos de primeira linha para cessação do tabagismo.
- (B) O aconselhamento breve a todo paciente tabagista, durante 3 a 10 minutos em qualquer atendimento não está recomendado por não aumentar a taxa de abandono.
- (C) São contraindicações ao uso de terapia de reposição de nicotina: gestação, infarto agudo do miocárdio há 2 semanas, arritmia, angina instável e acidente vascular encefálico.
- (D) A terapia combinada apresenta amplo aumento na taxa de cessação do tabagismo. A combinação mais usada é vareneclina com terapia de reposição de nicotina.
- (E) A nortriptilina representa a primeira escolha para fumantes com elevado grau de dependência na escala de Fagerstrom.

QUESTÃO 32

Assinale a alternativa correta sobre os tumores de mediastino.

- (A) O timoma é o tumor mais comum do mediastino posterior.
- (B) O linfoma mediastinal mais comum é o linfoma Hodgkin.

- (C) Os teratomas são frequentemente benignos e o tratamento é expectante.
- (D) O lipoma é o tumor mais frequente do mediastino anterior.
- (E) Os tumores neurogênicos são os mais frequentes do mediastino anterior.

QUESTÃO 33

Assinale alternativa correta sobre doenças supurativas.

- (A) O abscesso pulmonar deverá sempre ser tratado com antibioticoterapia e broncoscopia para aspiração de secreção.
- (B) O tratamento da fibrose cística inclui antibioticoterapia e suporte nutricional. Exercícios, agentes mucolíticos, broncodilatadores e antiinflamatórios não possuem benefício ao paciente.
- (C) A azitromicina pode ser usada de maneira prolongada no tratamento das bronquiectasias, mas sem redução na quantidade e gravidade das exacerbações.
- (D) O tratamento do abscesso pulmonar com antibioticoterapia deve ser prolongado e não inferior a 4 semanas, acompanhado de fisioterapia para drenagem das secreções. A broncoscopia não deve ser realizada rotineiramente em todos os pacientes para aspiração de secreção.
- (E) O abscesso pulmonar deve ser tratado sempre com quinolonas por via endovenosa.

QUESTÃO 34

Sobre Asma, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. Medicamentos beta-2 agonistas orais de longa duração, isoladamente, são fármacos de primeira escolha no tratamento ambulatorial da asma leve controlada.
- II. Na asma mediada por exercício, quando essa é a única manifestação da doença, podem ser usados para alívio dos sintomas fármacos beta-2 agonistas inalatórios de curta ou longa duração, antes ou logo após o exercício.
- III. O tabagismo não interfere no controle da asma.
- IV. Os antileucotrienos possuem excelente ação broncodilatadora.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 35

Sobre tromboembolismo pulmonar (TEP), analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. O tratamento para TEP agudo pode ser iniciado imediatamente com heparina quando a suspeita clínica é intermediária ou alta, antes da confirmação do diagnóstico.
- II. Pacientes com escore de Wells entre 2 e 6 apresentam baixa probabilidade clínica para TEP.
- III. A trombólise deve ser realizada em todos os pacientes hemodinamicamente instáveis.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas I, II e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) Apenas III.

QUESTÃO 36

Sobre hipertensão pulmonar (HP), assinale a alternativa correta.

- (A) O ecocardiograma é o exame definitivo no diagnóstico de hipertensão pulmonar.
- (B) O transplante pulmonar é indicado para tratamento de HP classe funcional II.
- (C) Doença pulmonar obstrutiva crônica e as doenças intersticiais pulmonares podem evoluir com HP e o tratamento deve ser feito de forma idêntica à hipertensão arterial pulmonar idiopática.
- (D) O cateterismo da artéria pulmonar é o método mais confiável e preciso no diagnóstico de hipertensão pulmonar.
- (E) É recomendada a utilização de sildenafila para todos os pacientes com HP.

QUESTÃO 37

Assinale a alternativa correta em relação às pneumopatias intersticiais difusas.

- (A) Pneumonia intersticial descamativa não está relacionada ao tabagismo e apresenta distribuição bronquiocêntrica.
- (B) Pneumonia intersticial não específica apresenta opacidades heterogêneas e tem prognóstico semelhante à fibrose pulmonar idiopática.
- (C) Bronquiolite respiratória é mais frequente em homens tabagistas e seu prognóstico é bom, geralmente regredindo após cessação do tabagismo. Pode eventualmente evoluir para fibrose pulmonar.
- (D) Pneumonia em organização criptogênica ou BOOP não apresenta boa resposta com uso de corticosteroides orais.
- (E) A fibrose pulmonar idiopática deve ser tratada com corticoide oral em altas doses.

QUESTÃO 38

Assinale a alternativa correta em relação à Síndrome de Apneia e Hipopneia do Sono (SAHOS).

- (A) A SAHOS é caracterizada por episódios recorrentes de obstrução parcial ou completa das vias respiratórias durante o sono.
- (B) O BIPAP é o melhor tratamento para apneia do sono.
- (C) A SAHOS não tem relação com obesidade.
- (D) Hipertensão arterial sistêmica não tem relação com aumento da probabilidade de ocorrência da SAHOS.
- (E) Rinite alérgica, tabagismo e uso de benzodiazepínicos não interferem com a SAHOS.

QUESTÃO 39

Sobre doenças ocupacionais, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. Trabalhador da indústria química com exposição a vapores têm risco de asma ocupacional.
- II. Silicose é uma doença ocupacional frequente entre trabalhadores expostos a jatos de areia.
- III. Bagaçose é uma doença ocupacional causada pela exposição a bagaço de cana mofado.
- IV. A silicose é a principal causa de óbitos por pneumoconioses no Brasil.

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas II e IV.
- (D) Apenas III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 40

Assinale a alternativa correta.

- (A) No paciente portador de DPOC em insuficiência respiratória, não está indicado o uso de ventilação não invasiva.
- (B) Em paciente portador de DPOC e diabetes melitus, não se deve usar corticoide oral ou parenteral nas exacerbações devido ao possível aumento da glicemia.
- (C) Em pacientes portadores de DPOC ou asma apresentando insuficiência respiratória, pode ser utilizada ventilação não invasiva em conjunto com medidas farmacológicas.
- (D) O uso de ventilação não invasiva está contraindicado em pacientes com edema agudo pulmonar.
- (E) Na crise asmática, deve-se usar primeiramente aminofilina por via endovenosa e, caso não haja melhora, iniciar fármacos beta-2 agonistas por via inalatória.

QUESTÃO 41

Assinale a alternativa correta.

- (A) Sempre deve ser realizada broncoscopia de urgência nos casos de hemoptise decorrente de bronquiectasia infectada.
- (B) Hemoptise maciça cursa com risco de morte e a broncoscopia é uma medida diagnóstica e terapêutica.
- (C) Doença do refluxo gastroesofágico não apresenta implicações no sistema respiratório.
- (D) No grande queimado não é necessário realizar broncoscopia para retirada de coágulos e avaliação das vias aéreas.
- (E) Arritmia cardíaca grave não é contraindicação de broncoscopia.

QUESTÃO 42

Sobre neoplasias de vias aéreas, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. **A ressecção cirúrgica é o tratamento de escolha nas neoplasias benignas de vias aéreas inferiores.**
- II. **O carcinoma epidermoide representa 95% das neoplasias malignas da laringe.**
- III. **Carcinoma verrucoso e condrossarcoma são tumores malignos raros da laringe.**
- IV. **Carcinoma bronquioloalveolar é o tipo histológico com maior rendimento diagnóstico na biópsia transbrônquica.**

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas II e IV.
- (D) Apenas III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 43

Sobre avaliação pré-operatória pulmonar e risco cirúrgico assinale a alternativa correta.

- (A) A reposição de nicotina pode ser utilizada no pós-operatório imediato em tabagistas que não conseguiram abandonar o hábito no período pré-operatório.
- (B) Pacientes obesos portadores de apneia e hipopneia do sono candidatos à cirurgia bariátrica devem realizar tratamento por pelo menos 8 meses antes do procedimento.
- (C) Paciente portador de asma controlada tem incidência de complicações pulmonares pós-operatórias inferiores ao paciente não pneumopata.
- (D) A DPOC não apresenta incidência elevada de complicações pós-operatórias pulmonares.
- (E) Nos portadores de doenças pulmonares fibrosantes, a utilização de anestesia geral e ventilação mecânica não aumentam o risco de exacerbação do processo inflamatório e desenvolvimento de lesão pulmonar aguda.

QUESTÃO 44

Sobre função pulmonar, assinale a alternativa correta.

- (A) Considera-se resposta significativa ao broncodilatador aumento de 5% no VEF1 em relação ao basal.
- (B) A capacidade pulmonar total (CPT) pode estar reduzida nas doenças intersticiais fibrosantes e nas doenças que reduzem a complacência da caixa torácica.
- (C) Considera-se resposta positiva no teste de broncoprovocação aumento de 20% no VEF1 em relação ao basal.
- (D) A espirometria permite a quantificação do volume residual e o cálculo da capacidade pulmonar total.
- (E) O VEF1 é considerado a variável primária para classificação de distúrbios ventilatórios restritivos.

QUESTÃO 45

Assinale alternativa correta sobre tosse.

- (A) Tosse crônica apresenta duração entre 2 e 4 semanas.
- (B) A tosse sempre deverá ser tratada com corticoide oral.
- (C) As causas mais comuns de tosse são síndrome da tosse de vias aéreas superiores ou gotejamento pós-nasal, doença do refluxo gastroesofágico e asma.
- (D) As causas mais comuns de tosse são infecciosas.
- (E) A tosse é rara em pacientes portadores de doenças intersticiais pulmonares.

QUESTÃO 46

Sobre asma, assinale a alternativa correta.

- (A) Formoterol ou salmeterol isoladamente são medicações de escolha no tratamento ambulatorial da asma moderada controlada.
- (B) Antileucotrieno deve sempre ser usado em todos os tipos de asma.
- (C) A associação de fármacos beta-2 agonistas inalatórios de longa duração e corticoides inalatórios é menos eficaz e tem mais efeitos colaterais do que a associação de corticoides inalatórios com metilxantinas na asma moderada.
- (D) Corticoide oral é a melhor opção no controle ambulatorial da asma leve.
- (E) Corticoides inalatórios são a primeira opção no tratamento ambulatorial da asma leve, pois diminuem a hiperresponsividade das vias aéreas, a mortalidade e a gravidade das exacerbações.

QUESTÃO 47

Assinale a alternativa correta sobre pneumonia adquirida na comunidade (PAC).

- (A) Sempre coletar lavado broncoalveolar dos pacientes internados com PAC para isolamento do agente etiológico.
- (B) Necessidade de ventilação mecânica e presença de choque séptico são critérios absolutos para tratamento em UTI da PAC grave.
- (C) A radiografia de tórax serve para avaliação de prognóstico e deve ser usada como padrão de cura.
- (D) O pneumococo nunca está relacionado com PAC grave.
- (E) A bactéria mais frequentemente isolada é o *Staphylococcus aureus* em todas as faixas etárias.

QUESTÃO 48

Assinale a alternativa correta sobre tuberculose (TB).

- (A) Em indivíduos HIV negativos a forma mais comum de TB extrapulmonar é o acometimento linfonodal, enquanto a TB pleural é mais comum em indivíduos HIV positivos.
- (B) Derrame pleural de etiologia tuberculosa é raro em adultos nos países com alta incidência da doença.
- (C) Na suspeita de TB pulmonar com baciloscopia negativa, não é recomendável realizar escarro induzido com solução salina hipertônica devido ao alto índice de broncoespasmo severo.
- (D) A baciloscopia de escarro é o método prioritário para diagnóstico e acompanhamento da TB pulmonar no Brasil.
- (E) Quimioprofilaxia em população indígena está indicada a todos que tiveram contato com paciente portador de TB e indivíduos com teste tuberculínico maior ou igual a 5 mm, independente do status vacinal.

QUESTÃO 49

Assinale a alternativa correta.

- (A) O pneumomediastino deve sempre ser tratado com drenagem mediastinal em selo d'água.
- (B) A tomografia computadorizada de tórax é exame obrigatório para o diagnóstico do pneumotórax.
- (C) A toracocentese no segundo ou terceiro espaços intercostais é suficiente para o tratamento definitivo do pneumotórax hipertensivo em pacientes sob ventilação mecânica.
- (D) O pneumotórax espontâneo nunca apresenta recidiva após tratamento do primeiro episódio com drenagem pleural.
- (E) Pneumotórax de grande volume é definido radiologicamente quando a distância entre parede torácica e pulmão for maior que 2 cm ou a distância interpleural apical for maior que 3 cm.

QUESTÃO 50

Paciente masculino, 30 anos, após viagem prolongada procura atendimento com dor torácica direita ventilatório-dependente, apresenta dor e empastamento de panturrilha direita; saturação de oxigênio: 97% em ar ambiente; eupneico e normotenso. Assinale alternativa correta sobre o caso.

- (A) Deverá ser realizada dosagem de D-dímero e, caso positivo, realizar também tomografia computadorizada de tórax contrastada com protocolo para tromboembolismo pulmonar.
- (B) Deverá ser realizada dosagem de D-dímero e, caso seja positivo, realizar tomografia computadorizada de tórax sem contraste.
- (C) O paciente deverá ser medicado com relaxante muscular e antiinflamatório, pois é somente dor de origem muscular.
- (D) Iniciar anticoagulação com warfarina, pois o quadro clínico nos permite concluir tratar-se de tromboembolismo pulmonar sem necessidade de

exames complementares.

- (E) Realizar teste de D-dímero e, caso seja positivo, liberar o paciente para repouso domiciliar.

