



## LÍNGUA PORTUGUESA


## TEXTO 01 (questão 01)

Disponível em: [www.facebook.com](http://www.facebook.com)

## 01. De acordo com o texto 01,

- A) na vida, os fatos acontecem em intervalos de tempo de longa duração.
- B) a vida humana é cercada de acontecimentos significativos.
- C) na efemeridade da vida, os cenários se multiplicam.
- D) virar páginas na vida é atitude de gente sábia.
- E) para muitos, a vida se torna monótona e insípida.

## TEXTO 02 (questão 02)

Disponível em: [www.facebook.com](http://www.facebook.com)

## 02. Analisando-se o texto 02, tem-se que

- A) para seguir a caminhada, é necessário se apassivar diante dos fatos.
- B) coragem é sentimento imprescindível para apaziguar situações constrangedoras.
- C) é preciso ter o coração esvaziado de entusiasmo para avançar.
- D) obstáculos nem sempre precisam ser vencidos.
- E) a vitória acontece quando o amor rege os sonhos.

## TEXTO 03 (questões 03 e 04)

*A objeção, o desvio, a desconfiança alegre, a vontade de troçar são sinais de saúde: tudo o que é absoluto pertence à patologia.* *(Friedrich Nietzsche)*

## 03. Em relação aos Sinais de Pontuação, assinale a alternativa CORRETA.

- A) A terceira vírgula poderia ser permutada pelo conectivo "e", e isso não caracterizaria desobediência às normas gramaticais vigentes.
- B) As três primeiras vírgulas separam termos explicativos.
- C) Os dois pontos poderiam ser permutados por reticências, e a frase se manteria gramaticalmente correta.
- D) A segunda vírgula poderia inexistir, e isso não seria considerado desobediência às normas vigentes de pontuação.
- E) Os dois pontos poderiam ser substituídos por uma exclamação, o que não se constituiria em erro gramatical.

## 04. Observe abaixo o fragmento de trecho:

*"tudo o que é absoluto pertence à patologia."*

## Nele, existe(m)

- A) três pronomes, sendo dois indefinidos e um relativo.
- B) um verbo cujo complemento não vem regido de preposição.
- C) um pronome demonstrativo.
- D) dois adjetivos de gêneros diferentes.
- E) um verbo de 1ª. conjugação.

**TEXTO 04 (questões 05 e 06)**

*Se alguém procura a saúde, pergunta-lhe primeiro se está disposto a evitar no futuro as causas da doença; em caso contrário, abstém-te de o ajudar. (Sócrates)*

**05. Em relação aos termos sublinhados, é CORRETO afirmar que**

- A) ambos são exemplos de próclise.  
 B) o primeiro é exemplo de próclise, ao passo que o segundo indica ênclise.  
 C) um deles poderia estar mesoclítico ao verbo.  
 D) ambos poderiam estar proclíticos ao verbo, sem caracterizar erro gramatical.  
 E) ambos são exemplos de ênclise.

**06. Extraíndo termos do texto 04, sobre ACENTUAÇÃO, assinale a alternativa que contém uma justificativa CORRETA.**

- A) Acentua-se o termo "alguém" por ser paroxítona terminada em EM.  
 B) O termo "saúde" é acentuado porque o "u" átono forma hiato com a vogal A.  
 C) Acentua-se o termo "contrário" por ser paroxítona terminada em hiato.  
 D) A tonicidade do termo "abstém" recai na última sílaba.  
 E) Os termos "saúde" e "contrário" obedecem à mesma regra de acentuação.

**TEXTO 05 (questão 07)**

*Os velhos invejam a saúde e o vigor dos moços; estes não invejam o juízo e a prudência dos velhos: uns conhecem o que perderam, os outros desconhecem o que lhes falta. (Marquês de Maricá)*

**07. Em relação à Classe de Palavras, analise os itens abaixo:**

- I. "estes não invejam o juízo e a prudência..." - o termo sublinhado se classifica como pronome indefinido e se refere a "moços".  
 II. "uns conhecem o que perderam..." - ambos os verbos existentes neste trecho estão conjugados em tempo presente.  
 III. "os outros desconhecem o que lhes falta." - o primeiro termo se classifica como artigo definido, e o segundo, pronome pessoal que se refere a "outros".  
 IV. "Os velhos invejam a saúde e o vigor dos moços..." - todos os termos sublinhados se classificam como substantivo.

**Está CORRETO apenas o que se afirma em**

- A) IV.                                      B) II.                                      C) II e IV.                                      D) I e III.                                      E) III.

**TEXTO 06 (questão 08)**

*A cólera prejudica o sossego da vida e a saúde do corpo, ofusca o julgamento e cega a razão. (Diderot)*

**08. Se o termo "cólera" fosse substituído por "maus pensamentos", preservando-se o tempo verbal do texto 06, estaria CORRETO o texto indicado na alternativa**

- A) Maus pensamentos prejudicariam o sossego da vida e a saúde do corpo, ofuscariam o julgamento e cegariam a razão.  
 B) Maus pensamentos prejudicavam o sossego da vida e a saúde do corpo, ofuscavam o julgamento e cegavam a razão.  
 C) Maus pensamentos prejudicam o sossego da vida e a saúde do corpo, ofuscam o julgamento e cegam a razão.  
 D) Maus pensamentos prejudicarão o sossego da vida e a saúde do corpo, ofuscarão o julgamento e cegarão a razão.  
 E) Maus pensamentos prejudicam o sossego da vida e a saúde do corpo, ofuscaram o julgamento e cegaram a razão.

**TEXTO 07 (questões 09 e 10)****AMOR É SÍNTESE**

Mário Quintana

*Por favor, não me analise  
 Não fique procurando cada ponto fraco meu.  
 Se ninguém resiste a uma análise profunda,  
 Quanto mais eu...  
 Ciumento, exigente, inseguro, carente  
 Todo cheio de marcas que a vida deixou  
 Vejo em cada grito de exigência  
 Um pedido de carência, um pedido de amor.*

*Amor é síntese  
 É uma integração de dados  
 Não há que tirar nem pôr  
 Não me corte em fatias  
 Ninguém consegue abraçar um pedaço  
 Me envolva todo em seus braços  
 E eu serei o perfeito amor.*

Disponível em: <http://muitaprosas.blogspot.com.br/2007/10/amor-sintese-mario-quintana.html>

**09. Observe os verbos dos itens abaixo:**

- I.** "Se ninguém resiste a uma análise profunda" - o verbo deste trecho exige complemento não regido de preposição.
- II.** "Vejo em cada grito de exigência  
Um pedido de carência, um pedido de amor." - o verbo deste trecho exige dois complementos: um regido de preposição e o outro não.
- III.** "Não me corte em fatias" - o verbo deste trecho exige dois complementos: um regido de preposição e o outro sem ser regido de preposição.
- IV.** "Ninguém consegue abraçar um pedaço"- o verbo sublinhado exige um complemento e este não vem regido de preposição.

**Está CORRETO o que se afirma apenas em**

- A) IV.                                      B) I e III.                                      C) II e IV.                                      D) III.                                      E) II, III e IV.

**10. Observe os fragmentos do texto 07, atentando para os termos sublinhados e as letras destacadas em maiúsculo.**

- I.** "Por favor, não me analiSe" - como o termo sublinhado, grafa-se "gaSe".
- II.** "Ciumento, exiGente, inseguro, carente" - o termo "anGina" escreve-se da mesma forma que o termo sublinhado.
- III.** "Todo CHeio de marcas que a vida deixou" - como o termo sublinhado, grafa-se "inCHaço".
- IV.** "É uma integraÇÃO de dados" - como o termo sublinhado, escreve-se "constipaÇÃO".

**Assinale a alternativa que contém apenas os itens CORRETOS.**

- A) I e II.                                      B) I e III.                                      C) II, III e IV.                                      D) II e III.                                      E) II e IV.

**CONHECIMENTOS GERAIS****Responda as questões de 11 a 13 de acordo com a legenda a seguir:**

- A) Apenas as afirmativas **a** e **c** estão corretas.
- B) Apenas as afirmativas **b** e **c** estão corretas.
- C) Apenas a afirmativa **b** está correta.
- D) Todas as afirmativas estão corretas.
- E) Todas as afirmativas estão incorretas.

**11. Em relação ao SUS, assinale a afirmativa CORRETA.**

- a) Região de saúde é o espaço geográfico contínuo, constituído por grupamentos de municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados.
- b) Universalização e Integralidade são princípios organizativos do SUS.
- c) O Conselho de Saúde é uma instância colegiada, deliberativa e permanente do Sistema Único de Saúde (SUS) em cada esfera de Governo, integrante da estrutura organizacional do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com composição, organização e tem suas competências fixadas na Lei Nº 8.142/90.

**12. Em relação à história da saúde pública no Brasil, assinale a afirmativa CORRETA.**

- a) O PSF foi lançado conjuntamente com o Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS em 1991.
- b) A reforma do setor de saúde brasileiro ocorreu de forma simultânea ao processo de democratização, tendo sido liderada por profissionais da saúde e pessoas de movimentos e organizações da sociedade civil.
- c) Na esfera das políticas de saúde, o referencial da medicina comunitária se materializava em programas de extensão da cobertura de ações básicas, direcionados à população excluída do sistema previdenciário.

**13. É(São) princípio(s) norteador(es) da bioética:**

- a) Justiça e beneficência.
- b) Não maleficência.
- c) Autonomia.

**14. Em relação aos determinantes sociais de saúde, coloque V nas afirmativas Verdadeiras e F nas Falsas.**

- ( ) O conceito estreito de determinantes sociais é puramente empírico e afasta a possibilidade de compreensão da saúde como um fenômeno social e humano.



- ( ) A formação dos trabalhadores de nível médio no âmbito do SUS não deve ser regida pelas diretrizes e orientações constantes da Portaria GM/MS nº 1.996, de 20 de agosto de 2007.
- ( ) A Lei 8.080/90 em seu Art 14 dispõe que Comissões Permanentes de Integração entre os serviços de saúde e as instituições de ensino profissional e superior seriam criadas a fim de propor prioridades, métodos e estratégias para a formação e educação continuada dos recursos humanos do SUS na esfera correspondente assim como em relação à pesquisa e à cooperação técnica entre essas instituições.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

- A) V-F-V                      B) F-V-V                      C) V-F-F                      D) F-F-F                      E) V-V-V

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**21. No procedimento cirúrgico do aparelho respiratório, fazem parte dos cuidados de enfermagem em Unidades de Terapia Intensiva:**

- I.** Manutenção do equilíbrio dos sistemas orgânicos, alívio da dor, prevenção de complicações.
- II.** Orientar o uso de respiração diafragmática, administração de anticoagulante preventivo; orientar a eliminação de secreção.
- III.** Avaliação dos controles gerais referentes aos antecedentes clínicos, fisiopatologia da doença, intercorrências intraoperatórias, elaboração do plano de cuidados.

Está CORRETO, apenas, o que se afirma em

- A) I e II.                      B) II e III.                      C) II.                      D) I.                      E) I e III.

**22. No atendimento às disfunções neurológicas, analise os itens abaixo:**

- I.** Avaliação do nível de consciência através da escala de coma de Glasgow.
- II.** Avaliação sistemática do tamanho e da resposta pupilar.
- III.** Monitorização dos gases arteriais e avaliação eletrocardiográfica.

Está CORRETO, apenas, o que se afirma em

- A) I e II.                      B) I.                      C) II.                      D) II e III.                      E) III.

**23. Sobre os cuidados Pós-Parada Cardiorrespiratória, assinale a alternativa CORRETA.**

- A) Administração de medicação, como adrenalina e amiodarona.
- B) Retorno de circulação espontânea.
- C) Monitoração e acompanhamento do paciente.
- D) Realização de intubação endotraqueal.
- E) Realização de 8 a 10 ventilações por minuto, com compressões torácicas contínuas.

**24. No que se refere aos diagnósticos de enfermagem no pós-operatório de cirurgia do aparelho respiratório, em Unidade de Terapia Intensiva, assinale a alternativa CORRETA.**

- A) Mobilidade física prejudicada do ombro e braço afetado, relacionada à ferida cirúrgica e à presença de drenos torácicos;
- B) Déficit de volume hídrico devido à perda de sangue excessiva durante a cirurgia.
- C) Troca gasosa prejudicada relacionada à utilização de aparelhos de ventilação mecânica.
- D) Padrão respiratório ineficaz devido ao uso de ventilação mecânica.
- E) Dor no local da cirurgia devido ao tempo cirúrgico.

**25. “Horta define o processo de enfermagem como a dinâmica das ações sistematizadas e inter-relacionadas, visando à assistência integral do ser humano”. Sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem, analise as afirmativas abaixo:**

- I.** A SAE envolve meios pelos quais é possível organizar o cuidado de enfermagem a partir de um fluxo contínuo.
- II.** A SAE é todo planejamento registrado dos cuidados de enfermagem desde a criação até a execução dos manuais de normas e rotinas padronizadas.
- III.** Apenas a documentação por si só representa a sistematização da assistência de enfermagem.

Está CORRETO o que se afirma, apenas, em

- A) I e III.                      B) I e II.                      C) II e III.                      D) II.                      E) III.

26. É fortemente recomendado realizar a vigilância de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde - IRAS com definições padronizadas em UTI. Essa ação pode tornar-se uma importante aliada na avaliação da qualidade da assistência. Em relação às técnicas de limpeza, desinfecção e esterilização de materiais e equipamentos utilizados em ventilação mecânica, analise as afirmativas e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- ( ) O processo de limpeza deve sempre preceder a desinfecção ou a esterilização dos produtos ou equipamentos de assistência ventilatória.
- ( ) Produtos ou equipamentos utilizados em procedimentos invasivos com penetração em pele e em mucosas adjacentes, incluindo todos os materiais que estejam diretamente conectados com essas regiões, devem, obrigatoriamente, ser esterilizados.
- ( ) Produtos ou equipamentos para a saúde que entram em contato com mucosas íntegras colonizadas exigem, no mínimo, uma desinfecção de alto nível. Os nebulizadores, os umidificadores, os inaladores e os circuitos respiratórios são exemplos desses tipos de produtos ou equipamentos.
- ( ) Cânulas de intubação e sonda de aspiração devem ser descartadas após o uso.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

- A) V-F-V-V                      B) F-V-V-F                      C) V-V-F-V                      D) V-V-V-V                      E) F-V-V-V

27 As infecções sanguíneas relacionadas aos cateteres venosos são causa de morbimortalidade nosocomiais, e quando estes são instalados em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, são responsáveis por infecções mais graves, cuja incidência é mais elevada devido ao maior tempo de permanência, maior colonização com a flora hospitalar e maior manipulação. Considerando que esses acessos vasculares são temporários ou provisórios e têm vida curta, qual das complicações abaixo é a mais frequente de ocorrer?

- A) Infecção no local da punção com manifestação sistêmica  
 B) Hematomas  
 C) Trombose  
 D) Estenose  
 E) Pneumotórax

28. Sobre os Resíduos dos Serviços de Saúde – RSS, de acordo com a nova Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS, Lei 12.305/2010, esses resíduos estão classificados em cinco grupos: A, B, C, D e E. O Grupo A se refere a

- A) resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente.  
 B) resíduos com a possível presença de agentes biológicos.  
 C) materiais resultantes de atividades humanas que contenham radionuclídeos e para os quais a reutilização é imprópria ou não prevista.  
 D) resíduos com características similares às dos resíduos domiciliares.  
 E) materiais perfuro-cortantes ou escarificantes: objetos e instrumentos contendo cantos, bordas, pontas ou protuberâncias rígidas e agudas, capazes de cortar ou perfurar.

29. Considerando os métodos e as técnicas de oxigenoterapia, sobre as formas de administração, analise as afirmativas abaixo:

- I. O Oxi-Hood ou capacete é utilizado para concentrar o oxigênio em um espaço menor, permitindo a manutenção adequada da fração de oxigênio do ar aspirado, podendo ser misturado com ar comprimido.
- II. O CPAP-Nasal produz pressão positiva contínua nas vias aéreas, com o objetivo de melhorar a expansão pulmonar e a perfusão sanguínea.
- III. Oxigênio sob máscara é oferecido, preferencialmente, em situação de urgência até conseguir outro equipamento.
- IV. Oxigênio sob cateter consiste em oferecer ao paciente maior oxigenação em concentração moderada através de um fluxômetro com umidificador.

Está CORRETO o que se afirma em

- A) IV, apenas.                      B) III e IV, apenas.                      C) I, II e IV, apenas.                      D) II e IV, apenas.                      E) I, II, III e IV.

30. Nas Unidades de Terapia Intensiva, a drenagem torácica é um procedimento bastante útil tanto para o diagnóstico como para o tratamento de diversas intercorrências pleurais, tais como: pneumotórax, hemotórax, derrame pleural e como drenagem profilática. Durante todo o período em que o paciente permanece com o dreno, são várias as atribuições da equipe de enfermagem. Sobre esses cuidados, analise as afirmativas abaixo:

- I. Antes e durante o procedimento, informar o paciente sobre o procedimento e indicar como ele pode ajudar.
- II. A posição do paciente para o procedimento deve ser sentado ou deitado sobre o seu lado não afetado, com decúbito elevado entre 30 a 45 graus.

- III.** Após a colocação do dreno, as intervenções de enfermagem são especialmente dirigidas à manutenção da permeabilidade e esterilidade do circuito.
- IV.** Incentivar o paciente a respirar superficialmente e evitar tossir, com a finalidade de elevar a pressão intrapleural.

Está **CORRETO** o que se afirma em

- A) IV, apenas.  
 B) I, II e III, apenas.  
 C) I, II e IV, apenas.  
 D) II e IV, apenas.  
 E) I, II, III e IV.

**31. A Unidade de Terapia Intensiva tem como função atender pacientes que necessitam de cuidados complexos e especializados. Um dos cuidados de rotina é o balanço hídrico das 24 horas. Considerando uma reposição de 1.500 ml de soro glicosado, 1.000 ml de soro fisiológico e 500 ml de sangue total e eliminação de 1.200 ml de diurese, 300 ml de débito hemático por dreno pleural, o balanço hídrico é de**

- A) - 900 ml                      B) + 900 ml                      C) - 1.500 ml                      D) + 1.500 ml                      E) + 1.200 ml.

**32. Um paciente adulto, sexo masculino, politraumatizado, internado na UTI apresenta desequilíbrio hidroeletrólítico. Sobre esse desequilíbrio, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.**

- I.** Para que ocorra o edema, deve haver uma quebra dos mecanismos que controlam a distribuição do volume de líquido no espaço intersticial. Quando essa desregulação é localizada, envolve apenas os fatores que influenciam o fluxo de fluido ao longo do leito capilar.
- II.** Na presença da hiponatremia (aproximadamente 20% dos casos graves admitidos em UTI), estão associados outros sintomas, como confusão mental, letargia, hipotermia, tremores, respiração Cheyne-Stokes, além de convulsões e vômitos.
- III.** Na hipocalcemia, em que a concentração de cálcio plasmático é menor que 8,5mg/dl, o paciente inicialmente apresenta manifestações clínicas neurológicas.
- IV.** As principais manifestações clínicas de hipermagnesemia são, principalmente, neurológicas e cardíacas, como perda de reflexos tendinosos profundos, paralisia respiratória, narcose e hipocalcemia.

Estão **CORRETAS** apenas

- A) I e III.                      B) II, III e IV.                      C) I, II e IV.                      D) III e IV.                      E) I, II e III.

**33. Sobre o Sistema Renal, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.**

- ( ) A Insuficiência Renal Aguda (IRA) que acomete pacientes internados em UTI tem mortalidade e prognóstico particular. As causas da ira Pré-renal ocorrem entre 2 a 4%, decorrentes da obstrução do sistema urinário desde os cálices até a bexiga.
- ( ) Os anti-inflamatórios não esteroides são causas importantes de IRA, especialmente em pacientes com comprometimento da função renal prévia, provocando lesão reversível da taxa de filtração glomerular.
- ( ) São critérios para indicação de tratamento dialítico no paciente com IRA na UTI: edema pulmonar, hiperpotassemia, acidose metabólica e encefalopatia urêmica.
- ( ) São cuidados de enfermagem prestados ao paciente submetido à hemodiálise: pesar o paciente pré e pós tratamento, avaliar turgor cutâneo e mucosa, realizar balanço hídrico e estar atento às dosagens e aos níveis séricos das drogas utilizadas e realizar controle da dor.

Assinale a alternativa que contém a sequência **CORRETA**.

- A) V-V-V-V                      B) F-F-V-F                      C) F-V-V-F                      D) V-V-F-F                      E) F-V-V-V

**34. Desde Florence Nigthingale, 1852, que se pratica o cuidado a paciente crítico. Para prestação desse cuidado, é necessário um ambiente especial, a UTI. Sobre a Unidade de Terapia Intensiva, analise as afirmativas abaixo:**

- I.** As UTIs devem atender a grupos específicos por faixa etária e especialidade. Todo hospital de nível terciário, com capacidade de 100 ou mais leitos, deve disponibilizar, no mínimo, 6% dos leitos para atendimento de tratamento intensivo.
- II.** Sendo a UTI uma área distinta do hospital, não há necessidade de leitos de isolamento nessa unidade, uma vez que a UTI já é uma área restrita e isolada.
- III.** O posto de Enfermagem deve ser centralizado, confortável, cujo tamanho deva ser suficiente para acomodar todas as funções da equipe de trabalho. É necessário, no mínimo, um posto de Enfermagem para cada 12 leitos.

Está **CORRETO**, apenas, o que se afirma em

- A) I.                      B) I e II.                      C) I e III.                      D) II e III.                      E) III.



**35. Sobre gerência e competência do Enfermeiro, analise as afirmativas abaixo:**

- I.** O gerenciamento realizado pelo enfermeiro é resultado da composição histórica da força de trabalho em enfermagem que sempre promoveu sua divisão técnica e social. A gerência configurada como instrumento do processo do cuidar pode ser entendida como um processo de trabalho.
- II.** A tomada de decisão é uma das responsabilidades do enfermeiro, objetivando o uso apropriado, a eficácia e o custo-efetividade, da força de trabalho, de medicamentos, de equipamentos, de procedimentos e práticas.
- III.** A liderança é uma das principais competências do enfermeiro, uma vez que, no trabalho em equipe multiprofissional, os profissionais de saúde deverão estar aptos a assumir posições de liderança, sempre tendo em vista o bem-estar da comunidade.
- IV.** Na gerência, a competência comunicacional é essencial, visto que para organizar é indispensável comunicar-se, a fim de estabelecer metas, canalizar energias e identificar e solucionar problemas.

Está **CORRETO** o que se afirma em

- A) I, II, III e IV.      B) II e III, apenas.      C) II e IV, apenas.      D) III e IV, apenas.      E) I, III e IV, apenas.

**36. Os cuidados para a transfusão sanguínea são bastante criteriosos desde o momento da triagem, da avaliação até a infusão. Sobre Transfusão Sanguínea, analise as afirmativas abaixo:**

- I.** Os critérios para administrar sangue total são restritos, e uma das indicações é a ex-sanguíneo transfusão.
- II.** Toda hemotransfusão deve ser feita com equipo específico, porém, na falta desse equipo, pode ser usado o equipo de microgotas.
- III.** A infusão de medicação pode ocorrer paralela à infusão na hemotransfusão, na mesma linha venosa.
- IV.** Sistematizar essa assistência em prescrição de enfermagem é primordial para a qualidade do cuidado.

Está **CORRETO** o que se afirma apenas em

- A) I e IV.      B) II e III.      C) II e IV.      D) III e IV.      E) I, II e III.

**37. A infecção do trato urinário (ITU) é um dos tipos de infecção hospitalar relacionada a procedimentos invasivos das mais comuns, podendo ser responsável por até 40% de todas as infecções nosocomiais. Em aproximadamente 6-7%, a instalação da sonda pode causar bacterímia transitória e ainda ser uma importante causa de infecção sanguínea hospitalar. Qual das medidas abaixo é recomendada para prevenção desse tipo de infecção?**

- A) Aderir à sondagem intermitente, utilizando um espaço de tempo de 2 horas entre a realização do procedimento.
- B) Utilizar sistema aberto ao meio ambiente e estéril para a realização do cateterismo urinário.
- C) Realizar a higienização das mãos imediatamente antes e após sondagem, ou manipulação de quaisquer componentes do cateter urinário.
- D) Trocar periodicamente, a cada três dias, o cateter vesical, utilizando técnica asséptica.
- E) Realizar manipulações diárias do cateter ou antisepsia do meato, com soluções antissépticas ou pomadas bactericidas.

**38. MJA, sexo feminino, 13 anos, deu entrada na UTI, em coma, hálito com odor cetônico, dispneia intensa. O resultado da glicemia e da gasometria arterial foi o seguinte:**

**Glicemia:** 400 mg/dl  
**Gasometria arterial:**  
 PH = 6,92  
 PCO<sub>2</sub> = 20 mmHg  
 HCO<sub>3</sub> = 16 mEq/L  
 PaO<sub>2</sub> = 50 mmHg

Quanto à análise da gasometria, é **CORRETO** afirmar que o paciente apresenta

- A) alcalose respiratória não compensada.
- B) acidose metabólica compensada pela alcalose respiratória.
- C) alcalose metabólica compensada por acidose respiratória.
- D) acidose respiratória não compensada.
- E) alcalose metabólica.

**39. AM, sexo masculino, 50 anos, admitida em uma unidade de terapia intensiva há 15 dias, com diagnóstico de acidente vascular encefálico. Ao realizar a avaliação desse paciente, a enfermeira diagnosticou uma úlcera de pressão (UP) em região sacrococcígea, com o seguinte aspecto: comprometimento da epiderme, derme e tecido subcutâneo; necrose nas bordas da lesão. Essa UP é classificada quanto ao grau de danos em**

- A) Estágio I – perda total de espessura da pele, envolvendo danos ou necrose do tecido subcutâneo que pode se estender em profundidade, mas não totalmente, na fáscia subjacente.
- B) Estágio II – perda parcial da espessura da pele, envolvendo a epiderme e ou derme. A úlcera é superficial e apresenta clinicamente uma abrasão ou bolha.

- C) Estágio IV – perda total da espessura da pele com destruição extensa, necrose tecidual ou danos aos músculos e ossos.  
 D) Estágio III - – perda total de espessura da pele, envolvendo danos ou necrose do tecido subcutâneo, que pode se estender em profundidade, mas não totalmente, na fáscia subjacente.  
 E) Estágio II – úlcera de pressão que apresenta alteração na pele intacta relacionada com a pressão, com região definida e vermelhidão.

**40. AJ, admitido na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), após cirurgia de grande porte, o que levou à realização de múltiplas condutas intervencionistas, apresentou perda súbita da função renal, caracterizando a Insuficiência Renal Aguda (IRA). Quanto a essa patologia, é CORRETO afirmar que**

- A) a IRA pré-renal ocorre devido à redução do fluxo plasmático renal e do ritmo da filtração glomerular.  
 B) a IRA renal intrínseca é caracterizada pela diminuição da diurese em que no balanço, observa-se menos de 0,5 ml/Kg/h em um período de 6 horas e, ainda, obstrução por coágulos.  
 C) a IRA pós-renal é secundária à obstrução extrarenal devido à redução do fluxo plasmático renal e do ritmo da filtração glomerular.  
 D) a IRA pré-renal é caracterizada pela presença de obstrução intra ou extra peritoneal secundária a cálculos, coágulos, traumas, tumores e fibrose.  
 E) a IRA isquêmica ou tóxica é caracterizada pela presença de glomerulopatias, associada à temperatura acima de 38°C, leucocitose e hemocultura positiva.

**41. I.A, 87 anos, admitida na clínica médica de uma unidade de saúde, e, após avaliação criteriosa, imediatamente transferida para UTI, por apresentar vômito com sangue, e hematócrito e hemoglobina com valores bem abaixo da normalidade. Quanto ao quadro apresentado pela paciente, é CORRETO afirmar que**

- A) a fisiopatologia da hemorragia digestiva alta está associada à perda do controle esfinteriano.  
 B) a terapêutica consiste primeiramente em realizar a estabilização hemodinâmica, realizada por medida de pressão arterial, frequência cardíaca, diurese horária, pressão venosa central e hematócrito seriado.  
 C) como medida de reanimação hemodinâmica, o enfermeiro deve instalar sonda nasogástrica, seguida de lavagem gástrica com 2 a 3 litros de solução fisiológica a 0,9% e mantendo-a fechada após a lavagem.  
 D) se o paciente tiver alteração do nível de consciência, deve-se aumentar a volêmia e evitar intubação orotraqueal, como medida profilática para infecção hospitalar.  
 E) a avaliação da perda sanguínea através dos sinais vitais não deve ser utilizada como um parâmetro seguro para a reposição da volemia.

**42. Administrar 500ml de Soro glicosado a 10%, porém no hospital somente temos na apresentação do soro glicosado a 5%. No posto de enfermagem, encontramos ampolas de glicose a 50% com apresentação de 20 ml. De quantos ml de glicose necessitamos para transformar o soro de 5% para 10%, como solicita a prescrição?**

- A) 100 ml de glicose      B) 75 ml de glicose      C) 50 ml de glicose      D) 75 ml de glicose      E) 25 ml de glicose

**43. Sobre administração por via parenteral, analise as afirmativas abaixo:**

- I.** Por via subcutânea, medicamento, como a heparina, sempre deve ser administrado num ângulo de 90°.  
**II.** Na administração de medicamentos irritantes, como a dextrana com ferro ou em idoso com massa muscular diminuída, o método de escolha para administração intramuscular é a técnica em Z.  
**III.** O local de escolha para a via intradérmica é a parte ventral do antebraço, por ser facilmente acessada e livre de pelos.

**Assinale a alternativa CORRETA.**

- A) I, II e III estão corretas.  
 B) Apenas I está incorreta.  
 C) Apenas I e II estão corretas.  
 D) Apenas III está incorreta.  
 E) I, II e III estão incorretas.

**44. Sobre a administração parenteral por via endovenosa, assinale a alternativa CORRETA.**

- A) O PICC é inserido em uma veia central e empurrado até que a extremidade do cateter se localize na veia cava superior.  
 B) Na administração por bomba de infusão, é utilizado pressão negativa, para impulsionar a medicação através do equipo de infusão.  
 C) O método de infusão contínua permite que um medicamento seja administrado durante um período curto de tempo; essa terapia pode exigir utilização de equipamentos especiais.  
 D) O cateter venoso central, por ser utilizado para fornecer líquidos e medicamentos pela veia cava superior, pode ser utilizado também para monitorar a pressão venosa central.  
 E) A injeção em bolus produz um nível de medicamento máximo quase imediato no sangue; a administração é realizada, especificamente, em acesso venoso primário periférico.

**45. Sobre a farmacodinâmica, analise as afirmativas abaixo:**

- I.** Trata-se do estudo das interações entre as substâncias e os tecidos vivos como base do tratamento medicamentoso.
- II.** O alimento pode retardar ou reduzir a absorção de um medicamento de uso oral, diminuindo, portanto, seus efeitos terapêuticos.
- III.** Alguns medicamentos endovenosos aderem aos recipientes plásticos, às seringas e ao equipo de administração; essa aderência pode diminuir a disponibilidade do medicamento ou provocar precipitação.

**Assinale a alternativa CORRETA.**

- A) I, II e III estão incorretas.
- B) I, II e III estão corretas.
- C) Apenas I e II estão corretas.
- D) Apenas I está incorreta.
- E) Apenas III está correta.

**46. Considerando a I Diretriz de Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) e Cuidados Cardiovasculares de Emergência da Sociedade Brasileira de Cardiologia (2013), sobre (suporte básico de vida) a RCP em crianças, é CORRETO afirmar que**

- A) o DAE (desfibrilador automático) deverá ser usado, se ela apresentar AESP (Atividade Elétrica Sem Pulso), porém executado por meio de 20 ciclos de compressões.
- B) a carga inicial deverá ser de 10 joules por cada quilo de peso que a criança apresente, com redução de 10% do total.
- C) se não for possível manter uma distância de 3cm de uma pá da outra, devido ao tamanho do tórax, deve-se colocar uma pá na frente do tórax e outra na região posterior.
- D) preferencialmente deve ser usado o DAE em lugar do desfibrilador manual que vem sendo contraindicado para aplicação em crianças de até 8 anos de idade.
- E) a atropina é amplamente recomendada em crianças até os 8 anos de idade, para reverter uma parada cardiorrespiratória súbita devido à AESP em criança submetida à cardiocirurgia.

**47. Em um impacto frontal, a velocidade do veículo é mantida no corpo dos ocupantes. Quando não estão contidos por cinto de segurança, os corpos dos passageiros podem ser arremessados para cima. Nesse caso, uma lesão possível e típica dessa cinemática é(são)**

- A) TRM ou LCT.
- B) Fratura de fêmur.
- C) Lesões de tendões do joelho.
- D) Fratura de úmero.
- E) Fratura de clavícula.

**48. O Escore de Trauma – Revised Trauma Score (TRS) determina a gravidade da vítima por meio de uma escala de valores, que varia de zero a 4. O valor total do RTS vai ser atribuído pela soma do valor da frequência respiratória (FR) com a PA sistólica (PAS) e a Escala de Coma de Glasgow (ECG). Considerando essas informações, qual o valor do RTS de uma vítima politraumatizada com FR= 9mpm, PAS= 60mmHg e ECG= 9?**

- A) 10
- B) 9
- C) 8
- D) 7
- E) 6

**49. A transferência do paciente em estado crítico representa um risco potencial de agravamento do quadro. Os riscos do transporte podem ser minimizados, se houver planejamento adequado, em que o enfermeiro deverá garantir que**

- A) a família seja orientada pelo serviço social a acompanhar o doente.
- B) o hospital de destino tenha condições de receber o doente em 24h.
- C) ocorra avaliação especializada no doente, utilizando métodos avançados.
- D) a monitorização dos sinais vitais do paciente crítico seja contínua.
- E) a transferência do paciente seja para uma unidade de maior complexidade.

**50. A Portaria Nº 2.648, de 07/11/2011 redefine as diretrizes para implantação do Componente Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) e do conjunto de serviços de urgência 24 horas da Rede de Atenção às Urgências. Entre as competências da UPA 24h na Rede de Atenção às Urgências, listadas no Art. 7º, tem-se:**

- A) funcionar de modo ininterrupto, nas 24 horas do dia e em todos os dias da semana e feriados.
- B) acolher os usuários e seus familiares, sempre que buscarem atendimento na UPA 24h.
- C) possuir equipe multiprofissional interdisciplinar compatível com seu porte e o atendimento realizado.
- D) deverá ser conforme o modelo de caracterização do Ministério da Saúde.
- E) deve obedecer às orientações técnicas do Ministério da Saúde acerca dos equipamentos mínimos.



## **ATENÇÃO**

- *Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova.*
- *Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 50 (cinquenta) questões objetivas do tipo múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 (dez) de Língua Portuguesa, 10 (dez) de Conhecimentos Gerais e 30 (trinta) de Conhecimentos Específicos do Cargo/Função de opção do candidato.*
- *Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe, imediatamente, ao Fiscal.*
- *Ao receber o Caderno de Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome completo, o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de Inscrição.*
- *Para registrar as alternativas escolhidas, você receberá um Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão coincide com o seu.*
- *As bolhas do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com caneta esferográfica azul ou preta.*
- *O tempo destinado à Prova está dosado, de modo a permitir fazê-la com tranquilidade.*
- *Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio.*

**BOA SORTE!**

