



UFPEL

NO CENTRO DE UMA OUTRA HISTÓRIA



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS - CPSI

Concurso Público (Aplicação: 21/06/2015)

Cargo: Auxiliar de Enfermagem/Classe C-101

LEIA ATENTAMENTE AS SEGUINTE INSTRUÇÕES:

- Verifique, nos espaços devidos do CARTÃO-RESPOSTA, se o número de controle é o mesmo que está ao lado do seu nome na folha de chamada. Caso o número de controle não corresponda ao que está nessa folha, comunique imediatamente ao fiscal de prova. Não se esqueça de assinar seu nome no primeiro retângulo.
- Marque as respostas das questões no CARTÃO-RASCUNHO, a fim de transcrevê-las com caneta esferográfica azul ou preta, de ponta grossa e corpo transparente, posteriormente, no CARTÃO-RESPOSTA.
- Ao transcrever suas respostas para o CARTÃO-RESPOSTA, preencha completamente o alvéolo, como indicado na figura, . Nunca assim , pois você corre o risco de ter sua questão anulada.
- Não pergunte nada ao fiscal, pois todas as instruções estão na prova. Lembre-se de que uma leitura competente é requisito essencial para a realização da prova.
- Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO-RESPOSTA, para que ele não seja rejeitado.

Leia o texto abaixo para responder as questões 1 e 2.



(tirasbeck.blogspot.com)

1

Da leitura do texto, infere-se que

- (a) toda opinião tem uma boa base, assim como as raízes das árvores e as fundações de uma casa.
- (b) apenas opiniões com boas bases são emitidas pelas pessoas.
- (c) nem toda opinião tem uma boa fundamentação, embora devesse tê-la.
- (d) devem seguir exemplos pessoais para se ter uma opinião bem fundamentada.
- (e) opiniões não dependem de uma boa fundamentação para serem emitidas.

2

Entre as frases de cada quadrinho estabelece-se uma relação de

- (a) adição.
- (b) oposição.
- (c) objetividade.
- (d) temporalidade.
- (e) finalidade.

Leia o fragmento de texto abaixo para responder as questões 03 a 08

Muita calma nessa hora

Há 47 anos não tenho uma opinião definitiva sobre o aborto. Acho que os dois lados têm suas razões. Não consigo resolver a questão no âmbito coletivo, como uma verdade ou lei que se aplique a todos. Só no individual. Cada um que decida.

5 Poderia aqui listar dezenas de temas sobre os quais não tenho opinião formada. Para aliviar a minha culpa, aderi a um novo movimento: opinião sem pressa.

Minha iniciativa é parente próxima do *slow jornalismo*, do *slow food*, do *slow living* e *slow parentig* – jornalismo sem pressa, comer devagar, viver devagar, dar tempo aos filhos para que sejam crianças. Admiro – e desconfio – as pessoas que formam opinião sobre tudo e qualquer assunto em meio segundo. Hoje é assim. Lê a primeira linha e dá um *like*. Apoiar qualquer causa que parece charmosa sem refletir meio segundo sobre ela.

10 Abomino esse fascismo bipolar. Ou você é uma coisa extrema, ou outra, ou então está no muro, é covarde.
[...]

(Tulio Milman. Zero Hora, 21/03/2015)

3

No título, o autor refere-se a uma hora que indica

- (a) o momento atual.
- (b) o momento de emitir opinião.
- (c) o momento em que se lê algo na internet.
- (d) o momento de votação da lei anti-aborto.
- (e) o momento político atual.

4

Nesse fragmento de texto, a ideia geral defendida pelo autor é que

- (a) o aborto é uma questão pessoal.
- (b) as pessoas não costumam ler uma notícia inteira.
- (c) dar um *like* (curtir algo) é algo corriqueiro.
- (d) é preciso pensar sobre um assunto antes de emitir opiniões.
- (e) não se podem dividir as pessoas em apenas dois lados.

5

Os usos dos dois pontos (linha 5) e dos travessões (linha 6 e linha 7) indicam, respectivamente,

- (a) citação; explicação; pausa.
- (b) esclarecimento; separação; evidência.
- (c) enumeração; síntese; explicação.
- (d) esclarecimento; explicação; destaque.
- (e) exemplificação; pausa; síntese.

6

O período “Admiro – e desconfio – as pessoas que formam opinião sobre tudo e sobre qualquer assunto em meio segundo” (linha 7 e linha 8) **deveria ser reescrito da seguinte forma, a fim de seguir a norma padrão da língua, mantendo a ideia desse fragmento do texto:**

- (a) Admiro e desconfio das pessoas que formam opinião sobre tudo e sobre qualquer assunto em meio segundo.
- (b) Desconfio e admiro as pessoas que formam opinião sobre tudo e sobre qualquer assunto em meio segundo.
- (c) Desconfio das pessoas, mas admiro aquelas que formam opinião sobre tudo e sobre qualquer assunto em meio segundo.
- (d) Admiro as pessoas que formam opinião sobre tudo e sobre qualquer assunto em meio segundo, mas desconfio delas.
- (e) Admiro as pessoas que formam opinião sobre tudo e sobre qualquer assunto em meio segundo, mas também desconfio delas.

7

No início do texto, o verbo “há” (linha 01) poderia ser substituído, com modificação na frase, por

- (a) faz.
- (b) fazem.
- (c) passou.
- (d) transcorreu.
- (e) fizeram.

8

A palavra “fascismo” (linha 10) está sendo usada, no texto, em sentido

- (a) real.
- (b) figurado.
- (c) histórico.
- (d) avaliativo.
- (e) coesivo.

9

O procedimento cirúrgico no qual uma abertura é criada na traqueia com a finalidade de permitir a passagem do ar é a:

- (a) traqueostomia.
- (b) ureterostomia.
- (c) gastrostomia.
- (d) colonostomia.
- (e) ileostomia.

10

O dispositivo que permite a mensuração da oxigenação do sangue é o:

- (a) esfigmomanômetro de pulso.
- (b) oxímetro de pulso.
- (c) catéter de porth a cath.
- (d) estetoscópio duplo.
- (e) catéter de hickman.

11

A melhor definição para um medicamento classificado como BRONCODILATADOR é o que promove

- (a) a inibição das secreções gastro, entero pulmonares, melhorando a oxigenação tecidual.
- (b) o controle e regulação da temperatura pulmonar, melhorando a oxigenação tecidual.
- (c) a dilatação dos brônquios, favorecendo a troca gasosa, melhorando a oxigenação tecidual.
- (d) o aumento da excreção de água e de eletrólitos pelos rins, melhorando a oxigenação tecidual.
- (e) o controle e alívio da diarreia, melhorando a motilidade intestinal e, conseqüentemente, a oxigenação tecidual.

12

O termo *sialorréia* está relacionado

- (a) à hiperemese.
- (b) ao aumento da salivação.
- (c) à diminuição da salivação.
- (d) à fome.
- (e) à dor abdominal.

13

Para administrar 5.000.000 UI (unidades internacionais) de penicilina cristalina, o auxiliar de enfermagem deverá aspirar de um frasco de 5.000.000 UI, que foi diluído em 8 ml de água destilada, o volume, em mililitros, de:

- (a) 25 ml.
- (b) 16 ml.
- (c) 08 ml.
- (d) 10 ml.
- (e) 05 ml.

14

Considerando os aspectos do Programa Nacional de Segurança do Paciente, considere as frases abaixo:

- I) É importante a identificação dos pacientes corretamente, como, por exemplo, o uso de pulseiras de identificação contendo nome, número de registro, código de barras, entre outros dados.
- II) Adoção de medidas para melhorar a atenção aos medicamentos potencialmente perigosos.
- III) A comunicação efetiva não está relacionada com os aspectos de segurança do paciente.
- IV) A realização do *check list* para a realização de cirurgia no paciente certo e no local correto.

Está(ão) correta(s):

- (a) as afirmativas II e IV, apenas.
- (b) a afirmativa I, apenas.
- (c) as afirmativas I, II, III e IV.
- (d) as afirmativas I, II e IV, apenas.
- (e) a afirmativa IV, apenas.

15

Considerando a Política Nacional de Humanização (PNH), considere as afirmativas a seguir:

- I) A implementação da PNH tem por objetivo reduzir as filas e o tempo de espera com ampliação do acesso e atendimento acolhedor e resolutivo baseados em critérios de risco.
- II) Entende-se por Humanização a valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de produção de saúde: usuários, trabalhadores e gestores.
- III) A PNH existe desde 2003 para efetivar os princípios do SUS no cotidiano das práticas de atenção e gestão.

Está(ão) correta(s)

- (a) as afirmativas I, II e III, apenas.
- (b) a afirmativa II, apenas.
- (c) a afirmativa III, apenas.
- (d) as afirmativas I e II, apenas.
- (e) a afirmativa I, apenas.

16

Em relação ao atendimento ao recém-nascido (RN) normal, na sala de parto, é correto afirmar que

- (a) para a desobstrução das vias aéreas superiores, o RN deve ser colocado com a cabeça em um nível superior ao corpo.
- (b) a posição da cabeça em um nível superior ao corpo impede que muco, líquidos, coágulos ou mecônio sejam aspirados para as vias respiratórias.
- (c) a desobstrução das vias aéreas só pode ser realizada por um dedo envolvido em uma gaze.
- (d) para a desobstrução das vias aéreas superiores, o RN deve ser colocado em posição de Trendelenburg e virado para o lado.
- (e) a aspiração deve ser realizada por sonda, com movimentos vigorosos.

17

A respeito da lei Lei Nº 7.498/86, que regulamenta o exercício profissional na enfermagem, é permitido ao auxiliar de enfermagem

- (a) realizar consulta de enfermagem.
- (b) prestar cuidados diretos a pacientes com risco de vida.
- (c) participar de projetos de construção e de reforma de unidades de internação.
- (d) executar ações de tratamento simples.
- (e) realizar auditoria de enfermagem.

18

O Sistema Único de Saúde, regulamentado pela Lei nº 8080/90, tem como princípios e diretrizes, EXCETO:

- (a) direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde, que deverá ser prestada exclusivamente pelo médico e pelo odontólogo.
- (b) universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
- (c) integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e de serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema.
- (d) igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie;
- (e) participação da comunidade.

19

A Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde, através do Programa de Aleitamento Materno, recomendam aleitamento materno exclusivo por

- (a) seis meses.
- (b) três meses.
- (c) um ano.
- (d) dois anos.
- (e) o tempo de que a criança necessitar.

20

Ao verificar os sinais vitais de A. L. C., paciente do sexo feminino com 38 anos de idade, bom estado geral e hipótese diagnóstica de infecção respiratória aguda, observou-se: Temperatura axilar=38°C; Pulso= 55 bpm; Respiração= 20 rpm. e Pressão Arterial=150x80mmHg. **Podemos afirmar que a paciente apresenta-se:**

- (a) afebril, taquicárdica, eupneica e normotensa.
- (b) normotérmica, taquicárdica, dispneica e hipertensa.
- (c) normotérmica, taquicárdica, hipopneica e normotensa.
- (d) febril, normocárdica, eupneica e hipotensa.
- (e) febril, bradicárdica, eupneica e hipertensa.

21

Configura-se como um sinal característico de diminuição da oxigenação periférica:

- (a) memoptise.
- (b) hematoma.
- (c) cianose.
- (d) purpúra.
- (e) hematêmese.

22

Ao atender um usuário que aguarda consulta médica em uma Unidade Básica de Saúde, o auxiliar de enfermagem posiciona-o sentado, com os braços estendidos entre as pernas, com a cabeça mais baixa em relação ao corpo. **Esse profissional tomou essa medida para evitar:**

- (a) hemotórax.
- (b) convulsão.
- (c) vômitos.
- (d) infarto.
- (e) desmaio.

23

Conforme o Calendário Básico de Imunizações, preconizado pelo Sistema Único de Saúde, são vacinas administradas à criança ao nascer:

- (a) BCG e Tríplice Viral.
- (b) BCG e Hepatite B.
- (c) Hepatite A e BCG.
- (d) Hepatite B e Penta.
- (e) Pentavalente e BCG.

24

A Hepatite A é uma doença infecciosa de etiologia viral que pode ser transmitida por meio de

- (a) transfusão sanguínea.
- (b) objetos contaminados com sangue e secreções do portador.
- (c) perdigotos e aerossóis.
- (d) objetos exclusivamente perfuro-cortantes contaminados.
- (e) água e alimentos contaminados.

25

Lesões provenientes de queimaduras e de úlceras podem permanecer abertas para cicatrizar espontaneamente. **Este tipo de cicatrização é chamada de:**

- (a) cicatrização por primeira intenção.
- (b) cicatrização disforme.
- (c) cicatrização por segunda intenção.
- (d) cicatrização por formação de fibrina.
- (e) cicatrização por intenção indeterminada.

Ao verificar os sinais vitais de uma gestante com IG=30 semanas, o auxiliar de enfermagem observa que ela apresenta aumento de peso significativo, edema de membros inferiores, cefaleia, distúrbios visuais e níveis elevados de pressão arterial, mesmo em repouso. **Em relação ao quadro de sinais e sintomas, pode tratar-se de:**

- (a) diabetes gravídica.
- (b) óbito fetal.
- (c) hemorragia da gestação.
- (d) eclâmpsia grave.
- (e) pré-eclâmpsia.

Considerando-se a seguinte prescrição médica "Administrar via intravenosa 1000ml de SG5% + 15 ml de NaCL20% +05 ml de Kcl10% em 12 horas", **a velocidade com que esse soro deverá ser infundido é**

- (a) 92,5mL/h.
- (b) 84mL/h.
- (c) 85mL/h.
- (d) 83,3mL/h.
- (e) 90mL/h.

Em relação à lavagem das mãos e ao uso de luvas é correto afirmar que:

- (a) as mãos só devem ser lavadas após contato com o paciente se o profissional não fez uso de luvas.
- (b) as mãos devem ser lavadas após a remoção das luvas e a cada cuidado prestado, devido à facilidade de contaminação durante essa remoção.
- (c) o uso de luvas estéreis dispensa o procedimento de lavagem das mãos antes e após o cuidado ao paciente.
- (d) a lavagem das luvas ainda calçadas é um procedimento seguro que possibilita a sua reutilização, desde que com o mesmo paciente.
- (e) a escolha do uso de luvas estéreis ou de procedimento depende do procedimento que será realizado e da possibilidade ou não de lavagem das mãos.

Em relação ao processo de esterilização de materiais com o uso de autoclave é correto afirmar que:

- (a) deve-se aproveitar apenas 80% do espaço útil do autoclave, pois o acúmulo de pacotes resulta em compressão de seus conteúdos e limita o acesso do calor seco.
- (b) o controle bacteriológico deve ser realizado mensalmente com *Bacillus stearothermophilus*.
- (c) alguns instrumentais cirúrgicos não podem ser esterilizados em autoclave, pois correm o risco de serem danificados.
- (d) deve-se aproveitar apenas 80% do espaço útil do autoclave, pois o acúmulo de pacotes resulta em compressão de seus conteúdos e limita o acesso do calor úmido.
- (e) a validade dos instrumentais que passaram pelo processo de esterilização é indeterminada, desde que se mantenha íntegro o seu invólucro.

Os cuidados com higiene e conforto dos pacientes internados são alvo da atuação do auxiliar de enfermagem. **Em relação aos cuidados com a higiene bucal é correto afirmar que:**

- (a) a higiene oral é dispensada quando o paciente estiver com o sensorio rebaixado.
- (b) bochechos diários com clorexidina a 0,12% ou outra solução precisa pelo médico ou dentista devem ser realizados independentemente das condições clínicas do doente.
- (c) mesmo acamado, o paciente deve ter seus dentes escovados e limpos por fio dental e, quando a escovação não for possível, deve-se proceder a higiene com gaze, água ou soluções prescritas pelo médico ou dentista.
- (d) a remoção de próteses é dispensável no procedimento de higiene oral, pois pode causar lesões na mucosa oral.
- (e) a solução de clorexidina a 0,12%, quando prescrita, só pode ser utilizada em pacientes que façam uso de próteses, pois ela pode alterar o esmalte dos dentes permanentes.

31

Ao utilizar álcool a 70% antes da realização de uma punção venosa, o auxiliar de enfermagem está realizando um processo de

- (a) limpeza.
- (b) assepsia.
- (c) desinfecção.
- (d) esterilização.
- (e) antissepsia.

32

Considera-se período neonatal até

- (a) 30 dias após o nascimento.
- (b) 60 dias após o nascimento.
- (c) 15 dias após o nascimento.
- (d) 28 dias após o nascimento.
- (e) 90 dias após o nascimento.

33

A administração de Vitamina K após o nascimento tem por objetivo prevenir

- (a) hemorragia Neonatal.
- (b) infecção Neonatal.
- (c) anemia Neonatal.
- (d) conjuntivite Neonatal.
- (e) icterícia Neonatal.

34

O procedimento inadequado, que deve ser evitado ao se administrar dieta enteral por sonda nasogástrica é o de

- (a) verificar a temperatura da dieta enteral.
- (b) deixar o paciente em posição confortável, baixando a cabeceira durante a infusão da dieta enteral pela sonda nasogástrica.
- (c) inspecionar o frasco da dieta enteral, quanto à presença de partículas e à separação de fases.
- (d) deixar o paciente confortável, mantendo-o sob observação quanto a sinais de intolerância, tais como vômitos, diarreia, náuseas ou distensão abdominal.
- (e) verificar se a sonda nasogástrica está pérvia.

35

Com relação à fisiologia, numere a coluna da direita de acordo com a sua correspondência na coluna da esquerda.

- | | | |
|---------------|-----|--|
| 1) Baço | () | Papel no controle da homeostase energética; |
| 2) Fígado | | produz grande número das proteínas plasmáticas. |
| 3) Rins | () | Controla, armazena e destrói as células sanguíneas. |
| 4) Hipotálamo | () | Produz hormônios que controlam em grande parte todo o sistema endócrino. |
| 5) Pâncreas | () | Função reguladora na manutenção do equilíbrio de fluidos e eletrólitos, eliminação de detritos metabólicos do organismo. |
| | () | Produz hormônios como insulina e glucagon e também tem função exócrina. |

A sequência correta é:

- (a) 3-1-5-4-2
- (b) 2-4-3-5-1
- (c) 5-4-3-1-2
- (d) 2-1-4-3-5
- (e) 4-2-5-1-3

36

Está prescrito a um paciente 90 gotas de determinado medicamento e, no momento do preparo, você dispõe apenas de uma seringa de 10ml. **Transforme gotas para mililitro e calcule quantos mililitros devem ser aspirados do frasco para que o paciente receba a dose prescrita.**

- (a) 3,8 ml.
- (b) 6,6 ml.
- (c) 9 ml.
- (d) 4,5 ml.
- (e) 7,5 ml.

37

A via correta da administração da vacina pentavalente é:

- (a) intramuscular.
- (b) subcutânea.
- (c) intradérmica.
- (d) via oral.
- (e) intratecal.

38

Considere um idoso com 80 anos, desnutrido e desidratado em pós-operatório tardio de osteossíntese do quadril, com déficit motor e acamado. Vários cuidados de enfermagem são importantes na recuperação desse doente, dentre eles a prevenção das úlceras de pressão. **Identifique a região mais suscetível ao aparecimento de úlcera de pressão em pacientes acamados:**

- (a) região sacrococcígea.
- (b) região lombar.
- (c) região cefálica.
- (d) região escapular.
- (e) região deltoide.

39

São sinais e sintomas relacionados ao climatério as alterações

- (a) ósseas e da glicemia de jejum.
- (b) psicológicas e anemia.
- (c) vasomotoras e psíquicas.
- (d) vasomotoras e renais.
- (e) ósseas e respiratórias.

40

A orientação mais importante no pós-parto imediato a ser recomendada a uma gestante portadora do vírus HIV em acompanhamento na Unidade Básica de Saúde, com vistas a evitar a transmissão vertical do vírus, é:

- (a) contraindicar o aleitamento materno, orientando quanto à utilização e à disponibilidade de fórmulas lácteas pelo Sistema Único de Saúde.
- (b) afastar o recém nascido da mãe, evitando assim o contato com o vírus transmissor da doença.
- (c) manter o recém nascido e a mãe na Unidade de Terapia Intensiva Obstétrica.
- (d) estimular o aleitamento materno como forma de elevar a imunidade.
- (e) Coletar exames anti-HIV, carga viral e reticulócitos no recém-nascido, monitorando a doença.