

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

A respeito do lítio, utilizado como tratamento de primeira escolha em pacientes com transtorno bipolar, julgue os itens a seguir.

- 51 Sintomas gastrointestinais, como náuseas, vômitos e diarreia, são manifestações comuns e precoces da intoxicação pelo lítio.
- 52 O uso crônico do lítio está associado ao desenvolvimento de diabetes *insipidus* nefrogênico.
- 53 Os efeitos decorrentes do uso do lítio incluem alterações do eletrocardiograma, como bradicardia, inversão ou achatamento da onda T e prolongamento do intervalo QT.
- 54 Em adultos jovens, a meia vida de eliminação do lítio é de dezoito a vinte e quatro horas.
- 55 A hiponatremia está associada à redução dos níveis séricos do lítio.

Com relação ao transtorno bipolar do humor, julgue os itens que se seguem.

- 56 A depressão bipolar se caracteriza por temperamento ciclotímico pré-mórbido, altas taxas de recorrências, inicia-se de forma rápida, em idade precoce, ou no pós-parto.
- 57 A duração dos episódios no transtorno bipolar geralmente permanece constante ao longo da trajetória da doença, e o intervalo livre entre episódios vai reduzindo após cada episódio sucessivo.
- 58 Ciclos rápidos de transtornos bipolares são mais comuns em homens e em indivíduos que nunca usaram antidepressivos.
- 59 Os tricíclicos são indicados para o tratamento da depressão bipolar devido ao menor risco da indução de episódios maníacos.
- 60 Episódios mistos, frequentemente associados ao aumento do risco de suicídio, são mais comuns em pacientes que fazem uso abusivo de substâncias psicoativas, como por exemplo o álcool, e que apresentam transtornos neurológicos.
- 61 Sintomas como insônia, redução do apetite e agitação psicomotora são comumente observados em pacientes com depressão bipolar.

Uma mulher de quarenta e sete anos de idade compareceu ao atendimento médico com queixas de dificuldades de concentração, sensação de fadiga e aumento do apetite. Relatou que os sintomas começaram com o falecimento da mãe, havia três meses. Descreveu sentimentos de tristeza, arrependimento e de culpa por não ter tido bom relacionamento com a mãe. Informou ainda que não fazia uso de medicamentos e que não tinha histórico de uso de álcool ou drogas. Ao exame físico, constatou-se boa condição médica geral.

Com relação a esse caso clínico, julgue os itens subsequentes.

- 62 Para o tratamento dessa paciente, como principal indicação terapêutica recomenda-se o uso de fluoxetina.
- 63 Nesse caso, o diagnóstico é de transtorno depressivo moderado.

Julgue os próximos itens, referentes a transtorno obsessivo compulsivo (TOC).

- 64 A exposição e a prevenção de resposta são as principais técnicas da psicoterapia cognitivo comportamental no tratamento do TOC.
- 65 No tratamento do TOC, os antidepressivos são eficazes se administrados em doses baixas.
- 66 No tratamento do TOC, drogas serotoninérgicas são mais eficazes que a maioria das drogas que afetam outros sistemas de neurotransmissores.

Uma mulher com vinte e seis anos de idade, foi ao consultório acompanhada do esposo, queixando-se de muita tristeza, anedonia, redução do apetite com emagrecimento, sono entrecortado e preocupação excessiva em relação ao seu primeiro filho de apenas três meses. Relatou que acordava várias vezes à noite para verificar se seu bebê estava respirando. Informou que sentia muita culpa por não ser boa mãe e apresentava, em alguns momentos, ideação suicida. Segundo o esposo, a paciente cuidava muito bem do filho, que era uma criança saudável. Os sintomas da paciente começaram logo após o nascimento do bebê, que se alimentava exclusivamente de leite materno. A paciente não apresentava histórico de patologias psiquiátricas no passado, e seus exames físicos e laboratoriais não mostraram alterações.

Em relação a esse caso clínico, julgue os itens seguintes.

- 67 A evolução do quadro da paciente do referido caso clínico é bastante favorável, com provável remissão completa dos sintomas em poucos meses, mesmo sem tratamento.
- 68 O diagnóstico mais provável para essa paciente é de depressão pós-parto.
- 69 No caso em tela, a sertralina é um dos antidepressivos mais indicados devido a sua menor secreção no leite materno.

A respeito do *delirium*, transtorno neurocognitivo comum que ocorre principalmente em idosos, julgue os itens a seguir.

- 70 Pacientes com demência têm risco menor de desenvolver um quadro de *delirium*.
- 71 A clorpromazina é o medicamento mais indicado para tratar a agitação psicomotora no quadro de *delirium* em idosos.
- 72 Em idosos, o uso de drogas anticolinérgicas, sedativo-hipnóticas, infecções ou estresse emocional pode precipitar um quadro de *delirium*.
- 73 O quadro clínico característico do *delirium* em idosos inclui desorientação no tempo e no espaço, alterações na capacidade de focar a atenção com níveis de consciência inalterados.
- 74 Em idosos, os sintomas do *delirium* costumam ter início rápido (horas ou dias) e durar dias ou semanas.

Com relação às interações medicamentosas, julgue os seguintes itens.

- 75 Fluvoxamina reduz os níveis plasmáticos do alprazolam.
- 76 O ácido valproico reduz os níveis séricos da lamotrigina.
- 77 A carbamazepina pode reduzir os níveis séricos dos anticoncepcionais orais.
- 78 O cigarro pode aumentar o metabolismo dos benzodiazepínicos.
- 79 A fluoxetina pode interagir com anticoagulantes (warfarina), aumentando o risco de sangramentos.

Uma mulher com trinta e dois anos de idade, após ser promovida no emprego, procurou atendimento psiquiátrico. Relatou que esteve muito relutante em assumir o novo cargo devido às dificuldades que esse cargo impõe aos ocupantes. Informou que sempre ficava muito ansiosa quando tinha de interagir com pessoas que não conhecia bem, e que isso aumentava sua frequência cardíaca e a sudorese, além de deixar a boca seca. A paciente informou que, em reuniões, apresentava um comportamento de medo por achar que iria falar alguma coisa irrelevante ou cometer alguma gafê. Sentia-se aterrorizada quando precisava falar em público. Disse que o quadro se agravou desde que assumiu o novo cargo, que exige maior interação com pessoas.

Com relação a esse caso clínico, julgue os itens que se seguem.

- 80 O medicamento mais indicado para o tratamento dessa paciente é a bupropiona.
- 81 O diagnóstico da paciente nesse caso clínico é de transtorno de ansiedade generalizada.

Com relação aos transtornos factícios e à simulação, julgue os itens a seguir.

- 82 A síndrome de Ganser — classificada como transtorno dissociativo — é caracterizada por respostas aproximadas do paciente quando lhe é perguntado algo, porém pode ser confundida com o transtorno factício ou a simulação.
- 83 Cerca de 20% dos pacientes admitidos em hospitais gerais apresentam sintomas factícios, sendo a maioria deles não diagnosticada.
- 84 A principal diferença entre o transtorno factício e a simulação é que no primeiro o paciente obrigatoriamente apresenta a motivação de assumir o papel de enfermo.

No que se refere à pedofilia, julgue o item que se segue.

- 85 O termo pedofilia, em psicopatologia, refere-se ao desejo sexual por crianças ou por púberes de ambos os sexos.

Muitas patologias psiquiátricas são identificáveis na infância e o tratamento precoce pode minimizar os danos causados por essas doenças. Acerca desse assunto, julgue os itens seguintes.

- 86 Segundo o DSM IV, para o diagnóstico de retardo mental profundo, o paciente deve apresentar pontuação abaixo de 15 no teste de QI.
- 87 Crianças com síndrome de Landau-Kleffner, perdem, após o surgimento da patologia, a habilidade de linguagem receptiva, no entanto, mantém a habilidade expressiva.
- 88 Ao prescrever os psicofármacos, o médico deve atentar-se para o fato de que crianças apresentam menor filtração glomerular se comparadas com a filtração glomerular em adultos.
- 89 Dislalia é definida por uma alteração na linguagem que resulta na deformação, substituição ou omissão de fonemas.
- 90 A síndrome de Prader-Willi é decorrente de uma alteração no cromossomo 15.
- 91 Ao comparar a prevalência entre o autismo e a esquizofrenia em crianças, observa-se maior prevalência de autismo em meninos e maior prevalência de esquizofrenia em meninas.

Em relação ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), julgue os itens subsequentes.

- 92 A dopamina e a serotonina são os principais neurotransmissores envolvidos na etiologia do TDAH.
- 93 O metilfenidato tem meia vida de uma a duas horas.
- 94 Em estudos com gêmeos diagnosticados com TDAH, observa-se um aumento da prevalência dessa patologia em gêmeos monozigóticos se comparados a gêmeos dizigóticos.
- 95 Em geral, os pacientes com TDAH apresentam hipertenacidade.

No que se refere a questões associadas à ética e à pesquisa em psiquiatria, julgue os próximos itens.

- 96 Projetos de pesquisa em genética humana, projetos que envolvam pacientes com deficiência mental permanente ou os que envolvam povos indígenas devem ser submetidos ao Conselho Nacional de Ética em Pesquisa.
- 97 Todo médico tem a obrigação ética de intervir e proteger o paciente de outro médico que apresente comprometimento ou deficiência que possa atrapalhar a consulta.
- 98 Em pesquisas com seres humanos, o princípio da proporcionalidade sugere que os ganhos devem superar os riscos.
- 99 No princípio da autonomia, reconhece-se o domínio do paciente sobre sua própria vida e em relação às escolhas que ele faz.

Para a avaliação da imputabilidade penal, o Código Penal brasileiro adota o critério biopsicológico. No que se refere à imputabilidade penal, julgue os itens a seguir.

- 100** A avaliação da imputabilidade é sempre retroativa.
- 101** Caso um indivíduo com esquizofrenia cometa um crime, pode-se concluir por meio do diagnóstico que ele não teve a capacidade plena de entender a ilicitude da ação praticada.
- 102** Como requisitos para a avaliação da imputabilidade, o critério biopsicológico exige o elemento biológico (doença mental), o elemento psicológico (cognitivo e volitivo) e o elemento cronológico.
- 103** De acordo com o Código Penal brasileiro, a paixão pode levar a uma privação de sentidos, o que resulta no abolimento da faculdade de apreciar a criminalidade do fato e de determinar-se de acordo com essa apreciação.

Com relação à avaliação do risco de periculosidade, julgue o item que se segue.

- 104** Gênero masculino, idade jovem, baixa condição socioeconômica e existência de transtorno mental são fatores associados ao comportamento violento.

Julgue os itens subsequentes relativos à simulação.

- 105** Na simulação, há uma produção intencional de sintomas por motivações inconscientes.
- 106** Ao suspeitar de simulação, o entrevistador deve fazer perguntas abertas e evitar a confrontação.
- 107** São indícios de simulação a confirmação indiscriminada de sintomas e um número elevado de sintomas raros.
- 108** Em psiquiatria forense, é maior a probabilidade de simulação de síndrome do pânico, de transtorno obsessivo compulsivo e de transtorno de personalidade.

Acerca da perícia em dependência química, julgue os itens subsecutivos.

- 109** Na perícia psiquiátrica de indivíduos com transtornos pelo uso de substâncias psicoativas, em regra a capacidade de entendimento em relação ao delito praticado está preservada, enquanto a capacidade de autodeterminação pode estar comprometida.
- 110** Para que haja o reconhecimento da inimputabilidade ou da semi-imputabilidade, é necessário que a condição de estar sob efeito de droga seja proveniente de caso fortuito ou força maior.

Com relação às disposições do Regimento Interno (RI) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), julgue os itens a seguir.

- 111** Se um servidor da justiça do Distrito Federal (DF) cometer infração disciplinar cuja penalidade, após processo disciplinar, seja a demissão, a autoridade responsável para aplicá-la será o corregedor da justiça.
- 112** Se um desembargador afastar-se de suas funções por um período de quarenta dias, o presidente do TJDFT designará um juiz de direito substituto de segundo grau para substituí-lo, o que vinculará esse juiz aos processos que lhe possam ser distribuídos durante o período da substituição.
- 113** O presidente e o vice-presidente do tribunal e o corregedor da justiça integram o Conselho Especial do TJDFT; os demais desembargadores integrantes desse conselho são eleitos pelo Tribunal Pleno.
- 114** Caso um advogado impetre pedido de *habeas corpus* no TJDFT em favor de um cliente seu e a referida medida for concedida, a decisão será cumprida, independentemente de acórdão.

Ainda com base no RI do TJDFT, julgue os itens que se seguem.

- 115** Se secretário de governo do DF cometer crime comum no período em que exerce a função, ele será processado e julgado originariamente pelo Tribunal Pleno do TJDFT.
- 116** O corregedor da justiça do TJDFT integra o Conselho da Magistratura, logo pode exercer, nesse conselho, as funções de relator e de revisor.

Acerca da organização judiciária do DF e dos territórios, julgue os itens a seguir.

- 117** Ação de indenização por acidente de trabalho ajuizada por servidor contra o DF deverá ser processada e julgada por uma das varas de fazenda pública.
- 118** O TJDFT tem competência originária para processar e julgar o governador e o vice-governador do DF em crimes comuns e de responsabilidade.
- 119** Um quinto dos cargos de desembargador devem ser preenchidos por membros do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e por advogados em efetivo exercício da profissão.
- 120** Cabe aos juízes de direito aplicar penalidades disciplinares a servidores que lhes sejam subordinados, desde que a pena não exceda a trinta dias de suspensão.