



TÉCNICO DE ENFERMAGEM - ECR

CÓDIGO: TEF17

CADERNO: 1

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

- 1 - A duração da prova é de 4 horas, já incluído o tempo de preenchimento do cartão de respostas.
- 2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a ela não retornar, será eliminado.
- 3 - Os três últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer na sala e somente poderão sair juntos do recinto, após aposição em ata de suas respectivas assinaturas.
- 4 - Você **NÃO** poderá levar o seu **caderno de questões (Provas) e nem copiar o gabarito**, pois a imagem do seu cartão de respostas será disponibilizado em <http://www.spdmpais.org.br> na data prevista no cronograma.

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

- 1- Confira atentamente se este caderno de questões (Provas), que contém **50 questões objetivas**, está completo.
- 2 - Cada questão da Prova Objetiva conterà **5 (cinco) opções** e somente uma correta.
- 3 - Confira **se seus dados pessoais**, o emprego escolhido, indicados no **cartão de respostas**, estão corretos. Se notar qualquer divergência, notifique imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local. Terminada a conferência, você deve assinar o **cartão de respostas** no espaço apropriado.
- 4 - Confira atentamente se o **emprego e o número do caderno** que consta neste caderno de questões (Prova) é o mesmo do que consta em seu **cartão de respostas**. Se notar qualquer divergência, notifique imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local.
- 5 - Cuide de seu **cartão de respostas**. Ele não pode ser rasurado, amassado, dobrado nem manchado.
- 6 - Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será considerada errada mesmo que uma das alternativas indicadas seja a correta.
- 7 - Os candidatos aos empregos de nível superior exceto os candidatos ao emprego de médico poderão entregar seus títulos ao final da prova objetiva no local indicado na escola onde está fazendo sua prova objetiva.

AGENDA

- **03/08/2014**, PROVAS OBJETIVAS/ RECEBIMENTO DE TÍTULOS.
- **04/08/2014**, Divulgação dos Gabaritos Preliminares e Disponibilização dos Exemplares das Provas Objetivas.
- **06/08/2014**, Disponibilização das Imagens dos Cartões de Respostas das Provas Objetivas.
- **07/08 e 08/08/2014**, Interposição de Recursos Administrativos quanto as questões das Provas Objetivas.
- **15/08/2014**, Divulgação dos Gabaritos Definitivos Oficiais, Resultado das Notas Preliminares das Provas Objetivas.
- **18/08/2014**, Divulgação do Resultado Final das Notas das Provas Objetivas.
- **19/08/2014**, Divulgação dos Candidatos de Empregos de Nível Superior que terão os títulos analisados.
- **19/08/2014**, Relação dos Candidatos Convocados para a etapa de Avaliação Psicológica.
- **23/08 e/ou 24/08/2014**, AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA.
- **25/08/2014**, Divulgação da Nota Preliminar da Avaliação de Títulos.
- **26/08 a 27/08/2014**, Interposição de Recursos contra o Resultado da Nota Preliminar da Avaliação de Títulos.
- **29/08/2014**, Resultado Final da Nota Final da Avaliação de Títulos.
- **28/08 a 29/08/2014**, Solicitação de VISTAS DOS TESTES e/ou ENTREVISTA DEVOLUTIVA.
- **26/08 a 27/08/2014**, Interposição de Recursos contra Avaliação de Psicológica.
- **08/09/2014**, Divulgação do Resultado Final.



INFORMAÇÕES:

- **Tel:** 21 3525-2480 das 9 às 18h
- **Internet:** www.spdmpais.org.br
- **E-mail:** spdm2014@biorio.org.br

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO

O DESASTRE DO BRASIL

Carlos Nejar, *O Globo*, 10/7/2014

Este desastre do futebol brasileiro diante da Alemanha, em goleada, começou bem antes da lesão propositada em Neymar, veio bem antes de quando Felipão mostrou-se desatualizado, soberbo, ditador; veio antes pela excessiva propaganda, cuidando dos mínimos gestos e movimentos de nossos jogadores, como se fossem deuses, novos e opulentos, com a supervalorização dos pés, como se pensassem ou criassem a ordem do universo. Não foi apenas a seleção alemã superior, houve negligência, pane, lapso dos atletas nacionais e como de início se viu um time de sopro curto. O preço foi muito caro.

QUESTÃO 1

Em relação à afirmação de que o desastre começou bem antes da lesão de Neymar, o texto:

- (A) não esclarece onde está o começo do desastre;
- (B) diz que o desastre começou com a desatualização do Felipão;
- (C) informa que o desastre teve início com a arrogância do treinador;
- (D) explica que o desastre é fruto do exagero de cuidado com os jogadores;
- (E) justifica que o desastre era inevitável em função da falta de inteligência.

QUESTÃO 2

“Este desastre do futebol brasileiro diante da Alemanha”; a expressão “diante da” pode ser substituída adequadamente por:

- (A) contra a;
- (B) para a;
- (C) frente à;
- (D) em relação à;
- (E) de encontro à.

QUESTÃO 3

A frase que não mostra um exemplo de grau superlativo é:

- (A) “Este desastre do futebol brasileiro diante da Alemanha, em goleada, começou bem antes da lesão propositada em Neymar...”;
- (B) “... veio bem antes de quando Felipão mostrou-se desatualizado, soberbo, ditador...”;
- (C) “... veio antes pela excessiva propaganda, cuidando dos mínimos gestos e movimentos de nossos jogadores...”;
- (D) “... como se fossem deuses, novos e opulentos, com a supervalorização dos pés, como se pensassem ou criassem a ordem do universo”;
- (E) “O preço foi muito caro”.

QUESTÃO 4

Ao dizer que a lesão em Neymar foi “propositada”, o autor do texto participa da opinião de que essa lesão foi:

- (A) intencionalmente praticada pelo adversário;
- (B) casualmente feita no calor do jogo;
- (C) prontamente punida pelo juiz da partida;
- (D) inevitavelmente ocorrida em atletas de ponta;
- (E) repetidamente praticada em jogos da Copa.

QUESTÃO 5

“veio antes pela excessiva propaganda, cuidando dos mínimos gestos e movimentos de nossos jogadores, como se fossem deuses, novos e opulentos, com a supervalorização dos pés, como se pensassem ou criassem a ordem do universo. Não foi apenas a seleção alemã superior, houve negligência, pane, lapso dos atletas nacionais e como de início se viu um time de sopro curto. O preço foi muito caro.”

Considerando as três ocorrências do vocábulo “como”, sublinhadas no texto, pode-se afirmar que:

- (A) apresentam valores semânticos diferentes;
- (B) só as duas primeiras ocorrências mostram o mesmo valor semântico;
- (C) a última ocorrência tem valor semântico de tempo;
- (D) as três ocorrências mostram valor de comparação;
- (E) só as duas últimas ocorrências mostram o mesmo valor semântico.

QUESTÃO 6

Ao dizer que “como de início se viu um time de sopro curto”, no termo sublinhado o autor empregou uma figura de linguagem denominada:

- (A) metonímia;
- (B) metáfora;
- (C) pleonasma;
- (D) eufemismo;
- (E) hipérbole.

QUESTÃO 7

A palavra “goleada” apresenta um sufixo (-ada), com valor de coletivo, como ocorre em:

- (A) jogada;
- (B) bananada;
- (C) laranjada;
- (D) trombada;
- (E) poeirada.

QUESTÃO 8

O par abaixo que é formado por classes de palavras diferentes das demais é:

- (A) futebol brasileiro;
- (B) excessiva propaganda;
- (C) mínimos gestos;
- (D) atletas nacionais;
- (E) muito caro.

QUESTÃO 9

O texto desta prova tem a finalidade de:

- (A) elogiar o futebol brasileiro;
- (B) lamentar a violência nos campos de futebol;
- (C) criticar alguns aspectos de nossa seleção;
- (D) apontar medidas que possam melhorar o nosso futebol;
- (E) mostrar a tristeza do povo brasileiro pela derrota.

QUESTÃO 10

“com a supervalorização dos pés, como se pensassem ou criassem a ordem do universo”; nessa frase do texto há uma relação de sentido implícita entre dois elementos, que só NÃO pode ser expressa por:

- (A) corpo e mente;
- (B) prática e teoria;
- (C) pés e cabeça;
- (D) trabalho e comodismo;
- (E) atividade e pensamento.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**QUESTÃO 11**

“Um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos” conceitua:

- (A) vigilância epidemiológica;
- (B) vigilância nutricional;
- (C) vigilância sanitária;
- (D) sistema de vigilância nutricional;
- (E) segurança alimentar e nutricional (SAN).

QUESTÃO 12

A Tuberculose é considerada um problema de saúde pública porque:

- (A) ainda é frequente no Brasil, e sua ocorrência está diretamente associada ao modo de viver e trabalhar do indivíduo;
- (B) apresenta distribuição uniforme pelo Brasil, acometendo, predominantemente, a raça negra;
- (C) tem alta incidência nas camadas mais pobres e no gênero feminino;
- (D) a transmissão é direta de pessoa a pessoa e vem apresentando diminuição da incidência;
- (E) apresenta declínio na taxa de prevalência, estando praticamente erradicada na região Sudeste.

QUESTÃO 13

Por universalização da saúde, expressão corrente no movimento sanitário início da chamada Nova República, entende-se a:

- (A) unificação das medidas preventivas e curativas;
- (B) abordagem compreensiva dos problemas de saúde;
- (C) aplicação das medicinas alternativas no atendimento médico;
- (D) extensão do direito à assistência médica gratuita para toda a população;
- (E) cobertura do atendimento exclusivamente aos grupos de riscos biológicos.

QUESTÃO 14

A atenção primária de saúde compõe-se de algumas atividades ou ações básicas de saúde, dentre as quais encontramos as seguintes, EXCETO:

- (A) educação para a saúde e sobre métodos de prevenção de doenças;
- (B) atendimento dos problemas de alimentação e abastecimento de água;
- (C) tratamento de doenças independente da complexidade;
- (D) imunização;
- (E) combate às enfermidades endêmicas locais.

QUESTÃO 15

Entre os indicadores de saúde, o mais conhecido e utilizado, e que está associado diretamente às condições econômicas, sociais e ambientais é:

- (A) a taxa de mortalidade proporcional por idade;
- (B) o coeficiente de mortalidade infantil;
- (C) a taxa de esperança de vida;
- (D) o coeficiente de morbidade;
- (E) a taxa de letalidade.

QUESTÃO 16

No início da década de 1990 ocorreu, no Rio de Janeiro, uma epidemia cuja principal causa de sua disseminação era a falta de saneamento básico. A epidemia retratada foi de:

- (A) meningite;
- (B) sarampo;
- (C) dengue;
- (D) tétano;
- (E) cólera.

QUESTÃO 17

O Sistema Único de Saúde - SUS possui, em cada esfera de governo, as seguintes instâncias colegiadas:

- (A) Fundo Nacional de Saúde e associação de moradores;
- (B) Programa de Saúde da Família e Comissão Intergestora Tripartite;
- (C) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde;
- (D) Comissão Intersectorial e Conselho Tutelar;
- (E) Ministério da Saúde e Distrito Federal.

QUESTÃO 18

Avalie se, de acordo com a Organização Mundial de Saúde – OMS, são fatores determinantes e condicionantes da saúde:

- I. Lazer e trabalho.
- II. Alimentação, saneamento básico, educação e acesso a serviços.
- III. Transporte, moradia, renda e meio ambiente.
- IV. Meio ambiente e moradia, exclusivamente.
- V. Renda, lazer e trabalho, exclusivamente.

É correto APENAS o que consta em:

- (A) IV e V;
- (B) II e V;
- (C) II;
- (D) III;
- (E) I, II e III.

QUESTÃO 19

A inalação da fumaça de derivados do tabaco por indivíduos não fumantes que convivem com fumantes em ambientes fechados é denominada:

- (A) tabagismo ativo;
- (B) antitabagismo;
- (C) fator de risco;
- (D) fator de proteção;
- (E) tabagismo passivo.

QUESTÃO 20

Em relação às doenças de notificação compulsória, pode-se afirmar que:

- (A) somente os casos suspeitos devem ser notificados;
- (B) apenas os casos confirmados devem ser notificados;
- (C) o caso suspeito não deve ser notificado antes da confirmação clínica;
- (D) a notificação de casos suspeitos é fundamental para o controle de determinadas doenças;
- (E) a notificação da doença deve ser feita após a confirmação laboratorial.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

Segundo o Código de Ética dos profissionais de enfermagem, ofender a integridade física, mental ou moral de qualquer pessoa, sem causar debilidade ou aquelas que venham a difamar organizações da categoria ou instituições se constitui em:

- (A) infração grave;
- (B) infração leve;
- (C) infração gravíssima;
- (D) infração média;
- (E) iatrogenia.

QUESTÃO 22

No que se refere à biossegurança, as medidas chamadas de “Precaução Padrão” devem ser seguidas para todos os pacientes, independente da suspeita ou não de infecções. São exemplos de medidas de “Precaução padrão”.

- (A) lavar as mãos com água e sabonete ou friccionar as mãos com álcool a 70% (se as mãos não estiverem visivelmente sujas) antes e após o contato com qualquer paciente; descartar, em recipientes apropriados, seringas e agulhas, sem reencapá-las;
- (B) friccionar as mãos com álcool a 70%; colocar avental imediatamente antes do contato com o paciente ou as superfícies e retirá-lo logo após o uso;
- (C) lavar as mãos com água e sabonete; manter termômetro para uso exclusivo do paciente quando estiver fazendo curva térmica;
- (D) lavar as mãos com água e sabonete; manter termômetro para uso exclusivo do paciente quando estiver fazendo curva térmica e colocar avental imediatamente antes do contato com o paciente ou as superfícies e retirá-los logo após o uso;
- (E) friccionar as mãos com álcool a 70%; descartar, em recipientes apropriados, seringas e agulhas, sem reencapá-las; manter termômetro para uso exclusivo do paciente, quando estiver fazendo curva térmica.

QUESTÃO 23

Para os pacientes com coqueluche, difteria, caxumba, influenza ou rubéola, é correto afirmar que:

- (A) o paciente deve ser internado em quarto privativo, mas se não houver esta disponibilidade, o paciente pode ser internado junto a outros pacientes com doenças infectocontagiosas;
- (B) Não há necessidade de que o estetoscópio seja de exclusivo deste paciente, desde que a cada uso este aparelho sofra desinfecção;
- (C) o uso de máscara, óculos e avental é obrigatório toda vez que o profissional realizar cuidados de enfermagem com estes pacientes;

- (D) o uso de quarto privativo, máscara cirúrgica e luvas de procedimento é obrigatório toda vez que o profissional realizar cuidados de enfermagem com estes pacientes;
- (E) o transporte do paciente deve ser evitado, mas, quando necessário, ele deverá usar máscara cirúrgica durante toda sua permanência fora do quarto.

QUESTÃO 24

A aplicação de bolsa de água morna é um cuidado de enfermagem eficaz para facilitar a circulação, diminuir a dor e edemas locais. Sobre este procedimento técnico, é correto afirmar que a bolsa deve estar limpa, seca e receber água morna até:

- (A) a metade de sua capacidade total.
- (B) estar com sua capacidade total preenchida.
- (C) um terço de sua capacidade total.
- (D) um quarto de sua capacidade total.
- (E) dois terços de sua capacidade total.

QUESTÃO 25

Administrar medicamentos é uma das atribuições do técnico de enfermagem. Para exercer este cuidado de forma segura, é preciso saber o volume adequado suportado por cada grupo muscular. Em uma administração no músculo deltóide, o volume máximo a ser administrado é de:

- (A) dois mililitros (2 ml)
- (B) três mililitros (3 ml)
- (C) cinco mililitros (5 ml)
- (D) quatro mililitros (4 ml)
- (E) dois mililitros e meio (2,5 ml)

QUESTÃO 26

Na coleta de urina para exames de cultura (urocultura), nos casos em que o paciente não tenha controle do ato miccional, o procedimento técnico correto a ser feito é:

- (A) realizar a higiene íntima do paciente com gaze estéril, fixar o saco coletor à região genital, aguardar no máximo 15 minutos e, caso não haja micção, repetir o processo;
- (B) realizar a higiene íntima do paciente com gaze estéril, fixar o saco coletor à região genital, aguardar no máximo 30 minutos e, caso não haja micção, repetir o processo;
- (C) realizar a higiene íntima do paciente com gaze estéril, fixar o saco coletor à região genital, aguardar no máximo 60 minutos e, caso não haja micção, repetir o processo;
- (D) realizar a higiene íntima do paciente com gaze estéril, fixar o saco coletor à região genital, aguardar no máximo 90 minutos e, caso não haja micção, repetir o processo;
- (E) realizar a higiene íntima do paciente com gaze estéril, fixar o saco coletor à região genital, aguardar até que o paciente urine.

QUESTÃO 27

A aplicação de insulina deve seguir rigorosa padronização, para se evitar erros que possam prejudicar o tratamento do paciente. Analise as afirmativas a seguir:

- I – Considera-se adequada a reutilização do conjunto seringa/agulha por até 08 aplicações, sempre pela mesma pessoa, desde que seja feita correta higiene das mãos e dos locais de aplicação.
- II – Para misturar a insulina dentro do frasco (homogeneizá-la), pode-se rolar o frasco entre as mãos ou agitar o frasco na vertical.
- III – Ao iniciar a aplicação da insulina, se for encontrada a presença de sangue na seringa, em pequena quantidade, pode-se continuar com a aplicação.

Assinale a alternativa correta:

- (A) apenas a afirmativa I está correta;
- (B) apenas a afirmativa II está correta;
- (C) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
- (D) apenas as afirmativas I e III estão corretas;
- (E) apenas as afirmativas II e III estão corretas.

QUESTÃO 28

Analise as afirmativas a seguir, em relação à contenção do paciente:

- I - Nas situações de urgência e emergência, os profissionais da equipe de enfermagem podem empregar a contenção mecânica do paciente.
- II - Salvo as situações de urgência e emergência, a contenção mecânica somente poderá ser empregada pelos profissionais de enfermagem sob supervisão direta de um enfermeiro.
- III - A contenção mecânica do paciente é empregada quando for o único meio disponível para prevenir dano imediato ou iminente ao paciente ou aos demais.

Assinale a alternativa correta:

- (A) apenas a afirmativa I está correta;
- (B) apenas a afirmativa III está correta;
- (C) apenas as afirmativas I e III estão corretas;
- (D) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
- (E) todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 29

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a frequência respiratória normal de uma criança de 12 meses a 5 anos é de até:

- (A) 60mrn (movimentos respiratórios por minuto)
- (B) 50mrn

- (C) 40mrn
- (D) 30mrn
- (E) 20mrn

QUESTÃO 30

Considera-se situação de risco e vulnerabilidade à saúde do recém-nascido quando:

- (A) a mãe do bebê reside com a família sem a presença do pai da criança;
- (B) a mãe do bebê tem baixa escolaridade (menos de oito anos de estudo);
- (C) o peso do bebê ao nascer é igual ou abaixo de 2.800g;
- (D) o bebê nasceu por meio de parto cirúrgico (cesariana);
- (E) a mãe do bebê tem história de doenças respiratórias.

QUESTÃO 31

Em relação à verificação de pressão arterial em crianças, as seguintes afirmativas estão corretas, EXCETO:

- (A) a largura da bolsa de borracha do manguito deve corresponder a 40% da circunferência do braço;
- (B) o comprimento da bolsa de borracha do manguito deve envolver 80% a 100% da circunferência do braço;
- (C) recomenda-se que a medida da pressão arterial em crianças seja feita preferencialmente na posição sentada;
- (D) a pressão diastólica deve ser determinada na fase V de Korotkoff;
- (E) explicar para a criança e para seu responsável o procedimento que será executado.

QUESTÃO 32

Como medida de prevenção de infecção viral respiratória, em todas as visitas de puericultura, os pais do bebê devem ser orientados para:

- (A) lavagem das mãos por todas as pessoas que têm contato com o bebê com o objetivo de evitar a propagação de vírus causadores de doenças respiratórias;
- (B) o uso de máscaras pelas pessoas que lidam com o bebê em casa, com o objetivo de evitar a propagação de vírus causadores de doenças respiratórias;
- (C) a lavagem diária de todas as roupas do bebê com água morna e sabão neutro e secagem ao sol, com o objetivo de evitar a propagação de vírus causadores de doenças respiratórias;
- (D) o uso de máscaras somente por pessoas que levam o bebê ao colo, com o objetivo de evitar a propagação de vírus causadores de doenças respiratórias;
- (E) restrição de entrada de ar por meio de janelas ou outras aberturas da casa, com o objetivo de evitar a propagação de vírus causadores de doenças respiratórias.

QUESTÃO 33

Contribui para o maior risco de morte súbita em bebês:

- (A) colocar o bebê para dormir na posição supina (de “barriga para cima”);
- (B) a prática do coleito quando os pais estão muito cansados;
- (C) dormir no colo;
- (D) choro noturno;
- (E) uso de chupetas.

QUESTÃO 34

De acordo com o esquema de vacinação do Programa Nacional de Imunização, a Tetravalente (DTP+Hib) protege a criança das seguintes doenças:

- (A) difteria, tétano, coqueluche, pneumonia e outras infecções por *Haemophilus influenzae* tipo b;
- (B) difteria, tétano, coqueluche, *Neisseria meningitidis* do sorogrupo C e outras infecções por *Haemophilus influenzae* tipo b;
- (C) difteria, tétano, coqueluche, parotidite e outras infecções por *Haemophilus influenzae* tipo b;
- (D) difteria, tétano, coqueluche e infecções por *Haemophilus influenzae* tipo b;
- (E) difteria, tétano, coqueluche, meningite e outras infecções por *Haemophilus influenzae* tipo b.

QUESTÃO 35

Na atenção integral à saúde da mulher, as orientações de enfermagem para a detecção precoce do câncer de mama são de muita importância nas unidades de atenção básica. Para tanto, o técnico de enfermagem deve conhecer as alterações da mama conhecidas como sinais de alerta. Avalie se esses sinais incluem:

- I - Nódulo ou espessamento que pareçam diferentes do tecido das mamas.
- II - Abaulamento no contorno das mamas.
- III - Retração no contorno das mamas.
- IV - Sensação de mamas cheias, acompanhada de desconforto.
- V - Secreção espontânea pelo mamilo, principalmente se for unilateral.

Assinale a alternativa correta:

- (A) apenas as afirmativas I, II e V estão corretas;
- (B) apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas;
- (C) apenas as afirmativas I, II, IV e V estão corretas;
- (D) apenas as afirmativas I, II, III e V estão corretas;
- (E) todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 36

A organização da linha de cuidado nos cânceres do colo do útero e da mama envolve intervenções nas seguintes situações:

- (A) promoção da saúde, na prevenção, no tratamento, na internação e na reabilitação;
- (B) promoção da saúde, na prevenção, no tratamento, na reabilitação e nos cuidados paliativos;
- (C) promoção da saúde, na prevenção, no tratamento, nos cuidados domiciliares e nos cuidados paliativos;
- (D) promoção da saúde, na prevenção, no tratamento, na internação e nos cuidados domiciliares;
- (E) promoção da saúde, na prevenção, no tratamento, na atenção básica e na internação.

QUESTÃO 37

Como membro da equipe de saúde da atenção básica, avalie se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas a seguir sobre as atribuições do técnico de enfermagem no controle dos cânceres do colo do útero e da mama:

- I - Prestar atenção integral e contínua às necessidades de saúde da mulher, articulada com os demais níveis de atenção, com vistas ao cuidado longitudinal.
- II - Examinar e avaliar pacientes com sinais e sintomas relacionados aos cânceres do colo do útero e da mama.
- III - Participar do gerenciamento dos insumos necessários para a adequada realização do exame citopatológico.
- IV - Identificar parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar ações intersetoriais da equipe.
- V - Avaliar periodicamente, e sempre que ocorrer alguma intercorrência, as pacientes acompanhadas em AD1 (Atenção Domiciliar 1) e, se necessário, realizar o encaminhamento para unidades de internação ou Emad (Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar).

As afirmativas I, II, III e IV são respectivamente:

- (A) V, F, F, V, F
- (B) V, F, V, F, F
- (C) V, F, V, V, F
- (D) F, F, V, V, F
- (E) V, V, V, V, F

QUESTÃO 38

Avalie se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas a seguir sobre as orientações educativas básicas para cuidados dos pés das pessoas diabéticas.

- I - Vestir sempre meias limpas, preferencialmente de lã ou algodão, sem elástico.
- II - Após lavar os pés, usar creme hidratante em todo o dorso, planta e entre os arcos.
- III - Cortar as unhas de forma reta, horizontalmente.

As afirmativas I, II e III são respectivamente:

- (A) V, V, V
- (B) V, F, F
- (C) F, F, V
- (D) F, V, V
- (E) V, F, V

QUESTÃO 39

Avalie se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas a seguir sobre a atenção integral no uso abusivo de álcool e de outras drogas em pessoas jovens.

- I - o uso de álcool é um dos maiores fatores de adoecimento, contribuindo para situações de risco da população jovem.
- II - deve-se capacitar adolescentes e jovens para atuarem como promotores de saúde junto aos seus pares, favorecendo novas estratégias de abordagem, comunicação e linguagem.
- III - recomenda-se que haja ampliação da rede de CAPS-ad para álcool e outras drogas; de CAPSi, infanto-juvenil, ambulatoriais e CAPS-III, de 24 horas.

As afirmativas I, II e III são respectivamente:

- (A) F, V, V
- (B) V, F, V
- (C) V, V, V
- (D) F, V, F
- (E) V, V, F

QUESTÃO 40

Uma das funções do técnico de enfermagem no controle da tuberculose na Atenção Básica é identificar pessoas classificadas como "sintomáticos respiratórios". Tais sintomas são:

- (A) tosse com expectoração há pelo menos três semanas ou que apresentem, além da tosse, febre vespertina, suores noturnos, perda de peso, escarro sanguíneo e/ou dor torácica;
- (B) tosse seca, febre alta pela manhã e escarro sanguíneo;

- (C) tosse com expectoração clara, que se acentua à noite e perda de apetite;
- (D) tosse discreta com constipação nasal, escarro sanguíneo, febre alta e dor torácica;
- (E) tosse com expectoração há pelo menos três semanas ou que apresentem, além da tosse, febre vespertina, perda de peso, escarro sanguíneo e/ou dor torácica e manchas avermelhadas pelo corpo.

QUESTÃO 41

Sobre a coleta do escarro para exame bacteriológico para detecção da tuberculose, analise as afirmativas a seguir:

- I - Recomenda-se, para o diagnóstico, a coleta de duas amostras de escarro.
- II - O material deve ser coletado em potes plásticos descartáveis, com boca larga (50 mm de diâmetro), transparente, com tampa de rosca e capacidade entre 35 e 50 ml.
- III - As amostras devem ser coletadas em local aberto, de preferência ao ar livre ou em sala bem arejada.

Assinale a alternativa correta:

- (A) apenas a afirmativa I está correta;
- (B) apenas a afirmativa II está correta;
- (C) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
- (D) apenas as afirmativas I e III estão corretas;
- (E) todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 42

Sobre a hanseníase, é correto afirmar que:

- (A) a principal via de eliminação do bacilo da hanseníase pelo doente é a pele e é também por esta via que as pessoas que convivem com o doente podem se contaminar;
- (B) a principal via de eliminação do bacilo da hanseníase pelo doente e a mais provável via de entrada deste no organismo são as vias aéreas superiores (mucosa nasal e orofaringe);
- (C) o contato com a pessoa doente e o aparecimento dos primeiros sinais pode levar em média 2 a 5 meses;
- (D) a excessiva oleosidade da pele é uma das manifestações clínicas da hanseníase;
- (E) é uma doença infecciosa e contagiosa causada pelo bacilo Koch.

QUESTÃO 43

Na Estratégia de Saúde da Família, para o atendimento da enfermagem na sala de vacinas, o Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde recomenda vacinar a criança com 3 meses de idade com a vacina:

- (A) BCG;
- (B) meningocócica C;
- (C) tetravalente;
- (D) poliomielite;
- (E) hepatite B.

QUESTÃO 44

Na Atenção Básica, a vacinação do BCG em prematuros com menos de 36 semanas deve ocorrer depois que eles atingem 2 Kg e completarem:

- (A) 10 dias de vida;
- (B) 15 dias de vida;
- (C) 20 dias de vida;
- (D) 25 dias de vida;
- (E) 30 dias de vida.

QUESTÃO 45

A principal contribuição da epidemiologia nas doenças transmissíveis é esclarecer o processo de infecção a fim de desenvolver, implementar e avaliar as medidas de:

- (A) investigação;
- (B) identificação;
- (C) controle;
- (D) notificação;
- (E) divulgação.

QUESTÃO 46

Uma atenção pré-natal, puerperal humanizada se dá com ações que integram todos os níveis da atenção. Deve-se implementar a promoção, prevenção e assistência à saúde da gestante e ao recém-nascido por meio da incorporação de conduta:

- (A) interventiva;
- (B) acolhedora;
- (C) complementar;
- (D) especializada;
- (E) paliativa.

QUESTÃO 47

Na prevenção do câncer de colo de útero, o método de rastreamento de lesões precursoras é o exame citopatológico. Para mulheres que já tiveram atividade sexual, o início da coleta deve ser realizada com a idade de:

- (A) 15 anos;
- (B) 18 anos;
- (C) 20 anos;
- (D) 22 anos;
- (E) 25 anos.

QUESTÃO 48

Na avaliação da vigilância epidemiológica, o atributo que verifica a reação dos participantes frente às questões relativas ao sistema e ao percentual de participação dos indivíduos envolvidos denomina-se:

- (A) sensibilidade;
- (B) aceitabilidade;
- (C) oportunidade;
- (D) representatividade;
- (E) flexibilidade.

QUESTÃO 49

Na Atenção Básica, para o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento na atenção à saúde da criança, cabe ao técnico de enfermagem realizar:

- (A) puericultura;
- (B) acuidade auditiva;
- (C) aferição de pressão arterial;
- (D) censo escolar;
- (E) mobilização social.

QUESTÃO 50

Na Atenção Básica, no trabalho em saúde, qualquer dispositivo como máscara, luva, óculos usado pelo técnico de enfermagem para se proteger contra riscos ambientais denomina-se:

- (A) CAT;
- (B) EPC;
- (C) EPA;
- (D) EPI;
- (E) SAT.

